

EX LIBRIS



IDEA VNIVERSÆ
MEDICINÆ

PRACTICÆ


Libris XII. absoluta.

Editione hac quatuor accessere.

IOH. IONSTONVS Med.D.
Concinnauit.

AMSTELODAMI,

Apud Ludovicum Elzevirium. A. 1648.



Adalberto de Nagy.

Serenissimo ac Potentissimo

PRINCIPI AC DOMINO,

D O M I N O

FRIDERICO GUILJELMO,
MONARCHIONI BRANDENBUR-
GICO, S. R. I. ARCHICAMERA-
RIO & ELECTORI, IN PRUSSIA,
JULIÆ, CLIVIÆ, MONTIUM,
STETINENSIVM, POMERANO-
RUM, CASSUBIORUM, VANDALO-
RUM, NEC NON IN SILESIA, CRO-
SNENSIVM AC CARNOVIEN-
SIVM DUCI, BURGGRAFIO NO-
RIMBERGENSI, PRINCIPI RUGIÆ,
COMITI MARCÆ & RAVENSPUR-
GI, DOMINO RAVENSTEINII,
DOMINO SUO CLEMENTISSIMO.

Serenissime Princeps.



Eu laborem, seu meipsum
spectem, nullum, qui sibi
hoc quicquid est opellæ præ-
ter C. T. pari jure vendica-
re posset, invenio. Nunquam à sum-
morum Principum genio Medicina
abhorruit. Herbis & confectionibus
à se inventis, Juba, Mithridates, Ar-
temisia, nomina sua imposuere. Salo-
mon Ebræorum, Evax Arabum Re-

(a 2)

ges

D E D I C A T I O.

ges, de rebus Medicis scripsere. Impulſu Miramolini Averroës ſuum Colliget; Sultani Babylonii Maimonides ſuos Aphoriſmos; Manſoris Rhazes ſuum Almanforem, compoſuere. Aſclepiades volumina Medica Mithridatis; Eyacis de lapidibus precioſis Tiberius; Andromachi de Theriaca Nero; Alguaziris de calculo Saracenorum Imperator, gratioſè exceperet. Quòd ſi partis illius Medicinæ, quam Spagyricam vocamus, habeatur ratio; in ſummis eam apud Rudolphum Imperatorem, Mauritium Haſſiæ Landgravium, Principes Anhaltinos, & alios fuiſſe deliciis inveniemus. De meipſo hoc dixiſſe ſufficiat, me jufſu ſereniſſimi glorioliſſimæ memoriæ C. T. Parentis, ab Univerſitate Francofurtana ad profefſionem Medicam vocatum, quia necdum per temporum ſævitiã comparère licuit, laborem hunc publico donare voluiſſe: ut, & quanti honorificam illam vocationem faciam; & quan-

D E D I C A T I O.

quantum vel abſens ſtudioſæ in eadem Juventuti prodeſſe cupiam, oftenderem. Cum verò T. C. D E U S ut totius illius terrarum tractus hæredem; ſic Academia Dominum & Patronum eſſe voluerit; meritò ad T. A. ſubſellia deponitur, quicquid eadem debetur.

Pateat itaque, humillimè peto, huic opellæ ad T. C. aditus; mihi ejusdem patrociniũ. Eò plus illa ex T. C. conſpectu æſtimii conſequetur, quò minus ex ſeſe ſplendoris habet. Ergo ſub hujus clypeo deliteſcens, tutus ab omni livore ero, & animoſior ad alia aſſurgam. Sic T. C. cum Sereniſſima Conjuge D E U S, Chriſtiani orbis bono perennare jubeat; & pacem emorienti Germaniæ largiatur clementiſſimè.

Sereniſſ. Ceſſit. T.

Cliens

JOHANNES JONSTONUS *Med. D.*

(a 3)

Præ-

Præfatio ad Lectorem.

DE tribus mihi in hac frontispicio monendus es. studiose Lector: descriptionis nempe causa, structura, & usu. De Causa non est quod multa dicam. Privatis olim usibus concinnatus hic labor. nunc eundem in publica fame Comitium, Francosurtanae Academiæ ad professionem Medicam vocatio protrahit. Per injuriam temporum quia comparere non licuit, quanti & vocationem faciam, & studio Medicinæ ibidem studiosorum promovendi studia flagrem, ostendere volui. Accessere amicorum aliquot monita, qui emolumenta inventuti literariæ ex ejus publicatione pollicebantur: & Trincavellum quidem, Fernelium, Fuchium, Pernumiam, Petræum, Brucellum, Zacutum, egregia præstitisse: eorum tamen quosdam nimis breves, Methodum medendi non attingere; alios signorum prognosticorum nullam vel levem rationem habere: nonnullos in disquisitionibus occupari; aliquos multos morbos non attingere, addebant. Monebant insuper, ne me obreftationum vel calumniarum aliquo abs-terreretur metu paterer. Propriarum virtutum ex-sortes per aliorum obreftationes apud homines similis fortis, fædè inclarescere. Invidos & pa-ribus destitutos bonis, alienam gloriam rodendo, suam famam profluere, &c. De structura breviter hac habeo. Omnium ferè morborum scia-graphiam

PRÆF. AD LECTOREM.

graphiam cum suis signis, causis, differentiis, & curatione, brevi gyro includere placuit, ut superius attractorum diligentia conjungeretur. Inter morbos primum Externis locum esse volui, tum quia à sensu notioribus incipiendum est: tum quia inde Medicina capisse creditur. Chiron inter Medicos primus censetur; inde nomen sortitus, quod Chirurgia peritissimus fuerit. Signa Causis præmissi, ut humani conceptus ordinem in indagando juvarem. Cum hoc vel illud symptoma refertur, in alia signa inquiritur. Cognito affectu, ad Causarum varietatem progredimur. Ad Differentias omnia reducere tentavi, ut & morbus exactius cognosci posset, & diversitas Curationis accuratius exprimeretur. De Authoribus, si queris, ex Danielis Sennerti Medici clarissimi Tomis me olim hanc excerpisse Isagen scito; cujus etiam dispositionem & ordinem in omnibus fere nunc sequor. Cum eo contuli Fernelium, Joëlem, Capivaccium, Lidellium, Aquapendentem, Petræum, Ferdinandum, Fabricium, Martinum, Collutium, Fracastorium, Fallopium, Quercetanum, Zacutum Lusitanum, Alsarium Crucium, Platerum, Septalium, Heurnium, Ferrandum, Höchstetterum, Martinum Untzerum, Mynsichtum, Beckerum, Hartmannum, Stockerum, & alios; quos omnes suis locis citatos invenies. In Medicamentis illa posui, quæ à præstantissimis Medicis

dicis laudari maximè, animadverti. sed nec illa reticui, quæ vel à magnis quibusdam in peregrinatione meâ viris acquisivi; vel in scriniis Matthæi Vechneri, p. m. Archiatri Regii, Medici hæcenus ferè apud nos absque pari, & quod præcipuum est, viri absque fucò, jactantia, & fastu, fœceri mei reperi. In pleraque autem digitorum duntaxat intendi, ut ad eorum Authorum lectionem studiosos incitarem; & ne, si expressissem juvenutis præsumptione nocivâ, illis abutetur. Circa Usum, quisnam ille sit, & quando loco opusculo Studiosus uti debeat, exponendum est. Si prius spectes, introductionem hic in vastos illos Saxoniæ, Mercati, Massariæ, Capivaccii, Rudii, Sennerti, de Corporis humani affectibus commentarios habes. Erit hic labor locorum communium instar, in quos omnia quæ legentur, referri tanquam in Indicem poterunt, sive illa sint à me non attacta, sive ad Correctionem, (errare me facile potuisse credo) augmentum, vel elucidationem faciant. Inserviet Collegiis privatis, quæ in Academiis utramque paginam faciunt; sive illa fuerint Disputatoria, quæ mihi non valde placent; sive Explicatoria spontanea, quæ magis sunt utilia; sive Explicatoria ad interrogationem Collegii, quæ maximè sunt necessaria. Si posterius attendas, nonnisi præmissis institutionibus ad hanc Ideam Medicinæ studio accedendum erit. Has autem cum fructu aggredi poterit, si linguas Latinam, Græcam, Arabi-

cam,

cam, cujus in Avicennæ, & aliorum Arabum scriptis summus est usus, calluerit, & Naturalem Philosophiam cum sua Historia bene excolluerit; & in hæc Fossilium, & Plantarum naturam, cum Corporis humani structurâ excusserit. Illa ex Agricola & Cæsius hauriet. Ista ex Dioscoride, Mathiolo, Dodonæo, & Clusio interim petet, donec nostri Phyticorum libelli (quos Medicinæ studioforum bono paramus) prodierint. Hanc Riolanus, Bauhinus, Spigelius aperient; ad quorum lectionem cum Columbus vel Ludovicus Hortensius preparabit. Institutiones Medicas is felicissimè absolvēt, qui factò à Riolo initio, ad Fernelium, mihi in doctrina de Urina & Pulsibus commendatissimum; & Sennertum in omnibus exquisitum, transibit. Medicamenta simplicia & composita ex Schonbornio & Morello memoriæ mandabit. plantas diligenter illustrabit. pharmacopolia frequentabit. sectiones corporum humanorum visitabit. nec Chymicas operationes (observationes Antonii Billichii Güntheri commendo) negliget. Et hæc sunt, de quibus te monendum volui, studiose Lector. Quod superest, Vos inclytæ Academiæ Francofurtanæ Proceres peramanter obsecro, ut laborem hunc, grati & prompti in Vos animi indicium, boni consulere, & favorem vestrum mihi integrum relinquere velit. Si enim tam gratum Medicinæ apud vos Studiofis cognovero; quàm utilem & proficuum, in pri-

(a 5)

mis

PRÆF. AD LECTOREM.

mis si Manuductor accedat, futurum scio; dabo operam, ne & imposterum quicquam in me desideretur. Da DEUS sidenti in cineribus suis Marchiæ pacem! Academiam pristino vigori restitue. Proceres ejus inter fortuna & dignitatum accessiones, perennare jube. Ut Civium eruditio cum sanctitate morum, tacitis augeat incrementis, & in maximos auctus diffundatur, largire. Sic ex animo voveo. sic fiat!



Præ-

Præfatio in secundam Editionem.

EDITIONEM hanc secundam, quatuor libris auctam, Benevole Lector, partim affectui, quo Medicinæ studiosi in exiguam hanc meam opellam feruntur, debebis; partim Typographi, viri industrii, petitis. Postquam enim illi exemplaria distraxissent, hic urgere non destitit, ut recensitum iterum in publicum protruderem. Fateor equidem, invitum me & quasi reluctantem ad hanc editionem hoc tempore accessisse? Nonnulla enim propter festinationem bene non potuere excoli: haud etiam pauca sunt, in quibus nec ipse quidem mihi satisfacio. Nec erat animus, post primam editionem quicquam in hoc studiorum genere publico dare, præter nervosum, accuratum, singulari Methodo instructum, Medicinæ universæ Syntagma parallelum, in quo jam toti desudamus. Nolui tamen viri amicissimi, & cui propter singularia officia multum debeo, precibus deesse, imprimis, cum Excellentiss. vir D. Johannes Michaëlis, Professor Lipsensis, amicus honoratissimus, qui id honoris huic opellæ dedit, ut eam publicâ cathedrâ dignaretur, de iterata editione diligenter inquiret, eandemque non tantum à studiosa juventute,

ventute, ut innui, sed etiam à viris magnis Lugduni, Francofurti, Noribergæ, &c. cum applausu exceptam fuisse scirem. Dabis itaque facilitati & promptitudini in literatam juventutem & amicos veniam; auctarium boni consules; defectus qui occurrunt, in opere quod paramus resarciri patieris; utque nobis in labore isto strenuè decurrentibus, DEUS benedicere velit, apprecaberis. Obtrectatores & Sy-cophantas, illos inprimis qui omnia quæ sua non sunt improbant, & dum insanum illum Menecratem, qui ob Medicationis successum divinitatem affectabat, æmulantur, alios omnes præ se contemnunt, non magis curo, quàm Luna canum latratum. Vale, benevole Lector, & interim his frue-re, donec exactiora prodierint.

IDEÆ

I D E Æ MEDICINÆ PRACTICÆ GENERALIS

Prolegomena.

LIBER PRIMUS.

De Hygieine.

Titulus I. De Rebus non-naturalibus in genere	5.
Caput I. De rebus non-naturalibus, quæ assumuntur.	
Articulus I. De Aëre.	6.
Artic. II. De cibo.	
Punctum I. De Ciborum differentiis.	12.
Punct. 2. De ciborum generibus.	14.
Punct. 3. De condimentis, Pane & cibi sumendi tem-pore.	35
Artic. III. De potu.	39.
Cap. II. De rebus non-naturalibus, quæ geruntur.	44.
Cap. III. De rebus non-naturalibus extrinsecus ad-hibitis.	50.
Cap. IV. De rebus non naturalibus, quæ excernun-tur & retinentur.	53.
Titulus II. De methodo tuendæ sanitatis.	
Cap. I. De tuenda sanitate, in genere.	54.
Cap. II. De tuenda sanitate, in specie; & primò, de parte iussuæ.	
Art. I. De tuenda Benehaborum sanitate.	
Punct. I. De tuenda sanitate infantum, puerorum & puberum.	57.
Punct. 2. De sanitate media ætatis tuenda.	59.
Punct. 3. De sanitate senum tuenda.	65.
Art. II.	

I N D E X.

Art. II. De sanitae Intemperatum tuenda. 66.

LIBER SECUNDUS.

De affectibus humani corporis praternaturalibus,
& eorum signis.

P Rolegomena. 69.

Tit. I. De Morbo genere.

Cap. I. De Morbi natura. ibidem.

Cap. II. De Morbi signis diagnosticis. 74.

Cap. III. De Morbi eventu. 80.

Tit. II. De causis Morborum.

Cap. I. De causis morborum internis in genere. 93.

Cap. II. De causis morborum internis in specie.

Art. I. De Humoribus.

Punct. I. De humoribus quantitate peccantibus, seu
Plethora. 94.

Punct. 2. De humoribus qualitate peccantibus, seu
Cacoehymia. 95.

Punct. 3. De humoribus motu, loco, & tota substan-
tia peccantibus. 98.

Art. II. De flatibus. 100.

Art. III. De rebus toto genere prater naturam. 101.

Titulus III. De Symptomatibus. 102.

LIBER TERTIUS.

De Medicamentis.

T It. I. De Medicamentis in genere. 103.

Tit. II. De Medicamentis in specie, & ipso-
rum Differentiis.

Cap. I. De Medicamentis simplicibus.

Art. I. De fossilibus. 107.

Art. 2. De medicamentis vegetabilibus. 111.

Art. 3. De medicamentis animalibus. 120.

Art. 4. De medicamentis microcosmicis. 123.

Cap. II. De medicamentis compositis naturalibus.

Art. I.

I N D E X.

Art. I. De Acidulis. ibid.

Art. 2. De Thermis. 127.

Cap. III. De medicamentis compositis artificialibus
in genere. 129.

Cap. IV. De medicamentis compositis artificialibus
in specie.

Art. I. De medicamentis internis.

Punct. 1. De medicamentis internis fluidis. 133.

Punct. 2. De medicamentis internis solidis. 137.

Punct. 3. De medicamentis internis mediis. 141.

Art. II. De medicamentis externis.

Punct. 1. De medicamentis externis fluidis. 144.

Punct. 2. De medicamentis externis solidis. 147.

Punct. 3. De medicamentis externis mediis. 149.

Punct. 4. De medicamentis externis indifferentibus.

Cap. V. De medicamentis à facultatibus denomi-
natis. 151.

Art. I. De medicamentis alterantibus.

Punct. 1. De medicamentis calidis. 153.

Punct. 2. De medicamentis frigidis. 156.

Punct. 3. De medicamentis humidis. 157.

Punct. 4. De medicamentis siccis. ibidem

Punct. 5. De medicamentis digerentibus, emollienti-
bus, indurantibus, & laxantibus. 159.

Punct. 6. De medicamentis rarefacientibus & con-
densantibus, stegnoticis & anastomaticis. 160.

Punct. 7. De medicamentis attenuantibus, aperien-
tibus, & incrassantibus. 162.

Punct. 8. De medicamentis Emplastis & ephra-
cticis, seu de obstruentibus. 163.

Punct. 9. De Anodynis, & Narcoticis. 164.

Art. II. De medicamentis motum conciliantibus. 165.

Art. III. De medicamentis aliquid generantibus.

Punct. 1. De maturantibus, Pus morventibus &
Sarcoticis. 167.

Punct. 2.

INDEX.

Punct. 2. De glutinantibus, & Cicatricem inducentibus.	168.
Punct. 3. De Lactificis & Seminificis.	169.
Art. IV. De medicamentis corrumpentibus.	ibid.
Art. V. De medicamentis aliquid auferentibus.	
Punct. 1. De Medicamentis purgantibus.	171.
Punct. 2. De Vomitoriis, & Diureticis.	176.
Punct. 3. De Hydroticis, & Diaphoreticis.	177.
Punct. 4. De medicamentis Cerebrum purgantibus.	178.
Punct. 5. De Expectorantibus.	179.
Cap. VI. De Medicamentis à partibus denominatis.	
Art. I. De medicamentis Cephalicis.	
Punct. 1. De medicamentis Cephalicis calefacientibus.	179.
Punct. 2. De medicamentis Cephalicis externis.	180.
Art. II. De Medicamentis Ophthalmicis.	181.
Art. III. De Medicamentis Thoracicis.	
Punctum 1. De Thoracicis calefacientibus.	182.
Punct. 2. De Thoracicis refrigerantibus.	184.
Art. IV. De medicamentis Cardiacis.	
Punct. 1. De Cardiacis calefacientibus.	185.
Punct. 2. De Cardiacis refrigerantibus.	186.
Art. V. De Medicamentis Stomachicis.	
Punct. 1. De Stomachicis calefacientibus.	187.
Punct. 2. De Stomachicis refrigerantibus.	188.
Art. VI. De Medicamentis Epaticis.	
Punct. 1. De Epaticis calefacientibus.	189.
Punct. 2. De Epaticis refrigerantibus.	190.
Art. VII. De Medicamentis Splenicis.	
Punct. 1. De Splenicis calefacientibus.	191.
Punct. 2. De Splenicis refrigerantibus.	192.
Art. VIII. De Medicamentis Nephriticis.	
Punct. 1. De Nephriticis calefacientibus.	193.
Punct. 2. De Nephriticis refrigerantibus.	194.
Art. IX.	

INDEX.

Art. IX. De Medicamentis Vterinis.	
Punct. 1. De Vterinis calefacientibus.	195.
Punct. 2. De Vterinis refrigerantibus.	196.
Cap. VII. De Medicamentis vegetabilibus planetariis.	ibid.

LIBER QUARTUS.

De Methodo medendi.

Tit. I. De methodo medendi in genere.	199.
Tit. II. De methodo medendi in specie.	
Cap. I. De methodo ἀφαιρέσεως.	201.
Cap. II. De methodo ἀφαιρέσεως in genere.	203.
Cap. III. De methodo ἀφαιρέσεως in specie, & primo de ἀφαιρέσει Causarum.	
Art. I. De ἀφαιρέσει causarum quantitate peccantium.	206.
Art. II. De ἀφαιρέσει causarum qualitate peccantium.	
Punct. 1. De Alteratione.	209.
Punct. 2. De Purgatione.	210.
Punct. 3. De Diuresi, Vomitione, & Sudatione.	216.
Art. III. De ἀφαιρέσει Causarum motu peccantium.	
Punct. I. De Revulsione & Repulsione.	218.
Punct. 2. De Derivatione, & Interceptione.	220.
Art. IV. De ἀφαιρέσει Causarum loco peccantium.	
Punct. 1. De Emolitione, & Discussione.	222.
Punct. 2. De Suppuratione, & Attractione.	223.
Art. V. De ἀφαιρέσει flatuum, seu Carminatione.	224.

LIBER V.

De Αφαιρέσει MORBORVM.

Tit. I. De Morbis partium similium, & eorum curatione.	
--	--

(b)

Cap. 2.

I N D E X.

Cap. I. De morbo intemperiei sine materia.	225.
Cap. II. De morbo intemperiei cum materia.	227.
Cap. III. De Morbis occultarum qualitatum.	230.
Tit. II. De morbis organicis.	
Cap. I. De morbis conformationis.	232.
Art. I. De morbis Figura.	ibid.
Art. II. De morbis Cavitationum.	
Punctum 1. De morbis Cavitationum in excessu.	233.
Punct. 2. De morbis Cavitationum in defectu.	235.
Art. III. De morbis Superficie.	237.
Cap. II. De morbis Numeri.	238.
Cap. III. De morbis Magnitudinis.	
Art. I. De Tumoribus.	239.
Punct. 1. De Abscessu.	242.
Punct. 2. De Sinu.	244.
Art. II. De morbis magnitudinis imminuta.	245.
Cap. IV. De morbis Situs.	ibid.
Art. I. De Luxatione.	246.
Tit. III. De morbis solutæ unitatis.	247.
Cap. I. De ulceribus.	248.
Cap. II. De Vulneribus.	254.
Cap. III. De Fracturis.	259.
Tit. IV. De Symptomatibus, & eorum causis.	262.
Cap. Vnicum. De Dolore in genere.	263.

LIBER VI.

DE MORBIS EXTERNIS.

Tit. I. De Tumoribus in specie.	265.
Cap. I. De Tumoribus à sanguine ortis.	
Art. I. De Corpulentia nimia.	266.
Art. II. De Inflammatione.	267.
Art. III. De Bubone.	269.
Art. IV. De Phygello, Phymate, Furunculo.	270.
Art. V. De Parotide.	ibid.
Art. VI.	

I N D E X.

Art. VI. De Paronychia & Pernionibus.	271.
Art. VII. De Ecchymomate.	272.
Art. VIII. De Carbunculo.	273.
Cap. II. De Tumoribus à bile ortis.	
Art. I. De Erysipellate.	275.
Art. II. De Herpete.	276.
Cap. III. De Tumoribus à pituita exortis.	
Art. Vnus. De Oedemate.	277.
Cap. IV. De Tumoribus ab humore melancholico.	
Art. I. De Scirrhus.	278.
Art. II. De Cancro.	279.
Cap. V. De Tumoribus ab humoribus serosis, salsis, & biliosis, inter se mixtis.	
Art. I. De Scabie.	281.
Art. II. De Phlyctenis, Sudaminibus, Sironibus, & varis.	283.
Art. III. De Epinyctidibus, Alpho, & Leuce.	284.
Art. IV. De Impetigine & Gutta rosacea.	285.
Cap. VI. De Tumoribus, in quibus humor peculiari membrana concluditur.	286.
Cap. VII. De Tumoribus à solida substantia.	287.
Cap. VIII. De Tumoribus à partibus solidis aliis incumbentibus.	
Art. Vn. De Aneurismate, Varice, & Elephantiasi Arabum.	288.
Cap. IX. De Tumoribus malignis.	
Art. Vnicus. De Elephantiasi.	290.
Tit. II. De Cutis affectibus.	
Cap. I. De Lentiginibus, Ephelidibus, Nevus matris, & Maculis infantum.	292.
Cap. II. De Maculis hepaticis, Pruritu, & malo odore.	293.
Tit. III. De Capillorum vitiiis.	
Cap. I. De Capillorum casu.	294.
Cap. II. De Porrigine & Plica.	297.
Tit. IV. De Ulceribus in specie.	

I N D E X.

Cap. I. De Gangrana.	298.
Cap. II. De Sphacelo.	300.
Cap. III. De Combustionibus.	301.
Tit. V. De Luxationibus in specie.	
Cap. I. De Luxationibus Mandibula, clavicula & Vertebrae.	303.
Cap. II. De Luxatione humeri, cubiti, radii & Digitorum.	305.
Cap. III. De luxationibus Femoris, Genu, Tali.	307.
Tit. VI. De Fracturis in specie.	
Cap. I. De fracturis ossium frequentioribus.	308.
Cap. II. De fracturis manus frequentibus.	309.

LIBER VII.

DE FEBRIBVS.

Tit. I. De Febribus in genere.	311.
Tit. II. De Febribus non putridis.	
Cap. I. De Febre Ephemera.	313.
Cap. II. De Syncho simplici.	315.
Tit. III. De Febribus putridis in genere.	316.
Cap. I. De Febribus putridis continentibus.	
Art. I. De Syncho putrida.	319.
Art. II. De Causo.	321.
Cap. II. De Febre continua periodica in genere.	323.
Art. I. De Febre continua primaria.	
Punct. I. De Febre Continua tertiana.	324.
Punct. II. De Febre continua quotidiana.	325.
Punct. III. De Febre continua quartana.	327.
Art. II. De Febre continua symptomatice.	328.
Cap. III. De Febre intermittente in genere.	329.
Art. I. De Tertiana intermittente.	331.
Art. II. De Quotidiana intermittente.	335.
Art. III. De Quartana intermittente.	337.
Art. IV. De Febribus compositis, & Semitertiana.	339.
Tit. IV.	

I N D E X.

Tit. IV. De Febre Hectica.	341.
Tit. V. De Febribus malignis.	
Cap. I. De Febribus malignis in genere.	344.
Cap. II. De Febribus malignis in specie.	
Art. I. De Variolis.	346.
Art. II. De Morbillis, & similibus exanthematibus.	348.
Art. III. De Febre Petechiali.	349.
Art. IV. De Morbo Hungarico.	351.
Art. V. De Sudore Angelico, Febre maligna cum spasma, & febre maligna cum tussi & catarrho.	352.
Tit. De Febribus pestilentibus.	353.
Cap. Vnicum. De Pestilentia.	355.

LIBER VIII.

DE MORBIS CAPITIS.

Tit. I. De morbis Cerebri.	
Cap. I. De intemperie cerebri sine materia.	359.
Cap. II. De intemperie Cerebri cum materia.	362.
Cap. III. De meatuum Cerebri angustia.	367.
Cap. IV. De Commotione Cerebri.	369.
Cap. V. De inflammatione Cerebri.	370.
Cap. VI. De Hydrocephalo.	372.
Cap. VII. De contusione capitis.	ibid.
Cap. VIII. De vulneribus capitis.	
Art. I. De vulnere cutis & pericranii.	374.
Art. II. De vulnere seu fractura cranii.	375.
Art. III. De cranii fractura cum meningum lisione.	377.
Tit. II. De Symptomatibus Cerebri.	
Cap. I. De symptomatibus sensuum externorum.	378.
Art. Vnicus. De Cephalalgia, seu dolore capitis.	ibidem.
Cap. II.	

I N D E X.

Cap. II. De symptomatibus sensus communis.	
Art. I. De Vigilis nimis.	382.
Art. II. De Comate somnolento, seu Cataphora.	383.
Cap. III. De symptomatibus Imaginationis.	
Art. unicus. De Vertigine.	385.
Cap. IV. De symptomatibus imaginationis & ratiocinationis lesa.	338.
Art. I. De Memoria lesione.	ibid.
Art. II. De Delirio.	389.
Art. III. De Phrenitide.	391.
Art. IV. De Melancholia.	ibid.
Art. V. De Mania.	395.
Art. VI. De Rabie.	397.
Cap. V. De symptomatibus plurium sensuum inter- norum.	
Art. I. De Comate Vigili.	399.
Art. II. De Lethargo.	ibid.
Cap. VI. De Symptomatibus motus animalis.	
Art. I. De Lassitudine.	402.
Art. II. De Inquietudine.	403.
Art. III. De Rigore.	404.
Art. IV. De Tremore.	405.
Art. V. De Paralyfi.	407.
Art. VI. De Spasmo, seu Convulsione.	409.
Cap. VII. De symptomatibus sensus internos, ratio- cinationem & motum, cum sensibus externis si- mul lesentibus.	
Art. I. De Incubo & Catalepsi.	412.
Art. II. De Epilepsia.	414.
Art. III. De Caro.	419.
Art. IV. De Apoplexia.	420.
Cap. VIII. De symptomatibus Excretorum.	
Art. unicus. De Catarrho.	413.
Tit. III. De Oculorum morbis.	
Cap. I. De Palpebrarum affectibus.	426.
Cap. II. De Ciliorum vitiis.	429.
Cap. III.	

I N D E X.

Cap. III. De Carnis angularis vitiis.	430.
Cap. IV. De Tunica annata morbis.	
Art. I. De Ophthalmia.	431.
Art. II. De Vngue oculi, Panno, & Hypophagmate.	433.
Cap. V. De morbis Corneae.	
Art. I. De Crassitie, Nebula & Albugine.	436.
Art. II. De Pusulis & Ulceribus Corneae.	437.
Art. III. De Vulneribus Corneae, & Dolore oculo- rum.	438.
Cap. VI. De Vvae morbis.	
Art. I. De Vvae procidentia, Pupilla dilatatione, & angustia.	439.
Art. II. De Suffusione.	440.
Cap. VII. De Humoribus in oculis vitiis.	442.
Cap. VIII. De morbis oculi globum infestantibus.	
	444.
Tit. IV. De Aurium morbis.	445.
Tit. V. De aurium symptomatibus.	
Cap. I. De Dolore, & Surditate.	447.
Cap. II. De Aurium tinnitu, & Obauditione.	449.
Tit. VI. De Narium morbis & symptomatibus.	
Cap. I. De Ulceribus narium, Ozena, & Polypo.	450.
Cap. II. De Hemorrhagia narium.	452.
Cap. III. De Olfactus lesione, Gravedine & Ster- nutatione.	455.
Tit. VII. De Linguae morbis & symptomatibus.	
	456.
Tit. VIII. De morbis & symptomatibus labiorum.	
	459.
Tit. IX. De Faciei morbis & Symptomatibus.	
Cap. I. De Oris apertione, hiatu & oscitatione.	460.
Cap. II. De Oris tortura.	462.
Cap. III. De Pryalismis.	463.
Tit. X. De Oris affectibus.	
Cap. I. De Aphthis.	465.
Cap. II.	

I N D E X.

Cap. II. De fœtore Oris.	466.
Tit. XI. De morbis & symptomatibus Dentium.	
Cap. I. De morbis Dentium.	
Art. I. De Dentium corrosione.	467.
Art. II. De Dentium mobilitate.	468.
Cap. II. De Dentium symptomatibus.	
Art. I. De Odontalgia.	469.
Art. II. De Stupore, Stridore, & Nigredine dentium.	472.
Tit. XII. De Gingivarum affectibus.	473.
Tit. XIII. De Maxillarum affectibus.	474.
Tit. XIV. De Gurgulionis affectibus.	475.
Tit. XV. De Tonsillarum affectibus.	476.

LIBER IX.

DE MORBIS MEDII VENTRIS.

Tit. I. De morbis Faucium, seu Angina.	478.
Tit. II. De morbis Gutturis.	
Cap. Vnicum. De Strumis & Bronchocele.	
Tit. III. De Asperæ arteriæ morbis.	484.
Tit. IV. De Pulmonis morbis.	
Cap. I. De Pulmonis intemperie.	485.
Cap. II. De Peripneumonia.	487.
Cap. III. De Pulmonis angustia.	489.
Cap. IV. De Pulmonis vulneribus.	492.
Cap. V. De Pulmonis ulcere, seu phthisi.	493.
Tit. V. De morbis Thoracis.	
Cap. I. De Mediastini inflammatione, & Diaphragmatis tumoribus.	497.
Cap. II. De Pleuritide.	498.
Cap. III. De Empyemate.	502.
Cap. IV. De Tabæ & Vermibus dorsi.	503.
Tit. VI. De symptomatibus Pulmonum & Thoracis.	

Cap. I.

I N D E X.

Cap. I. De vitis Respirationis.	504.
Cap. II. De Asthmate.	505.
Cap. III. De Tussi.	508.
Cap. IV. De Hæmoptysi.	510.
Tit. VII. De Cordis affectibus.	
Cap. I. De palpitacione Cordis.	512.
Cap. II. De Animi deliquio.	514.
Tit. VIII. De Mammillarum affectibus.	
Cap. I. De Mammillarum morbis.	
Art. I. De Tumoribus.	517.
Art. II. De Cancro & magnitudine Mammarum.	519.
Cap. II. De symptomatibus Mammarum.	
Art. I. De Lactis defectu, redundantia, & coagulatione.	520.

LIBER X.

DE Morbis infimi ventris.

Tit. I. De affectibus OEsophagi.	
Cap. I. De Morbis OEsophagi.	
Articulus I. De OEsophagi intemperie & tumore.	522.
Art. II. De OEsophagi angustia, Vulnere & ulcere.	524.
Cap. II. De OEsophagi symptomatibus.	525.
Tit. II. De affectibus Ventriculi.	
Cap. I. De Morbis ventriculi.	ibid.
Art. I. De intemperie Ventriculi in genere.	526.
Art. II. De intemperie Ventriculi sine materia.	ibidem.
Art. III. De intemperie Ventriculi, cum materia.	528.
Art. IV. De Tumoribus Ventriculi.	530.
Articulus V. De Vulneribus & ulceribus Ventriculi.	532.
Cap. II.	

(b 5)

I N D E X.

Cap. II. De Ventriculi symptomatibus.	
Art. I. De Dolore & Ardore Ventriculi.	533.
Art. II. De Anorexia.	535.
Art. III. De nimia Appetentia.	538.
Art. IV. De Appetitu depravato, seu Pica.	539.
Art. V. De nimia siti.	540.
Art. VI. De Coctionis seu Chyloleos lesione.	541.
Art. VII. De singultu.	544.
Art. VIII. De Ructu, & Rugitu.	545.
Art. IX. De Nausea & Vomitu.	547.
Art. X. De Cholera.	550.
Tit. III. De affectibus Intestinatorum.	
Cap. I. De morbis Intestinatorum.	552.
Art. I. De inflammatione intestinatorum.	ibid.
Art. II. De intestinatorum angustia.	553.
Art. III. De Vermibus.	554.
Art. IV. De Hernia intestinali.	557.
Art. V. De Ani procidentia ac Vulneribus, ac ulceribus Intestinatorum.	559.
Cap. II. De symptomatibus intestinatorum.	
Art. I. De Iliaca passione.	560.
Art. II. De Coliaca.	563.
Art. III. De Alvi retentione.	567.
Art. IV. De Alvi fluxu.	
Punct. I. De Lienteria, & Caliac.	568.
Punct. 2. De Diarrhoea.	571.
Punct. 3. De Dysenteria.	576.
Punct. 4. De Fluxu alvi sanguineo & Epatico.	582.
Tit. IV. De Recti intestini affectibus.	
Cap. I. De intestini recti morbis.	584.
Cap. II. De Recti intestini symptomatibus.	
Art. I. De Pruritu & Tenesmo.	586.
Art. II. De Hamorrhoidum fluxu, & suppressione.	587.
Tit. V. De Mesenterii affectibus.	
Cap. I. De Mesenterii intemperie & Obstructione.	590.
Cap. II.	

I N D E X.

Cap. II. De Mesenterii inflammatione, & Abscessibus.	592.
Cap. III. De Mesenterii dolore, & Omenti ac Pancreatis affectibus.	594.
Tit. VI. De Epatis affectibus.	
Cap. I. De Epatis morbis.	
Art. I. De Epatis intemperie.	596.
Art. II. De Epatis obstructione.	599.
Art. III. De Epatis inflammatione.	602.
Art. IV. De Epatis scirrho.	605.
Art. V. De Vulneribus & Viceribus Epatis.	607.
Cap. II. De Epatis symptomatibus.	
Art. I. De imbecillitate Epatis.	608.
Art. II. De Cachexia.	609.
Art. III. De Hydroke in genere.	611.
Art. IV. De Ascite.	612.
Art. V. De Tympanite, & Anasarca.	616.
Art. VI. De Ictero.	618.
Art. VII. De Atrophia.	620.
Tit. VII. De Lienis affectibus.	
Cap. I. De Lienis morbis.	
Art. I. De Lienis obstructionibus.	
Art. II. De Lienis inflammatione, & Scirrho.	623.
Art. III. De Ulcere & Vulnere Lienis.	625.
Cap. II. De symptomatibus Lienis.	
Art. I. De Dolore Lienis & Ictero nigro.	626.
Art. II. De affectione hypochondriaca.	ibid.
Art. III. De Scorbuto.	632.
Tit. VIII. De Renum affectibus.	
Cap. I. De Renum morbis.	
Art. I. De Renum angustia.	641.
Art. II. De Renum inflammatione.	643.
Art. III. De Calculo Renum.	645.
Art. IV. De Ulcere & Vulnere Renum.	648.
Cap. II. De Renum symptomatibus.	649.
Tit. IX. De Vesicæ affectibus.	
Cap. I.	

I N D E X.

Cap. I. De Vesica morbis.	
Art. I. De Vesica calculo.	650.
Art. II. De Vesica Inflammatione, Scabie, ulcere, & fistula.	652.
Art. III. De Meatus urinarii angustia.	654.
Cap. II. De Vesica symptomatibus.	
Art. I. De Incontinentia Urinae.	655.
Art. II. De Diabete.	656.
Art. III. De Ischuria.	658.
Art. IV. De Stranguria.	660.
Art. V. De Dysuria.	661.
Art. VI. De Mictus cruento, purulento & pilari.	663.
Tit. X. De partium genitalium in viris affectibus.	
Cap. I. De earundem morbis.	
Art. I. De morbis Testium.	665.
Art. II. De morbis Scroti.	666.
Art. III. De morbis Virgæ.	669.
Cap. II. De membrorum genitalium in viris symptomatibus.	
Art. I. De lasa seminis generatione, & Virgæ erectione.	670.
Art. II. De Salacitate, Priapismo, & Satyriasi.	672.
Art. III. De Gonorrhœa.	673.
Tit. XI. De partium genitalium in fœminis morbis.	
Cap. I. De morbis Cervicis uteri.	
Art. I. De Tentigine & Cauda.	675.
Art. II. De Cervicis uteri angustia.	676.
Art. III. De Vteri pustulis, condylomatibus & hæmorrhoidibus.	678.
Art. IV. De Cervicis uteri Ulceribus.	680.
Cap. II. De morbis Vteri.	
Art. I. De intemperie uteri.	682.
Art. II. De vasorum Vteri angustia.	685.
Art. III. De Vteri inflatione.	686.
Art. IV. De inflammatione Vteri.	688.
Art. V. De scirrho uteri.	690.
Art. VI.	

I N D E X.

Art. VI. De Hydropè Vteri.	691.
Art. VII. De Vteri procidentia.	692.
Art. VIII. De Vteri adscensu, vulncribus & ulceribus.	694.
Tit. XII. De symptomatibus Uteri.	
Cap. I. De symptomatibus communibus.	
Art. I. De uteri imbecillitate.	695.
Art. II. De Vteri dolore.	697.
Art. III. De Mensium suppressione.	698.
Art. IV. De Mensium stillicidio & difficultate.	701.
Art. V. De Mensium decoloratione.	703.
Art. VI. De Mensium inordinato fluxu.	704.
Art. VII. De nimio Mensium fluxu.	706.
Art. VIII. De fluore muliebri & Gonorrhœa.	708.
Cap. II. De symptomatibus extra conjugium viventibus magis familiaribus.	
Art. I. De Morbo virgineo.	711.
Art. II. De suffocatione Vteri.	712.
Art. III. De furore uterino, & Melancholia mulierum.	716.
Cap. III. De symptomatibus Conjugatis propriis.	
Art. I. De symptomatibus circa conceptionem.	
Punct. I. De sterilitate.	717.
Punct. II. De Mola.	720.
Art. II. De symptomatibus Gravidarum.	721.
Art. III. De symptomatibus circa partum.	724.
Tit. XIII. De Abdominis affectibus.	
Cap. unicum. De Hernia umbilicali, & Musculorum abdominis inflammatione.	
Appendix. De Arthritide.	

I N D E X.

L I B E R X I.


D E M o r b i s V e n e n a t i s.

T It. I. De Lue Venerea.	733.
Tit. II. De Venenis.	
<i>Cap. I. De Venenis fossilibus.</i>	740.
<i>Cap. II. De Venenis vegetabilibus.</i>	741.
<i>Cap. III. De Venenis animalibus.</i>	742.

L I B E R X I I.

D E M O R B I S P V E R O R V M.

T It. I. De morbis Capitis.	744.
Tit. II. De morbis medii Ventris.	747.
Tit. III. De morbis infimi Ventris.	748.
<i>Concluso.</i>	751.



I D E Æ
 MEDICINÆ PRACTICÆ
 G E N E R A L I S

PROLEGOMENA.

Medicina practica est ars, sanitatem
 humani corporis, quantum possibile
 est, presentem conservandi, amif-
 sam instaurandi.

I. Practicam voco, non quòd aliqua sit
 Theorica; tota enim Medicina operationi
 destinatur: sed quod hæc operationem im-
 mediatè respiciat; illa verò quæ Theorica
 dicitur, per se ad opus non tendat, sed po-
 tiùs cognitione suâ Practicæ inserviat.

II. Ars est, tum quia *ποιῶν* pro fine ha-
 bet: tum quia de objecto suo, corpore hu-
 mano, non ut id cognoscat, sed ut medea-
 tur, agit. Est autem Ars omnium artium ἐπι-
 φανεστάτη, præclarissima: sed ἀλλὰ τὴν ἀμείνους τῶν τε
 ἡγεμονίων αὐτῇ, καὶ τὴν εἰς τὰς τοιαύτας κεινόντων, pro-
 pter ignorantiam, & eorum qui eam exercent,
 & eorum qui temere hos judicant, infima. Soli
 namque Medicinæ nulla pœna in Rebusp.
 statuta est, præterquam ignominia, quæ,
 καὶ παλαιότερὸν τὰς ἐξ αὐτῆς συγχεμένους, non ledit eos
 qui ex ipsa constati sunt; ut Hippocrates in
 lege loquitur. Ad ipsius ergo acquisitionem

tria necessariò requiruntur. I. *Natura*. Nam Φύσις ἀντιπαρδείσης κενεὰ πᾶσι, *natura repugnante irrita sunt omnia*. Φύσις δὲ εἰς τὸ ἀριστὸν ὁδηγέσης διδασκαλὴ τέχνης γίνεται, *eam viam ad optima commonstrante, artis Doctrina contingit*.

II. *Doctrina*, illaque à puero, quod καθ' ὥσιν, opportuno tempore, oporteat semina εἰς τὴν ἀρετὴν πείσθαι, *terra committere*. Hac comprehendendo omnium eorum notitiam, quæ vel Medicinam constituunt, vel eidem ancillantur; sive sint linguæ, sive disciplinæ philosophicæ. *Methodum* aperuit D. Kyperus. habemus & nos quædam in præfatione. Authores in Lindano de scriptis medicis invenies; sufficiunt tamen illi quos Kyperus produxit. III. *Exercitatio multi temporis*, coque diligentior, quo certius, duobus cruribus, *Ratione* nempe & *Experientiâ* Medicinam niti; & impossibile esse, κατ' ἐξουσίαν ἐν αὐτῇ σὺ φερεῖς γένεσθαι, id est, *in ea doctrinam firmam tradi non posse*. Sic κατ' ἐξουσίαν ἐμφυσιᾶς εἶσαι, disciplina in naturam versa ac veluti ingenerata, feliciter & copiosè fructus suos proferet: & ἀπὸ τῆς κακῆς θησαυρός, καὶ κακὸν κειμήλιον τοῖσιν ἔχουσιν αὐτήν, καὶ ὅσοι καὶ ὕπαιρ, δὲ θημίσσῃ καὶ δόξουσιν ἀμείβεσθαι, δειλίσσῃ καὶ θρασυτέλει πρὸς τὴν, hoc est, *imperitia malus thesaurus, & infelix opulencia, his qui eam possident, tum opinione ipsâ, tum revera tranquillitatis animi, & letitiæ expers, timiditatis & ignorantia nutrix, exulabit*.

III. Ob-

III. *Objectum Medicinæ practicæ* est corpus humanum vivens, non quidem in se, sed in ordine ad finem, quatenus nempe medicabile est. Necessaria autem ejusdem Medico cognitio, tum quoad *Res naturales*, Temperamentum nempe, Partes tam similes quàm dissimiles; Humores tam alimentales, quàm excrementitios, seu hi sint prolis causa, seu simpliciter tales, seu aliquando corpori utiles; Spiritus tam insitos, quàm influentes; facultates denique & actiones, tam naturales, quàm vitales & animales: tum quoad *Res naturalibus annexas*, sexum nempe, ætatem, corporis colorem, ejusdem habitudinem (undecim istius sunt species, Quadratus habitus, Carnositas, Extenuatio, Pinguitudo, Macies, Succulentia, Marcor, Proceritas, Parvitas, Crassitudo, & Gracilitas) & consuetudinem. Causas in sequentibus sparsim habebis.

IV. *Finis Medicinæ practicæ* est *Sanitas*, quæ nihil aliud est quàm corporis humani, eas quæ secundum naturam sunt, actiones exercendi potentia, à partium omnium naturali constitutione dependens, ita ut ea non in constitutione essentiali, quæ immutabilis est, quàm diu homo vivit, quia anima nec lædi nec labefactari potest; sed in accidentali, quæ varias mutationes sortitur tam ratione partium similiarum, quàm dis-

familiarium consistat; latitudinem certam habeat; ita ut unus homo perfectius actiones exerceat quam alter; & Neutri idè dicantur, quod ab optima sanitate desleant.

V. *Subiectum est Medicus, Non Methodicus*, qui paucis generalibus regulis contentus, experientiae omnem derogat fidem. Nec *Empiricus*, qui soli experientiae innititur. Nec *purus Paracelsista*, qui Theophrastum Paracelsum sequutus, omnia ferè in medicina ex sale, sulphure, & Mercurio deducit, & veterem Medicinam planè rejicit. Sed *Dogmaticus & Rationalis*, qui rationem cum experientia jungit, seu simpliciter Græcos & Arabes (de quibus Neumanum in Historia Medicorum consule) sequatur; seu Dogmaticam medicinam Spagyricam prudenter jungat: quod plerosque nunc facere video. Lege de hisce *Sennerti de consensu & dissensu Chymicorum cum Galenicis opus*. Quid in eo præter accuratam Medicinæ notitiam requiratur, haurire tum ex Hippocrate de Decoro habitu, & aliis primæ sectionis scriptis, tum ex *Septalii Animadversionibus Medicis*, & *Zacuti Praxi Historiarum poteris*. Posui & ego in Epilogo præcipua.

VI. *Partes Medicinæ Practicæ sunt duæ: Hygieine, de sanitate in quantum possibile est tuenda; & Therapeutice, de eadem collapsa instauranda.*

IDEÆ

I D E Æ

MEDICINÆ PRACTICÆ.

LIBER PRIMUS.

De Hygieine.

TITULUS I.

De Rebus non naturalibus in genere.



Hygieine est pars medicinae practicae modum sanitatem, per rerum non naturalium administrationem tuendi, præscribens.

Res non naturales illas vocamus, quæ, etsi in naturalium censu sint, imò necessarium ad tuendam sanitatem si adest, tum ad recuperandam si abest, requiruntur; corporis tamen viventis essentiam, sive naturam non constituunt: quinimo corpus humanum afficiunt, illiusque sanitatem lædere possunt. Unde Salubrium & Insalubrium titulum à quibusdam accepere.

Præscriptio duabus partibus absolvitur. I. *Prima* Res non naturales recenset, & quomodo corpus humanum afficiant, exponit. *Diæticam* communiter vocant. *Alteræ*, Methodum sanitatis tuendæ, seu quomodo rebus non naturalibus, ne corpus humanum lædant, utendum sit, aperit.

Rerum Non-naturalium quatuor sunt classes. I. Illa quæ assumuntur, continet. II. Ea quæ geruntur. III. Ea quæ foris corpori adveniunt. IV. Ea quæ excernuntur, complectitur.

CAPUT I.

De Rebus Non-naturalibus, quæ assumuntur.

ARTICULUS I.

De Aere.

Res Non naturales quæ assumuntur, sunt Aër, Cibus, & Potus.

Aër est res non naturalis, corpus humanum ambiens, eique se per certos meatus insinuans.

Quatuor de eo observanda. I. *Necessarium ad sanitatem esse.* II. *Corpus humanum afficere.* III. *Differentias varias habere.* IV. *Mutationibus variis obnoxium esse.*

I. *Necessarium ad sanitatem esse*, & quidem ita, ut si quis *ἢ τῷ πνεύματι εἰς τὸ σῶμα διεξόδῳ* interceptat, eidem exigua diei parte pereundum sit, vel ex eo pater, quod nisi cor refrigeraretur, nisi ignis internus ventilaretur & excitaretur, nisi Spiritus regenerarentur, homo actiones suas exercere non posset. Aër verò idē in pulmonibus attrahitur, ut Cor contemperet: idem calorem internum motu suo tanquam flabello ventilat, ut non modò tepescat, sed & excitetur: idem denique ab asperis arteriis extrinsecus attractus, in pulmonis carne primum, mox in corde & arteriis, iis maximè, quæ in plexu sunt reteformi, ultimò ac perfectissimè in cerebri ventriculis, confectus, Spiritus suâ substantiâ generat.

II. *Corpus humanum afficit dupliciter.* I. Quatenus ipsum seu nudum seu vestitum ambit. II. Quatenus eidem se insinuat, seu per inspirationem, quæ fit vel ore, *ἢ ἐκ τῆς ἀπὸ τοῦ ὕδατος καὶ ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ ἀπὸ τοῦ πνεύματος*: vel Arteriis, *ἢ ἀπὸ τοῦ αἵματος καὶ ἀπὸ τοῦ πνεύματος*: seu per transpirationem, quæ fit per cutem universam, quæ tenuissimis cribri instar meatibus, quos *πόροι* Græci vocant, pertusa est.

III. *Differentias, à Quantitate, Qualitate, &*
Sub-

Substantia sortitur. I. *Ratione Quantitatis* est copiosus, paucus, plenus, quem Hippocrates de flatibus, *ὑποπτερον* vocat. II. *Ratione Qualitatis* est 1. *Calidus*, qui bilem auget, humores liquat, coctionem imminuit, & dissipato calore nativo vitam breviorē efficit. 2. *Frigidus*, qui cutis meatus occludendo ac perspirationem impediendo, febres putridas; comprimendo, destillationes excitat, & quæ in ventre sunt obdurat. 3. *Humidior*, qui pituitam & cruditates multas congerit. 4. *Siccior*, qui quidem humores supervacuos absumit, sed febres acutas ob humorum acrium proventum parit, & cutem desiccatur. 5. *Vitiosus*, qui vel nimis in primis qualitibus excedit, vel vaporibus è stagnis vel paludibus elatis inquinatur, vel flatibus ventorum agitari nequit. 6. *Optimus*, qui in qualitibus primis temperatus est, purus, nullis inquinamentis obnoxius, serenus, à ventis suaviter spirantibus agitatus, quique pluviis salubribus interdum irrigatur. III. *Ratione Substantia.* 1. *Crassus*, qui visionis adspēctum plerumque interceptat, ne aut stellas minutiores cernere possimus, aut nisi infuscatas. 2. *Turbidus*, qui partes crassiores multas humore suo constantes ventis turbulentis inter serenum agitata habet. 3. *Tenuis*, qui huic est contrarius, limpidus, serenus, liber & perflatus. 4. *Putris*, seu à se putrescat, dum non ventilatur, ut qui montibus excelsis undique velut conclusus teneatur; seu aliunde, puta à cœlo, fide-ribus, ventis ex locis infectis spirantibus, retro vapore, &c. 5. *Sincerus*, qui sub constitutionibus benignis constituitur, ventis salubribus agitur, nec rerum putridarum vaporibus inquinatur.

IV. *Mutationes*, quas Galenus *ἢ τὴν κατὰ τὸν αἰσθητικόν* vocat, à decem potissimum rebus Aër accipit.

I. *Ab Astris*, Nam & planetis & stellis fixis magna

gnæ sunt in hæc inferiora vires. De illis apud Porphyrum in paraphrasi librorum Ptolemæi de stellarum effectationibus, cap. 4. legere est, plenilunio pleraque mulieres concipere, Hippocrates scribit. De his vel ex sola Canicula, Plejadibus, & Arcturo, videre est. Ex ortu Caniculæ æstuant maria, fluctuant in cellis vina, canes in rabiem aguntur, &c. Plejadum occasu tempestates ventique aquilonii insurgunt. Arcturo emergente, procellosæ grandines.

II. Ab Anni temporibus, tam maioribus, quæ à Medicis, quod maximarum mutationum ex ortu & occasu stellarum primæ magnitudinis in iis rationem habeant, septenario numero includuntur; vulgò ad Ver, Æstatem, Autumnum & Hyemem rediguntur: quàm minoribus Mensibus, nempe, *Septimanis & Diebus*. Ver enim est calidum & humidum. Æstas calida & sicca. Autumnus frigidus & siccus. Hyems frigida & humida. Mensium qualitates ex signo Zodiaci in ipsis dominantis sumi debent. *Septimanarum* ex quadris Lunæ deducuntur; quarum prima humida est, secunda calida, tertia sicca, quarta frigida. *Dierum* à partibus, quarum *matutina* vernalis quodammodo est, *meridiana* æstiva, *vespertina* autumnalis, *nocturna* hyemalis: in quo tamen parum momenti constituitur.

III. A Ventis, tam communibus, quorum alii sunt Anniversarii, ut Chelidoniæ, Etesiæ prodromi; alii Regionales, seu illi Terrestres, seu Marini: quàm propriis, qualis est Chenerona illis, qui Phasin accolunt, Atrabulus Apulis, Garbas Siculis, Japix Calabris, &c. Et hic nota. I. Ventos omnes sua natura humectare & refrigerare. II. Propter situm & conditionem locorum, per quæ spirant, aliam atque aliam temperiem induere. III. Ex *Septentrionalibus*, cum vehementer spirant, Boream esse vehementissimum. Dimidiatos ipsi esse proximos.

mos. Ex collateralibus subsolano boream tepidiorum & humidiorum. Favonio boream nebulosiorum. IV. Ex *Orientalibus*, qui moderatè calefiunt & siccant, cum à terra spirant; humectant, cum à mari. *Eurus*, qui ab Ortu brumali spirat, de natura Austri aliquid accipit. *Cacias*, qui ab ortu æstivo, borealium aliquid retinet, & nubium coactor dicitur. *Subsolano*, qui ab ortu æquinoctiali, id quod in genere diximus, convenit. V. *Occidentales* moderatè sunt frigidi & humidi. In Vasconia tam noxii, ut rarè sine incolarum pavore ingruant. VI. *Meridionales* sunt aquosi, nimbofi, & morbosissimi. Phœnix tamen minus quam Libonorus, quia ad Subsolanum accidit. Vide de eis egregiè agentem *Vernulamium*, & *Federicum Bonaventuram*.

IV. Ab aliis Meteoris. Ignem enim, si sunt pura, ut faces ardentes, sagittæ, dracones volantes; quia ἀνασφύρασιν ἰεγυλῶν καὶ ἐκροῶν pro materia habent, immoderatos aëris caliditates & siccitates, ne de pestilenti corruptela dicam, inferunt: si impura, ut Cometæ, tonitrua, fulmina, siccitates, pestes, sterilitates, diluvia, æstus, &c. causantur. Aëria, quid possint, superius dictum; sufficiat addidisse, solere post magnos terræ motus pestilentiam fieri: de quo vide Senecam l. 6. II. Q. c. 27. & 28. Ex Aqueis, Pluvia si continua, sæpè putredinem aëris infert. Ros frequentior vermiculos noxios generat. Pruina gemmas vitium & calamos aristarum nigro colore inficit. Nix aërem turbidum reddit. Consule de iis *Fromondum* & *Keckermannum*.

V. A Zonis, quarum idèò una *Torrida*, altera *frigida*, tertia *Temperata* vocatur. Torridæ regiones propter æstum incultas credidere veteres: nos commodissimè, propter noctium & dierum æqualitatem, imbrum assiduitatem, locorum vallibus & montibus distinctum situm, Oceani viciniam, ventorum tam

statis quam extraordinariis temporibus leviter flantium auram, habitari novimus. Frigidæ statum Hollandi didicere, cum per Oceanum glaciale transiunt in Cathaiam quærent.

VI. *A Climatibus*, quæ nihil aliud sunt, quam spacia globi terreni inter duos parallelos versus eundem polum ab Equatore distantes regiones ab invicem determinans semihora diei, quamvis id in illis quæ magis ad polum accedunt, non obtrineat: quorum septimum quod per Venetias & Mediolanum inter duodecimum & decimum quartum parallelum decurrit, temperatissimum putatur, non quod nulli excessui vel mutationi sit obnoxium, sed quod vicissitudines non omnino excedentes, si ad tempestates extremarum regionum comparaveris, admittat. Habenda tamen est propter generalem locorum positionem, uniuscujusque regionis situs proprii ratio.

VII. *A regionibus mundi cardinalibus*. *Orientales* enim regiones, sunt mediocriter temperatæ, aquas habent limpidas, odoratas, incolas *λαμπροφύους*, sanos, mulieres fecundas. *Occidentales* morbosæ sunt, aquas habent turbidas, incolas decolores. *Meridionales* aquis scatent multis subfalsis, sublimibus, incolas ferunt capite humido, alvi profluvio obnoxios. *Septemtrionales* aquas habent duras & frigidæ, homines siccios, longævios, proceros. *Orientales sunt salubriores Occidentalibus*, tum quod sol humiditates quas Oriens excitavit, dum viget, dissolvit: tum quod eos quos toto die secum versus Occidentem rapit, non tantum non dissolvat, sed etiam in Occidente plures excitet, eosdemque deferat; tum quod plures in Occidentali, quam Orientali parte, quia longè plura & majora ibi sunt maria, excitentur vapores.

VIII. *A Mundi partibus, regnis, & provinciis*. Nam vel ipsa locorum positione interdum fit, ut ven-

ti,

ti, qui habentur alicui loco salutare, alteri sint noxii. Sic Aquilo serenissimus est Europæis, Lybicis oris nimbofos; Auster illis noxius; Zephyrus Vasconibus perniciosus, Græcis & Italis gratissimus.

IX. *A Civitatibus & Edibus*. Hinc Caunii æris vitio tam luridi & pallidi erant, ut quidam mortuos ibi ambulare diceret. Sol æstate altius incedens, domos ad meridiem versas non intrat; hyeme verò propinquius accedens, totus per fenestras infunditur. Ideo ædes pro diversitate regionum aut mundi inclinationum, diversimodè constituuntur.

X. *A particulari locorum constitutione*. Ubi observat I. *Loca elata* aëre puro, & ab aëre ac ventris defecato gaudere, ideò incolas robustos, propter humidorum excrementorum carentiam, & longævos alere. II. *Declivia* & inter altos montes depressa, radiis solaribus reflexis æstate suffocari, humore nimio madescere, & crassis vaporibus ob Solis absentiam pollui. III. *Plana*, si se undique decenter habent, nullam proprietatem, nisi eam quæ ex Climatum observatione desumitur habent. IV. *Petrosa & aperta* æstate aërem habent calidum, hyeme frigidum, & adeò subtilem, ut nulli ferè vapores ex petris eleventur. V. *Montosa* & alta nivosa sunt, & per nives salubria; his liquatis, nimbose evadunt; quod si montes sunt ad Aquilonem positi, erunt propter reflexionem radiorum solarium calida; si ad Aquilonem, sunt propter nives & ventos frigida. Si ad Orientem, sunt frigida, quia ab Oriente teguntur. Crassi aëris, tum quia montibus vicina, tum quia ventis Occidentalibus aperta: si ad Occidentem sunt, quia ventis Orientalibus exposita, salubria. VI. *Sylvosa*, spisso & suffocato, nebuloso & turbido aëre infestantur: inter arbores Nux & quercus præcipuè nocent. VII. *Fluvii vicina* nimium humectant. VIII. *Palustria & lacustria*, propter retros vapores, morbis generandis oppor-

opportuna sunt. 1. *x. Marina* salubria esse, quod falso corruptioni resistat, & venti semper aërem purgant, mare hyeme & in frigida regione aërem tepidiorem, æstate & in calida temperatiorem reddat, esse putantur. *x. Thermis* *scatentia*, loca aërem vitiare, non tamen ideo ut robusta corpora, quæ calida non sunt, lædant, quoniam à putredine procul absunt, Cardanus reliquit. Sed vide quæso de his, post Hippocratem egregiè agentem, *Renatum Moreau* supra scholam Salernitanam.

ARTICULUS II.

De Cibo.

PUNCTUM I.

De Ciborum differentiis.

Cibus est res non naturalis, substantiam corporis humani restaurans & augens.

Circa eum sex ista explicanda. 1. *Differentia varia.* 2. *Genera.* 3. *Condimenta.* 4. *Panis ipse.* 5. *Tempus sumendi.*

I. *Differentia Ciborum* sunt variae. 1. *Ratione substantia,* est 1. *Durus*, qui difficulter coquitur, & faciliè corrumpitur. 2. *Mollis*, qui faciliè perniciem concipit. 3. *Gravis*, densus, & crassus, qui crassum, fibrosum, & terrenum succum cumulat. 4. *Viscidus* & lentus, qui difficulter in venas distribuitur. 5. *Firmus*, qui quidem multum alimentum suppeditat, sed magno caloris robore ad coctionem indiget. 6. *Infirmus*, qui quidem faciliè coquitur, sed vel paucum, vel citò dissipabile nutrimentum suppeditat. 7. *Difficilis*, vel *Facilis concoctus.* II. *Ratione Quantitatis*, est 1. *Nimius*, seu ut ad vasorum capacitatem refertur, qui quidem totus in sanguinem facescit, sed ob nimiam humorum abundantiam periculum suffocationis, &c. minatur; seu

seu ad vires seu naturam nos gubernantem, qui cruditates multas parit. 2. *Paucus*, quando vel paucis cibis, vel *ἀλγιστόφαις*, vel ex longo intervallo assumtis utimur, qui semper vires minuit. 3. *Moderatus*, qui corporis substantiam caloremque nativum, & humorum symmetriam tuetur, excrementisque modum adhibet, in quo assumendi modus est, cum nondum satietas cepit. III. *Ratione Qualitatum*, est 1. *Calidus*, qui crassos humores attenuat, viscidos incidit, flatu discutit, in temperatis bilem auget. 2. *Frigidus*, qui æstum sanguinis & ventriculi temperat, sed flatu materiam suggerit. 3. *Humidus*, quo siccitas partium emendatur, alvus subducitur. 4. *Siccus*, qui ægrè concoquitur, firmiter alit, & succum melancholicum suppeditat. 5. *Dulcis*, qui quidem, benè si compactus est, alit, sed jecinoris & lienis obstructions efficit. 6. *Salsus*, qui putredinem arcet, si nimirum sumatur, sanguinem exurit, & pruritus excitat. 7. *Amarus*, qui tergit, & incidit. 8. *Acris*, qui obstructa liberat, bilem auget, & acres halitus excitat. 9. *Acidus*, qui incidit, & si simpliciter talis est, succum crassum deorsum subducit; si ad dulcorem vergit, alvum lenit; si ad acerbitatem, adstringit. 10. *Acerbus & Austerus*, qui adstringit, si cibis aliis præmittatur; si postremo assumatur, laxat. 11. *Boni vel mali succi.* 12. *Simplex vel medicamentosus*, qui præter vim nutriendi, alterandi quoque potentiam habet. 13. *Insalubris*, è quo pravus succus generatur, & qui faciliè putrescit. 14. *Optimus*, qui faciliè concoquitur, plurimum nutrit, bonum alimentum suppeditat, non faciliè corrumpitur, aut pravam qualitatem induit, & pauca excrementa relinquit. IV. *Ratione preparationis.* 1. *Crudus*, quo hodiè Abyssini, Scythæ, & multi alii Barbari gaudent. 2. *Assus*, quo solo Trojani belli temporibus Heroës usi dicuntur, qui siccum alimentum præbet, & excrementa sæpe moratur: quod si ex

fi ex venis extractus, undique ne exhalare possit concludatur, noxius est. 3. *Tostus*, qui nimium adustus est. 4. *Frixus*, qui in sartagine cum humido externo paratur, & suavis quidem propter humidum pingue est; sed quia humidum internum superfluum non ita convenienter emittit, imò plus externi redundantis imbibit, coctus est difficilis, nidorulentus & sanguinem exaffans. 5. *Elixus*, qui intrus quidem est sicciior, propter exteriorem tamen humiditatem humectat. 6. *Suffocatus*, qui quia æqualiter coctus est, laudabilem, temperatum, & permeabilem succum generat. 7. Est *conditus*, vel *Non*.

PUNCTUM II.

De Ciborum generibus.

Genera ciborum sumuntur 1. *Ex plantis*. 2. *Avibus*. 3. *Quadrupedibus*. 4. *Piscibus*. 5. *Ex sanguibus*.

I. *PLANTÆ* sunt, *Frumenta*, *Legumina*, *Olera*, & *Fructus*.

I. *Ad Frumenta* pertinent. 1. *Triticum*, quod est calidum & humidum, plurimi, firmi & saluberrimi nutrimenti. Visciditas, si qua ei inest, præparatione tollitur. 2. *Zea*, vulgò *Spelta*, quæ est naturâ tritico proxima, & nutrit plus hordeo, minus tritico; fit ex ea *Alica*. 3. *Secale*, quod aliis *Rogga*, è qua panis in plerisque locis conficitur, calidius est hordeo, & plus eo nutrit, sed difficilior quàm triticum concoquitur. 4. *Hordeum*, ex quo *Prisana* conficitur, alimentum bonum, meatus abstergens, & facilè transiens, sed tenuius, & ad vitæ longitudoem minus commodum. 5. *Avena*, quæ calefacit, & bonæ notæ alimentum præbet, alvumque sistit. Paratur alibi ex ea *Avenatum*, cum lacte bubulo, caprillo, aut succo amygdalarum dulcium & saccharo. Editur tusa, & ex jure carni. 6. *Oryza*, quæ apud Orientis populos plerumque

rumque in panes cogitur. Temperata est, cum lacte cocta multum nutrit; sed difficilior coquitur, & succum crassiorem idè obstruentem præbet, semen auget. 7. *Frumentum Saracenicum*, quod commodè labori dedito nutrit, difficulter coquitur, flatu gignit, & oculis nocet. 8. *Milium*, quod frigidum & siccum est, alvum sistit, & difficulter coquitur. 9. *Panicum*, quod deterioris est, quàm milium naturæ. Pinsitum & evolutum fursure, pulvem, quasi inopia, non fastidiendum præbet.

II. *Ex Leguminibus* sunt, 1. *Faba*, quæ sunt frigida, sicca, & flatulenta. Crudi, sed simul absterfivi nutrimenti, difficilisque coctionis, sensum hebetiorem & somnium turbulentum reddunt. idè studiofis sunt inimica. Lugdunenses molâ fractas, percoctas, & delibratas, in crassamen quoddam album reformat. 2. *Pisa*, quæ sunt frigida, sicca & flatulenta, inprimis viridia, nervis creduntur nocere: jus substantiâ est melius. 3. *Lentes*, quæ alimentum frigidum & siccum, difficilis coctionis, caput crassis vaporibus replens, oculis avidis noxium, sanguinis crassi authorem præbent, inprimis si cum salsis carnibus edantur. 4. *Ciceres*, qui propter abstergendi facultatem magis in usum medicum expetuntur. Dioscorides utentibus coloris præstare elegantiam scripsit. 5. *Cicerula*, quæ medium locum inter ea cibaria, quæ boni malive succi sunt, concoctu facilia & pervicacia, obtinent. 6. *Vicia*, quæ crassum succum & atra bili generandæ commodum suggerit, & alvum stringit.

III. *Sub Oleribus*, seu *Hortensibus cibariis*, herbæ seu folia, germina, Radices, & fructus, tacebo de seminibus, comprehenduntur. 1. *Ex foliis & germinibus* sunt 1. *Lactuca*, quæ omnium olerum optima, sanguini generando plus quàm alia materiæ præbet: frigiditate suâ æstum ventriculi compescit, somnum concit-

conciat, renum calorem temperat. Sed si nimium ea vescaris, semen extinguit. Succus duarum unciarum pondere interficit. Sumitur cruda oleo, sale & aceto. 2. *Intubum*, quod vires lactucis similes habere docuit Galenus. Alibi in hybernos menses accersitur. Solent enim folia ubi adoleverint, ea velut in globum exiliore filo colligare, & fictilibus vasis cooperta servare. 3. *Brassica*, quæ frigida & sicca est, difficulter concoquitur crassum alimentum, & quod fuliginosos in caput vapores exhalat, somnos turbat, & visum hebetat, præbet. Corrigitur, si cum jure carniū sumeris. Succus acrimoniam & vim alvum exstimulandi præ se fert. Melior foliis expansis quàm capitata. Labori deditis offerri potest. His piper adjicitur. 4. *Spinachium* refrigerat & humectat, serofos humores gignit, & flatuum proveniū, nisi piper Sal & butyrum admiscueris, felix est. 5. *Malva* leviusculè alit, alvi profusionem concitat, & gratiam à butyro & condimentis mutuatur. 6. Idem de *Atriplici* & *Blito* dici potest. 7. *Beta* frigida & sicca est, & diversarum partium, succus detergit, substantia sistit; Epatis tamen & lienis obstructiones tollit. Veteres eis vina piperque adiciebant. 8. *Asparagi*, quibus turiones seu prima germina lupuli affines sunt, temperatæ sunt naturæ, alimenti parum nec id probum præbent, gustui grati sunt, appetitum excitant, detergunt, urinas movent, & renes mundant. 9. *Nasturtium*, quod condimenti loco propter calorem sumitur. Aegineta stomacho adversari, & mali succi esse addidit. Persis olim familiare in cibo. 10. *Sinapi*, quod est acris saporis calidum evidentissimè & siccum. Ideo inter condimenta reponitur, quæ crassos cibos attenuant. Musto per vindemias diluitur; unde Mustardæ nomen. 11. *Ex radicibus* sunt 1. *Cepa*, quæ parum alimenti præbent, calefaciunt, incidunt, attenuant, sanguinem accendunt, dis-

cussis

cussis partibus tenuioribus, succum crassum post se relinquunt, Venerem irritant, somnia turbulenta adferunt; & capiti, oculis, dentibus, ac gingivis in biliosis inprimis nocent. 2. *Allium*, quod mense Majocum recenti butyro à multis Gallorum populis editur, & ex quo cum nucibus juglandibus simul in pila contritis, Alliarum parant. Nullum in crudo alimentum, in cocto paucissimum & pravum. insigni caliditate & siccitate humores crassos attenuat & incidunt, ad toleranda frigora aquarumque pravitatem corrigendam exquisitum est remedium. 3. *Porrum*, quod ferè earundem est virium, Biliosos, cerebro infirmos, graviter afficit, aciem oculorum hebetat frequentius sumtum bilem porraceam gignit. Crudum ex sale primo cibo esitatum ventriculum à crassissuccis liberat. 3. *Raphanus*, quo cruda sale aspersa utimur. Obsonii potius loco est, utpote calida, acris. dentes atterit. Spiritum colligit, & ructum laxat, urinam mover, arenulas ex renibus pellit. Optimus putatur, qui facile frangitur. 4. *Raphanus sylvestris*, easdem vires obtinet, & condimenti potius quàm alimenti vicem habet. 5. *Rapum*, quod satis alimenti, calidi nempe & humidi præbet, tardius, crudum præfertim coquitur, & ventrem inflat. Habetur & flaccidum. 6. *Napus*, qui plus nutrimenti suppeditat, minus quam Rapum crassi & flatulenti succi est, Venerem stimulat. 7. *Pastinaca sativa*, paucum, crassum, calidum, nec admodum probi succi, alimentum præbet. Urinam promover, Venerem stimulat, menses mover. 8. *Beta rubra*, quæ cum aceto semine carvi & radice sylvestris raphani condita, acetarii potius quàm cibi loco exhibetur, cum parum nutriat. III. *Ex fructibus* sunt. 1. *Cinara*, quæ in secundo gradu calefacit & siccat, coctionis est difficilioris, succi non satis boni. Estur à quibusdam cruda ex solo sale, ab aliis ex piperis polline, & butyro cocta. ex

B

aceto

aceto & oleo copiosam & foetidam urinam pellit: quidam appetentiam excitare, & dejectam restaurare credunt. 2. *Cucurbita*, quæ alimentum præbet gelidius humidiusque, idè citò delabitur. Corrupta in ventriculo, in malignum succum vertitur. Quidam eas cucumeribus innocentiores ponunt. Aliquando assæ frictæve in mensas veniunt. Gratiore quæ longiores tenuioresque, idè salubriores; quæ pendendo crevere, minimum seminis habent. 3. *Cucumeres*, qui sunt frigidi & sicci. Galenus hominum cibis perpetuò abdicandis censuit. Vivunt quippe in stomacho in posterum diem. Commodissimè tamen sumuntur immaturi adhuc, in acetariis conditi muria ex aceto & pipere; illeque minus noxii sunt, qui ventriculum habent calidiorem. Veneti in pestilentiales morbos ab iis incidunt. 4. *Melones*, qui & gustui sunt grati, & odorem aromaticum spirant; sed quia aquosâ humiditate abundant, facile corrumpuntur, & corrupti veneni naturam induunt, & cholera excitant. Idè primis mensis sumi debent, ut facilius delabantur, eos cibus boni succi, & unus vel alter haustus boni vini excipiat. 5. *Fraga*, quæ humida sunt & frigida, tenuis succi, & faciliè in ventriculo corrumpuntur. Ventriculo & epat biliosiora refrigerant, sanguinis & humorum fervorem restringunt, sitim sedant, urinam movent, renes purgant. Optimè in prima mensa sumuntur. Eduntur interdum ex lactis cremore cum saccharo: sæpe & melius ex vino. 6. *Cappares*, quæ recentes valentius alunt, & alvum subducunt. Ex aceto & oleo sumtæ, cibi appetentiam excitant, lienis & jecoris obstructions tollunt, & pituitam in ventre contentam detergunt. I V. *Arborum* fructus sunt. 1. *Poma*, ex quibus *Dulcia*, & aromatico odore fragrantia, alimenti mediocrem quantitatem præbent, & affectibus melancholicis profunt. *Acida* frigida sunt, & nimis flatulenta. *Anteriora*

steriora crassiora sunt, & nimis tardè per alvum descendunt, quamvis coctione vis corrigatur. *Aquosa* vitiosissimi sunt succi, nulliusque saporis. 2. *Mala Cydonia*, quæ frigida & sicca sunt, pauci alimenti & difficilis coctionis, cruda nervi nocent: primo cibo sumta alvum sistunt: à cibo, alvum laxant, & os ventriculi claudunt. 3. *Aurantia*, quæ si acida, intinctus cibariis præstant, aviditatem excitant; & fastidium tollunt: si dulcia, intinctibus quidem accepta non sunt, sed tussibus & exasperatis faucibus opitulantur. 4. *Pyra*, quæ si dulcia, humidioris & frigidioris sunt naturæ, *Muscattellina* si excipias, quæ calida, & corruptioni magis obnoxia: si *Austera* & *acriba* adstringunt & refrigerant, ventriculo & intestinis noxia. Coctione emandantur. 5. *Mespila*, quæ sunt frigida & sicca; mitia tantum eduntur, paucum idque concoctu difficile alimentum præstant, vomitum sedant, & bilioso ventriculo conveniunt. 6. *Ficus*, quæ calidæ & humidæ sunt, plus reliquis fructibus nutriunt, faciliè è ventre descendunt. si nimium sumantur, flatu excitant. Aridæ, quæ *Caricæ* dicuntur, ita interdum absterunt, ut lienteriam inferant, humores ad exteriora pellunt, sudores movent, copiosius sumtæ pediculos gignunt. 7. *Mala Persica*, quæ omnia sunt frigida & humida, parum nutriunt, & faciliè corrumpuntur: recentia antè cibum sumenda. siccata vel cocta pravitate aliquomodo deponunt. 8. *Mala Armeniaca*, quæ Persicis sunt meliora, & stomacho gratiora. 9. *Pruna*, quæ omnia sunt humida & frigida. Dulcia bilem mitigant, faciliè coquantur, & per ventrem descendunt. *Alba* & cerea vilissima sunt. Optima Damascena & Ungarica. *Recentia* excrementitiæ sunt humiditatis; & si *cruda*, deterioris succi, imò ventriculi tonum laxant. *Siccata*, nutritioni magis sunt accommoda. 10. *Cerasa* si sunt dulcia, ob copiam facile corrumpuntur, & lum-

bricos ac putridos febres gignunt : si sunt *Acida*, refrigerant, epatis & ventriculi fervorem compescunt, facile coquuntur, & per alvum descendunt, appetentiam excitant, nec mali succi sunt. 11. *Mora*, quæ humectant, refrigerant, parum nutriunt, facile per ventrem descendunt, & quia si retineantur, facile corumpuntur & putrescunt, vacuo, & à vitiosis humoribus libero ventriculo, assumenda sunt. 12. *Vva*, quæ si *dulces*, sunt calidiores, & sitim excitant. Si *Acida* vel *austera*, frigidiores; si *vinosa*, mediæ. Si *recentes*, sunt pauci alimenti, lienem in tumorem tollunt, colicam pariunt, epar & ventriculum crudis humoribus, si diutius detineantur, replent. Si *Passæ*, austera & acerbæ ventrem adstringunt. *dulces* plus alimenti exhibent. *dulces* & *austera* inter omnes excellunt, epati tota substantia conveniunt, & pectori profunt. *Corinthiackæ*, quæ sine nucleis, plus roboris ventriculo addunt. 13. *Olivæ*, quæ si *Halmades*, seu muriâ servatæ, ad invitandum appetitum sunt nobilissimæ, & minore negotio à ventriculo perficiuntur. Adstringentiores secundis mensis adhibentur, ut roborato ventriculi ore cætera per alvum pellantur. 14. *Amygdalæ*, quæ si *amara*, urinam vehementer cient, & amaritudine fastidium pariunt : si *dulces*, calidæ sunt & humidæ, copiosum & boni succi alimentum præbent, idè emaciatissimæ optimæ. Febribus biliosis & stomacho calido non ita commodæ sunt. 15. *Castaneæ*, quæ calidæ & siccæ, difficilis coctionis, boni si benè coquuntur, sed difficilis distributu, alimenti ; si copiosius comedantur, flatu pariunt. 16. *Nuces juglandes*, calidæ sunt & siccæ. *Recentes*, quia humidæ, commodius sale aspersæ eduntur. *Sicca*, post piscium esum quorum humiditatem siccitate sua temperant, sumuntur. bilem generant, os ventriculi, gulam, & asperam arteriam exasperant. 17. *Nuces avellana*, juglandibus sunt frigidiores, &

plus

plus alimenti præbent, difficiliter coquuntur, & terrenum succum generant. His *Tubera* & *fungi* adduntur, qui plerique sunt frigidi, insipidi, aquei & crassi alimenti, non sine periculo sumuntur, tum quia mali succi, tum quia interdum venenata.

II. *AVES* quæ homini in cibum cedunt, sunt vel *Terrestres*, vel *Aquaticæ* : suppeditant *carnem*, *partes alias*, & *ova*.

I. *Carnis respectu ex Aquaticis*, præcipue in cibum veniunt. 1. *Anas* tam cicur, quam sylvestris, quæ crassum & melancholicum succum generant, venas mesenterii & lienem infarciunt, & quartanis febribus opportunæ sunt : illa inprimis, quæ coeno perpetuo immoratur. 2. *Anser*, qui si domesticus, excrementitii est succi, quique putredinem facile concipit; sed ille magis. Ex *Terrestribus*, principem locum obtinent 1. *Gallinaceum genus*, quod carnem habet temperatam, succi boni, & excrementi pauci. Ubi nota. 1. Carnem corporis primas obtinere, & omnium avium laudes, quantum ad obsonia pertinent, comprehendere. 2. Gallinas esse sicciores. 3. Gallorum carnem duriorē & sicciorē, fenum inprimis, quorum jus alvum dicit. 4. Gallum Indicum nec sapore, nec succi bonitate caponibus cedere, convalescentibus benè apponi, hyeme, pectori, & ventre suaviorem esse. variè & saginari & præparari. Unde sunt conchillati pulli, parthici, oxyzomi, laserati, variani tracto gælati, leucozomi, Ificii, Amilati, Oxylipari, Asii, Elixi, frixi, pressi, destillati. 2. *Perdix*, cujus caro temperata est, nonnihil ad siccitatem declinans, facilis concoctionis, præstantis succi, multi alimenti, pauci excrementi, quæque convalescentibus & lue venereâ laborantibus benè exhibetur. 3. *Phasianus*, qui carnis & succi bonitate gallinaceos æquat. Autumno & hyeme laudatur, alis quam coxis melior. Ejus pullus sex octove septima-

B 3

narum

narum æstate est suavissimus. 4. *Attagen*,cujus caro ejusdem cum priore qualitatis. Convalescentibus convenientissimus est cibus. 5. *Columba*, quarum caro est crassi, melancholici, & excrementosi sucçi, nec facile coquitur, nec febribus putridis convenit. Meliores sunt montani & sylvestres. *Turtur* modicum & tenuem succum præbet, sed seniores sanguinem melancholicum creant. 6. *Turdus*,cujus caro facile concoquitur, bonum præbet succum, nutrimentumque firmum. 7. *Alauda*, quæ optimum succum generat, & facile coquitur, peculiari facultate à colica præservare, eandemque curare creditur. 8. *Merula*,cujus caro suavitate, coctionis facilitate & sucçi bonitate hœdis est paulò inferior. 9. *Coturnix*, quæ calida & humida, difficilis coctionis, mali nutrimenti, multi excrementi, febribus generandis materiam suppeditans. 10. *Sturnus*,cujus esum Galenus concedit iis, qui gracili & attenuato sunt habitu. Apicius Diabolicam earum carnem vocat, quod virosum odorem ob cicutam spiret. Uvis maturescentibus præpingues capiuntur. 11. *Passer*, qui omni tempore quibusdam gratus, sed hyeme magis, quod æstate propter salacitatem, macrior, aridior, calidiorque evadit.

II. *Partes avium* sunt 1. *Crista*, quæ solæ gallinæo generi datæ sunt. Inter cibos Galenus enumerat, quos nemo vel probavit, vel damnavit. Creduntur ad venerem tardos accendere. 2. *Ale*, quæ ob superfluum crudamque humiditatem labore dissipatam, sucçi sunt boni & facilis coctionis. 3. *Trochæum*, quod magis iis, quibus breviores pedes, Carnosum est & præpingue, sed ob adipis copiam interdum nauseam movet. 4. *Cerebrum*, quod quadrupedum ficius & durius est, montanarum delicatius quam illarum, quæ circa paludes & campos degunt, Gallinaceorum, perdicum, & Phasianorum, suavissimum.

mum. *Passerum*, & *Columbarum* irritat venerem. 5. *Collum*, quod claritati oculorum propter sanguinem ibi coagulatum, officere creditur. 6. *Lingua*, quæ quo musculosior, eo melior. Anserum, libidinem movere, scribit Bruyerinus. 7. *Côr*, quod fibrosæ & duræ substantiæ est, difficulter coquitur, & ægrè permeat. Sæpius sumtum melancholicum sanguinem generat. 8. *Pulmo*, qui ob raritatem facile coquitur, & parum nutrit. 9. *Ventriculus*, qui magnam partem carnosus callosusque, suavissimus Anserum. Carnosus magis quàm callosus Gallinarum altilium. 10. *Intestinum*, quod in rostratula suavissimè editur. Alaudæ interanea, quæ dura & amara, à quibusdam ad alvum ciendam pillularum instar deglutuntur, sed evanido successu. 11. *Tecur*, quod propter temperamentum calidum & humidum, nostro calori affine est. Anserinum est *πρωτόδιον ἢ πολυτέλες*. Ut potenter nutriret, olim eorum alimenta lacte imbuta fuere. 12. *Lien*, quia maximæ avium parti exiguus, in nullam venit rationem. 13. *Testiculi*, qui in gallinæis præstantissimi, si galli cibo seroso lacte imbuto nutriti fuerint. Experuntur à delicatis tanquam incentiva libidinis. 13. *Pedes*, qui, quia exigua carnis, tenuissimè nutriunt, quia nervosi & tendinosi, difficulter coquuntur. 14. *Cutis*, quæ, si altilium & pinguium suavis est, sed alimenti exigui, & difficilis coctionis, si illa quæ lumbos gallinaceorum tegit, suavissima est. Si colli rugosa & adiposa, elixa melior quàm tosta. 14. *Medulla*, quæ si spinæ, ejusdem est virtutis cum cerebro, nisi quod paulò durior existat; si ossium, jucundior ac pinguior est; sed liberalius sumta, nauseam parit. 15. *Pinguedo*, quæ moderatè sumta, sale aspersa, parum quidem & malè, sed non injucundè nutrit. Appetitum, si vinum superbibatur, aufert, quod ventriculus complanetur, rugæ auferantur, & sensus doloris ex suctu exciteretur.

III. *Ova avium* ex vitello & albumine constant. Ille proprietate substantiæ faciliè inflammatur, & in fumos abit. Hoc, frigidum & glutinosum, sanguinem pravam generat, & agrè concoquitur. Ipsa pro ratione substantiæ, figuræ & coctionis variant. Sunt 1. *Gallarum*, *Perdicum*, *Phasianorum*, *juvenum* & *pinguium*, quæ omnibus præstant. 2. *Anatum*, *Anserum*, *Parvorum*, quæ deteriora habentur. 3. *Parva* oblonga, & candida, quæ reliquis fucci bonitate excellere creduntur. 4. *Pallidiora*, qualia sunt *Anatum* & *Anserum*, quæ plus aquæ naturæ possident. 5. *Tremula*, quæ eatenus per coctionem inspissantur, ut in manu tenentis in putamine tremere videantur, plurimum alimenti & optimi fucci corporibus exhibent, facillimè concoquuntur & distribuuntur, & sanguinem cordi quam maximè congruum generant. 6. *Sorbilia*, ῥοφνη, quæ tremulis minus nutriunt, sed facilius subducuntur, & faucium asperitates lævigant. 7. *Cocta*, Græcis ἐφ, id est, cocturâ in temperatione densata, quæ difficulter coquuntur, tarde transeunt, & crassius alimentum præbent. 9. *Assa*, quæ quod humiditatem eorum foci caliditas depascatur, elixis sunt crassiora; & si cinere torâ obruuntur, quia densata undique à circumfuso igne extrema parte fumorum exhalatio interceptitur, pejora evadunt: si nuda prunis imponuntur, quia fumos exhalant depuranturque, meliora sunt. 10. *Elixa*, quæ quia aquæ humiditas ne foci caliditate exsiccentur, obfistit, assis præstantiora sunt. 11. *Frixa*, quæ dum in ventriculo coquuntur, in nidorem abeunt, & alios cibos corrumpunt, crassumque succum reddunt. 12. *Suffocata* seu πυρ, quæ Galenus parare docet, elixis & assis sunt meliora, si in meliorem consistentiam redacta fuerint.

III. *Tertium Ciborum genus* sunt *QUADRUPEDES*, quæ subministrant cibando homini. 1. *Car-*

nem

nem musculosam. 2. *Caput*. 3. *Pectus*. 4. *Abdomen*. 5. *Extrema*, & 6. *Ea*, quæ ab iisdem sumuntur, sed partes non sunt.

1. *Caro musculosa*, frequentissimè cibi loco sumitur, & calidior est vivifico calore volatilibus, idè animalia ter majora hisce evadunt. Est 1. *Bubula*, quæ si Novellorum, quoniam nondum laboribus fracti, utilior habebitur, sed rarè apponitur; si vetulorum, est crassa, difficilis coctionis, & venas non facile pervadens, lentoris tamen & visciditatis expers est. Alimentum præbet dissipatum, difficile, & sanguinem crassiores producit. Hippocrates Chole-ram siccam inducere scripsit. 2. *Vaccina*, quæ est crassi, & atrabiliarii fucci. 3. *Viculina*, quæ est temperata, boni fucci, concoctu facilis. Crassiores tamen paullo succum quam hædina, aquina & vervecina præbet. 4. *Suilla*, quæ pro ratione ætatis variat. Δελφάκων seu lactentium est humidior, fucci minimè boni & facile putrescibilis, idè ei vinum superbibendum. *Adolescens* est melior, & benè nutrit. *Juvenum*, inprimis si Majales, cæteris præstat. potentissimè nutrit, & firmum alimentum præbet, hominibus ætate florentibus, & qui magnis laboribus exercentur, commodissima. *Decrepitorum*, qui χῆροι, est dura, insipida, melancholicorum morborum parens, vino diluenda. *Aprugna*, tum quod nec ita excrementitia sit, neque viscosum siccorum progeneret, domestica præstantior est. Non alio ex animali post interitum numerosior Materia generat, quinquaginta ferè sapes, cum cæteris singuli. 5. *Ovilla*, quæ est nimium sapore ingrato, & rusticis conveniens: Graviter olet, si post Solstitium elixeretur; gravius, si assètur. 6. *Agnina*, quæ ante annum completum, est humida, mucosa, post annum, boni, copiosi, & mediocriter constantis fucci, facileque coquitur in iis, qui laboribus exer-

B 5

centur,

centur, facillè discutitur. 7. *Vervecina*, quæ facillè coquitur, & bonæ notæ sanguinem generat, si juniorum est. 8. *Capreoli*, quæ nutrimenti boni, & reliquorum Sylvestrium carne, coctionis facilitate, & excrementorum paucitate præstantiores, sicciorum tamen est. 9. *Haedina*, quæ temperata facillè digeritur, & bonos, sed magis quàm vitulina viscosos generat humores. Farva est, & nisi assetur, insipida. 10. *Cervina*, quæ sicca, difficilis coctionis, succum melancholicum generat, si adultioris est, & facillè viscera obstruit. 11. *Leporina*, quæ melancholicum succum præbet: sed si probè coquatur, non mali succi est; floridumque faciei colorem conciliare creditur.

II. *Capita quadrupedum* edulia sunt, *Bovinum*, *Vitulinum*, *Suillum*, *Aprugnum*, *Haedinum*, *Leporinum*, &c. de quibus in genere hoc dici potest, coctionis esse difficilis, crassi viscosique succi, multum tamen nutrientis. *Partes ipsorum* potiores sunt. 1. *Lingua*, quæ carne sui generis, laxâ nempe, fungosâ, humidâ & glutinosâ constat: idèd minimè solidum, densum, aut diu persistens alimentum præbet; nonnullis tamen suavissima inest, mollis, probi succi, facilis coctionis, & alimenti non poenitendi. Pars ea quæ exferitur, durior est. 2. *Oculi*, qui despiciuntur, vitulinos si excipias, qui multa pinguedine, mollique carne obsepti sunt, & tenerioribus membranis involvuntur. 3. *Aures*, quæ quia Cartilagineæ, parèd nutriunt, nisi cum vicinis partibus ingerantur. 4. *Gena*, quæ si sunt quadrupedum juniorum pinguium & carnosorum, bonitate succi non desistuntur. Vitulinæ sunt tenerissimæ. 5. *Cerebrum*, quod pituitosum est, crassi succi, tardè permeantis, & ad coquendum difficilis. Nauseam excitat, & vomitum movet. Varignana venenis conferre dixit, fortè propter visciditatem, qua ventri-

culi

culi parietes oblinuntur. 6. *Palatum*, quod in bove laudatur. Membranosâ quadam carne obductum est, & frequentissimè minutalibus additur. 7. *Rostrium*, quod Galenus in porco pedibus postponit, auribus antepont.

III. *In Pectore Cor & Pulmo* locum suum sortita sunt. 1. *Cor* coctu difficile esse, superius diximus. Suillum augere mœrorem, in illis scilicet, qui jam aliquo affectu melancholico tentantur, Salernitanis placet. 2. *Pulmo* frigidi & humidus est temperamenti, pituitosi succi, facilis ob raritatem, & levitatem coctionis ac distributionis: quidam inflare ventrem dicunt.

IV. *Abdominis partes* sunt, *Iecur*, *Lien*, *Renes*, *Testes*, *Vulva*, *Ventriculus*, *Intestina*, *Mesenterium*, *Ilia*, *Sumen*. 1. *Iecur*, omnium animalium crassi est succi, ad coquendum difficile, & tardè permeans. Suillum reliquis præfertur, inprimis σκωτὸν. Agnorum, hædorumque facilius permeat, & minus crassi succi est. Caprillum epilepticas convulsiones asferre dicitur, non minus quam hircinum. Aprugnum ἐπιπλοῦν μένον, seu Epiploœ obvolutum, laudatur. 2. *Lien*, quia sanguinem crassum, lutulentum, & melancholicum attrahit, tale quoque nutrimentum præbet. Pubentes, quales porcorum, quia sanguine minus pravo tinguntur, non ita mali sunt succi. 3. *Renes* sunt pravi succi, ingrati saporis, difficilis concoctionis: hædini & vitulini, quod neque duri sint, neque virosi laudantur. 4. *Testiculi*, quia virosi, quid in animalibus maximè coitum expertis sapiunt, duri sunt & concoctu difficiles. Suum tamen præferuntur, nec agnini omninò improbantur. 5. *Vulva* veteribus ἡδίστον κρέας, suavissimum edulium, metropolis quoque & mater filiorum Hippocratis, (Lurconem quandam Atheniensem puta) fuit, & in duplicem, Ejectitiam nempe,

pe, seu prægnantem, & porcariam seu virineam, quæ *ἐν τῷ μίει*, dividebatur. Succum quia gignit, frigidum & crudum, idè difficulter concoquitur. 6. *Ventriculus*, quale nutrimentum præbeat, facillè ex ejus constitutione colligi potest. 7. *Intestina gracilia*, quæ Græci *μεγάλα*, Latini *laetes* appellant, esu suavissima fuisse, Epicharmus in Megaride testatur: crassa, quæ *φύσκει* nuncupabant, non minus in deliciis fuere. 8. *Mesenterium*, vituli inprimis lactentis & obesi, suavissime cum tantillo aceti editur. 9. De *Ilibus* nihil ferè occurrit. 10. *Sumen*, ὄψος Græcis, Latinis uber, specile seu spetile, inter lautiores cibos computatum fuisse, ex Plauti Pseudolo colligi potest.

V. *Extrema*, Græci *ἀκροτάτια* vocant, quo vocabulo in macellis & culinis extremi pedes macetatarum victimarum veniunt. Pedes verò quadrupedum inter *μυζῶδεις* habentesq; aliquid *ὄλκμον* & *γλίσχρον*, Aristoteles retulit. Mnesitheus Atheniensis hos & caput & *πολὺ τὸ κρόφιμον* & *λιπαρὸν* habere scripsit. Alii Veneris victimam vocare. Huc refero *Glandia* & *Callum*. *Glandium* est corpus glandinosum, molle, spongiosum, & album, quod thymum vocant. Commendatur à Plauto in *Curculione*. *Vitulinum* est suavissimum. *Callus* & *callum*, caro erat suillà pinguior, & mirum in modum densata, ut callum obduxisse videatur. Fuit inter lautitias veterum.

VI. Quod à Quadrupedibus sumitur, & pars non est, est *Lac*; quod partes quoque ex quibus constat, *Serum*, *Butyrum*, *Casum* largitur. I. *Lac* multiplex est. 1. *Crudum*, quod recentissime mulsum sumi debet, ne flatus exciter. Recens enixorum animalium non probatur. Corripitur salis vel sacchari modico. 2. *Coctum*, quod quidem minus flatulentum, sed quia serum coctione absorbitur, cras-

crassius evadit, & venas obstruere aptum est. 3. *Casseosum*, quod plurimas caset partes obtinet. Multum nutrit, sed minus salubre est. 4. *Butyrosusum*, quod viscosus paulò est, difficilior distribuitur, inflationesque generat. 5. *Serosum*, quod minimum nutrit, sed confestim alvo secedit. Nihil de Melca, aphrogala, argyrotophemate, pyraſto, *χρῖς*, colostro, & oxygalo dicam. 6. *Animalium macilentorum*, quod parum alit. 7. *Animalium obessorum*, quod periculum convulsionis afferre dicitur. 8. *Animalium nigrorum*, quod melius candidorum lacte. 9. *Post partum emulctum*, quod liquidissimum ac tenuissimum, spissatur temporis progressu. 10. *Optimum*, quod tepidum, æqualis substantiæ, admodum ungui statim non diffuens, levius quàm gravius, minimè viscosum, sed dulce, inodorum, album, & aliquo pacto splendens, ac denique à sano animali, & in benè valentibus benèque constitutis mammis elaboratum. 11. *Humanum*, quod quàm proximè ad optimum accedit. 12. *Bubalum*, quod muliebri crassius est, pinguius, & magis nutriendum, facile obstruit, & argè in ventriculo coquitur. 13. *Ovillum*, quod bubulo inferius est, & magis obstruit. 14. *Caprillum*, quod supradictis paulò calidius, substantiæ tenuioris, & paucioris nutrimenti, magis alvo secedit. 15. *Equinum*, cui, ob multi serosi tenuitatem & caliditatem, eximia detergendi facultas. 16. *Asininum*, quod reliquis frigidius, tenuius, & serosius, minus nutriendum, & minus obstruens, maximè absque acrimonia & mordacitate tergit, & subducit. II. *Serum*, quoad substantiam aqueam & phlegmaticam refrigerat & humectat; quoad acrem salsam & biliosam, detergit. III. *Butyrum* pectus & pulmones juvat, sputum educit, & ad frigidas aridasque tussis confert: abundè sumtum ventrem lubricat, facultateque digerendi, dis-

cuien-

cutiendi, coquendi, & leviter educendi pollet. *Vetustam acrimoniam contrahit.* IV. *Casii aliquot sunt differentia.* 1. Est *Recentior & mollis*, qui durato & recentiori præfertur: quippe magis alit, & ocyus subit. 2. *Rarus & laxus*, qui densitate utilior. 3. *Immodicè lentescens*, & ariditate friabilis, qui culpat. 4. *Orvillus*, qui facilius reliquis coquitur, & melius alimentum præbet. 5. *Vaccinus*, qui ovillo bonitate proximus. 6. *Caprinus*, qui utroque deterior, calidior certè est & tenuior. 7. *Optimus*, qui nec est ocellatus & foraminulentus, nec sale nimio adpersus, nec capillis intrinsecus sordidus, nec liquorem stillans, nec vetustus, nec durior, neque denique foetidus. Vide de his *Gesnerum de Lacte & operibus lactariis, & Nardium in Lactis physica analysis.* IV. *Quartum Ciborum genus*, sed quadrupedibus deterius, sunt *Pisces*, quorum Qualitates, per Differentias & partes, *Carnem* nempe & *reliqua membra*, optimè explicabuntur.

I. *Differentia* sumuntur I. *A Loco*, ratione cuius, alii sunt *Lacustres* tam *πελαιοπαῖοι*, quàm *λιμναῖοι*, alii *Fluviatiles*, alii *Marini*, tam *saxatiles* quàm *pelagii* & *litorales*; alii *Fossiles*, alii *Αμφίβιοι*, de quibus omnibus sequentia notentur. 1. *Palustres*, quia cœnosi, & minus exercentur, excrementis scaterere. 2. *Lacustres*, qui lacus ingentes, fontibus & fluminibus irriguis incolunt, meliores esse. 3. *Fluviatiles*, qui in turbidis & magnarum urbium sordes excipientibus fluminibus versantur, stomacho adversari, crassioris substantiæ esse, & difficulter excerni; qui in aquis perpetuè limpidis, lacustribus præferri. 4. *Marini*, qui in mari ventis agitato, & ad boream spectante vivunt, propter exercitationem & venti puritatem, carnem habent optimam. 5. *Pelagii*, qui in imo maris degunt, dura sunt carne, difficulter coquuntur, sed copiosum corpori ali-

men-

mentum subministrant. 6. *Litorales*, quia eluvie maris cibantur, improbari possunt: & quia à sole illustrata loca incolunt, & jugi exercitatione, quicquid excrementitum ex pabulo colligitur, dissipatur, pelagiis antepponendi sunt. 7. *Saxatiles*, *ἀπέμεικτες*, qui nec locum, nec cibum mutant, sunt *ὀφθαῖοι*, *ὄχυλοι*, *σρικηῖ*, *κεφαῖ*, *ὀλιγατέφοι*, concoctu faciles (nonnulli veterum *Chylosin* per putrefactionem fieri putarunt) boni succi, abstergentes, leves & parùm nutriendes: qui *πλανήται* errone vocantur, propter motum assiduum & fluctuum verbera, carnem duriorē acquirunt. 8. *Fossiles* duram nec jucundam carnem habent, tam pravos & exitiales aliquando fuisse, ut omnes, qui illos ederant, perierint, Seneca author est. 9. *Αμφίβιοι*, qui partim in terra partim in aquis degunt, propter cibi & motus varietatem ad facultatis tutelam vix probantur. 10. *Pisces* ejusdem generis & speciei differentiam bonitatis & malitiæ, pro salubritate & insalubritate loci, in quo vivunt, obtinent. Meliores nonnulli in Oceano, quàm mediterraneo; & contra. II. *A Substantia*, ratione cuius pisces sunt, 1. *Carnis dura*, qui improbantur, maximè si eadem lenta quoque fuerit. 2. *Mollis*, quæ præstantissimi, si teneram simul & friabilem obtinere. 3. *Media natura*, qui friabilem carnem habent; sed non mollem; quales sunt *Mulli*. III. *Ratione Ætatis*, cuius respectu nota, 1. *Parvos*, si duriorē sunt carne, improbari; sed & molliores, quod mucosam habeant, rejici. 2. *Senes*, multum carnis per ætatem amittere. 3. *Mediam ætatem*, quod nec mucosa sit, nec succo destituatur, probari. IV. *Ratione Cibi*, ratione cuius 1. *Sarcophagi*, duriorē, ficioreque sunt carne. 2. *Qui mucos vescuntur*, glutinosæ sunt substantiæ. 3. *Qui radices & herbas depascuntur*, friabili molliorque carne præditi sunt, &c. Sed de his vide nos in libris de Piscibus.

II. Ex

II. Ex *Partibus piscium*, quæ in cibos veniunt, præcipua est *caro*. Ratione hujus itaque, 1. *Asellus* etsi recens friabilis, tener, loci succi, & facilis coctionis sit; tamen exsiccatus, crassum & difficilis coctionis alimentum, & quod non nisi à valentiore ventriculo vinci potest, suppeditat. 2. *Solea*, *Pas-ser* & *Rhombus*, recentes, candidum & bonum ac copiosum nutrimentum suppeditantem, quodque non facile corrumpitur, habent. Siccati duriores sunt. 3. *Salmonis* caro tenera est, palato gratissima, facile coquitur, & bonum succum præbet, recentem intelligo. 4. *Troctæ* inter pisces, qui in dulcibus aquis progignuntur, sunt optimi, facilis coctionis, multi, boni, ac tenuis succi: majores pinguedine & visciditate improbantur. Palmam referunt, quæ carnem rubram, & plures maculas rubras habent. 5. *Funduli*, sunt salubris alimenti, boni saporis, concoctu faciles, nec diu in stomacho morantur. 6. *Gobitides* fundulis sunt affines. 7. *Lucius minor* imprimis carnem habet friabilem, haud difficulter concoquitur, & facile distribuitur: secundum alios est duræ carnis. Fluviatilis lacustri potior est. 8. *Perca* marina, est secundum Diphilum tenera, minimè virofa, coctu facilis; fluviatilis, friabilem quidem carnem non habet, haud tamen difficulter coquitur, nec mali succi est; alii imbecillum alimentum, & quod facile dissipetur, præbere ajunt. 9. *Cyprinus* seu *Carpa*, carnes humidiores, aqueo potius, quàm tenaci humore dilutas possidet, succumque non parvum excrementitium habet. Laudatur maximè qui in rapidis & puris aquis vivit. Non debet variis cibis misceri. 10. *Barbus* caro candidissima est, facilis coctionis & distributionis, alimentique & succi non mali. 11. *Lampetra* glutinosa est: sed si benè condiatur, gratum & sapidum alimentum præbet. In vino quidam suffocari volunt eam.

12. *Anguilla* carnem habet mollem & dulcem, sed glutinosam, pinguedine & humiditate multâ scatentem: quidam quippiam intus anguillæ inesse dicunt, quod non exemptum, visceribus pestem adferat. Inflammationem pulmonis inferre certum. Veteres tamen tanti habuere, ut cœnarum Helenam appellarent. 13. *Tincam*, Ausonius vulgi solatium dixit. Tantæ creditur pravitatis, ut ejus esus febres inducat. 14. *Hales* carnem habet albam & friabilem, boni saporis, non difficilis coctionis, succi boni. Salitus vel fumo induratus, à seipso degenerat. 15. *Acipenseri*, seu sturioni caro est dura, pinguis glutinosa. Non malum præbet succum, nisi quid difficulter coquatur: juniores sunt gratiores, & multum alimentum præbent.

III. *Reliqua Piscium membra* sunt. 1. *Caput*, quod in quibusdam edule est. Mullus olim non nisi propter caput & jecur emebatur. Hodie Salmonis, Umbrinæ, & Carpionis in deliciis est. Carnium Lupi piscis tres olim lautissima. 2. *Lingua*, quæ in Delphino tenera & pinguis; in Cyprino si assetur prædulcis, & Venerem extimulat. 3. *Oculi*, qui in Salmone sunt teneri & adiposi. 4. *Barba*, quas plenis fabatariis, & discis Heliogabalus pro Nasturtiis, Apiastris, & focno græco exhibuit. 5. *Clidium*, seu ea pars, quæ pectus à cervice determinat. Utraque pars salita *Omotarichum* dicitur, & ori gratum, ægreque vitari Xenocrates prodidit. 6. *Hepar*, quod in Afellis cæterorum piscium jecinoribus anteponitur. Siluri adèò dulce est, ut nauseam pariat. Lupi aslatum & succo mali aurantii conditum, hepatis anserino non cedit. In Mustelarum fluviatilium jecinora, relictus principatus aliquando insumti sunt. 7. *Lateræ*, quæ in Acipensere & Muræna laudantur. 8. *Viscera*, sine quibus Scarus est insipidus, quæque in Delphino sapore & violæ odore delectant.

stant. 9. *Venter*, qui in Hufone carnem porcinam sapore refert. Ex Thynnorum ventre, circumciso abdomine umbilicos enucleando, & fale, aceto, & fœniculo inclusos cadulis condiendo, quidam obsonii genus commentus est. 10. *Lactes*, qui in Lucio, Hufone, & Muranis commendantur. 11. *Abdomen*, quod in Thynnis pingulus & lapidius Hicesius prodidit. 12. *Intestina*, quæ in Salmone, Afello, Congro, & Lucio laudantur. 13. *Ilia*, quæ in Rhombis Horatius l. 2. f. 8. deprædicat. 14. *Lumbi*, quorum in Sphyræna seu Sudi Antiphanes interplautissima obsonia meminit. 15. *Cauda*, quæ in Lucio, Thynno exposcitur. Vulgari proverbio, Cyprini caput, Scordulæ pars media, Lucii cauda à cupedia- rum peritis peritur. 16. *Cutis*, quæ in Tinca à mulieribus Gallicanis carni longè præfertur. 17. *Ova*, quæ ex Percis craticulâ tosta; ex Cyprinis elixa, & frixa; ex Lupo, Salmone, Hufone, Marde condita; *nicaea* expetebantur. *Barborum* intolerabilia tormenta excitant, Luciorum ventrem distendunt. Et tantum de Piscibus.

IV. Inter EXSANGUIA, *Ostreas* duntaxat, *Cochleas* & *Cancros* reponam. I. *Ostreæ* falso, quem præ se ferunt succo ventrem ad dejectionem irritant, appetitum excitant, Venerem stimulant, minus nutriunt, & aliquid difficultatis in ventriculo pariunt. II. *Cochleæ terrestres* seu *Limaces*, carnis sunt duræ, & contumaces concoqui: at si perficiantur, perplenè nutriunt, si crebrius mensis adhibeantur. Crassum & atrum sanguinem gignunt. Quod hæcicis prodesse dicuntur, in carniū jure est, & in parte saltem posteriore, quàm Aristoteles *μηκῶνα*, hoc est, papaver nominat. Inest huic aliquid glutinosum, caseosæ substantiæ paulò magis duratæ simile, facile dissolubile, dentibus statim cedens, tenerum, quod non difficulter coquitur, & valdè nutrit.

trit. Laudantur minus albæ, & quæ in vinetis & fructicetis inveniuntur. III. *Cancrī* qui cauda carent, & gammari ac Astaci, qui caudam habent, qui nostris regionibus familiares sunt, non multum inter se differunt. Difficilis sunt coctionis; victi, validè nutriunt, sed crassum succum gignunt. De *Reptilibus* & aliis, quæ apud quasdam gentes in usu, taceamus.

PUNCTUM III.

De Condimentis, Pane, & Cibi sumendi tempore.

Tertium quod circa cibos explicandum venit, sunt CONDIMENTA, ἰσχυρὰ καὶ ὑποκρίματα, quorum & Differentia & Materia seu Genera enarranda sunt. I. *Differentia Condimentorum* quod attinet, sunt illa, vel 1. *Simplicia*, quæ ex unius rei admissione exsurgunt: vel *Composita*, quæ ex duabus aut pluribus. Illa sunt Calefacientia, frige- facientia, Temperata, Acrida, quæ Aromatica, Amara, Salsa, Acerba, Acida, Dulcia, Pinguia. Hæc fortè plura. *Intinctus*, nempe, *Embammata*, *Saccharata*, *Salviata*, *Alliata*, *Cepata*, *Oxypora*, *Acetaria*: ut taceam, *Tyrotarichos*, *Tuceta*, *Tomacula*, *Succidia*, *Capnistas*, carnes, jura atra, pulmenta, vitulos, porcellosque Trajanos, pernas, minutalia, ventres falscos, apexabones, & alia *ροζαλῶματα*, de quibus consulantur Apicius & Athenæus.

II. *Materia Condimentorum*, sunt *Fossilia*, *Plantæ* ipsæ, *Plantarum succi*, & *Mel*. Ex *Fossilibus* est *Sal*, qui viscosa cibaria attenuat, insipidis saporem conciliat, humida exsiccat, graveolentiam fœtidorum tollit. Optimus est candidus, pellucidus, crystalli instar, densus, inodorus, quique æqualem & cum quadam suavitate acrimoniam obtinet. Dicitur si Mauris fides est, oculos hebetare, genituram absumere, & scabiem excitare. II. Ex *Plantis* est.

1. *Piper*, nigrum inprimis, quod concoctionem præclare adjuvat, & naturis pituitosis mirè confert. Optimum gravissimum, plenum, nigrum, sine rugis. 2. *Zingiber*, cujus calor diutius quàm piperis perdurare creditur, stomachi cruditates compescit, & Venerem excitat. 3. *Cariophylli*, quibus bubulæ linguæ, vaccarum ubera, &c. transfiguntur. Calefaciunt cum quadam adstrictione, & graveolentiam animæ infringunt. 4. *Cinnamomum*, quo juscula cerevisiaria frigida, & aquarum vitia castigantur. Calefacit ventriculum cum adstrictione quadam. 5. *Cardamomum*, quod gustatu est acre & amarum. 6. *Nux myristica*, quæ ad hos pariter usus, ut superiora usurpatur. 7. *Crocus*, qui ciborum coctionem juvat, bonum colorem parit, hepatis oppilationem aperit, & narcotica vi præditus est. 8. *Sambucus*, cujus prima germina aceto condiuntur, & alvum commovent. 9. *Cappares*, qui Sale conditi cum oleo vel oxymelite appetentiam excitant, pituitam in ventre contentam dejiciunt, & lienis obstructions levant. De *Nasturtio*, *Cepis*, *Aliis*, &c. vide supra. III. Ex *Plantarum succis* est, 1. *Saccharum*, quod acria lenit, acida terundit, salsa suaviora reddit, austeritatem vincit, acerbam mitescere docet, insipidis sensum tribuit, sed simul in calidioribus bilem producit; dentibus verò nigredinem, rubiginem, & mobilitatem adfert. 2. *Oleum*, quod si ex olivis benè maturis expressum fuerit, conveniens naturæ nostræ alimentum suppeditat: & aliorum alimentorum malitiam, herbarumque cruditatem emendare & corrigere potest. Alvum etiam mollit & laxat, omnem asperitatem tollit, ruptis & fractis auxiliatur, & dolorem mulcet. 3. *Succi uvarum acerbarum*, *Citriorum*, *malorum agrestium*, quibus Galli & Itali utuntur. Refrigerant, adstringunt, & malaciæ muliebri conferunt. Huc pertinet *Acetum*, quod

quod summè refrigerat, & penetrat. Acrementum ejus pane tosto, vino, uvis passis, sambuci floribus, rosis, saccharo, & similibus infringitur. Melancholicis & feminis uteri morbos reformidantibus, noxium est. IV. *Mellis* natura calidior est, illud quod albicat, & sanis videtur commodum si exceperis. Facile in bilem transit, ideò nec calidioribus naturis nec calidioribus partibus commodum, aliàs detergendi & putredini resistendi vim, habet. Paratur ex eo Medo.

IV. Quarto loco posuimus PANEM, cujus, ratione materiæ & præparationis, variæ sunt Differentiæ.

I. *Ratione Materiæ* I. *Neccessaria* est 1. *Siliginus*, qui ex flore farinæ conficitur, quique potissimum corpori tribuit alimentum. 2. *Similaceus*, qui ex Similagine, quæ post florem est purior farinæ pars, fit, & superiori quàm proximè accedit. 3. *Cibarius*, qui ex polline, quæ pars furfuris minus impura & crassa, coquitur, & minus quidem alit, sed magis ob admistos furfures per ventrem descendit. 4. *Furfuraceus*, qui minimè omnium nutrit, sed maximè per alvum secedit. 5. *Domesticus*, seu *αἰνυτός*, satis optimè nutrit, citoque alvum petit. 6. *Hordeaceus*, qui si ex hordeo præstantissimo conficitur, minus à triticeo abest; si ex laxo & levi, furfuraceo responderet. 7. *Secalinus*, qui si ater & ponderosus, gravitatem infert, mali est succi & crassi, in renibus calculos generat. II. *Condimentaria* est 1. *Fermentatus*, qui levior & distributioni melior, quam azymus. 2. *Azymus*, qui è contra se habet. 3. *Acrizymus*, qui quoque est *δυσεντός*, & ventriculū gravat. 4. *Salitus*, qui levior non salito. 5. *Non salitus*, qui generandis obstructionibus aptus est. *Crocatum*, *Ovatum*, *Butyratum*, *Caseatum*, *Saccharatum* non attingo. Huc pertinent partes

ipsius panis. 1. *Medulla*, de qua sumendum est, quod hic de pane dicitur. 2. *Hetta*, seu *Crusta superior*, quæ humiditates absorbet, & calorem acuit; si verò est retorrida, humorem adustum & atrabiliarium generat. 3. *Crusta inferior*, quæ suo nomine caret, & cui eadem competunt.

II. *Ratione preparationis* panis est 1. *Sapidus*, in quo fermentum & sal benè mista sunt. 2. *Inspidus*, qui se in contrarium habet. 3. *Benè subactus*, qui nec nimium, nec parum, plurimum, moderatè tamen, subagitatus est. 4. *Male subactus*, qui obstruit, inflat, onerat. 5. *Clibanites*, qui quia per totum seipsum coctus est, omnium optimus est. 6. *Furnarius*, quibusdam Clibanites, qui in testis seu furnis portatilibus coquitur; & quia in profundo non similiter assatur, præcedente paulò est deterior. 7. *Ipnites*, seu in majore summo tostus, qui vel super craticulam vel pavementum, aut cineres calidos torrentur, quia exusta superficie partes intimæ crudæ relinquuntur, parvus est. 8. *Subcineritius*, qui cineribus obruitur, & cui cineres pravitatem aliquam adspargunt. 9. *Bis-coctus*, qui desiccatur, & si filigineus est, minimum excrementi relinquit. 10. *Recens*, qui si calidus, siticulosus est, flatuque & suffocationes parit; si frigidus, salubriter esitatur; si viduanns aut triduanns, præ siccitate ægrè concoquitur. 11. *Vetus*, qui durus & mucidus, humorem melancholicum generat; & alvum adstringit. 12. *Magnus*, qui, quia ignis ejus humidum non excoxit, gravitatem ventriculo adfert, & flatu excitat. 13. *Parvus*, qui, quia crustam justo majorem undique obducit, sanguinis affati materiæ, & siccitatis causa est. 14. *Mediocris*, qui magis laudatur. 15. *Spongiosus* & *lævis*, qui leviter alit, & obstructions in visceribus minimè creat. 16. *Solidus* & gravis, qui superiore deterior. 17. *Optimus* itaque est Siligineus,

neus, qui ex tritico maturo, non admodum recenti, solo pingui enato, tineis, pulvere, lolii semine, nigella aut pruina minimè vitiat, non imbre madido, aut ex asservatione fœrido conficitur, benè perteritur, fermentatur, salitus coquitur.

V. *Quintus locus* TEMPORI CIBI SUMENDI datus est, quod etiam pro ratione Nationum variat. Ebraei videntur bis in die sumfisse. Apud Græcos jam dudum ab Homeri tempore edendi tempora distincta fuere in ἀρτον ἢ δείπνον, seu prandium & δειπνον seu cœnam; sequentes habuere ἀκρωτισμο, ἀρσεν seu δεξιήσιν, ἐσπερτισμο, seu δείπνον, δείπνον, & quintum tempus, cujus epulæ κῶμοι, & ἐπιδειπτισμο dicebantur. Romani habuere jentaculum, prandium, merendam, cœnam, & comestationem. Nostrium tempus à Romanorum consuetudine non recedit: plurimi tamen mortalium prandio duntaxat, & cœnâ contenti vivunt. Et tantum de cibis sufficiat. Plura qui voluerit, adeat post Galenum de Alimentorum facultatibus. Morellum in Scholam Salernitanam Bruyerinum de Re Cibaria, Iulium Alexandrinum de Salubr. & Vlysses Aldrovandrum de Animalibus.

ARTICULUS III.

De Potu.

POTUS est res non naturalis humidam corporis humani substantiam instaurans, & sitim sedans. Duo circa eum observanda. Necessitas ad sanitatem, & Genera.

I. *Necessarium ad sanitatem potum esse*, vel exinde patet, quod potus humidam corporis substantiam, quæ indies absumitur, instauret, sitim naturalem sedet, humidum pingue crassumque per angustos meatus deferat, ciborum in ventriculo misturam,

ram, cocturam, & fusionem faciat, & pinguis illius alendo corpori humano destinati inflammationem prohibeat.

II. *Genera potus sunt*, 1. *Aqua*. 2. *Vinum*. 3. *Cerevisia*. 4. *Mulsa*. 5. *Liquores* quidam è pomis, pyris & similibus parati.

I. Circa *Aquam* duo obveniunt, *Differentia* nempe, & *Correctio*. I. *Differentiarum* respectu, *Aqua* est 1. *Pluvialis* seu cœlestis, quæ si procellosa & nimboſa, damnatur; si cum tonitru descendit seu temporaria, levissima est & tenuissima, quod sol subtilissimum sorbeat atque trahat; impura tamen, & putredini obnoxia, quia varii vapores per calorem sublati, pluviae permiscuntur. 2. *Nivalis* & *glacialis*, quæ quia pars tenuissima, & levissima diffatur & evaporat, crassa, ventriculū lædit, & graves articularum nervorum viscerumque morbos excitat. 3. In *Cisternis collecta*, quæ multum limi de se dat, pigra est, calcis virosum saporem odoremque sæpè repræsentat, & animalcula quædam interdum concipit. *Putealis*, quæ, cum supra terram non attollatur, crassa est, & diu in visceribus hæret. *Nota vero*, *Dulcem* in argilloſa terra, *frigidiorē* in top̄ho, *exilem* & limosam in sabuloso. *Optimam* speique certissimam in saxi rubris, *boni saporis* in glarea, *rigentem* ad radicem montium, in saxosis & silice, *laudatissimam*, quæ hyeme calet, æstate alget. 4. *Fontana*, quæ si è *petra* exit, & versus Septentriones fluit, adversumque solem habet, inutilis est: si ad *emersum solis æstivum*, salutaris est: si in *planis* jacet, quia sol tenuissimum educit, & terrenum reliquit, minus salubris: si *per plumbeas fistulas* decurrit, noxia; si *per arenam ac lapillos*, nihilque limi secum trahit, laudata. 5. *Fluvialis*, quæ maxima parte, quod è pluribus fontibus confluvio oritur, & à nivibus in montibus solutis, & pluviis au-

gea-

geatur, mixta est. Cruditatem ejus solis radii, dum per multa spacia terrarum decurrit, corrigunt. Ipsa pro varietate fluminum, & terrarum per quas fluunt, variat. 6. *Lacustris seu stagnans*, & *Palustris*, quæ pessima est. Est enim crassa, & cruda, sæpe pestilens. Ventriculū offendit, viscera obstruit; humores corrumpit, sæpe putridarum febrium causa est. 7. *Optima*, quæ pellucida, saporis & odoris alieni expert, citò refrigeratur, citò incalescit, levis est, & in qua carnes & fructus citius elixantur. II. *Correctio aquarum*, coctione perficitur, quā non solum cruditas & frigiditas emendatur, sed & terrestres & vitiosæ partes separantur, quæ postea calore evanescente subsident. Vide de hac materia *Pamphilum Herilacum*, de Aquæ & vini qualitatibus.

II. *Vini aliquot sunt Differentia*. 1. *Ratione loci natalis*, est 1. *Falerium*, quod præstantissimi succi. 2. *Creticum seu Malvasium*, ventriculi frigidi levamentum, quod colicos dolores pellit. 3. *Gallicum*. 4. *Rhenanum*, quod tenue, cordi roborando, viribusque instaurandis aptissimum. 5. *Hungaricum*. 6. *Hispanicum*, &c. II. *Ratione substantiæ*, est 1. *Tenue*, quod faciliè penetrat, vires subito reficit, meatus aperit, sudores & urinas movet, sed paucioris est alimentii. Tale est inprimis aquosum. hinc fulvum & flavum. 2. *Crassum*, quale est nigrum, rubrum, dulce & austerum, quod plus nutrit; sed diutius in partibus hæret, eas magis calefacit, & ficit, aliquando & obstructions generat. II. *Ratione coloris* est 1. *Album*, quod minus quàm fulvum & flavum calefacit, si præter colorem substantiæ etiam tenuitatem habeat. 2. *Fulvum*, quod albo proximū, & si simul tenue, optimum. 3. *Rubrum*, quod moderatè calefacit, sanguinem bonum generat, nec caput tentat: si crassum simul est, lienis & epatis obstructions appropinquat. 4. *Helvolum*, quod earundem ferè est virium. 5. *Nigrum*,

C 5

grum, quod crassioris est substantiæ, plerumque dulce, maximè nutriens, & sanguinem crassum generans. Dum in visceribus diutius hæret, viscerum obstructions parit, & caput replet. III. *Ratione saporis est* 1. *Dulce*, quod benè nutrit, palato, visceribus, pulmoni & faucibus est gratum, nec caput tentat: at quia crassum, obstructions gignit, & facilè in bilem mutatur. 2. *Austerum*, quod debiliorem calorem habet, in ventre diutius moratur, & ad vias urinarias penetrat, fluxionibus est commodum; sed quia sputum detinet, in morbis thoracis adhiberi non debet. 3. *Medium*, quod optimum. IV. *Ratione odoris est* 1. *Fragrans*, quod vel ipso odore vires collapsas reficit, spiritus auget, omnes facultates roborat. Senibus est utile, nisi quod caput repleat, & nervos feriat. 2. *Inodorum*, quod nec à ventriculo tam avidè arripitur, nec tam aptam augendis spiritibus malè materiam præbet. 3. *Alieni odoris*, quod noxium est. V. *Ratione Ætatis est* 1. *Mustum*, quod flatulentia sua colicam gignit, & urinæ excretionem impedit. 2. *Novum*, quod musteâ adhuc dulcedine blanditur, excrementosum est, non facilè in corpus distribuitur, & fluctuationes in corpore paret. 3. *Vetustum*, quod nervos ferit, & caput tentat. 4. *Medium*, cujus usus ad omnia commodior. In hoc tamen magna varietas. Alia ætatem ferunt, alia vires citius amittunt. III. *Cerevisia*, apud Septentrionales, ubi minor vini proveniunt in usu est. Paratur ex tritico, hordeo, secale, avena, vel separatim sumtis, vel mistis; & conditur lupulo. *Differentias* quoque habet varias. I. *A materia est* 1. *Triticea*, quæ plus hordeaceâ nutrit, calefacit, & humectat; sed succum viscidiorum generat, obstructions parit, urinam conciet, sed alvum laxat. 2. *Hordeacea*, quæ quidem propter hordeum minus calefacit; sed quia plus lupuli fortitur,

tur, non parvam calefaciendi vim acquirit, succum præbet tenuiorem, & magis est diuretica. 3. *Avenacea*, quæ ejusdem est cujus avena qualitatis. 4. *Secalina*, quæ validè nutrit; sed obstructions parit, & urinam remoratur. Huc pertinent *Differentia ab Aquis*, pluvia nempe stagnante, fluviali, puteali, &c. sumtæ, quæ quoque facultates & vires cerevisiarum variant. II. *Ab Ætate est* 1. *Recens* quæ insalubris est, inprimis si turbida: meatus enim obstruit, & calculosis noxia est. 2. *Defecata*, quæ salubrior. III. *A Locis est* 1. *Polonica*, quæ plerumque ex tritico fit, benè nutrit, & moderate calefacit. 2. *Dantiscana*, quæ est Syrupi instar, assuetos optimè nutrit, in non assuetis sitim excitat. 3. *Hamburgensis*, quæ plerumque ex tritico conficitur, est boni saporis, vividum colorem conciliat, urinam pellit, si nimium bibatur, ruborem faciei excitat. 4. *Lubecensis*, quæ nimis fortis, caput gravat, & sanitati officit. 5. *Goslariensis*, quæ primo gustu dulcis videtur, mox vinosum saporem linguæ imprimit. Conducit sanitati. 6. *Embecensis*, quæ subtilis est, clara, & penetrans, primò amariuscule, mox acris, pellit urinam & bilem: idèd in ictero & febribus laudatur. 7. *Brunsvicensis*, quam *Mumam* vocant, non multum ab Embecensi abludit; nisi quodd sit crassior, & flatulenta. 8. *Rostochiensis*, quæ sitim sedat, urinam pellit, & parum nutrit, æstate benè bibitur. 9. *Servestana*, quæ diu in hypochondriis hæret, & quandoque ardorem urinæ excitat. 10. *Neoburgensis* in Thuringia, quæ benè excoquitur, & nutrit; nimium si bibatur, caliginem oculis inducit: quidam à nimio ejus potu, cæci evasere. 11. *Erfurtensis*, quæ sanitati maximè conducit. 12. *Torgaviensis*, quæ laudabilem sanguinem generat, & aromatico sapore principalia membra roborat. 13. *Wittenbergensis*, quæ earundem est cum Rhe-

Rhenana malè excocta virium. 14. *Rauschenburgensis* in Hassia, quæ contra calculum laudatur. 15. *Paderbornensis*, quæ crassum sanguinem generat. 16. *Brabantica*, *Geldrica*, *Zutphanica*, quæ scorbutum producant. 17. *Flandrica*, quæ laudabilissima, inprimis duplex. 18. *Anglica*, quæ bibentes pingues reddit. 19. *Rhenana*, quæ plerumque vilis & noxia. 20. *Coloniensis*, quæ Brabanticam superat. Taceo *Differentias à vasis sumtas*, quæ quoque facultates mutant. Servantur aliquando in picatis, aliquando non picatis vasis. *Mulsum* seu *Hydromel*, plerumque plus quàm vinum calefacit, præsertim, si aromata addantur. Facile verò in bilem ob mel abit.

CAPUT II.

De Rebus non naturalibus, quæ geruntur.

Res non naturales quæ geruntur, sunt Affectus animi, Motus & quies corporis, somnus & vigilia, magna ad sanitatem seu conservandam, seu violandam momenta. De Affectibus animi, & eorum actione in corpus, hæc ex præcipuis occurrunt. 1. *Moderatos* sanitatem conservare, nec quicquam in corpore mutare. 2. *Excessum passos*, sæpè corpus de statu naturali dejicere, aliquando & mortem repentinam inferre. 3. *Affectus bonos* si species, 1. *Amor* si excedit, quia Spiritus in corde, rem amatam ad se attrahere gestiente vehementer accendit, ut eos rei amatae obviam mittat, sæpè palpitationem, aliquando insaniam, syncopen, &c. excitat. 2. *Latitia*, si moderata est, cor & spiritus vitales recreat; si *repentina* & nimia, Spiritus, quos in ea cor ad membra exteriora, propter nimiam sui dilationem effundit, ita dissipat, ut sæpè mortem inferat. 4. *In Affectibus malis* 1. *Tristitia* sensim & paulatim Spiritus dissolvit, corpus

pus refrigerat & siccatur, concoctionem vitiat, vigiliis inducit, & morbos melancholicos generat. 2. *Metus*, vires propter subitum caloris Spiritum & sanguinis ad exteriora recursum, resolvit, pulsum parvum cum extremorum refrigeratione inducit, & aliquando subitæ etiam in juvenibus caniciei causa fuit. 3. *Ira*, in qua Spiritus & sanguis quasi in corde effervescent, & cum impetu ab interioribus ad exteriora moventur; Spiritus & humores agitat, corpus universum calefacit, febresque generat. Sæpè iratos, tremores artuum, & cordis palpitationes, invadunt. Mulieres verò in periculum abortus incidunt. Mortem, quia Spiritus in ea libere & cum impetu feruntur, vix cuiquam intulit; si factum, aliquem affectum naturalem accessisse, necesse est.

II. *Motum* ad sanitatem esse necessarium, exinde patet, quod calorem nativum augendo, nutritionem promoveat; Spiritus movendo & agitando, vapores & excrementa discutiat; soliditatem membrorum & duritiem ex mutua attritione partibus conciliando, *duo prædicta* quandam corpori inducat. Pro ratione verò *Differentiarum* diversimodè in corpus humanum agit. *Optimus*, omnes partes æqualiter exercet. Huic *proximus*, quo omnes sed non æqualiter moventur; *levissimus*, qui unam exercet. I. *Nimius*, Spiritus & solidas partes exhaurit, totum corpus refrigerat, musculorum, nervorum, & ligamentorum robur dissolvit, & lumini oculorum obest. II. *Celer*, corpus densat & attenuat. III. *Tardus*, carnem rarefacit & auget. IV. *Vehemens*, corpus durum, vegetum, sed simul gracile reddit. V. *Continuatus & æquabilis*, quia ab eo tanquam multo membra refranguntur, magis delassat. VI. *Inæquabilis*, quia quiete interciditur minus. VII. *Intercisus ac ordinatus*, minorem defatigationem, cum interruptio quietem, quies lassitudinis minus inducat, parit.

VIII. In calidis locis magis exurere, in humidis humectare, quod corpora exercitatione rarefacta facillimè ad imbibendas aëris & locorum qualitates disponantur, certum est. IX. Ex Motibus à se factis, 1. *Salvus sine intermissione*, calorem nativum excitat, sed caput concussione & pectori compressione dum dorsum flectitur, nocet. *Versus altum*, coxas juvat, pectori noxius; *versus inferiora*, caput à superfluitatibus emundat, & crura corroborat. *Cum exsultatione*, diuturnis capitis morbis accommodatur, & materiam ad superiora tendentem ad inferiora deducit. 2. *Cursus*, si est *vehemens*, obesitas & humidis corporibus prodest, sed capite quoquomodo dolentibus nocet. Si *moderatus*, corpora perbellè calefacit, appetitum excitat, & licet primum defluxiones moveat, eas tamen postea tractu temporis cohibet. *Longus anterior*, si sensim fit, carnem diffundit; sed corpora crassiora reddit. *Retro* si placidus est, capiti oculis, stomacho, lumbis, accommodatus est; *Circularis*, carnem & ventrem distendit, & caput valdè offendit. *Per accliviam*, thoraci & cruribus inimicus est. *Per decliviam*, caput vehementer afficit, viscera quassat, coxas debiles perturbat, *per plana*, omnia superius dicta præstat. *Tecto corpore*, sudorem movendo humectat, & carnem calefacit, sed corpora decoloratiora, quod Spiritus sincerus, allabens ipsa non depurget, facit. *Nudo* magnam sudorem copiam elicit, per occultos halitus humores evocat, corporaque magis adurit. 3. *Disinctus*, propter vehementiores in longius discum projiciendo obnixus, vehementia motus, & musculorum intentione, artus magis solidescunt, & ab excrementis purgantur, sed renibus aut thorace malè affectis vitandus est. 4. *Iaculatio*, boni habitus acquisitioni inservit; ideo Æsculapius & Apollo magistri jaculandi esse putantur. 5. *Deambulatio, mediocris, contenta* tamen, corpora pura red-

dit,

dit, defluxionibus & mensium suppressionibus auxiliatur. *Velox*, magnopere calefacit, & magnitudinem carnis tollit. *Tarda*, senibus imbecillioribus commoda est: quia corpora immodicis laboribus exsucta emollit, meatusque corporis laxando purgat. *Nimia*, corporis tremorem debellat, flarus discutit, & capita debilia magnopere perturbat. *Multa*, capite & thorace affectis, & quibus partes infernæ non nutriuntur, auxiliatur. *Pauca*, iis quibus deambulationibus à cibo opus est, quique gravitatem corporis sentiunt, prodest. *Longa & recta*, capiti prodest, sed nimis humiditates exfugit. *Longa & concitata*, singultui comprimendo prodest. *Brevis*, ex motu & quiete inter reflectendum orta, laborem infert, & continuis reversionibus caput labefacit. *Cum intensione crurum, calcibus incumbendo* instituta, thoraci humido & utero convulso prodest. *Extremis digitis insistentibus*, & alvo suppressis conveniens est. *Per accliviam*, magis, quod corpora quasi onere premanantur, fatigat, sudorem movet, & Spiritum cohibet; genibus verò infirmis valdè adversatur. *Per decliviam*, à capite ad inferiores partes trahit, sed femora invalida reddit. *Per plana*, ob motus universitatem, corpus labore afficit, ob naturæ quam tenent similitudinem, citius eosdem finiunt. *Per inæqualia* iis qui citò deambulando defatigantur, commodæ sunt. *Per aspera* caput replent. *Per arenas profundas*, maxime ad omnes corporis partes firmandas corroborandasque faciunt. *Loco concluso*, aëre intemperato, vitioso, crasso, & corpus universum replente fruitur. *Sub dio*, si ad mare, & siccandi, & crassos humores attenuandi vim habet; si ad stagna & flumina, humectat, sed Epilepticis nocet; si in mediterraneis, factæ circa mare cedit; si in rore, non sine damno humectat; si in locis vento minus perflatis, ad evocandum per halitum, & excrementa digerendo facit, & in colicis

licis à frigida causa ortis commendatur; si *sub borea*, tussis excitat, sed sensuum integritatem affert; si *sub Austro*, caput replet, alvum mollit; si *sub Zephyro*, omnium saluberrima est; si *sub Apeliote*, ferit; si *in sole*, capiti humano noxia est, calidum liquefacit, siccum siccius reddit. De illa quæ *sub umbra*, nota 1. Arborea rore suffusa vitari debere, quod colliquatis à rore arborum superficiebus, aspergo noxia corporibus affusa, partes extimas mordeat & discindat. 2. Saluberrimam deambulationem, quæ sub myrto, lauro, & inter bene olentes herbas instituitur. *Cælo sereno*, levat, per halitum evocat, bonam respirationem conciliat. *Cælo nebulofo*, gravitatem affert, caput implet. *Matutina*, alvum mollit, segnitiam à somno contractam dissolvit, appetitum excitat, & humidioribus temperamentis, quod humoris transitus exinaniantur, confert. *Vespertina*, hominem ad somnum præparat, inflationes dispergit, & caput debile malè afficit. *Post cibum*, exigua assuetis & illis quibus non sine labore cibus in ventriculi fundum descendit, conveniens est. 6. *Erecta statio*, universim, qui dorso sunt imbecilliori, vel renum inflammatione & ulceribus laborant, noxia est: In specie considerata. *Ante cibum*, ventriculi excrementis inaniendis, & asthmaticis, auxiliatur, urinam provocat, & pedes corroborat, sed vertiginosis, quod fumi caput petant, non convenit. *Post cibum*, si *moderata*, descensui ciborum in ventriculi fundum cooperatur; si *diutina*, vaporum copiam ad superiorem corporis regionem mittit, humorum multitudine ad inferiora præcipitat, thoracem labefactat, & vesicam, totamque mingendi actionem vitiat. *In umbra*, ex ambulatione in eadem judicanda est, habita pauci & multi ratione. *Sub sole*, magis in æstate deurit quam deambulatio, & in impuro corpore magnum capiti nocumentum affert, &c. X. *Ex Motibus ab alio factis*

Estis est, 1. *Equitatio*, quæ si placida & lenta, lassitudinem magnam parit, hominesque infecundos reddit: si *celer*, nec admodum frequens, equitantes, continuâ genitalium attractione, libidinosiores facit, & corpus laboriosè concutit, thoracique maximè adversatur: si *succussante equo* peragitur, caput, collum, dorsum, & nates offendit, sed renum arenulas educit: si *currentibus equis*, nimium calefacit, sensus hebetat, & oculos offendit. 2. *Gestatio*, in genere, in sanis & valetudinariis, calorem naturalem auget, & materiæ multitudinem discutit: in vigilantibus verò, somnium, excrementa quæ à capite à stomachum delabuntur digerendo, conciliat &c. In Specie. *Vehiculo* quæ peragitur, si *est mitior*, in capitis affectionibus, & intestinorum fluxionibus prodest, sed Epilepticis, quod motus rotarum vertiginem faciat, obest: si *retroversa sit facie*, visui debili, ejusque obfuscationi magnum juvamentum adfert. Si *vehementior*, in supprimenda carnis multitudine, à Cœlio commendatur. In *Lecticâ*, sanis post cibum in obviandis negotiis commoda, in ægris quoque olim in usu. *Decumbebant* lethargici, nephritici, &c. sic enim materiam expulsionem aptam efficit; *sedebant*, diuturno aliquo & levi morbo impliciti, in integra febrium declinatione consistentes. In *sella*, in naturis frigidis, & quæ manifestè inclinare animadvertuntur, admittitur. Sed de his omnibus consule eruditissimum Mercurialis de Arte Gymnastica opusculum, quod forte recensitum, & aliquot Notulis auctum, in publicum aliquando iterum emitemus. IV. De *Quiete* non est, quod aliquid dicam. Ex Motu quod dici potest, unusquisque colliger.

III. *Somnus* quoque ad sanitatem necessarius est, ut & membra corporis humani lassâ refocillentur, & Spiritus quibus anima in perficiendis actionibus utitur, restaurentur. *Moderatus* si est, non tantum eo

vires defatigatæ refocillantur, & Spiritus laboribus diurnis dissipati instaurantur; sed & calor ad interiora revocatur; unde alimentorum, crudorumque humorum in toto corpore coctio feliciter perficitur, totum corpus, & inprimis viscera, suaviter humectantur, calor augetur, & totum corpus validius redditur; curæ tolluntur, ira sedatur, animusque tranquillior evadit; immoderatæ evacuationes, præter sudorem, supprimuntur; senibusque inprimis utilis est somnus. *Immoderatus* contra somnus, spiritus obscurat & torpidos reddit, mentique & memoriæ stuporem quasi conciliat, caloremque crudis humoribus cumulatis & superfluis cohibitis obtundit. Somnus etiam, qui corpore quocunque modo inani- to initur, corpus exsiccat, atque extenuat.

I V. *Vigilia* etiam vel sunt *Moderata*, vel *Immoderata*. Illa Spiritus ac sensus excitant & vegetiores reddunt, spiritus & calorem in omnes corporis partes distribuunt, alimenti distributionem adjuvant, excrementorum propulsionem promovent. *Immoderata* tamen si sint vigiliæ, spiritus, inprimis animales, absumunt & dissipant, & universum corpus, præcipuè cerebrum, exsiccant, bilem augent, acuiunt & inflammant; tandemque calore dissipato morbos frigidus excitant.

CAPUT III.

De Rebus Nonnaturalibus extrinsecus adhibitis.

Res Nonnaturales extrinsecus adhibita sunt, Balnea, Inunctiones, Frictiones & Vestes.

I. De Balneis observa. 1. Non minus alterare, quam aër ipse. Sed pro diversitate temperaturæ, diversimodè, plusque in iis artificii quàm in aëre. 11. Non rarè & quidem graviter, inprimis insuetos, plethoricos, cacochymicos, catarrhosos, inflamma-

tionem

tionem & erysipelati obnoxios, lædere. 111. Fieri aut ex *liquoribus*, ut aqua dulci, fontibus medicatis, decoctis herbarum, oleo, lacte, vino, &c. aut ex *vapore*, aut ex *solida substantia*, calida nempe, arena, sale, vinaceis. I V. *Vapor aqua dulcis* calefacit, primo humectat, relaxat; mox liquores concretos liquat, & sudores elicit; tandem, diuturniore mora exsiccat. V. *Aqua dulcis calida*, per se humectat, sed primum adhibita, calefacit; deinde expirantibus calidis vaporibus, refrigerat, attenuat, & exsiccat: *Aqua tepida*, sive modicè calida calefactos refrigerat, refrigeratos calefacit, simulque relaxat, & mediocri tempore adhibita impingat, & excrementa sub cute coquit, longiori temporis morâ resolvit & discutit; quare naturis gracilibus calidis, & quibus calor mordax est, mediocri temporis mora, convenit; item melancholicis, hæsticis, ac febribus siccis, sitientibus: præterea lassitudines arcet, dolores mitigat, cutaneis affectibus convenit: *Aqua frigida* refrigerat, sed simul meatus constipat, densam duramque cutim efficit, totumque corpus roborat, calorem ad inferiora revocat, unde concoctiones juvat, & bonum præsidium est contra læsiones ab externis causis, si modicè rectaque ratione utamur. Illis qui augentur, & bona victus ratione ac exercitii non utuntur, aut cruditatibus & constipationibus opportuni sunt, & acres vapores gignunt, noxia. VIII. De *Artificialibus balneis* ex ingredientibus judicandum est. IX. *Aqua ex medicatis fontibus*, pro sua qualitate partes alterant, ut sulphureæ exsiccant, calefaciunt, resolvunt: Nitrosæ exsiccant, abstergunt, &c. Vide de illis *Fallopium*, *Mercurialem* & *Baccium*.

II. *Inunctiones* quod spectat, ante & post balneæ istæ olim incisu, ut passim ex Galeno patet. Quia hodiè discere, ideò de illis nil dicam. Vide Galenum 2. de simpl. Medic. facult. c. 2, 4. item 7. Method.

D 2

medendi

medendi cap. 6. Consule & Mercurialem artis Gymnast. lib. 1. c. 8.

III. *Frictionis* effectus pro differentiarum ratione variat. 1. *Dura*, corpus induratur, cogitur, densatur. 2. *Mollis* contra, emollitur, laxatur, solvit. 3. *Media*, mediam rationem obtinet. 4. *Multa*, carnem minuit, dissolvit, & gracilitatem inducit. 5. *Pauca*, eadem eandem quantitate relinquit. 6. *Mediocris*, carnem auget. 7. *Matutina*, optimè post communium superfluitatum excretionem instituitur, resiccatis & lassitudinem sentientibus proficua. 8. *Vespertina*, lassatis, resiccatis, & alimentum non sentientibus commoda est.

IV. *Vestitus* loco aëris ambientis ab Hippocrate l. 6. Epid. l. 8. ponitur: nobis inter extra adhibita referre placuit. Omnis in genere aliquatenus corpus nostrum calefacit, tam prohibendo, ne aër frigidior corpus nostrum attingat; quàm impediendo calidum corporis nostri effluxum, & inducendo proprium ac germanum calorem. Effectus pro ratione *Differentiarum* variat. 1. *Bombycinus*, magis calefacit, cum subtile ac tenerum est, emollit. 2. *Sericeus*, quo magis villosus est, eo potentius calefacit. 3. *Lanæus*, multum calefacit & exsiccat. 4. *Pelliceus*, si pilis multis refertus, omnium maximè calidus existit. 5. *Coccineus*, & quisquiliatus Spiritus & humores cum quibus analogiam habet, à centro ad circumferentiam evocat, idèo calidior habetur. 6. *Aromatizatus*, cerebro calidiori obest, & cephalalgiam inducit. 7. *Linteus* & *byssinus*, calce dealbatus, mordicat & scabiem excitat. 8. *Cannabinus*, ficior est lineo.

CAPUT IV.

De Rebus Nonnaturalibus, quæ excernuntur,
& retinentur.

Res Nonnaturales, quæ excernuntur, & retinentur sunt, tum illæ, quas in nutritione corporis humani, natura, ad restaurandum id quod absumptum est, retinet; tum illæ, quas tanquam inutiles separat, & exercet.

De eis observandum in genere. I. Excrementa pro ratione coctionum variari. Sunt quædam simpliciter talia, ut Urina, vapor internus. Fuligo, Furfures, Sudor, Medor, Ichor, Lachrymæ, Lemæ, Menstrum, Hæmorrhoides, Sputa, Mucus, Coryza, Styriæ, Aurium sordes, Faces Alvi: Quædam proliis causa, ut Lac, semen, sanguis maternus. II. Eadem ad sanitatem necessaria esse, tum quod videamus, inculpatam hanc si commodè excernantur; lædi, si vel retineantur, vel intempestivè ejiciantur.

In Specie trium hic in primis rationem habendam, Excrementorum nempe alvi, Urinæ, & Veneris. I. Alvi excrementa si sæpius deponantur, & secum humores vitiosos deferunt, sicque corpus levant, sanitatem firmant: si frequentius & diutius, corpus necessario alimento fraudatur, & tabescere incipit, vires deiciuntur, & non rarè intestina abraduntur. si non debito tempore, per putridos vapores, coctionem impediunt, caput debile lædunt, & partibus reliquis molestiam creant. II. Urinæ, si diutius retineatur, non solum vesicam, partesque vicinas gravat, sed sæpe eandem adeò distendit, ut postea contrahi non possit. Quod si renes serosam humiditatem ad se non traxerint, permixta cum sanguine manet, & in totum diffusa corpus, cachexiæ & hydropi causam suppeditat. III. Semen intempestivè retentum, corporis

totius gravitatem inducit; & si corrumpatur, gravissima accidentia, excitat: *Nimum* excretum calorem nativum dissipat, corpus universum debilitat, cruditates cumulat, nervos lædit, paralyfin, & mentis debilitatem inducit.

TITULUS II.

De Methodo tuenda sanitatis.

CAPUT I.

De Tuenda sanitate in genere.

Methodus tuenda sanitatis est doctrina, præcepta de legitima rerum non naturalium ad sanitatem conservandam usum præscribens.

Finis itaque erit Sanitatis conservatio, quæ & intemperiei totius corporis, & singularium partium similiarium, earumque proprietatis specificæ, & occultarum qualitatium, & in organicarum, conformationis justæ, & utrarumque unitatis conservatione consistit.

Præcepta illa sunt vel *Generalissima*, vel *Generalia*, vel *specialia*.

I. *Generalissima* sunt quasi communia principia, ad quæ diæta conveniens exigitur, & sunt sequentia.

1. Quod secundum naturam est conservandum esse.

II. Mediocritatem semper esse sequendam. Nam

πάν το αριστόν τῇ φύσιν πολέμιον, omne nimum est

Natura inimicum; quod sic egregiè expressit Phocylides: Μᾶλλον μὲν φανερόν ἐστι πλεονεξία καὶ μὲν λογίζεσθαι

πάντων μέτρον ἄριστον, ὑπερβολὴ δὲ ἀλεεινή. III. Mu-

tationes subitas esse vitandas. Semel enim multum

vel repente vel evacuare, vel replere, vel calefacere,

vel refrigerare, aut alio quovis modo corpus move-

re, periculosum est, ut Hipocr. l. 2. aphor. 51. lo-

quitur. IV. A consuetis non facile recedendum.

Consuetudo enim altera natura, & πᾶσι κοινὴ ἔσθι

18

18 συνήθην καὶ ἡ χεῖρα τῶ ἀσυνήθων ἥσσον ἐνοχλεῖν εἶδη. Consuetudo longo tempore etsi deteriora sint, minus insuetis molesta esse solent, ut l. 2. aphor. 50. traditur. Quomodo autem Consuetudo sit ἐπίκτητος φύσις, adventitia natura. & quantum in actiones naturales, vitales, animales, & partes humani corporis possit, vide apud Renatum Moreau in scholæ Salernitanæ caput 15. p. 215, & Sennertum in Paralipom. p. 48. IV. Exactè sana corpora similibus fovenda; ab exacto sanitatis statu recedentia, paulatim & moderatè ad contraria deducenda esse. V. Ita occultis proprietatibus servandis invigilandum, ne temperies corporis lædatur. VI. Calidum innatum omnium partium, moderatè calidis, & modicè adstringentibus, servandum est.

II. *Generalia*, de rebus non-naturalibus præcepta, secundum eorundem superiore titulo propositam seriem, optimè deducemus.

I. *Aër itaque* 1. Eligatur temperatus, purus, non foetens, liber, tanquam salubris eligendus est, fugiatur, qui vitiosis halitibus scatet. 2. Mutatio calidi in frigidum & contra summopere vitetur. 3. Frigidus, accenso foco, suspensis peripetasmatis, hypocausto excalefacto; Calidus, aquâ gelida de vase in vas transfusa, vel per pavementum sparsa, stratis per ædes rosas, foliis Nymphææ, salicis, viticis, arborum frondibus alteretur. Humidus igne luculento, & suffitibus aromaticis; siccus, aquarum irrigationibus & herbis humectantibus; Pestilens suffitu lignorum aromaticorum, Turis etiam, corrigitur. 4. Otiosis extra moenia in aëre libero & campestri deambulandum. 5. Manè citra montes, vesperi circa fontes & flumina exspatiandum; tum quod ibi ver, tum temporis purior sit & illustrior; hic à sole occidente illustretur, & sincerior reddatur; tum quod manè non admodum æstuemus propter præceden-

tem noctem; vesperi per meridianum calorem molestum, refrigerium, ad aquas inveniamus. II. Circa *Cibum* observanda sunt quædam in genere, quædam in specie.

I. *In genere* nota. 1. Eligendos esse cibos maximè temperatos, & naturæ nostræ familiarissimos, ut sunt, panis benè coctus, carnes animalium, & quæ ab animalibus peruntur, pisces, &c. Inter Panes optimus est, benè fermentatus, oculatus, plurimum ab artifice subactus, & in clibano mediocriter calido bellè coctus, mediocri sale conditus, & ex optimis granis seu laudatissimo tritico confectus. 2. Utendum & simplici victu, & quia iste facilè satietatem & nauseam parit, vario; modò hic non sit diversæ substantiæ diversarum qualitatum, sed earundem, ut ab eodem calore & eodem tempore concoqui possit; nec copiâ peccetur. 3. Consuetudinis summam habendam rationem, quâ effectum, ut quidam venena absque noxa assumerint. 3. Paulò peiorem sed suaviorem cibum & potum, meliori, at ingrato præferendum esse. Tales enim ventriculus avidè attrahit, rectè complectitur, & feliciter coquit.

II. *In specie*, habenda est ratio *Quantitatis*, *Electiois*, *Condimentorum*, *Temporis*, & *Ordinis*: de quibus in *Diætâ* mediæ ætatis agemus.

III. De Reliquis nihil ferè in genere occurrit: hoc duntaxat addi potest, cavendum esse, ex Celsi monito, ne in secunda valerudine, adversæ præsidia consumantur; Præstat corpus moderatè quotidie exercere, ne superfluitates colligantur, quàm purgationibus vel aliis medicamentis uti.

C A -

CAPUT II.

De tuenda sanitate, in Specie; & primò de parte Δειπνῆς.

ARTICULUS I.

De tuenda Benehaborum sanitate.

PUNCTUM I.

De tuenda sanitate infantum, puero-
rum & puberum.

Tantum de tuenda sanitate in genere: jam videndum quomodo in specie sanitas conservari possit. Est autem hæc vel *Benehaborum*, vel *Intemperatorum*.

Benehabiti seu Δειπνῆς, unde hæc pars Δειπνῆς dicitur, sunt vel *Infantes* tam nondum nati, quàm in lucem editi; vel *pueri*, vel *puberes*; vel *mediæ ætatis* homines, vel *senes*.

I. *Infantes nondum nati*, bene habebunt, si Prægnans fugerit quædam, fecerit quædam. Ex *Fugientibus* sunt 1. Aër tam humidus & Australis, quàm fœtidus à lucernis extinctis, castoreo sulphure, & similibus excitatus. 2. Odor & herbarum fortium, rutæ, pulegii, menthæ, & suaveolentium, si suffocationi uterinæ obnoxia est. 3. Adspæctus rerum horridarum, & terribilium. 4. Cibi acres, amari, falsi, & qui venarum ora aperiunt: quales sunt, alium, cæpæ, sinapi, petroselinum, &c. nec non illi qui flarus excitare possunt; quibus adde absurdos, vel difficulter acquirendos. 5. Motus tum violentus tam corporis quàm animi, primis præsertim mensibus, tum nullus, qui humores colligit. 6. Veneris usus in initio conceptionis, ne uteri conceptione fœtus excutiat. 7. Balnearum usus, ne uteri ligamenta laxentur. 8. Risus nimius, vel imaginatio.

D 5

9. Alvi

9. Alvi tarditas, quæ usu jusculorum & mannæ tolli potest. Ex *Faciendis* sunt 1. Aër temperatus, ficus potius quam humidus. 2. Cibus boni succi, & ultimis mensibus copiosus Poma, Cydonia foetui vigorem conciliare creduntur, sed & ficuum assarum singulis diebus ante cibum usus partu appropinquante commendatur, quod inde secundas facilius separari & extrahi credant. Crocus denique & Cinnamomum ultimâ mensâ probantur. 3. Vini boni vel cerevisiæ claræ moderatus usus. 4. Motus nono mense fortior, ut partes dilatentur. 5. Venus circa idem tempus moderata. 6. Balnea aquæ tepidæ, quæ partes genitales ad partum laxant. 7. Somnus quam vigilæ potior. 8. Usus foetum confortantium; inter quæ Balsamus, Embryonis, & Amygdalæ dulces cum malvatico excellunt.

II. *Infantibus recens natis*, secundum septenarium benè providebitur. 1. Si in lucem edito, superfluitates per alvum, exhibitio saccharo penidiato, cum oleo amygdalarum dulcium vel melle, ut Epilepsia præcaveatur, deturbentur. Si à Nutrice nisi mater sit debilis, vel morbis obnoxia, vel pravorum morum, caveatur. 3. Si lacte ad biennium vel octodecim menses ita alatur, ut interim aliis cibis assuescat. Commune est apud nos ex farina triticea & lacte pulmentum; quod quia tormina & obstructions parit, vel ista in clibano benè exsiccanda est; vel cibus ex medulla panis triticeï olim jusculo gallinæ substitutus. 4. Si victus primo triennio ad humidum vergat. 5. Si recens natus singulis diebus post tertium mensem ad septimum alternis, à septem ad ab lactationem singulis septimanis bis, lavetur. 6. Si sub primi septennii finem, balnei usus sit rarior; nec statim à cibo vel potu, ne crudus in corpus trahatur, fiat. 7. Si vinum ante XXI annum ex Platonis præcepto fugiat. 8. Si quo magis crescit, eo sæpius, sed ita

ita ne vel membrum aliquod distorqueatur, vel intempestivè siccitatem contrahat, exerceatur. 9. Si dum crescit, sensim de somno abstrahat.

III. *Pueri exigunt*. 1. Cibos solidiores, sed moderate siccatos, ne humidum importunè lædatur. 2. Exercitationem validiorem, sed minorem aliquando quam vires ferre possunt.

IV. *Puberibus* debetur 1. *In genere* victus cuique vitæ generi convenientis inchoamentum, ut corpus, hac ætate, diætæ toto vitæ decursu servandæ assuescat. 2. Cibi qui etiam in non magna quantitate, magnam alendi vim habent. 3. Labores firmiores, ut ad quodcunque exercitiorum genus & aëris constitutiones ferendos corpus aptum reddatur. 4. Veneris fuga, quæ calorem nativum intempestivè dissipat, & corpus frigefacit, fuga. *In specie*. *Studiosis* debetur Spirituum animalium cura, ut sint copiosi, nitidi, puri. Tales verò suppeditant Aër subtilis & purus. Victus tenuior, & succi laudabilis. Excrementorum justa evacuatio. Intempestivorum studiorum, quibus cruditates accumuluntur, & corpus morbidum redditur, fuga.

PUNCTUM II.

De Sanitate mediæ ætatis tuenda.

MEdiam ætatem illam vocamus, quæ sumta à tertio Septenario initio, per quatuor sequentes decurrit, & in quinquagesimo anno finitur, ita ut adolescentiam, juventutem, virilitatem, & maturam ætatem complectatur.

Hujus sanitatem tuebimur, si quædam circa Cibus, Potum, Affectus, Motum corporis, Somnum, Balneas & Excreta observaverimus: & si quod erratum commissum fuit, id postero die mox emendemus.

I. *In Cibo* habenda est ratio I. *Quantitatis*, de qua

qua nota. I. Tantam esse debere, quanta ad vires restaurandas, non verò gravandas requiritur, quod ex famis, post sex vel septem à cibo horas sensu; ructu, gravitatis & odoris carentia, somno quieto, vigiliarum, & peregrini saporis absentia; & si Sole orto caput non sit grave, & homo ad omnia negocia promptus, colliges. 2. Ad tria inprimis respiciendum, 1. Alimenti naturam, cujus respectu, Cibi difficulter concoctibiles majori copiâ plus nocent, quam qui facilè concoquuntur. Perniciosa copia, si qualitatem noxiam adjunctam habet, nisi à suavitatem aliquo modo imminuatur. Qui ventriculum frigidum nacti sunt, minus assumere debent; quia is plus appetit, quàm concoquit; qui calidum plus, quia plus digerit; qui temperatum, appetitam mensuram quantitatis cibi constituent, nec cibum antequam fames venit assumere. Melius est, ut calor cibos excedat, quàm ut ab iisdem superetur. 2. Corporis & vitæ genus, & labores, quorum respectu Otiosis minus sumendum, quia minus digerunt; laboriosis plus, quia exercitio calor augetur. 3. Tempus anni & coeli constitutionem; cujus ratione, Hyeme & Vere plus edendum, quia tum ventres naturâ calidissimi. Contrarium æstate. 3. Inedia, victu parcior, somno, quiete, & vomitu, corrigendum, si vel more pravo, vel ciborum illectamentis peccatum est, sæpe boni cibi usu natura ad coctionem invitata, cruditatem quàm antea vincere non potuit, aggressa est. II. *Electionis*, ubi nota. 1. Familiariores esse naturæ nostræ animalium carnes, quam ullos alios cibos. 2. Ex *volatilibus* laudari, *Anatem* unius anni, hyeme, ex ea pulpam pectoris, jecur, & posteriora; ex Sylvestri alam à Septembri ad Januarium. *Anserem* unius anni, hyeme, & ex ea pectus, jecur, & posteriora, pullos unius mensis vere & æstate. *Caponem*, unius anni ab Octobri ad Aprilem, & ex

eo,

eo, alas, Uropygium, pulpam pectoralem. *Coturnicem* Augusto, Septembri & tota hyeme. *Columbinos* pullos trium vel sex Septimanarum, quorum primæ partes Coxæ & venter. *Gallinam* annuam, Januario, Febuario & Martio, pullos vero sex septemve Septimanarum. *Indicam* hyeme, pectore, & ventre, cujus etiam pullus vere melior est, duorum aut trium mensium. *Perdicem* Octobri ad Ver usque omnibus partibus, sed alis maximè. Cujus pullus sex octove septimanarum Julio, Augusto & Septembri regium est edulium. *Phasianum*, autumnus & hyeme alis potius quàm coxis, cujus pullus sex octove Septimanarum, æstate suavisissimus. *Turdum*, unius mensis, autumnus & hyeme. III. Ex *Quadrupedibus* probari *Bovem*, à Septembri ad Martium, maximè si sit quinque annorum, pectorali inprimis pulpa, lumbaribus partibus, & musculis coxariis. *Cuniculum*, hyeme & æstate, vertebrae ad lumbos, coxis & armis. *Leporem* hyeme rigida. *Lepusculum*, duorum triumve mensium omni tempore. Hoc dum, vere, uno aut altero natum mense, præstat tamen ejus posterioribus partibus, costis, ventre, capite, & pedibus vesci, quàm aliis. *Porcum*, biennem hyeme, vertebrae dorsi, lumborum, costis, auriculis & pedibus. *Porcellum*, quovis tempore. *Vitulum*, à Decembri ad Majum lumbis, pectore, ventre, capite, hepate, renibus. De *Piscibus* taceo, ne compendii nomen excedam. III. *Conditorum*, de quibus observa. 1. Sanis & valentibus paucis admodum condimentis utendum. 2. Ab iis quæ plurimum à temperamento nostro distant abstinendum. 3. Iis, quæ ad temperamentum ciborum quibus vescimur proximè accedunt, utendum. 4. Ætatis tempore, & biliosis natura condimenta frigidiora, hyeme & pituitosis calidiora concedenda. 5. Sic illis utendum, ut nusquam plures cibi ingerantur, quam

quam calor ventriculi, coquere possit. *IV. Temporis*, seu quoties & quando cibus sit sumendus. De utroque universim occurrunt. 1. Non comedendum sæpe & multum, quod athletæ olim faciebant; quia hoc nec corpori nec menti commodum. 2. Præstat pluries & parùm, quàm semel comedere: sic nec ventriculus gravabitur, nec corpus contabescet. 3. Toties ad beneplacitum, quoties fames oboritur. hoc autem pro ratione ætatis, temperamenti, vitæ generis, consuetudinis variat: saluberrimum tamen bis de die cibum sumere, iis qui mediocribus laboribus exercentur, qui frequentioribus quater. Nec statim fame obortâ cibus sumendus, nec eadem diu nimis toleranda. Id enim ventriculi orificio, propter exquisitam sentiendi vim excitato, cruditates parit; hoc ventriculum prævis humoribus replet. 5. Biliofi, graciles, & multo exercitio dediti, sæpius cibandi sunt. Illi enim ex inedia facilè in animi deliquium incidunt; inprimis si eis bilis in ventriculum effundatur. Isti corpus perspiratione & dissolutione aptum habent. Hi nimis exercitiis nimium dissipant. 6. Frigidis & humidis, pinguibus & obes, laboribus paucis vel mediocribus occupatis, minus cibi, propter contrarias rationes debetur. 7. Temperatus homo bis de die comedere potest. 8. Quia non totus eodem tempore cibus coquitur, imò particula ad intestina descendit, non est cur subtilitas illa horarum, quæ inter prandium & coenam intercurrere debent, attendatur. Modo manifesta cruditatis vel repletionis signa non adfuerint, poterit coena à prandio, quatuor, quinque sexve horis distare. 9. Ita eadem hora comedendum est, ut ad infuerum quoque deveniatur, ne exacta consuetudo, quam Græci *μετὰ δὴ* vocant, aliquid periculi inferat. 10. Consuetudinis ubique summus habendus est respectus. Nam qui bis de die cibum sumere consueverunt, illi nisi

nisi pransi fuerint, *μετὰ δὴ* patiuntur, calidum mingunt, &c. *II.* Et si vix definiri potest, an largius homo sanus & benè temperatus, qui sui juris est, in coena & prandio sit cibandus; cum pro utraque sententia validæ rationes militent, & melior videatur de die quam de nocte in ventriculo concoctio, ut melior de nocte quàm de die invenis; certum tamen est, quosdam cibos ut cæpas, & alios vaporosos commodius in prandio sumi; nec tantum senes, sed & eos, qui à sano statu desceunt, & Capitis imbecillitate, catarrhis & vertigine laborant, parcius coenare quàm prandere debere. *VI. Ordinis*, ratione cujus nota. 1. Quia omnes cibi in Chylum mutantur, & citius cocta ab epate, liene & intestinis attrahuntur, nihil quidem quantum ipsam coctionem & cibi generationem attinet, in hominibus sanis referre, qui cibi prius qui posterius sumantur, melius tamen præmitti cibos liquidos durioribus, quod facilius in actum deducantur, & fermentatione sua reliquorum coctionem juvent; Liquidos & laxantes, adstringentibus, si os ventriculi inferius laxum non est, ne diutius in ventriculo retenti alvum seignorem faciant; Corruptione obnoxios aliis, ut orificio ventriculi laxato facilius descendant: adstringentes laxantibus, si retentrix ventriculi facultas debilis est. 2. Commodius facilè corruptibiles cibos separatim, & una vel altera ante alios hora summi; ne, cum diversæ sunt naturæ, chylum foedent & corrumpant.

II. De Potu hoc habe. 1. Tantum bibendum, ne cibus in ventriculo natet. Moderatus corpus humectat, spiritus fovet, distributione ciborum juvat, &c. Nimius calorem obruit, cruditatem parit, mentem turbat. 2. Bibendum inter edendum, post cibum licet, si è ventriculo cibus non facilè descendit; sed non nisi post integram coctionem. Durante si bibas,

bibas, coctio turbatur, & crudus cibus ad epar trahitur. 3. Jejuno stomacho, potus vitandus: quia nervos tentat. 4. Commodius est potum, qui cum cibo, sumitur partiri, quam semel aut assatim eum haurire. Illo modo sitis sedatur, hoc fluctuationem in ventriculo parit. Sed vide de Prandio & Coena Bernhardum Paternum, nec non Stuckium l. 1. Antiquit. Convival. c. 14.

III. *Affectus* moderati esse debent, ideò rationi est obediendum, quæ istos frenare solet.

IV. *Motus corporis* pro ratione corporum, temporis, loci & modi variare debet. Itaque 1. Graciles moderatè, robusti validius moveantur, habità consuetudinis ratione; de qua Hippocrates. Quotidianis laboribus affueri, etsi sint invalidi & senes, infuetis quamvis robustis & juvenibus, facilius affueta ferunt exercitia. 2. Ubi fames est, vel ubi cibi crudi, non laboretur, si hoc fiat, alimentum nondum elaboratum in diversas corporis partes trahetur: si illud, calor dissipabitur, & humores pravi ad ventriculum deducuntur. 3. Motus cibum & præcedat, & sequatur, sed levis. Ille excrementa in meatibus angustis hærentia tollit; hic, cibum in fundum ventriculi deducit. 4. Qui imbecillo aut pleno sunt capite, sub Sole non ambulent. 5. Quies & motus alternis se vicibus excipiant. 6. Exercitiis finem, color in corpore, & erumpens sudor imponat. 7. Studia statim à cibo, ne calor à ventriculo avocetur, & cerebrum vaporibus repleatur, vitentur.

V. *Somnus*, quantum ad Tempus, tam diu durare debet, donec cibus sit concoctus, Spiritus restaurati. Non protendendus itaque ultra novem horas, nec, si sex sit brevior, convenit. Sed nec diurnus laudatur, nisi fortè noctem bonam partem informem egeris, alias cerebrum vaporibus implebit.

Vitu-

Vituperandus etiam, qui post ortum solis, qui corporis meatus suis radiis aperit, & humores ac spiritus à centro ad circumferentiam evocat, continuatur: quantum ad *Decubitus*, debet fieri super alterum latus, incipiendo à dextro, ut coctio ventriculi à calore epatis adjuvetur, cruribus & brachiis modicè contractis, capite non nihil elevato, corpore reliquo mollissimè posito: quantum ad *Locum*, vitandi sunt radii Lunares: Lectus sit mollis, ad aëris frigiditatem arcendam accommodatus. An caput tegumentis involvendum sit, in dubio relinquo.

VI. De *Balnis* hæc observa. 1. Nec frequentia nec diutina esse debere: nam calorem dissipant, & cachymiam movent. 2. Non incunda ante cibum concoctum, ne cruditates in corpus rapiantur. 3. Non comedendum in iis, nec bibendum. 4. Deserenda ante defatigationem, nec bibendum, vel comedendum, priusquam calor exspiravit. De lotione capitis & pedum hoc duntaxat addo. Illam in dolore capitis & catarrhis malè adhiberi; istis non obstantibus poros aperire, & fumos educere. Hanc, humores à capite avertere.

VII. Excrementa, quia quotidie cumulantur, quotidie quoque excerni debent. Itaque 1. Mox à somno fæces alvi dejiciantur. 2. Si id non fit, alvus jusculis gallinaceis, & aliis lenientibus promoveatur. 3. Tertiæ coctionis excrementa exercitationibus expellantur.

PUNCTUM III.

De sanitate senum tuenda.

Senum nomine illi veniunt, qui annum quinquagesimum affecuti sunt. sed eorum ætas, in viridem senectam, quæ ab initio octavi Septenarii ad partem aliquam noni extenditur, senectutem ipsam, senium

E

66

Et capularem aetatem dispefcitur. Pars Medicinæ, quæ eorum fanitati providet, *περονουμένη* dicitur.

Tuebimur verò benè ſenum fanitatem, ſi quædam in genere, quædam in ſpecie obſervaverimus.

I. In genere danda eſt opera, ut quia in ſenectute corpus indies magis exſiccatur, ſiccitas præcaveatur, & diætâ in calidum & humidum vergat.

II. In ſpecie. I. Aer ſit calidior & humidior. Frigidior in autumno & hyeme arte depellatur. II. Alimentum ſit boni ſucci, & facilis coctionis; (quidam mel ad abſumendam pituitam commendant) minore quam ante hac quantitate exhibeatur, ne major copia calorem imbecillis obruat. Ter in die potius, quam bis detur: in ejus quantitate nunquam, ſi poſſibile eſt, erretur. Interdum permutetur. III. Potus ſit vel vinum tinnæ, fragrans, ætate medium, fulvum vel flavum, vel muſta vel cereviſia. IV. Animi affectus vitentur, ne calidum illud debilius diſſipetur aut ſuffocetur, & *μεροσμός* inducatur. V. Exercitia conſuetâ non ſunt omnino omittenda: leves ante cibum inſtituantur. Friktiones moderate mutatione, ut calore poſt ſomnum excitato cibi diſtributio felicius peragatur, laudantur. VI. Somnus ſit longior: vigilie lotionibus pedum, ante ſomnum, & aliis hypnoticis præcaventur. VII. Excrementa maturè & convenienter deponantur; & quia alvus ſenum ob temperamenti ſiccitatem eſt interdum adſtrictior, emollientibus & abſtergentibus, ut melle, ficubus, uvis paſſis, reſinâ terebinthinâ & aliis, utantur. Vide Sebitium de Diætâ ſenum.

ARTICULUS II.

De ſanitate Intemperatorum tuenda.

Intemperatorum nomine tria hominum ab optima temperie deviantium genera intelligimus. Intemperatos.

peratos nempe ſimpliciter, qui quidem exactiſſimâ ſanitate carent, ſed vitæ actiones ſatis commodè obeunt, nec ad morbum declinant. *Declinantes*, qui à ſtatu temperato verſus morbum vergunt, quod ex triplici Symptomatum genere cognoscitur, & niſi obviam eatur, in eundem incidunt: & *Convaleſcentes*, qui à morbo iterum ſe recolligunt. Illis *ὁμαλὴν* in ſpecie ita dictæ, illis *περὶ φυλάξεσθαι*; hiſce *ἀναλεπτικὴ* ſuccurrit.

I. De Intemperatis nota 1. In genere. 1. Si ad ſtatum meliorem reduci non debent, ſimilibus, in genere & ſpecie, ſeu ut loquuntur quantitate & gradu, conſervandos: ſi reduci poſſunt, ſenſim contrariis aſſuefaciendos. 2. Calidam & humidam temperiem, quia naturæ noſtræ convenientem, nullo modo mutandam. 3. Siccam, in quantum poſſibile, repellendam. II. In ſpecie. 1. Calidi & ſicci, ne calorem mordacem magis accendant, vel excrementa acriora cumulent, aërem æſtuantem, cibos calidos, frām, meditationes nimias fugiant, potus ipſis ſit copioſior, ſed debilior. balneæ aquæ dulcis frequentes, ſomnus longior, calidorum & ſiccorum uſus fugiatur. 2. Calidi & humidi, ſi moderatè tales, temperamentum conſervent, & omnia moderata ſequantur, ne, copia excrementorum contracta, in morbis putridos incidunt. 3. Frigidi expoſcunt & cibos calidos, qui calorem excitent, non abſumant, & excrementorum pituiſoſam maturam evacuationem. 4. Siccis, Cibi humidi & balnea aquæ dulcis debentur. 5. Frigidis & ſiccis, infelix eſt conſtitutio, quæ ſomno longiore, friktionibus calorem roborantibus, non diſcutientibus, & balneo aquæ dulcis emendanda eſt. 6. In frigidis & humidis frigiditas corrigenda, humiditas quantum fieri poteſt, conſervanda eſt. Exercitia temperata calorem commovent, ut humido dominari poſſit.

II. *Declinantes*, qui aliàs *Neutri decidentia* vocantur, quia propter plathoram & Cacochymiam versus morbos vergunt, quietem primò & abstinentiam; quod si hæ non sufficiunt, venæ-sectionem & lurgationem exposcunt. Itaque Primo vere humores pituitosi & melancholici, sub ejusdem finem biliosi, sub auctumnum atrabilarii evacuentur. Aloë rosata, ex qua decies sexies in succo rosarum infusa pilulæ Aquæpendentis formantur, unâ ante cœnam hora sumatur, sed nec nimis crebro, nec nimia copia, quia epati noxia est: sufficiet, materiam in ventriculo & primis viis hærentem eduxisse.

III. Circa *Neutros Convalescentia* duo observanda. 1. Ne rursus in morbos incident. 2. Ut citò pristinum sanitatis gradum recuperent. Itaque 1. Quia quæ in morbis post crisin relinquuntur, recidivas facere solent: si aliquid adhuc materiæ superfluæ adsit, per *emaciationem* detrahendum, & partes roborandæ sunt. 2. Si nulla materia superest, corpus studiose alendum est alimento humido, concoctu facili, boni nutrimenti. 3. Quæ longo tempore extenuata sunt corpora, sensim reficere oportet; quæ brevi, repente. 4. Ea in primis usurpanda, quæ causam imbecillitatis respiciunt, & morbosus dispositionibus resistere possunt. Et tantum de Methodo tuendæ sanitatis.

IDEÆ

IDEÆ MEDICINÆ PRACTICÆ GENERALIS

LIBER II.

De affectibus humani corporis præternaturalibus & eorum signis.

PROLEGOMENA.



Sic Hygieine fuit: sequitur *Therapentice*, seu pars *Medicina altera*, quæ modum affectus præter naturam Sanitatem humanam lædentes, eos benè cognitos, per certa remedia removendi, ut eadem, si possibile est, restituatur.

Finis itaque ejus est Affectuum, si possibile est, præter naturam remotio, & sanitatis amissæ restitutio.

Partes quoque erunt duæ: 1. *Generalis*, in qua de Affectuum præter naturam natura, signis, causis, differentiis, & cura in genere, & separatim & conjunctim agitur. *Specialis*, quæ de affectibus ad partes corporis humani adstrictis agit. *Illa* in quatuor iterum dispescitur partes. In *prima* de Affectuum præter naturam natura & signis agitur. *Secunda* Medicamenta exponit. *Tertia* Methodum medendi generalem aperit. *Quarta*, primas morborum differentias & ipsarum curam collectim tractat.

TITULUS I.

De Morbo in genere.

CAPIT I.

De Morbi Natura.

Affectus humano Corpori præter naturam infestisunt tres: Morbus, Causa morbi, & Symptoma.

Morbus est partium viventium corporis humani ad actiones naturales exercendas, ex praternaturali earum constitutione, exorta impotentia.

Consideranda circa eum obveniunt, 1. Subiectum. 2. Tempora. 3. Causæ. 4. Differentiæ. 5. Signa. 6. Eventus: de quatuor illis hoc capite agemus, signis & eventui peculiaria destinabimus.

I. Subiectum, sunt partes corporis humani viuentes, tam spermaticæ, quàm sanguinæ; tam quoad materiaturam, ad quam temperamentum & occultæ qualitates pertinent; quàm quoad structuram, ad quam conformatio & unitas. Interdum omnes simul, interdum plures simul afficiuntur; interdum una.

II. Tempora sunt quatuor. I. Principium, in quo crudus est morbus, nec ulla coctionis vel contrariæ corruptionis signa adsunt, omnia sunt remissiora, nisi materia agitata partem aliquam magis infestet; donec vel dissipetur, vel in ambitum corporis detrudatur, salubres denique morbi remotis causis interdum delentur. II. Incrementum, in quo Symptomata ingravescunt, & signa vel coctionis vel contrariæ corruptionis apparere incipiunt. III. Status, in quo inter morbum & naturam maxima est pugna; signa salutis & mortis manifestò se exhibent, & omnia sunt vehementia: quod si aliqua remissio apparet, fit id, quia viribus solutis natura succumbens, causis morbificis sese amplius opponere potest. IV. Declinatio denique, in qua morbus à natura victus mitescit, & nemo nisi vitio vel suo, vel Medici, vel morbi, qui in pejorem transit, moritur. De istis omnibus in genere nota, 1. Singula, quia in omnibus morbis æqualia non sunt, in totidem dividi, ut principio sit suum principium, incrementum, &c. 2. Intermittentes morbos sua particularia tempora in paroxysmis habere, 3. Ægrotudines hyemæ

hyemæ nutrimentum capientes, æstate finire, & contra, nisi infra dierum circuitum absolvantur.

III. Dum de Causis agitur, non est res de Materia. Caret enim eadem, loco ipsius subiectum habens; nec de forma, hæc enim in definitione explicata est: nec de Fine, tum quia finem illa habent, quæ in perfectione consistunt; morbus ex ipsius defectu oritur, tum quia ex accidenti generatur & crescit; sed de Causis efficientibus, quæ vel respectu ad morbum considerantur, vel absolute seu ut res sunt. Illæ sunt variæ: 1. Remotæ, quæ aut agunt per modum causarum αἰτιαὶ γενικαί, quæ 1. vel sunt in corpore, vel extra corpus, ideo cum externis non recurrunt. 2. Externæ, quod non sint in illis, quæ corpus nostrum constituunt, dicuntur. 3. Cum causæ manifestæ, ut gladius &c. proximè morbum inferre possint, cum iisdem identificantur. 4. Latentes in corpore causas excitant & movent, ita ut ad sensum corpus nostrum afficiant, ut vigilæ. 5. Suapte natura magnum morbum procreare non possunt: Aut agunt per modum causarum αἰτιαὶ ὑπερβαίνον, seu Antecedentium, quæ dispositiones in corpore abditas, quas morbus insequi potest, quæ tamen cum eo conjunctæ non sunt, continent, potentia agendi duntaxat definiuntur, in morbis cum materia conjunctis tantum habentur: quia denique internæ, ut ad morbum relatæ & antecedentes & conjunctæ esse possunt, cum iis non recurrunt. II. Proximæ, quæ morbis proximè in corpore humano inhaerent, ita ut positis illis ponantur, sublati tollantur. Hinc continentes & conjunctæ dicuntur. III. Per se, quarum viribus morbus existit; & Per accidens, quæ eundem alterius intervntu excitant. IV. Privativæ, quæ per absentiam; & Positivæ, quæ per præsentiam agunt. V. Communes & Propriæ. VI. Externæ denique & internæ, de quibus inferius agemus.

IV. *Differentia morborum* vel sunt *Essentiales* & *primariæ*, de quibus & earum cura, quinto libro agitur; vel *Accidentales*, quæ à *Numero*, *Magnitudine*, *Duratione*, *More*, *Eventu*, *Ordine*, *Subiecto*, *Causis*, *Anni temporibus* & *Loco* sumuntur. I. *Ratione Numeri*, morbus est 1. *Unus*, qui unam partem, vel plures, verum sine ulla interruptione occupat: qui, vel est *Simplex*, qui cum nullo alio morbo coniungitur, & unius duntaxat speciei simplicem naturam accepit; vel *Compositus*, qui ex pluribus morbis in eadem parte concurrentibus constat, sive ii sint ejusdem generis, sive non; quod si cum causa aut graviore Symptomate connectitur, *Comitatus* dicitur; sicut *Solitarius*, quem neque causa, neque ullum grave symptoma insequitur. 2. *Multi*, quorum unus non inhaeret parti quam alter occupat, & hi vel communi actioni nocent, & *Complicati* seu *Impliciti* dicuntur: vel unus ad alterius generationem aliquid confert, & *Connexorum* nomine veniunt. 3. Per *Sympathiam*, qui existit, vel cum pars humorem vel vaporem aliunde suscipit, vel cum suscipere cogitur materiam, qua vacua esse debebat; vel cum Spiritus animæ actionibus necessarium instrumentum influere prohibetur, vel cum materia ad actionem necessaria denegatur: hoc verò accidit, vel propter sympathiam partium, quæ est vel generis, vel per nervos ac membranas continuitatis, de qua eleganter Paralip. p. 39 Sennertus, vel unius operis, vel vicinitatis, vel propter earundem robur ac debilitatem: hinc enim fit vel *Diadosis* à parte nobili ad ignobiliorem, vel *Metastasis* ab ignobiliore ad nobiliorem. 4. *Disjuncti*, qui in sejunctis partibus hærentes nec eidem actioni nocent, nec ad mutuam generationem quicquam conferunt. II. *Ratione Magnitudinis*, morbi sunt 1. *Parvi*, qui vel actionem minus mediocriter, quam seu à tota sua specie, seu in

una.

unaquaque facere solent, lædunt, vel partibus ignobilioribus inhærent. 2. *Magni*, qui vel constitutionem & partem magis ad vitam necessariam lædunt, vel à statu naturali maximè recedunt, vel pravam qualitatem conjunctam habent, vel facultatem ex cuius læsione vitæ periculum oboritur deiciunt, vel magnum spacium occupant. III. *Ratione Durationis* sunt morbi, 1. *Longi*, qui tardè moventur. 2. *Breves*, qui citò. 3. *Continentes*, qui uno semper motu moventur, donec plenariè finiantur. 4. *Continui*, qui quidem continuò affligunt, sed per intervalla intenduntur & remittuntur. 5. *Intermittentes*, qui periodos & paroxysmos, inque iis typos suos habent. 6. *Acuti*, qui decimo quarto; *Peracuti*, qui septimo; *Perperacuti*, qui quarto; *Acuti ex decedentia*, qui quadragesimo die terminantur. 7. *Critici*, qui mutatione magnâ per evacuationem vel translationem finiuntur. 8. *Non Critici*, qui paulatim diminuendo solvuntur. IV. *Ratione moris*, sunt 1. *Benigni*, qui nullum grave symptoma præter naturam habent. 2. *Maligni*, qui aliquid de occultis traxere. 3. *Pestilenciales*, qui per contagium afficiunt. V. *Ratione Eventus*, sunt. 1. *Salutares*, qui ad salutem terminantur. 2. *Dubii*, à quibus multi sanantur, & multi intereunt. 3. *Lethales*, qui semper aut magna ex parte perimunt, seu quod actionem per quam vita est tollant, seu quòd à materia pepsimi experte inducantur, seu quòd focus eorum tam longè absit, ut eò medicamenta integris viribus pervenire nequeant. VI. *Ratione Ordinis*, sunt 1. *Ordinati*, qui typum suum servant. 2. *Erratici*, qui eum negligunt. 3. *Recidivantes*, qui cum putabantur esse penitus finiti, denuò revertuntur. VII. *Ratione Subiecti*, sunt 1. *Universales*, qui totum corpus afficiunt. 2. *Particulares*, qui partem unam vel plures. 3. *Cognati*, qui temperamento, constitutio-

E 5

ni,

ni corporis, ætati, tempori, &c. congruunt. 4. *Minus cognati*, qui iisdem adverſantur, ſunt *Virorum, Mulierum, Infantum, Puerorum, virorum, Senum*. VIII. *Ratione Cauſarum* ſunt 1. *Exquiſiti* ſeu *Legitimi*, qui ab una & ſimplici cauſa proveniunt. 2. *Norbi* ſeu *Spurii*, qui ex miſtis humoribus excitantur. 3. *Hæreditarii*, qui vitia ſeminis aut ſanguinis materni pullulant. 4. *Congeniti*, qui à primo ortu vitio conformationis contingunt, eſſi parentes eo morbo non laborarunt. 5. *Adſcititi*, qui caſu quodam accidunt. 6. *Fientes*, qui jam producti ſine exiſtente materia perdurare non valent. 7. *Facti*, qui cauſis remotis ſuperſunt. IX. *Ratione temporum Anni*, ſunt Verni, Æſtivi, Autumnales, Hyemales. X. *Ratione Loci*, ſunt. 1. *Sporadici*, qui inter ſe ſpecie diſcrepantes, diverſos homines, eodem tempore, & eadem in regioneprehendunt. 2. *Communes* ſeu *Pandemii*, qui nunquam niſi in aliqua regione tantum, aut qui quandoque in una, vel in pluribus, multos eodem tempore invadunt. 3. *Endemii* ſeu *vernaculi*, qui niſi unam regionem tantum, aut locum ſemper, vel poſſiſimum infeſtant. 4. *Epidemii*, ſeu *vulgares*, qui certo quodam tempore, nunc in una, nunc in pluribus regionibus, multos ſimul infeſtant, & plerumque peſtilentes ſunt.

CAPUT II.

De Morbi Signis diagnosticis.

Signa morbi diagnostica, reſpiciunt 1. Morbum in ſe. 2. Tempora morbi. 3. Partes affectas. 4. Differentias morbi. 5. & denique Omnia illa promiſcuè: ſuntque vel pluribus & diverſis communia, vel uni morbo propria, quæ aut inſeparabilia ſunt, aut propria & inſeparabilia ſimul, vel Pathognomonica, & morbo

morbo eſſentialia, cumque eorecurrentia; vel Affidentia & ſupervenientia.

I. *Morbus in ſe cognoscitur* 1. *Ab eſſentialiter inhærentibus*; in externis facillimè, ut aliis ſignis opus non ſit; in internis, mediantribus aliis. 2. *A Cauſis*, quæ vel adſunt, vel præceſſere. 3. *A corporis diſpoſitione*, quæ ab hæreditate, ætate, ſexu, vitæ genere, victus ratione, & intermiſſa evacuatione pendet. 4. *Ab Actionibus naturalibus, vitalibus, animalibus*, quæ læduntur, abolentur, imminuuntur, depravantur, & quidem vel ſubito, vel lento. 5. *Ab Excretis*, Urina nempe, fecibus, ſudore, ſputo, &c. 6. *A qualitativis corporis mutatis*, colore, odore, &c. quæ tamen cauſam potius quàm morbum ſignificant.

II. *Tempora morbi*, quorum cognitio vel ratione ſtatu, in quo cretionis perfectæ ſigna apparent; ſi quæ apparent, & bonæ ſiunt crifeſ, eſt neceſſaria, cognoscuntur 1. *A Morbi Idea*, ſive ille longus, ſive brevis. 2. *Ab Anni tempore, victu, regione, temperamento, viribus, & ſimilibus*. Calidiora calidorum & acutorum morborum cauſæ ſunt. Virtus forrior in morbo non lethali, morbum brevem & ſtatum in propinquo; in lethali, longum ſignificet. 3. *A paroxyſmorum mutationibus*, in quibus eorundem anticipatio, poſtpoſitio, duratio & vehementia obſervandæ: de quibus etiam vide Authores. 4. *A morborum ſymptomatibus*, quæ in principio levia, in ſtatu maxima. 5. *A Coitione & Cruditate*, quæ vel eſt uni morborum generi propria, ut ſputum in pleuritide, vel pluribus communis.

III. *Partes affectæ cognoscuntur* 1. *A cauſis* quæ aſſumuntur, geruntur, retinentur, foris adhibentur. Quædam magis uni parti quàm alteri infeſta ſunt; quædam etiam tempeſtate pulmo maximè afficitur, aliâ ventriculus, &c. 2. *Ab eſſentialiter inhæ-*

inhærentibus, seu partis proprietate, & morbis partibus inhærentibus. 3. Ab Actionibus læsis, nisi ab errore externo lædantur, Dolore inprimis, de quo in sequentibus peculiari capite agemus. 4. Ab Excretis, in quibus substantia, quantitas, qualitates, & mistura observanda sunt. 5. A qualitatibus mutatis.

IV. *Differentiarum morbi* primarum & essentialium signa, libro quinto explicabuntur; ratione Accidentalium, quas superius posuimus, nota I. *De Morbis per Sympathiam*, 1. Eos cum primario affectu decrementum & incrementum suscipere, & primo ab affectu deseriri. 2. Non continuò, sed per intervalla, nisi materia continuò suppeditetur, infestare. 3. Ex adhibitis alteri juvantibus vel lædentibus, juvari, vel lædi. II. *De Morbis Acutis*, eos mox à principio, ac primis tribus diebus extremos protinus labores habere, & gravia symptomata, quòd à calidis, acerbis, tenuibus, & mobilibus humoribus, qui naturam vehementer laceſcunt, exoriantur, inferre. III. *De Morbis Malignis*, 1. Eos à causis tota substantia peccantibus, tam externis quàm internis oriri. 2. Ægrum in iis sæpè esse inquietum, quamvis nullum vehemens aut periculosum symptomata referre possit; à principio sæpe graviore somno detineri, sudoribus & aliis excretionibus non levare, sine causa horrere, incallescere, sanguinem stilare; cætera verò febre quasi lentà cum signis quasi salutis detineri, ex levi occasione animi deliquiis agitari. Cum linguæ nigredine & asperitate non silere. 3. Eosdem post levem remissionem malignitate se per humores diffundente, celerrime & vehementissime exacerbari. 4. In iisdem dolores qui aderant, absque excretionem aut abscessu remittere, pulsuum respectu caloris febrilis insolitam parvitatem cum inæqualitate & frequentia habere.

V. Omnia

V. Omnia ista promiscuè respicientia signa, Urinarum & Pulsuum differentiarum suppeditent.

I. *Urinarum* differentiarum à *Consistentia*, *quantitate*, *qualitate*, *permixtis* & *contentis* sumuntur. Itaque I. *Quantum ad Consistentiam*, *Tenuis* indicat potum nimium, validam renum & Ureterum obstructionem, & nativi caloris ex intemperie sola penuriam. *Salis*, qui è cibo resolvi solet, defectum. *Crassa*, caloris per humorum exsuperantiam appressionem. *Mediocris*, calorem vegetum, exquisitam jecoris venarum, & ventriculi concoctionem. *Perspicua & clara*, integram concoctionem, humorum bonitatem, unde hypostasin postea secernit. *Turbata*, quæ à Frigore externo talis est, & calore corrigitur in febribus coctionis rudimentum. *Turbida*, quæ talis emittitur, renum vel vesicæ affectus. *Crudorum* crassorum, & viscidorum humorum, è quibus flatus crassi & multi producti, urinæ permiscuntur, & materiam descendere prohibent, copiam, subitam obstructionem lienis, jecoris, venarum, renum, &c. solutionem, si subito accidat. *Confusa*, quæ tota sui similis, nec quicquam hypostaseos obtinet, venarum affectus, & propriè sanguinis & humorum, qui in venis majoribus sunt, confusionem, corruptionem, & putredinem; ideò in solis febribus, illisque continuis & malignis deprehenditur. *Pinguis*, humoris alimentarii qui ad partes adfluit iniquationem, ut in substantiam partium cedere non possit, ad quod exolutio sequitur. II. *Quantum ad Quantitatem*, *Multa* significat immoderatum potum, Medicamenta diuretica, frigidam intemperiem, & frigus exprimens, victum humidum, renum calorem allicientem, aquam in aliquo loco conclusam, corporis in liquorem sive sponte, sive vi caloris resolutionem, cui pinguedo conjungitur. *Pauca* ostendit, potum paucum vel austerum, Sudores nimios, copio-

sam

fam alvi dejectionem, Renum, ureterum, cervicis, vesicæ obstructionem. Febrilis calor, vehementiam, potus in nutrimentum corporis abitum, quod convalescentibus interdum accidit. III. *Ratione Odoris*, *Odorata* innuit terebinthinæ, moschi, filiphei, &c usum, ab internis causis vix unquam talis, *Fætida* esum putris casei, alii, ulcus renum, pudendi, colli vesicæ, putredinem humorum si recens, substantiæ, si diuturnus est fætor. IV. *Ratione coloris*. *Alba si tenuis & perspicua*, indicat potum tenuem & copiosum, Mesenterii, jecoris, aut renum validam obstructionem, summam coctionis imbecillitatem, bilis defectum, & aliquando ad ventrem, caput, partem aliquam in habitu corporis ascensum; si *crassa*, & *obscura* seu lactea, pituitæ crassæ exsuperantiam. *Rubra*, si simul *perspicua*, calorem jecoris vel febre; si *crassa*, flavæ aut vitellinæ bilis permissionem, jecoris phlegmonem, aut exquisitum scirrhum. *Crocea*, Rhabarbari, croci, vel sceniculi usum, folliculi obstructionem, & tum lintea immerfa colorem referunt. *Cruenta*, Epatis atoniam, Renum & lumborum ulcus & contusionem. *Vinea & passæa* sanguinis adustionem, & in aram bilem mutationem. *Viridis*, bilem æruginosam. *Livida*, plagas, melancholiam, nativi caloris extinctionem. *Nigra*, si ex *nigra & viridi* componitur, summum incendium & bilis atræ permissionem; si ex *carulea & livida*, caloris extinctionem, nisi crisi effundatur. V. *Ratione permistorum*, *Corona*, quæ supremam faciem ambitu cingit, qualis in vasis majoribus sit sanguis, albedine, rubedine, & lividitate ostendit. 2. *Spuma*, quæ citra agitationem, flatum est testis. 3. *Bullæ magnæ & perseverantes*, crassos & viscosos humores, nec non flatus indicant. *Levi de causa ruptæ*, tenuiores, *parvæ*, per coronam, capitis totius dolorem si per totam; dimidii, si per dimidiam; acrem si aureæ, mitem

mitem si albæ; diuturnam, si diu permanentes. *Gravis similes* in corona sitæ & agitæ, descendentes à capite in infimas partes destellationes demonstrant. 4. *Pinguedo* telis araneorum similis, pinguedinis vel renum vel totius consumptionem indicant. 5. *Ferufurosa* si subsident, vesicam scabie laborare; si in tenui apparent, substantiam solidum intertrimentum per flammeum ardorem deperdere, innuunt. 6. *Squamula*, cum odore gravi, vel vesicæ exulcerationem, vel tunicarum in vasis & solidarum partium per ardorem colliquationem testantur. 7. *Farinacea*, idem volunt. 8. *Caruncula*, à vulneratis sunt renibus. 9. *Filamenta*, à vasis seminariis, in mulieribus, vel mensium albore, vel fœda uteri colluvie laborantibus. 10. *Sanguis*, à recenti renum vel alijus visceris ulcere. 11. *Pus*, ab inveterato & fordido, vel in renibus, si sine ullo sensu doloris, & bene urinæ permistum est; vel à cervice vesicæ, si cum dolore, & minus benè: ubique subsidet. 12. *Arenula*, si *flava & rubra*, à renibus; si *alba*, à vesicæ; si *purè obducta*, à sordido vesicæ ulcere; si *superficie innatant*, & *lateribus adherent*, ab epatis calore, & sanguinis adustione. 13. *Semen* vasorum spermaticorum noxam indicat, & urinæ innatat. VI. *Ratione Contentorum*, quæ debent esse in sanis alba, lævia, æqualia, pyramidalia. 1. *Paucum*, ab alteratricis imbecillitante, intemperie, humorum multitudine vel crassitie, substantiæ per causas externas dissipatione proficiscitur. 2. *Multum*, à consuetæ evacuationis suppressione, si simul crassum ac crudum est; ab alimentorum & facultatis robore, si substantia & colore mediocre. 3. *Crassum*, à materiæ crudioris copiam, vel diuturnorum morborum crisi. 4. *Tenuis*, à cruditate vel coctionis initio. 5. *Spicuum, aureum, rubrum*, à bilis in venis exsuperantia, & sanguinis incendio. 6. *Venetum, lividum, nigrum*, à caloris

loris extinctione, sanguine corrupto, & atro humore.

II. *Pulsuum* multæ sunt differentiæ, quæ subtilitates Herophileas respiciunt: prudentiores tribus differentiis sunt contenti. *Æquali* & *inaquali*, *veloci* & *tardo*, *valido* & *debili*. Ex his *Æqualis* naturæ firmitatem significat. *Inaqualis* vel vasorum obstructiones & compressiones, vel humorum abundantiam indicat. *Velox* usum auctum, vires adhuc fortes, aut certè non admodum debiles, innuit. *Tardus* contrarium indicat. *Validus* facultatem fortem, & interdum irritationem magnam, monstrat. *Debilis* vel spirituum dissipationem, vel virium oppressionem indicat.

CAPUT III.

De Morbi eventu.

Eventus morbi quatuor innuit: 1. *Terminationem morbi*. 2. *Tempus terminationis*. 3. *Modum terminationis*, & 4. *Cognitionem horum omnium*.

I. *Terminatur* morbus vel ad salutem, vel ad mortem. Unde eventus vel est salutaris, vel lethalis.

II. *Temporis respectu* terminatur vel citò, vel tardè.

III. *Modus terminationis* est triplex. Terminatur enim morbus, *vel per solutionem*, quando sensum per coctionem & alterationem sanitas redit: *vel per Marasmodum*, quando paulatim ad mortem convertitur: *vel per Crisin*, quando aut subitò & perfectè morbus solvitur; aut subira fit ad melius mutatio, quam tandem sanitas excipit; aut æger subitò moritur, vel morbus subitò in pejus mutatur, quam mutationem mors excipit. Circa *Criseos* verò *naturam*, seu Definitionem, Causas, Differentias, Modos &

& Dies hæc nota. I. Eam nihil aliud esse, quàm subitam in morbis, cum conturbatione & evacuatione, per excretionem vel translationem, certis diebus factam, & ad salutem vel mortem tendentem mutationem. II. *Oriri* ratione conturbationis, seu criticorum illorum Symptomatum congeriei ab agitatione ac molestia humorum quam corpori pariunt, provenientes ab aëstrorum influxu; & causâ interna tum naturam tum materiam irritante; ratione *Evacuationis*, à vi expultrice, quæ vel copiâ vel qualitate materiæ irritata, id quod molestum est, Criticè expellit, ope fibrarum & præcipuè spirituum & calidi innati. III. *Differentias* varias habere. Est enim *Bona*, quæ ad salutem tendit, *Mala* quæ ad mortem. *Fida* absque recidivæ metu. *Insida*, quæ eandem minatur. *Tuta*, quæ est sine periculosis Symptomatibus. *Periculosa*, quæ fit per partem principem. *Perfecta*, quæ morbum integrum tollit. *Imperfecta*, quæ ejusdem aliquid relinquit. *Εὐομγος*, quæ sui habet præcedentibus diebus indicia. *Αὐομγος*, quæ insperato ingruit.

IV. *Fieri vel per Excretionem*, per hæmorrhagiam narium, vomitum, sudorem, alvum, urinam, hæmorrhoides, menses, plura loca: *vel per materia translationem*; vel *per materia concoctionem*, quod fit in pueris, qui in somno crudos succos concoquunt. V. *Dies certos* habere, qui sunt. 1. Vel *Critici simpliciter*, seu septimus quisque ut 7. 14. 20. 27. 34. 40. Non enim integri dies sumuntur, sed breviores. 2. Vel *Indicatorii*, à quibus monstratur Crisis futura, & sunt cujusque septimanæ medii, ut 4. 11. 17. 24. 3. Vel *Intercalares*, in quibus ex accidenti & contra naturam crisis fit, & sunt, 3. 5. 9. 13. 19. 4. Vel *Vacui*, seu *Medicinales*, in quibus vel nulla, vel imperfecta & mala crisis accidit; ut sunt, 6. qui tyrannus est. 8. & 10 illo minus periculosiores.

losiores. Quod verò istis diebus tales mutationes accidere solent, facit id 1. Lunæ progressus tum ad signa quadrata & opposita, tum ad sextilem vel Trigonum. 2. Motus & dispositio humorum, quæ causa est, quod crisis nunc citius nunc tardius accidat. 3. Natura corporis, quæ à Lunæ moribus adjuta, & ab humoribus à Luna concitatis irritata, pugnam cum materia morbifica aggreditur, eam expellit, & crisin efficit.

IV. *Eventus morbi cognitio* quatuor respicit, 1. *Eventum ipsum in genere.* 2. *Terminationem.* 3. *Tempus terminationis seu Durationem,* & 4. *Modum.* Signa quæ cum ostendunt, *Prognostica* dicuntur, & inter ea præcipua, quæ cruditatem vel coctionem testantur. 1. *Eventus morbi cognitio in genere,* à collatione virium naturæ & morbi dependet, quo & status morbi prævisio multum facit. *Vires* tum ex causis suis, tam proximis, partium nempe naturali intemperie, conformatione & unitate, constitutione, quàm remotis, sex nempe non naturalibus; tum ex effectis, actionibus nempe, excretis, & qualitatibus mutatis, judicantur. *Morbi robur,* ex essentialiter in hærentibus, causis tam externis quàm internis, juvantibus, & effectibus seu morbum consequentibus dependet. Hic nota. 1. Sæpè ex multis parvis signis, quod maximum est colligi. 2. Sæpè unum fortius plus in significando valere, quàm plura debilia. 3. Quia quædam signa meliora vel pejora sunt, quatenus cum viribus vel fortibus vel debilibus conjunguntur, idèò signatum cum viribus ægri, tum inter se comparanda esse. 4. Dignissima illa esse, quæ facultatis vitalis robur, vel imbecillitatem indicant. 5. Sæpè apparentibus aliquibus coctionis signis, ob aliquam malignitatem, quæ se in pulsu debili, & lingua arida, &c. exserit, ægrum perire posse. 6. Quò minora & pauciora sunt Symptomata, eò debiliorem esse

esse morbum, & contra. 7. Minus periculose ægrotare, quorum vel naturæ, vel ætati, vel consuetudini, vel tempori similis est morbus, quàm quibus horum nulli affinis existit. 8. Majus esse periculum, cum humores turgent peccant, quàm cum quieti, modò hi non parti quieti inhæreant; cum morbus diuturnum & frequens in victu aut aliis rebus non naturalibus, erratum sequitur: cum humores sunt misti, quàm quando simplices: cum materia solida peccat, quàm quando liquida, &c.

II. *Terminatio Morbi,* & utrum is futurus sit fatalis an lethalis, ex actionibus naturalibus, vitalibus, & animalibus, excretis, & qualitatibus mutatis colligitur; non quod ista statim salutem vel mortem indicent, sed quod aut spem salutis promittant, aut metum mortis incuriant. Itaque I. *Ratione Actionum Naturalium.* 1. Bonum spem facit. 1. Si benè se æger ad ea quæ offeruntur habet, quia facultatem naturalem se rectè habere significat. 2. Si ea, quibus per sanitatem delectabatur, comedit. II. Malum eventum minantur. 1. Si exsolutis viribus cibos æger appetit, id enim moribundis accidit, & vel ob humorem acidum ad ventriculum delabentem, vel ob maximam corporis à morbo resolutionem obvenit. 2. Si intensissimè sentit, quia id à magno in visceribus incendio provenit. 3. Si cibos in morbis acutis fastidit, & cætera perniciofa signa adfunt. 4. Si in ardentibus linguâ existente arida, non sirit, quia vel delirium, vel exsolutionem facultatis appetentis significat, nisi ventriculus ab humore de capite delabente humectetur. 5. Si sitis, quæ in acuto morbo fuit, nulla ex ratione, lingua sicca manente, urinis crudis, tollitur & solvitur, quia sensum elanguescere indicio est.

II. *Ratione Actionum vitalium.* I. Bonum signum præbet. 1. Si pulsus à naturali Symmetria

non multum recedit, & alia bona signa adsunt. 2. Si mutatio in pectus, si quæ in eo accedit, ob causam aliquam evenit. 3. Si nulla vel lipothymia, vel cordis palpitatio adest, vel si adest, per consensum inferitur. 4. Si respiratio secundum naturam se habet, & alia bona signa adsunt, quia inde nec thoracem, nec pulmonem, nec præcordia affici colligitur. 5. Si eadem magna & velox; quamvis enim magnam fuliginosorum excrementorum copiam significet; organorum tamen promptitudinem & facultatis robur simul indicat. 11. Metum incutit, 1. Pullus, seu is languidissimus, tardissimus & rarissimus, qui omnium pessimus; seu minimus & mollissimus, & durissimus; seu frequentissimus, at non celerrimus, neque maximus. 2. Respiratio magna & velox, quia hæc solis mente motis competit: magna & frequens, quia alicujus ex respirationis instrumentis, dolorem aut inflammationem significat; magna, cum multo intervallo, quia delirii signum est. 3. Respiratio parva & velox, quia à fuliginosorum excrementorum copia, cum dolore aut inflammatione alicujus ex organis respirationis procedit; parva & tarda, quia facultatem debilem prodit. Parva & obscura, ut æger vix spirare videatur, quia virtutis exsolutionem innuit; parva, obscura & frequens, quia à dolore aut inflammatione partis alicujus ad respirationem necessariæ provenit; parva & rara, quia summam virium debilitatem significat, idè tum spiritus frigidus efflatur. 4. Respiratio sublimis, in qua thorax maximè dilatur, & quod inspiratur paucum est, sed simul ob urgentem necessitatem densissimum & frequentissimum, quia talem Hippocrates morti proximam facit. 5. Respiratio cum stertore, inprimis si cum aliis perniciosius signis conjungitur, quia talis morientium est.

III. Re-

III. Ratione Actionum animalium. 1. Spem bonam faciunt 1. Mentis constantia, quæ etsi ad salutem non sufficiat, cum multi mente constantes moriantur; in morbis tamen, quibus cerebrum vel per se, vel per accidens afficitur, mala est. 2. Decubitus consuetus & naturali similis, si nempe æger in alterutrum latus decumbit, manibus, cervice, cruribus, parum inflexis, corpore erecto, non ad pedes prolapsus. 3. Tremor paralyti succedens, quia naturæ morbum vincentis, vel minuents, indicium est. 11. Metum incutunt, 1. Delirium, quod, etsi nullum tutum sit, cum risu tamen & bonis signis conjunctum, leve nec continuum tutius; continuum & vehemens periculosius; audax & temerarium pessimum: simul tamen & alia signa, pulsus scilicet respiratio, & alia, observanda. 2. Somnus & vigilia, si modum excedant. 3. Coma, si in principio & vigore morbi accidat. 4. Auditus læso, si à malis evacuationibus vel viribus labascentibus obveniat. 5. Scupor, quia vel humoris vitiosi ad Cerebrum delati, vel caloris nativi extincti indicium est. 6. Dolores, qui mali, si in initio crudæ adhuc materiæ, partes principes affligunt; si morbus ab iis non minuitur; si mox evanescent, vel ad partes nobiliores ab ignobilioribus transeunt; si in aliqua parte non sentiuntur, malè enim tum mens constat. Eadem Lassitudinis cum doloribus ratio. 7. Convulsio, quæ periculosa, si in ea contractio vehementior & diuturnior, si plures & cerebro viciniore partes occupat, si à sanguinis fluxu aut hypercatharsi oritur; si febribus acutis, phrenitidi, ileo aut vigiliis succedit: Minus periculosa, si pueris contingit, si ob nimium motum materiæ ad caput aut nervosum genus facta est, si propter morsum ventriculi ab acrimonia humoris,

humoris, aut medicamento, aut contentione in vomendo oritur, nec diu perseverat. 8. *Singultus*, qui *periculosus*, si in morbis post nimiam inanitionem accidit, si cum inflammationibus & febribus, in senibus præsertim, maximè si signa alia perniciose adsunt, jungitur. 9. *Tremor*, qui *malus*, si in principio morborum præsertim longiorum sine causa incidit, & aliis gravioribus Symptomatibus jungitur. 10. *Horror* & *Rigor*, si in initio morborum crudâ materiâ oboriuntur. 11. *Torpor*, qui perpetuo malus est, & citra febrem, Apoplexiam; in febribus, ob caloris nativi extinctionem, insigne periculum portendit. 12. *Vox*, quæ si clangosa, periculosa est; si *Nulla*, lethalis est, nisi Critica evacuatio sequatur.

IV. *Ratione Excretorum & Retentorum*. I. *Spem bonam faciunt*, 1. *Urina*, tenues cum colore bono, crassæ si prius fuere tenues, & post principium minguntur, subrubræ, subcroceæ, subluteæ, subrubræ, cum sedimento subrubro. 2. *Vomit*, qui naturæ morbi respondent, quia morbum vel tollunt, vel minuunt. 3. *Sudores*, si coctione jam facta accidunt, si sunt calidi, & copiosi, si ex tota corpore fluunt, & morbum minuunt. II. *Metum incutiunt*. 1. *Urina* tenues & ruffa, quia crudum morbum significant: *turbida non residentes*, quia in imbecilli mortem, in validiore longitudinem morbi portendunt. *Alba*, si perseverant. *Nigra*, si in acutis obveniunt. *Oleosa*, *virides*, quarum ratio superius reddita est. *Sedimento, enaoremate, & nubecula carentis*, nisi æger vel inediam passus fuerit, vel vigilaverit, vel biliosus sit. *Crassa absque sedimento*. Cum sedimento farinaceo, fursuraceo, squammoso, &c. 2. *Alvi dejectiones siccae*, quia à caliditate ignea proficiuntur, & si simul nigrae sunt, ardentem circa medium corporis affectum indicant. *Aquosa*, quia à cruditate magna oriuntur, & in morbis biliosis, cum urinis malis, lethales

thales sunt; in mitioribus longum morbum significant. *Exigua*, & *sæpe egesta*, quia retentricis debilitatem innuunt. *Pingues*, quia corporis exsolutionem indicant. *Spumosa*, quia defluxionem à capite, & vermes in intestinis ostendunt. *Alba*, quia vel meatus per quem bilis ad intestina descendit obstructionem, vel hujus ad partes superiores motum portendunt. *Rubra*, quæ per se perniciose, nisi naturæ victoriam sequantur. *Nigra*, si ab atra bile, quia lethales sunt, nisi aliorum admittance temperentur; si à sanguine concreto, vel humore melancholico, non semper sunt malæ. *Virides & aruginosa*, si illæ à bile æruginosa ad atram tendente, si à parte aliqua principe & viscere Erysipelate laborante excernantur. *Livida*, quia partium inferiorum vehementes frigus significant. *Fætida* denique, quia putredinem adesse significant, & febres putridas prænunciant. 3. *Vomit*, si in principio morbi nondum concoctâ materiâ fiunt, & aliis malis signis conjunguntur, si illi sint sinceri, pallidi, lividi, si nigri, graveolentes, ab Ileo, exigui, &c. 4. *Sudores*, si morbo crudo, nimis copiosi vel pauci, & frigidi accidunt; nec ex toto corpore exeunt. Vide Hippocratis aphorismos.

V. *Ratione qualitatum mutatarum*, 1. *Bonam spem facit*. 1. Totus corporis habitus, si non multum sano dissimilis redditur. 2. *Hypochondria*, si dolore vacant, & sunt mollia, ex utraque parte æqualia, non extenuata. II. *Metum incutiunt*. 1. *Totus habitus corporis*, si nihil in morbo mutatur, quia longitudinem id indicat, si extenuatus, in declinatione cibo non reficitur, quia id recidivam minatur, si in acutis morbis intumescit, quia calorem epatis debilitatum indicat, nisi Criticè humores aliquò detrudantur. 2. *Facies*, eaque *Hippocratica*, in qua nasus acutus, oculi concavi, adstricta tempora, aures frigida, contractæ, fibræ earum inversæ, cutis circa

frontem dura, intenta, arida, & color totius vultus viridis, aut niger; in primis in principio morbi, nisi à causa evidente talis evaserit, & per diem & noctem emendetur. *Coloratior*, quia affectionem valde calidam in Cerebro denotat, nisi hæmorrhagiæ narium, aut abscessus post aures futuri sit indicium. *Viridis, livida, nigra*, quia caloris nativi extinctionem significat, in primis si citius, & absque causa evidenti appareat. 3. *Oculi*, & ii *Lucem refugientes*, quia cerebrum læsum ob spirituum dissipationem, & capitis debilitatem significant. *Tumidi & prominentes*, quia vel musculorum resolutionem, vel humorum, vaporum, & spirituum illic confluentium copiam denotant. *Cavi*, quia absunt à calore, quæ oculi orbitam replet substantia tales redduntur. *Feroces & horridi*, quia delirantium & phreneticorum proprii, plerumque convulsionis, vel etiam mortis cum aliis signis sunt indices. *Fixi & stabiles*, quos *Concretos* dicunt, quia ob convulsionem & cum malis signis mortem significant. *Perversi*, quia convulsionem indicant. *Alter altero minor*, quia facultatem eum regentem extingui pronunciat. *Venulas lividas & nigras habentes*, quia malorum humorum copiam ad cerebrum ascendere, caloremque nativum extingui innuunt. *Candidum in rubrum conversum gerentes*, quia & copiam & fervorem sanguinis in membranis, vel inflammationem earum significant. *Involuntariè lacrymantes*, quia certam retentricis imbecillitatem denotant. *Non planè clausi*, quia id vel ob musculi oculorum convulsionem, vel ob facultatem adeò debilem, ut palpebras attollere nequeat, accidit. 3. *Dentes*, si inconsueti strident, quia insaniam vel mortem significant, si humore glutinoso obducuntur. 4. *Nasus*, & is *perversus*, quia convulsionem denotat. *Acutus*, quia magnam virium imbecillitatem arguit. *Pruriens præter consuetudinem*, nisi im-

minentem

minentem hæmorrhagiam pronunciet, quia futurum delirium, propter humorum & vaporum ad caput ruentium copiam, portendit. 4. *Aures livide, nigra, contracta, frigida*, quia caloris nativi extincti indices sunt. 5. *Lingua arida, dura, nigra*, si cum aliis signis appareat, ægerque non sitiatur, quia vel delirium, vel extinctæ facultatis, & proinde mortis signum est. 6. *Hypochondria*, eaque *Inflammatione aut dolore vexata*, intenta, inæqualia, extenuata, quia aut ingentem quandam siccitatem, aut flatum, aut inflammationem partis in iis sitæ significant. *Pulsantia*, qui aut caput inflammatum, aut status multi ex humore effervescente in caput elevationem significant, perturbationem, & cum oculis instabilibus delirium portendunt, nisi hic pulsus crisi præfagiatur. 7. *Ungues lividi & nigri*, si corpus simul grave, quia lethale signum sunt. At si æger benè ferr, & aliud signum salubre adest, morbus ad abscessum verget.

III. *Modi quo morbus terminari debet cognitio*, omne id quod de Crisi superius diximus respicit, & plures quæstiones involvit. Quæritur enim, I. An morbus sit finem habiturus, per Marasum? II. An per solutionem? III. An per Crisim? Et si per Crisim, IV. An Crisis sit futura per Excretionem, & si per hanc, per quam & qualis? V. An per Transflationem? VI. An Crisis facta sit optima? an mediocri? an mala? VII. Quo tempore fiet?

I. *De Cognitione terminationis per Marasum & Solutionem* non est quòd multis agamus. Nam si dies Criticos, & acutorum per decidentiam morbus superaverit, vel per solutionem, vel per marasum finem sortietur.

II. *Per Crisim terminabitur morbus*, I. Si est magnus & acutus, vel parvus videtur, & malignitas subest. 2. Si à materia calida, tenui & acri,

F 5

qui

qui naturam laceſſere poteſt, oritur; poteſt tamen & in longo morbo aliqua Critica evacuatio accedere, ſi idem aliquot dierum periodis antea vehemens evaſit. 3. Si vires ſunt ita robuſtæ, ut morbo ſuperiores evadant. 4. Si perturbationes circa actiones animales, vitales, & naturales in corpore exoriuntur.

III. *Per Excretionem* finem ſuum ſortitur morbus. 1. Si eſt acutus, ex tenui & acri materia, & criſis primis diebus ſperatur. 2. Si natura eſt fortis, pulſus altus, viæ apertæ, natura ſudori vel alteri evacuationi aſſueta. 3. Si tempus ipſum æſtivum concurrit. II. Si terminari debet per *Hæmorrhagiam*.

1. Hypochondria primum abſque dolore tenduntur, & hinc reſpirationis difficultas non diu durans ſuccedet. 2. Statim dolor capitis & cervicis, faciei & oculorum rubedo, ſplendor & caligo ante oculos, ſpectrorum ante eoſdem obſervatio, delirium, Arteriarum in temporibus micatio, Pulſus denique vehementia ſequuntur. 3. Tandem jam inſtante hæmorrhagia nares ægri ſcalpere incipient: quæ omnia certiora ſunt, ſi conſentiant ætas, & natura ægri, & præſens æris conſtitutio. III. *Si per Vomitus*, humores ad ventriculum movebuntur. Unde ejuſdem morſus, cum dolore capitis, vertigine, tenebris, exorietur; ſuperius labium agitatur, ſputum eſt multum & tenue, nauſea, rigor, hypochondriorum frigidity, pulſus durties, & inæqualis ſpirandi difficultas, afficiunt. IV. *Si per ſudorem*, quod frequentiffimè fit, præcedet urinæ ſuppreſſio, rigor & aliarum excretionum ſigna aberunt, erumpente ſudore pulſus erit mollis & undofus, cutis mollis, exteriora calebunt, vapor calidus erumpet. V. *Si per alvum*, nullum proprium ſignum erit, ſed reliquarum excretionum ſigna aderunt, aderunt ruſtus & inflatio ventris, lumborum dolor, genuum gravitas, interdum laxa alvo, urina ſupprimitur. VI. *Si per urinam*, aberunt ſigna reliquarum excre-

excre-

excretionum, ægri non valdè erunt inquiri. Circa veſicam aderit inflationis ſenſus, & hypochondriorum gravitas. Urinæ incipient augeri. Cum ardore quodam alvus retinebitur. VII. *Si per Hæmorrhoides*, ægro illæ erunt familiares, ſigna reliquarum excretionum aberunt, æſtus aut dolor circa ſpinam dorſi cum tenſione lumborum percipietur, rarius per eas criſes fiunt. VIII. *Si per Menſes*, aberunt reliquarum excretionum ſigna, inſtabit tempus menſium. *Æſtus lumborum cum hypochondriorum dolore & tenſione, & aliis quæ menſium inſtante fluxu eveniunt, aderit.* IX. *Si per plura loca*, plurium etiam excretionum ſigna animadvertentur. X. *Excretio erit bona*, I. Si humor peccans & quidem coctus evacuatur. 2. Si debita quantitate & die Critico. 3. Si juſto modo, conſertim, & per loco conſerentia.

IV. *Per tranſlationem ſeu Abſceſſum terminabitur* morbus. 1. Si eſt acutus, & materia craſſior. 2. Si virtus eſt debilior, & longo tempore urinæ tenues & crudæ exiere. 3. Si naturæ eſt ad hæc loca propenſio, anni tempus frigidum, ætas ſenilis, & criſeos per excretionem futuræ ſigna abſunt. II. *Firin partibus ſuperioribus*, ſi materia eſt tenuis. *In inferioribus*, ſi non eſt adeo tenuis, & natura fortis. III. *Erit bona*, I. Si materia eſt concocta. 2. Si ſubſtantiam habet laudabilem, & figuram acuminatam. 3. Si æqualiter matureſcit, antequam ſuppuratur. 4. Si citò ſuppuratur, & eſt in loco externo & ignobili.

V. *Optima Criſis eſt*, ſi ſigna Critica, de quibus ſuperius egimus, præceſſere. ſi ſigna coctionis & cruditatis præmiſſa ſunt. ſi in die indicatorio monſtrata ſunt. ſi die judicatorio evenit. Si naturæ morbi convenientia excreta ſunt. ſi æger poſt criſin morbo & ſymptomatibus liberatur. *Mediocris*, ſi non

non exquisita coctionis signa præcessere, si in augmento, vel paulò ante statum, vel coctione demum incipiente, accidit; in quo casu hæmorrhagia ex omnibus excretionum modis commodissima est, si die indicatorio non indicatur, si in die intercalari evenit, si evacuatio morbi naturæ non congruit, si æger non benè fert. *Mala* fit, si ante statum irritata à naturæ malignitate aut copia naturæ evenit, si talis in die Indicatorio indicata fuit; quamvis sæpè repente ingruat, si alia optimæ crisi contraria adsunt. Ubi nota. 1. Sæpè in mali crisi apparere, ac si ægri melius habeant, qui tamen mox ad pejorem statum, cum illa quæ levare videntur, præter rationem sint, redit. 2. Aliquando, morbo lethali & viribus firmioribus, pro una mala & simpliciter exitiali crisi, plures imperfectæ malæ, in quibus rudimenta coctionis instabilia apparent, antequam æger moriatur, eveniunt. 3. Crisium ad mortem præcognitiones minus stabiles esse.

VI. *Tempus futura Criseos aperiunt*, 1. *Signa coctionis & Cruditatis*, quæ necessariò in aliquo die indicatorio, vel decretorio apparere debent. Quarto die fiet, si primo die signum se ostendit; septimo, si quarto. 2. *Signa quæ morbi idea, magnitudo, & mos suppeditant*: de quibus superius egimus. 3. *Signa temporum morbi*, perfecta ante statum non accidit, imperfecta accidit: exitialis in principio etiam vel augmento habetur. 4. *Signa Critica*, quæ superius habes.

TITU-

TITULUS II.

De Causis morborum.

CAPUT I.

De Causis morborum internis in genere.

Alter affectus, qui corpus humanum præter naturam affligit, est Causa morbi; eaque vel Externa, vel Interna. Sed cum hæc illius effectus sit, vel potius cum illa ad hujus productionem plurimum conferat, ideo internam duntaxat definimus.

Causa morbi interna est, quæ intra corpus humanum nata & hærens, idem præter naturam afficit.

Consideranda circa eam obveniunt, *Signa, Causæ & Differentiæ.*

I. *Signa* Causarum sumuntur in genere. 1. A signis propriis, sapore nempe, colore & motu. 2. A signorum communium, quæ ex antecedentibus & consequentibus, seu causis evidentibus, corporis dispositionibus & symptomatibus sumuntur, syndrome.

II. *Causæ causæ* internæ sunt Res non naturales, Aer, Cibus, Potus, Motus & quies, somnus & vigiliæ, Excreta & Retenta, & animi affectus, quatenus aliquo vitio corpus humanum afficiunt. Ut verò id fiat, requiruntur temporis præsentia, proportionis inter agens & patiens certitudo. Corporis aptitudo, & contactus.

III. *Differentias* quod spectat, reducuntur causæ internæ ad *Humores, Flatūs, & Res toto genere præter naturam.*

C. A.

CAPUT II.

De Causis Morborum internis in specie.

ARTICULUS I.

De Humoribus.

PUNCTUM I.

De humoribus quantitate peccantibus,
seu Plethora.

Primum Causarum internarum genus sunt Humores: peccare autem hi *quantitate, qualitate, motu, loco, & totâ substantiâ*, solent. Humores *quantitate peccantes*, Plethora nomine veniunt, quæ nihil aliud est quam humorum alendo corpori destinatorum, ex causis suis orta exundantia. Humores corpus humanum alentes in massâ sunt sanguinem, Sanguis nempe, bilis, pituita, & Melancholia. Hæ partes sui generis, in cambium deductæ, nutriunt, illisque tantum calorem quantum habent communicant. *Signa* plethoræ sunt, Lassitudo; quia sanguis non diffusus inferiores partes petit. Respiratio ex minimo labore, musculis thoracis sanguine onustis. Venarum turgescencia, Musculorum distensio, Habitus carnositas, somni profunditas, faciei rubedo, &c.

Causæ sunt bonum alimentum, quod multum succi suppeditat. hepar calidum & humidum, quod conficit. Otium, Evacuatio suppressa, Membri abscessio, insuetarum balnearum à cibo usus.

Differentia. 1. Alia est *Exquisita*, quando vel omnes proportionem & æqualitate quæ illis debetur servata (dupla est autem proportio sanguinis ad pituitam, hujus ad bilem dupla) augentur; vel solus sanguis tantum; vel duo aut tres ex reliquis, sanguine etiam proportionem non servante exuberant. *Cognoscitur*,

gnoſcitur ex signis supra positis. *Oritur* quoque ab iisdem, quæ supra memoratæ sunt, causis. Alia *Notha*, quando sanguinis exundantiæ succorum malorum copia conjungitur. *Cognoscitur* ex signis Caco-chymia cum plethora junctis. *Oritur* quoque ab utriusque causis. 1. Alia est *ad vasa*: quæ quidem vires, quod æquabiliter cum sanguine & carnis mole increſcant, non premit, sed vasorum tunicas præ copia distendit, cui etiam superius dicta competunt. Alia *ad vires*, quando humores ita accrescunt, ut à viribus hominis imbecillibus gubernari & confici non possint. *Cognoscitur* ex eo, quod sanguis non valde sit bonus, gravitas & pulsus inæqualis, cum cruditatum & Orientis putredinis signis afficit.

PUNCTUM II.

De Humoribus qualitate peccantibus,
seu Caco-chymia.

Caco-chymia est humorum excrementitiorum à causis suis ortorum in corpore humano præsentia.

Subjectum est corpus humanum, 1. Tum ratione venarum, arteriarum & nervorum; tum illorum quæ extra ea. 2. Tum ratione *regionis alvina*, quæ ventriculum, venas mesaraicas, cava jecoris, lienem, & his interjectum pancreas includit. Tum *venosa*, quæ jecoris convexa cum vena cava, arteria majore, & quicquid earum inter axillas & inguina incidit, complectitur. Tum *Habitus corporis*, qui musculos membranas, ossa, omnem denique corporis molem includit.

Signa ex differentiis quæ sequuntur, depromi debent. Pertinet huc dier. certorum motus, illeque nec Criticus, nec symptomaticus, sed naturalis, qui certis diebus & dierum horis mensuratur, & tam præcisus est, ut cum horologiis certet.

Causa

Causæ sunt sex non naturalia, de quibus superius dictum est.

Dividitur variè.

I. Alia est à *Bile*, quæ est humor præternaturalis calidus & siccus: præternaturalis inquam, quia distinguitur, tum à parte massæ sanguineæ calidioræ, ex calidore & tenuiore chyli parte nata; tum ab excrementitia bile naturali, quæ in folliculo fellis colligitur, & fæces alvi tingit. *Cognoscitur* ex venarum propter calorem dilatantem amplitudine. Coctionis propter nimium depravatione, appetitu potus quàm cibi majore, pulsu vehementi, veloci proclivitate ad iram, somno nullo vel paucio, habitu gracili, colore corporis flavo, motu à tertio ad tertium, & quidem circa meridiem. *Oritur* à corporis constitutione calida & sicca, ætate juvenili, vigiliis, irâ, corporis exercitatione nimia, alimentis calidis & siccis, dulcibus & pinguibus. *Dividitur* 1. In *vitellinam*, quæ vitellum refert, à flava adusta oritur, & ob consumtam à calore serositatem crassâ est, à sanis interdum excernitur, & in atram bilem si aduratur, facessit. 2. *Porraceam*, quæ porrum refert, & plerumque in ventriculo ob cruditatem ex oleribus corruptibilibus, sæpe in venis ex vitellina oritur. 3. *Æruginæam*, quæ æruginem imitatur, & ab intensissimo calore, in epate, venis, & ventriculo producit. 3. *Isatideam*, quæ isatidem refert, & ex præcedente magis adusta oritur.

II. Alia à *Pituita*, quæ est humor præternaturalis frigidus & humidus. Præternaturalem dico, ut discernatur, tum à massæ sanguineæ parte frigidioræ; tum à pituita, ventriculum, intestina, pulmones, artus & Cerebrum oblinente. *Cognoscitur* ex Corporis mollitie & albedine, Crudorum dejectione. Urina cruda, alba, nunc tenui, nunc crassâ, salivæ abundantia, majore appetitu quàm ut cibi

conco-

concoqui possint, motu quotidiano, & quidem circa vesperam. *Oritur*, à cibis crudis & frigidis, potu intempestivo, intemperie viscerum frigida. Excrementorum per vitam otiosam detentione, somno nimio, &c. *Dividitur* 1. In *Inspidam*, quæ cruditatem in ventriculo ob defectum coctionis accipit, & corpus plumbeo colore tingit. 2. *Acidam*, quæ eadem cum præcedente vires habet. 3. *Salsam*, quæ ex salsa & serosa humiditate oritur, frigidis & calidis partibus constat, sitim, saporem salsum, & mordicationem infert. 4. *Vitreæam*, quæ substantia & colore talis est, frigidissima & vi viscosissima eadem, sævissimos cruciatus detenta excitat.

III. Alia à *Melancholia*, quæ est humor præternaturalis frigidus & siccus. *Præternaturalis* inquam, ut discernatur tum à parte sanguinis frigidioræ & sicciore, quæ in liene ex crassiore chyli parte per portæ ramum splenicum, antequam epas ingrediatur, attracta producit, & crassiores partes cum liene alit: tum ab excrementitia naturali, quæ quia in alimentum nulla ratione transmutari potest, ex liene partim per venas hæmorrhoidales, partim per arterias splenicæ ejicitur; interdum ad ventriculum &c. pervenit. *Cognoscitur* ex Urinæ liyore & nigredine, hæmorrhoidum suppressione, flatulentia & ructu, nimio ciborum appetitu, tristitia, taciturnitate, somniorum turbulentia, habitu corporis macilento, duro, & lividi coloris, motu à quarto ad quartum circa mediam noctem. *Oritur*, à Cibis crassi succi, bubula, brassica, pisicibus in quos calor exsiccans sed non adurens agit. Aère frigido & sicco dum tenuitatem absumit, præsertim si æstas calida & sicca præcessit, suppressione hæmorrhoidum, aut aliarum melancholicarum evacuationum, &c. *Dividitur* in

G

Diluv.

Dilutam, quam urinae copiosae, & sudores per noctem patefaciunt. *Crassam*, quam melancholicorum obstructions ostendunt, & *Attram bilem*, quae à calore sanguinem, vel bilem, vel succum melancholicum exurente oritur. Estque modò acida, modò nullius saporis, modò acerba, ut carnem liquet, & effusa in terram fermentetur.

I V. Alia ab *Humore seroso*, qui nihil aliud est quam aquosa tenuis & salsa, copiâ & qualitate corpus humanum afficiens humiditas. *Cognoscitur* ex urinae & sudorum copiâ, Dolore interdum vago, quia propter tenuitatem faciliè deducitur, & ab alieno calore faciliè effervescit. Affectuum fugacitate & recursu, ventris interdum tumore, &c. *Oritur* à cibis humidis & aquosis, sed & bonis, in convalescentibus, ob caloris in ventriculo dissolutionem & languorem. Detentionem seri* ob expultricem laesam, aliorum viscerum obstructionem, vel pororum ab externo frigore constrictionem, vitium lienis, &c. Soli ipsi interdum *Colliquatio* conjungi, quae vel in fame fit propter caloris naturalis marcorem, ac humidi radicalis & carni in vaporosam humiditatem dissolutionem: vel in depravato victu ab ipsius alimenti tanquam non proportionati & familiaris casam assimilationem, quam prius illud insequitur. *Dividitur* in *Mitem*, qui nihil aliud quam sanguis dilutus, & *Acrem*, qui salledinem suam ab adustione acquirit.

PUNCTUM III.

De Humoribus motu, loco, & tota substantia peccantibus.

I. **H**umores motu peccantes sunt iidem ipsi, quatenus ad partes vel ob attractionem, vel ob transmissionem influunt. Partes istae vel sunt imbecilliores,

becilliores, & nulli insigni actioni destinatae, seu naturae, ut laxae, molles, rariae; seu ob aliquam morbosam constitutionem: vel *procliviores*, quae cum mittente nexum, & vias per quas humores admittant, amplas & patentes habent, vel ipsis subjacent. *Causa* motus est. 1. *Attractio*, seu ob calorem ab externis conciliatum, seu ob dolorem. Nam pars dolens ex transmissorum spirituum copiâ incalescit, natura dum doloris causam propulsare nititur, sanguine ac spiritu dolentem locum replet, dolor denique partem debilitat, & ad recipiendum aptissimam facit. 2. *Transmissio*, vel à toto corpore, seu venoso genere, vel partibus aliquibus, & quidem, si expultrix ipsarum valida, viâ laxa, major materiae copia. Accidit tamen interdum, ut humores in suis vasibus accumulati, suoque impetu moveri incipiant, & in partem aliquam pro situ & vasorum ratione irruant. Humores verò illi maximè moventur, qui tenuiores sunt & acres, ut biliosi.

II. *Humores loco peccantes sunt iidem ipsi, quatenus ibi sunt ubi esse non debebant. Causa* sunt 1. *Influxus*, seu per attractionem, seu per transmissionem. 2. *Congestio*, quae fit aut partis vitio, quatenus vel concoctrix vel expultrix suum officium non faciunt: aut alimenti vitio, cum illud vitiosum & tale, ut tantam excrementorum copiam faciat; vel cum materia crassa producitur, quae facultati expultrici resistit.

III. *Humores totâ substantiâ peccantes sunt illi, qui intra corpus peculiarem corruptionem sortiti, idem occulte & totâ substantiâ afficiunt.* Intellige humores tum praeternaturales excrementitios, tum naturales excrementitios retentos, ut semen, grumum sanguinis, sanguinem menstruum. *Signa* praebent subiti malignorum Symptomatum, ut delirium, lipothymia, &c. incursum, morborum ipsorum idea,

&c. *Causa* est tum *materia alimentaria*, quæ seminium corruptionis illius habet, & aliis quidem commista non nocet, sed ab iis secreta & per se existens, venenum evadit. Sanè multis vescimur quæ venenatis vescuntur: tum *Calor* principali agenti & materię junctus, cui accedunt Dispositio Corporis, vel hæreditaria vel acquisititia. Coeli influxus particulares, Aër influxus astrales & exhalationes terrestres recipiens. Contagium, venenum. Imaginatio denique & affectus. *Corruptio* autem illa determinata longa sæpe digestionem ac fermentationem ad hunc gradum deducitur: unde fit, ut non singulis annis pestis grassetur, quamvis singulis sint multa humorum vitia, sæpe etiam sine putredine procedit, ut in plantis & animalibus sine putredine venena generentur; & in siccissimo aëre pestilens venenum nascitur, in quo nulla putredinis apparent indicia.

ARTICULUS II.

De Flatibus.

Flatus est Spiritus halituosus, multus, ex cibo & potu, & humore viscido ab imbecillo calore in animalis corpore excitatus.

Subiectum est animalis corpus, sed præcipuè ventriculus & intestina.

Signa sunt, Tensio sine gravitate, Dolor vagus, præcessus causarum generantium. Affectus subito nascitur. Urinæ in superficie bullis repletæ sunt.

Causæ sunt. 1. Cibus multus & humidus, qui difficulter per se vinci potest, interdum per se flatulentus, ut sunt, fructus *igari*, radices inflativæ, pisces cetacei, pingua omnia, dulcia lenta, &c. 2. Humor crudus & visciditatis propter coherentiam in divisione quæ fit attenuatione partium necessariam, particeps. 3. Calor imbecillis, & materiam digerere

NON

non valens, sive talis sit per se, sive ratione materię in quam agit.

Dividitur in *Pituitosum*, qui tardius movetur, & diutius durat. *Biliosum*, qui mordax, acris, citò evanescens. *Melancholicum*, qui fixus est, & tristitiam excitat, & *sanguineum*, qui mitis, & magis quantitate quàm qualitate infestat.

ARTICULUS III.

De Rebus toto genere præter naturam.

Res toto genere præter naturam sunt *Calculi* & *vermes*.

I. *Calculus* est substantia solida & lapillosa, mucilagine limosâ tartareâ, facultate *διπορευτική* instructâ, in corpore humano, adjumento caloris exortâ.

Subiectum est corpus humanum, & in eo Cerebrum, epas, vesicula fellea, ventriculus, renes, vesica, &c.

Signa partes ipsæ suppeditant. In genere nihil ferè de illis dici potest.

Causa est, non *pituita*. Multi enim eo infestantur, quibus cum calculo nihil commercii, & multi sunt calculosi, qui accuratam victus rationem servant; sed *succus lapidescens*. Hinc calculosi sæpè urinam reddunt, quæ mucum refert, mox in lapidem concrevit. Provenit autem is ex sæculentia alimentorum, quæ si retineatur huic vel illi parti se agglutinat, per novum materię appulsus quotidie augetur, aucta sensim exsiccat, atque ubi materiam viscosam, crassam, terrestremque apprehendit, eam coagulat, & adveniente postea spiritu salis microcosmici interno, quem ob naturalem suam visciditatem seu mucilaginem Tartarum istud faciliè recipit, inque se recondit, tandem in perfectum tophum coagulatur.

G 3

II. Ver-

II. *Vermes sunt animalcula vermicularia*, in corpore humano, ex crasso, lento, excrementitio, & principium vitale sui generis continente humore, & calore vivido, per putredinem suscitato exorta.

Subjectum est corpus humanum, inque eo cerebrum, epar, ventriculus &c. *Causa* est 1. Humor principio vitali sui generis instructus, unde diversi ex diversis nascuntur vermes; illeque interdum crassus & lentus, interdum amarus. Unde ex absinthio & sale marino vermes nascuntur. 2. Calor, non coelestis, sed innatus; illeque humidus, nec tamen solus. Hic paulatim rem dissolvit, & in materia disposita *ψυχρὸν θερμὸν*, & *ζεῦν ἀρχὴν* delitescentem excitat.

TITULUS III.

De Symptomatibus.

Symptoma est affectus præter naturam in iis, quæ extra constitutionem partium ad actionem necessaria sunt, aliquid aliud præter naturam sequens.

Signa symptomatum sensus plerumque unus vel plures aperiunt; quod si latent, ex iisdem fontibus, ex quibus signa morborum & causarum sumuntur, causis nempe & effectis cognoscuntur.

Causæ à qua oriuntur, sunt Morbi, *Causæ*, & ipsa Symptomata.

Dividitur præcipuè trifariam. I. Aliud est *Morbi*, quod morbum proximè, nullo affectu præter naturam interveniente, sequitur. Aliud *Causa*, cum à causa aliqua morbifica actio læditur. Aliud *Symptomatis*, quod aliud Symptoma præcedens sequitur.

II. Aliud est *Actionis læsa*, seu hæc sit abolita, seu imminuta, depravata, vel aucta. Fit id vel *facultatis vitio*, quando instrumentum proximè malè affectum est; quo spirituum & caloris influentis ab-

sentia

sentia refertur, vel *Erroris externi causâ*, quando illa cum quibus fiunt, aut sine quibus non fiunt actiones, fallunt. Aliud *Excretorum* & *Retentorum*; Aliud *qualitatum mutatarum*, quæ ex actionum læsionibus, & ab iis provenientibus humoribus dependent.

III. Aliud est *Facultatis Naturalis*, nimirum, Nutritivæ, Augmentativæ, Generativæ. Aliud *Facultatis vitalis*. Aliud *Facultatis animalis*, quo pertinent symptomata sensuum externorum, internorum, motricis, &c.

I D E Æ
MEDICINÆ PRACTICÆ
GENERALIS

LIBER III.

De Medicamentis.

TITULUS I.

De Medicamentis in genere.

POSTQUAM de Affectibus corpus humanum præter naturam affligentibus egimus, sequitur ut de *Remotione eorundem* aliquid dicamus. Circa Remotionem verò affectuum duo inquiruntur. 1. *Per quæ media removeri possint*. 2. *Quomodo removeri debeant*. Media illa Medicamenta dicuntur, quæ vel in genere, vel in specie & suis Differentiis spectantur. Medicamentum in genere est omne id, quod corpori ægro applicatum, illud à statu præternaturali ad naturalem, per facultates suas, reducere aptum est.

Quinque circa illud consideranda veniunt. *Nomen, Facultates, Dosis, Adulteratio, Substitutio, & Collectio.*

I. *Nominis* si habeatur ratio, res est de medicamento non communiter & absolute accepto, nam & pigmenta & venena ita comprehendit; sed cum relatione ad corpus humanum, idque vel in genere sumtum, quatenus ipsum nec nutrit, nec corrumpit. Sed immutat: vel in specie, quatenus ægrum est.

II. *Facultates medicamentorum* sunt, 1. Manifestæ, & hæc vel primæ calefaciendi, frigefaciendi, ficcandi, humectandi; quæ interdum componuntur vel secundæ, quæ à primis oriuntur, & pro ratione variant, ut potius ipsius sint modi, Attenuandi, abstergerendi, deobstruendi, rarefaciendi, discutiendi, incrassandi, adstringendi, repellendi, stupefaciendi, &c. 2. Occultæ, & harum respectu vel humorem certum peculiari facultate evacuant medicamenta; vel cum membro aliquo peculiarem cognitionem habent; vel venenis resistunt. *Nota 1. De facultatibus in genere.* 1. A forma eas esse, & illis mediantibus hanc agere, hinc illæ, ut ad actionem referuntur, causæ quædam effectrices vocantur, quibus mediantibus in determinatum corpus agitur. 2. Alias actu inesse, ut se statim exferere ut visio in igne possint. Alias potentiâ medicamento à calore corporis in actum deducto, quod fit tardius vel celerius, vel pro ratione materiæ resistentis & caloris agentis, vel pro ratione impedimentorum materiæ, quibus ipsarum actiones ligantur. 3. Alias se exferere per accidens alterius interventu, ut aqua frigida calorem excitat in convulsione: nonnullus per se & immediatè. 1. *De facultatibus primis.* 1. Interdum uni subjecto æqualiter inesse, ita ut vel omnes sint æquales, vel duæ æquales, una inæqualis. 2. Inæqualitates quæ insunt, magis vel minus à temperie disce-

discedere. Non nimis evidenter corpus temperatum alterant, quæ *primi gradus* sunt. Evidenter sed citra noxam, quæ *secundi*. Vehementer, nec citra aliquam noxam, quæ *Tertii*. Cum noxa evidenti, quæ *quarti*. 3. Humiditatem omnium qualitarum minimè activam, quarti gradus esse non posse. 4. Vehementissimè calida nunquam humectare. 5. Nullum quarto gradu desiccare, quod non urat, tertio plurima, quæ frigida sunt & adstringunt. III. *De occultis*, ab occultis eas qualitatibus quæ à forma pendere. Hanc autem formam inferiorem anima ut sui domicilii architectrix est, ut sibi in corpore disposito instar subjectæ materiæ sit, producit, quæ etsi totam suam materiam informet, attamen in spiritu duntaxat insito, humidoque radicali, & calido innato, quod etiam in emortuis est, præcipuè residet, & cum isto à reliquo corpore crassiore salva separari, & rectè quinta essentia appellari potest. IV. De earum cognitione. *Prima* cognoscuntur ratione & experientia, quarum illa à velocitate aut tarditate actionis, habita patientis ratione, odoribus, saporibus, coloribus, qualitatibus tactilibus, ætate, loco natali, operationibus & virtutibus cognitis sumitur. *Secunda* datæ primis non possunt non innotescere, utpote illarum pedissequæ. *Occulta* ex similitudine in primis seu signaturis conjecturantur, hinc experientiâ confirmantur, de quibus consule Portam in Phytognomonicis, & Crollium in signaturis.

III. *Dosis* requiritur in medicamento, quia nulum rectè agere nisi in sua quantitate exhibitum. Hæc verò sumitur ex ratione qualitatis, partis affectæ, & ægri. Mensuratur apud nos grano, scrupulo, drachmâ, uncia, libra, Cochleari, &c. apud veteres, mystro, cyatho, acetabulo, quartario, hemina vel cotylâ, sextario, Congio, urnâ, amphorâ, & culco.

IV. *Adulteratio*, in Exoticis inprimis locum habet, ut *Caphura* ex Borneo allata, admista habet lapidum fragmenta, aut gummi quoddam Chamderros vocatum, succino crudo perfimile, aut ligni cujusdam scobem. Sic *Bezoar* lapis multifariam incuratur. *Moschum* simul & massa quædam è sanguine hirci, pane asso & trito, cum ladano subacta. *Ambra* fingitur pulvere Agallochi lævigato. *Cinnamomum*, corticibus tamaricis in aqua Cinnamomi maceratis, & postea siccatis. *Benjicinum*, mistura resinæ, turis masculi, cum paucio styrace. *Opobalsamum*, oleo liquedambar. *Opium*, meconio.

V. *Substitutionis* occasio ex indigentia: sic Calamus aromaticus succedit Acoro; absinthio abrotanum; abrotano, origanum; acaciæ, hypocistis; acantho, malum; ammi, anisum; amomo, acorus; amygdalis amaris, nuclei persicorum; arsenico, sublimatum; balacistio, malicorium; Calamo aromatico, schænanthum. Cardamomo, cyperus. Cinnamomo, canella vulgaris. Dactylis, ficus Massilienses. Dictamno, salvia. Elleboro albo, cleterium; nigro, lapis lazuli. Erucae, crysimum. Mandragoræ, papaver. Nardo Syriacæ, schænanthum. Nunci moschatæ, caryophylli. Xylobalsamo, radix ligustici, &c. de quibus vide Authores. inprimis Renodæum lib. 4 Pharmaceuticæ cap. 16.

TITU-

TITULUS II.

De Medicamentis in specie, & ipsorum Differentiis.

CAPUT I.

De Medicamentis simplicibus.

ARTICULUS I.

De Fossilibus.

Medicamenta in specie considerata, variè dividuntur: præcipue tamen Differentia illa sunt, quæ à constitutione, qualitatibus & viribus, partibus corporis humani, Planetis & signis Zodiaci, quibus Magica addi possunt, sumuntur.

Constitutionis respectu, Medicamenta sunt vel simplicia vel Composita. *Simplicia* ea voco, quæ talia sunt qualia natura produxit, quæque nullam ab arte compositionem sortiuntur, compositionem tamen arte factorum ingrediuntur: sunt autem, vel Fossilia, vel vegetabilia, vel Animalia, vel Microcosmica. *Fossilia* sunt Medicamenta ex terræ visceribus deprompta. Continentur sub iis, 1. *Terra*, quæ infusâ aquâ solvuntur, ut sunt, 1. *Argilla*, exigui quidem sed tamen alicujus in Medicina usus. 2. *Creta*, quæ in anorexia utilis. *Terra Lemnia* rufi coloris & pinguis, ut in ore contenta ex sevo constare videatur. 4. *Bolus Armenus*, seu Orientalis, qui laudatissimus, si calcis modo subito in summum lævorem pistillo adhibito solvitur, nec quicquam arenosum habet. Rubeus, officinarum est communis. 5. *Cimolia*, seu illa candida, seu purpurascens, Pinguis; & cum tangitur frigida, optima. 6. *Terra Silefiaca* seu *Serigenfis*, quam Montanus invenit.

II. *Succi concreti*, ut sunt, 1. *Sal* sive gemmeus, sive

sive marinus, quorum ille in fodinis excinditur, & in ignem coniectus, non crepitat, sed ignescit. 2. *Nitrum*, tam Dioscoridis, rosei aut candidi coloris, quàm vulgare, sal nitrum, seu sal petrae dictum, spuma quam longa coctione eructat, Aphronitrum dicitur. 3. *Alumen*, *rupeum* inprimis. Nam scissile, plumbeum, quod vim ignis non metuit, & *Catinum* ex Cineribus plantae Kali non est in usu. Vocatur stypteron. 4. *Vitriolum*, sive *Chalcantum*, quod nihil aliud est quàm saluginis sulfureae, aeratae, ferratae coagulum. Vide de eo Verbezum, & Billichium Observ. Chymic. lib. I. c. 13. Album & nativum praefertur, ustum vocatur Colcothar. 5. *Sulfur*, quod si nativum, debet esse nitedulae modo splendens, pellucidum, colore extus subcinericio, intus luteo: si factitium, debet esse praepingue & virescens.

III. *Bitumina*, ut sunt 1. *Naphtha*, bituminis Babylonii colamen, fluida, candida, ignis rapacissima. 2. *Petroleum*, quasi oleum è petra, quod in agro Mutinensi colligitur. 3. *Sperma ceti*, seu *Ambra* subalbida, flos maris. Colligitur in mari, cujus aliqua pinguis & fursurosa spuma est. Eligatur candidum, pingue, &c. 4. *Ambra*, seu Ambarum griseum vulgò dictum, quod ex maris fontibus, & alveis procellarum vi ad litus ejicitur, & aëri expositum densatur. Optimum est cinerei coloris, odoratissimum, quod acu perfossum multum succi pinguis refudat. Factitia, plerumque nigra est, & aquae imposita citius mollescit. 5. *Succinum*, quod & *Ambra Citrina*, *Electrum*, *Carabe*, inter vada & in ipso maris litore invenitur. Candidum est levius, odoratius, imò optimum, fulvum, bonum etiam, si pellucidum, & attritu calefactum rosinarini odorem refert. Vide de illis Libavium in singularibus. 6. *Gagates*, niger, crustosus & bituminis ferax, qui igni admotus

flagrat,

flagrat, odoremque bituminis exhibet, sic à Carbone fossili distinguitur.

IV. *Lapides*, ut sunt 1. Ex pretiosioribus, 1. *Smaragdus*, qui optimus Scythicus, unicolor, ex lucido viridior. 2. *Sapphyrus*, qui si coloris est cyanei, melior est; si aquei, vilior. In Zeilan, Calcut & Pegu invenitur. 3. *Rubinus*; cujus quatuor sunt genera. Vetus, cocci & laccæ Indicae colorem refert, vilissimus Balassius & Spinellus. 4. *Granatus*, qui optimus, si Martii violæ colorem habet rubedini intermixtum. 5. *Sardius*, quod Sardis plerumque fuerit inventus, ita dictus, probatur qui plurimum rubet. 6. *Hamatites* virescens, variegatus, guttis cruentis conspersus. 7. *Nephriticus*, opacus, variegatus, ex colore viridi alisque permixtus, superficies ipsius semper pinguis apparet. 8. *Chrysolithus*, qui vel Orientalis, vel Europæus. Iste mollis est, & cum aureo colore vel multum vel parum nigricat. 9. *CrySTALLUS*, qui, si pellucidissimus, optimus est. 10. *HyaCINTHUS*, qui eò melior quò magis unicolor. pessimus Arabicus. 11. *Ex minus preciosis*. 1. *Lapis lazuli*, opacus Saphiri aut florum Cyani colore, aureis punctulis aut flammulis exornatus. 2. *Lapis Armenius*, qui maculis multis & viridibus & cœruleis, & quibusdam subnigris distinguitur, praefertur colorato cœruleus. 3. *Lapis Iudaicus*, subrotundus, striis secundum longitudinem æquidistantibus & discurrentibus, ac si torno factæ essent. 4. *Lapis Lynceis*, qui aliàs Belemnites. Est pyramidalis, & sub variis coloribus reperitur. 5. *Magnes*, seu Heraclius, eò melior, quò magis cœruleus & ponderosus. 6. *Osteocolla*, qui ossis figuram æmulatur, dicitur & Holosteus. 7. *Silex*, lapis notissimus. 8. *Talcum* lapis speculari lapidi similis, magis tamen tenuis, squamosus, viridiusculus, igni resistens, ac fixus; quod & de Osteocolla quidam produnt. 9. *Unicorni fossile* seu lapis

colore

colore & levore, sæpe formâ ipsâ cornu referens. **III. Ex illis qui à viventibus desumuntur.** 1. *Corallium*, rubrum inprimis. Probatur colore floridum, ut algâ odoratum, ramosum, fractu facillimum; non scabrosum, non concavum. 2. *Lapis spongia*, qui porosus, friabilis, in spongiis concretus, colore candido vel gryseo. 3. *Alectorius*, optimus censetur, qui in corpore suo velut stagnantem injecti cibi micam modicam, nec usque adeo obscuram ostendat. 4. *Chelidonium*, qui est hemisphaericus, & semper intrinsecus cavus. 5. *Lapis Carpinum*, qui triangularis, & circa initium spinæ dorsalis reperitur. 6. *Oculi cancri*, res notissima. 7. *Umbilicus marinus*, qui in limacis orificio dum se hyeme ocludit, invenitur. 8. *Lapis Caymanum*, quem ventres Crocodilorum seu lacertorum ingentium in America præbent. 9. *Lapis porcorum*, qui propè Malaccam in felle porcorum reperitur. 10. *Lapis perca piscis*: duo autem in eo inveniuntur, albi, oblongi, plani, altera parte dentati. 11. *Lapis Bezoar*, ex quibus laudantur Orientales, Persici, è nigro colore virides, ablata superiore cristâ inferiore splendentes. Verus est, qui calce fricatus puniceum colorem contrahit, vel in aqua per tres horas maceratus, idem cum eo quod antehac habebat pondus obtinet. 12. *Ætites*, qui ab Aquila in nidum deferuntur; de quo vide Laurembergium.

I V. Metalla, quæ sunt vel *Naturalia*. 1. *Aurum*, quod Chymicis Sol. Præstantissimum est Arabicum, hinc Ungaricum, tandem Rhenanum. 2. *Argentum*, quod Chymicis Luna & Cerebrum. 3. *Stannum*, Hermeticis Jupiter. In Anglia defæcatissimum habetur. 4. *Æs* seu *Cuprum*, Chymicis Venus. Laudatissimum est in Cypro. 5. *Ferrum*, seu Mars. Optimum Damascenum, & Hispanicum. 6. *Plumbum*, seu Saturnus. 7. *Hydrargyrum*, seu Mercurius, Chy-

Chymicorum idolum, quod ex multarum fodinarum glebis guttatim stillat. His adde *Stribium*, seu *Antimonium*, Hermeticor. curas & tormentum, quod olim fossile, nunc excoctum divenditur. 11. Vel *Fæditia*, ut sunt. 1. *Scoria* seu recrementum, dum vena metallica in fornace excoquitur. 2. *Cadmia fornacum*, quæ in venarum excoctione partibus fornacum superioribus insidet. Optima quæ in Cypri fornacibus. 3. *Pompholyx*, Nihili seu Tuthia, volatilis ex ære excocto favilla. Optima est candida & lævis. Cypria laudatissima. 4. *Spodium* Græcorum intellige, non Arabum, & nihil aliud est quàm concretus ex favillis, quæ in excoctione aeris evolant, mox in pavementum delabuntur, glomusculus. 5. Flos æris, cui adde Æruginem & squamam. 6. *Cerussa*, quæ ex plumbo beneficio aceti educitur. Laudatissima Rhodiaca, & Puteolana. 7. *Cinnabaris*, quam officinæ argenti vivi dant. 1. *Lithargyrum*, denique, seu fax tenuior argenti à plumbagine repurgati, vi follium excussa.

ARTICULUS II.

De Medicamentis Vegetabilibus.

Medicamenta vegetabilia sunt, arbores, frutices, & herba; quatenus illa removendis corporis humani affectibus, vel tota vel partibus suis, radicibus nempe, lignis, corticibus, foliis, cimis, floribus, fructibus, & humoribus inserviunt. 1. *Arbores* istæ sunt 1. *Pomifera*, Malus seu Pomus propriè dicta. Malus Cydonia. Malus Citria. Malus Aurantia. Malus Punica, Pyrus, Ficus, Sycomorus, Morus, Arbutus, Mespilus, Sorbus, Malus Persica, Malus Armeniaca, Persica, Prunus, Myrobalanus, Sebestena. Zizyphus, Cornus, Lotus, Cerasus, quibus Ebenum & Guajacum adjiciemus. 11. *Nucifera*, Amygdalus,

mygdalus, Nux juglans, Nux avellana, Castanea, Pistacia, Glans unguentaria, & Stryax, ad quos multæ Nuces exoticæ referri debent. III. *Dactylifera*, qualis est Palma. IV. *Glandifera*, Fagus, quercus, Phellodrys, Suber, Ilex & Smilax Arabum; quo etiam spectant viscum, Gallæ & Uva quercina. V. *Baccifera*, Santalus, Lentiscus, Thurifera arbor, Terebinthus, Balsamum, Rhus, Cocconileia, Fraxinus, Aquifolia, Tilia, viburnum, Ostrya, Gossypium, Acer, Platanus, Sassafras, Ricinus, Berberis, Grossularia, Sambucus, Laurus Laureola, Chamelæa, Thymelæa, Cneoron, Myrtus, Ruscus, vitis Idæa, Buxus, Olea, Agnus Castus, Ligustrum, Phylirea, Philyræ, Rhamnus, Lycium, Rubus, Capparis Sabina, Cedrus, Cupressus, Juniperus, Asparagus, Taxus, & Draco Arbor. VI. *Aromatifera*, Nux moschata, Macis, & Macer, Cassia seu Canela, Cinnamomum, Folium, Caryophilli, Piper, Cubebæ, Amomum, Grana Paradisi, & Cardamomum. Potest huc & Agallochum referri. VII. *Siliquata*, Cytisus, Anagyris, Acacia, Aspalathus, Genista spartium, Scorpium, spartium, Coluthea, Senna, Euonymus, Nerion. VIII. *Conifera*, Cedrus conifera, Pinus, Larix, Picea, & Abies. IX. *Ulisera*, Salix, Alnus, Ulmus, quæ & vesicas fert. Populus. X. *Rhodiflora*, Rosa, Cistus. Cistus Ledum, &c. XI. *Scoparia*, Tamariscus, Erica, & aliæ.

II. *Herba* dividuntur etiam variè. Sunt enim I. Si *Radices* spectemus, *Bulbosa*, ut, Iris bulbosa, Leucoium, Crocus, Colchicum, Cepa, Porrum, Scilla, Allium, Moly, Orchis, Satyrium, &c. II. Si *Folia*, sunt I. *Longicaulifolia*, ut Gramen, Juncus, Nardus, Cyperus, Equisetum, Arundo, Papyrus, Xyris, Iris, Acorus, Galanga, Zinziber, Zedoaria, Costus, &c. 2. *Craissifolia*, ut Sedum, Umbilicus Veneris, Aloë, Rhodia radix, Telephium, Portulaca, Cepæa, Crith-

Crithmum, Kali, Tragum. 3. *Hirtifolia*, Borrage, Lithospermon, Cynoglossa. 4. *Nervifolia*, Gentiana, Plantago, Psyllium, Bistorta, Potamogeton, Nymphaea, Arum, Elleborus, &c. 5. *Rotundifolia*, Aristolochia utraque, Tusfilago, Petasites, Lappa, Asarum, 6. *Capillares*, Phyllitis, Hemionitis, Asplenium, Lunaria, Capillus Veneris, Polytrichum, Ruta muraria, Ros solis, Filix, Polypodium, & aliæ. 7. *Spinosa*, ut Carduus, Scolymus Theophrasti, Dispacus, Eryngium, Euphorbium, Tragacantha, &c. 8. *Trifolia*, *Pentaphylloides*, &c. 9. *Mollifolia*, ut Althea, Mercurialis, Rhubarbarum, &c. III. Si *Flores* sunt I. *Verticillata & Galeata*, ut Menta, Calamintha, Origanum, Pulegium, Hyssopus, Thymus, Stoechas Arabica, Lavendula, Spica vulgaris, Chamæpitys, Botrys, Salvia, Urtica, Betonica, Euphrasia, Scrophularia, Prunella, Gratiola, Dictamnus, &c. 2. *Stellata*, ut Rubia, Gallion, Cruciatra, Ruta. 3. *Calcariflora*, ut Aquilegia, Consolida regalis, Linaria, &c. 4. *Umbellifera*, ut Cuminum, Foeniculum, Anethum, Pyrethrum, Ferula, Thapsia, Turpetum, Peucedanum, Daucus, Chærefolium, Apium, Angelica, Imperatoria, Laserpitium, Panax, Carvi, Coriandrum, Anisum, Pimpinella, Myrrhis, Cicuta, Ligusticum, Filipendula. 5. *Corymboides*, Helenium, Pyrethrum, Artemisia, Ptarmica, Absinthium, &c. 6. *Capitata*, Scabiosa, Jacea, Cyanus, Scorzonera, Caltha, Succisa, Cardui, &c. IV. Si *Fructus*, sunt I. *Pomifera*, Mandragora, Cucumis, Melo, Pepo, Anguria, Cucurbita, Colocynthis, Cucumis asininus, &c. 2. *Siliquata*, ut sunt præter leguminosas, & oleraceas, Hedysarum, Ornithopodium, Polygala, Onobrychis, Galega, Glycyrrhiza, Fumaria, Chelidonium, Aquilegia, Nigella. 3. *Capsulifera*, Nasturtium horrense, Bursa pastoris, Cochlearia, Raphanus rusticus, &c. 4. *Vasculifera*, ut

Centaurium minus, Auricula muris, Linum, Hypericon, Anagallis, Numularia, Herniaria, Papaver, &c. v. Si *usum*, sunt 1. *Frumentacea*, ut Triticum, Zea, Hordeum, Secale, Avena, Ustilago, Oryza, Milium, Panicum, Phalaris, Frumentum Indicum. 2. *Oleracea*, ut Rapa, Rapunculus, Campanula, Rapiſtrum, Napus, Raphanus, Iberis, Dracunculus esculentus, Eruca, Sinapi, Alliaria, Brassica, Lapathum, Beta, Blitum, Centaurium majus, Atriplex, Parietaria, Mercurialis, Lactuca, Sonchus, Cichorium, &c. 3. *Leguminosa*, ut Faba, Phaseolus, Pisum, Ervilia, Vicia, Lentescens, Orobus, Cicer, Lupinus, Fœnumgræcum, &c. vi. Si *modum crescendi*, sunt *Convolvuli* seu *Scandentes*, ut sunt præter Pomiferas & Leguminosas, Scammonia, Soldanella, Salsaparilla, China, Bryonia, Mechoaca, Lupulus, Vitis vinifera, Lilium convallium, Hedera, Nasturtium Indicum, Aristolochia, Cyclamen, Gramen Parnassi, Saxifraga, &c. vii. Si *succum*, sunt quædam *Lactaria*, ut Tithymallus, Efula, Peplus, Peplis, Lathyrus, & Chamælyce, &c. viii. Si *Locum*, in quo proveniunt, sunt, 1. *Horrentes*, *Sylvestres*, *Campestres*, *Montana*, *Prætenſes*, *Aquatica*; ut sunt, Muscus, Lenticula palustris, Lichen seu Pulmonaria arborea, Urtica marina, Alga, Periscaria, Anagallis, &c. ix. Si *Vires* denique spectemus, infinitas ferè herbarum differentias invenimus; de quibus in sequentibus, quantum ad institutum satis erit, agemus: plura exactius alibi.

III. *Humores plantarum*, optimè in *Succis inspissatis*, *Gummata*, *Resinas*, & *Picem* distinguuntur.

I. *Succi inspissati* sunt, 1. *Ammoniacum*, nomen ab Hammonis oraculo habens, gignitur in arbore quam Metopion vocant. Laudatur sincerum Turis instar in grumos condensatum, odore Castoreum utcumque referens, sapore amarum, exterius flavum,

interius

interius candidum, digitis dum tractatur mollescens. 2. *Galbanum*, plantæ ferulaceæ in Syria nascentis succus. Optimum est cartilaginofum, flavum, pingue, non lignosum, gravis & ingrati odoris, quod in se nonnihil ex suis seminibus & famentis retineat. 3. *Opopanax*, succus ex Panacis Heraclei radice effluens. Probatur, intus albus, extus flavus, amarus, odore gravis, pinguis, galbani instar lactescens, & dum resolvitur ad lacteum liquorem propius accedens. 4. *Sagapenum*, ferulaceæ herbæ in Media nascentis liquor. Probatur sincerum, pellucidum, foris rufus, intus cum frangitur flavis aut candidantibus guttis compactum, inter digitos lentescens. 5. *Opium*, seu liquor lacteus, ex papaveris nigri scapo leviter inciso collectus. Optimum est candidum, vel leoninorum pilorum instar flavescens, in massam veluti ex granulis diversi coloris coactum, fordium, odore gravi & viroso. 6. *Aloë*, quæ vel Caballina, vel hepatica seu Soccorina. Eligenda pinguis, calculorum expers, hyeme friabilis, æstate molliuscula, hepatis modo coacta. 7. *Scammonium*, quod ex radice lactei plena, incisa, & exsiccata, reservatur. Laudatur pellucidum, spongiae instar foraminosum, & cum linguæ affricatur, in candidissimum liquorem lacti similem se superficie resolvens. 8. *Elaterium*, seu succus cucumeris agrestis inspissatus. qui omnium medicamentorum diuturnissimus est; optimusque, qui vetustissimus. 9. *Euphorbium*, seu succus acerrimus arboris ferulæ speciem gerentis. Eligendum est purum, translucens, candidum, aut flavum & acre, quod levi linguæ contactu os accensum diu detinet. 10. *Succus liquiritiæ*, qui ex radicibus elicitor, & in pastillos condensatur. 11. *Succus Acaciæ*, qui ex Acacia in Ægypto exprimitur. Eligitur modicè fulvus & odoratus. 12. *Acacia Germanica*, seu succus ex prunis sylvestribus coctis,

H 2

expres-

expressus, in solatus, & exsiccatus. 13. *Manna*, quæ in Calabria circa Canis ortum ex Fraxino & Orno colligitur. Eligenda candida, recens, anno non vetustior. Adulteratur saccharo penidio herbarum foliis circumvoluto. 14. *Gummi gotte*, seu Chittajemu, Gummi gamandra, Gummi de Peru, quod ex Ricino Indico elicetur. vide de eo *Reudenium*, *Lotichium*, & *Bontium* in Medicina Indorum.

II. *Gummata* sunt: 1. *Gummi Arabicum*, quod laudatur, si vitri modo est pellucidum, sincerum, in vermiculorum speciem contractum, dein candidum. 2. *Gummi tragacanthum*, quod à radice cujusdam plantæ spinosæ, quæ Græcis Tragacantha, manat. Pellucidum est, album, subdulce, leve ac sincerum. 3. *Sarcocolla*, seu lachryma arboris cujusdam in Perside nascentis, turi tenui similis, subfulva, gustu amariusecula. 4. *Gummi hedera*, ex flavo rubescens, odore grave, sapore acre. 5. *Canna-mum*, seu lacryma Arabicæ arboris, myrrham quandatenus referens, virosi gustus. 6. *Lacca Officinarum*, quæ fit ex succo arboris cujusdam in Pegu, & Malavar. Dicitur à formicis alaris fieri. 7. *Sanguis Draconis*, seu lacryma arboris cujusdam instar sanguinis exsiccari concreta. Aquam lacteam reddit, sed sine mixtione. 8. *Asa foetida*, seu lachryma Sylphei in Lybia & alibi crescentis. Eligenda est sincera, alii odorem ferè æmulans, viscida. Adulteratur permixtione farinæ, fursuris, sagapeni. 9. *Camphora Officinarum*, seu resinosa proceræ cujusdam arboris lachryma. Seligenda est alba, pellucida instar crystalli, non maculata, odora, digitis friabilis, accensa vix extinguibilis. 10. *Gummi linniperi*, aridum, durum, flavum, Mastichi simile. Vernix liquidus ex eo & oleo ex semine lini expresso fit. De Gummi Cerasorum, & Ulmi, taceo.

III. *Resina* vel sunt *humida*, vel *secca*. 1. *Humida*

mida sunt. 1. *Terebinthina vera*, seu liquor ex Terebinthi trunco & ramis defluens. Probatur alba, pellucida, vitreo colore, in cœruleum vergente, odorata, & acris. 2. *Resina laricea*, seu Terebinthina Officinarum, quæ sæpè pro prima venditur. Optima quæ purissima, odoratissima, aliquantum translucenta, & quæ ab intincto digito contumaciter & æqualiter diffluit. 3. *Mastiche*, quæ ex lentisco effluit, & inter Gummi-refinas reponenda videtur. Probatur candida, splendens, odorata, friabilis, in Chio nata. Adulteratur thure & resinâ permixtis. 4. *Thus* seu *Olibanum Officinarum*, seu liquor arboris in Arabia nascentis. Primas tenet masculum, & *gioris*, naturâ rotundum, candidum, secundæ *Orobio*, quod in Amelo nascitur, quod minus est & fulvius debentur; tertiæ *Amomiti*, quod candidum, & dum mollietur, mastiches more digitis cedit. 5. *Myrrha*, seu lacryma arboris in Arabia nascentis, Ægyptiacæ spinæ similis, quâ incisâ, in substratas teges distillat. Primas tenet *Troglodytica*, quæ subviridis, pellucida & mordax; secundas, tenuis & bdellii modo lentescens; tertiæ, *Caucalis*, nigra & retorrida; ultimas *egyptiacæ*, quæ aspectu gummi refert. 6. *Styrax* seu lacryma arboris malo cotoneo similis, in Syria nascentis. Præfertur flavus & pinguis, resinofus, albicantibus grumis, qui, dum mollietur, melleam humiditatem & odore perseverantem ex se emittit. Adulteratur arboris scobe, quæ vermiculorum erosione facta est. 7. *Liquidambar*, seu resina oleaginosâ, suavissimi ac fortissimi odoris, effluens ex arbore quadam Occidentalis Indiæ, Ocosot dicta. 8. *Bdellium*, seu lacrymæ arboris Bactrianæ. Probatur amarum, translucidum, taurino glutini simile, intus pingue, & facile mollescens. 9. *Benjuinum*, seu gummi ex arboris cujusdam vastæ, in India Orientali prodeuntis, ramis vulneratis effluens.

Optimum est amyglades, quod unguēs seu maculas candidas amygdalarum instar admittas habet, & in Zeilan provenit. 10. *Tacamahaca*, seu resina ex vulnerata arbore, quæ in Nova Hispania crescit, profluens. Colore accedit ad galbanum, unguibus est albis, odorem ac saporem gravem refert, cutique tenaciter adhærescit. 11. *Gummi Elemi*, seu lacryma pellucida, albicans, cum flavis particulis intermixta, in massam redacta, suavem odorem accensahalans. Adfertur ex Æthiopia. Dioscoridi flavum est, ac scammonio utcumque simile, mordaxque. 11. *Ex Resinis siccis*, est *Colophonia officinarum*: quæ est substantiæ oleaginosæ, flavescens, arida ac friabilis, residua ex resinis abietina strobilinaque coctione dum purgabantur, inspissatis ac frigore induratis. Eligenda est pellucida, odorata, quæ turis fumum accensa æmulatur.

III. De *Pice* non est quod aliquid adjiciam. De Plantis consule *Theatrum Botanicum Bauhini*, quod jam prodit: in earum faciliorem cognitionem deducet te, Deo volente, nostrum Phytognomicon, & alia, quæ, ringente quamvis invidiâ, meditamur.

Cæterum *Virium in plantis cognitio*, ex signaturis quoque seu similitudinibus, quas cum *partibus humanis, humoribus & morbis* habere videntur, dependet, seu figurâ id fiat, quæ potissimæ hic considerationis, seu qualitatibus sensibilibus foliis, seu actionibus & moribus, &c. Sunt tamen notæ illæ vel *Fixæ*, quæ in seminibus, radicibus, & floribus conspiciuntur: vel *Mobiles*, quæ ex Sapore, odore, colore, formâ, hirsutic, lævitate, &c. desumuntur.

I. *Partes humanas* quod concernit, repræsentat 1. *Caput*, Papaver, Juglans, Nux Indica, Pœonia folliculus, Scillæ radix, Agaricum, flor. libor. convallium. 2. *Oculos*, Grana herbæ Paris, flos Euphrasiæ, anthemidis, calthæ, hieracii, anemones, scabiosæ, &c.

sæ, &c. 3. *Dentes*, hyoscyamus sine siliquis, acini mali punici, pinci nuclei, dentaria, folia vermicularis, radix Chelidoniæ minoris. 4. *Aures*, folia Asari, Cochleariæ. 5. *Nasum*, fol. mentastri aquatici. 6. *Guttur*, seu *tracheam arteriam*, Pyrola, Uvularia, Cervicaria, Cassia fistularis. 7. *Pulmones*, pulmonaria saxosa, pulmonaria maculosa, pulmonaria quercina. 8. *Cor*, Citri fructus, anthoræ radix, fructus anacardii. 9. *Jecur*, Lichen, Fungus betulæ, quercus, jecoraria. 10. *Lienem*, Scolopendrium, Lingua cervi, lupinus. 11. *Ventriculum*, Folia Cyclaminis, Zingiber, Galanga. 12. *Intestina*, Convolvulus, Calamus aromaticus, Cassia fistularis. 13. *Umbilicum*, Umbilicus Veneris. 14. *Vescam*, Alkekengi, Nux vesicaria, Colutea, Solanum. 15. *Pudenda*, Arum, Fabæ. 16. *Testiculos*, species Orchidum, satyrium, Dracunculus porrum, boletus cervinus. 17. *Vterum*, Aristolochia rotunda, Macis, Sabina. 18. *Renes*, Portulaca. 19. *Articulos*, hermodactylus, sarsapariglia. 20. *Manum*, Palma Christi. 21. *Capillos*, Muscus Arborum, Capillus Veneris.

II. *Humores* quod spectat, resipiunt 1. *Bilem flavam*, plantæ floribus vel succis flavis croceisve, ut Aloë, Senna, Absinthium, Tithymalus, Crocus, Colocynthis, Rhubarbarum, &c. 2. *Bilem prassinam*, quæ viridi & herbaceo colore præditæ sunt, ut Blium, Atriplex. 3. *Bilem pallidam*, Bryonia. 4. *Bilem atram*, quæ floribus, foliis, vel succo nigrescunt, purpurascunt, cæruleisve sunt coloris, ut fabæ, lens, vicia, borrago, buglossa, &c. 5. *Pituitam*, plantæ albifloræ, ut Cucurbita, lactuca, &c. 6. *Sanguinem*, quæ rubri coloris sunt, vel rubro colore tingunt, ut Santalum rubrum, Radix Chinæ, filicis, acetosæ.

III. *Quantum ad Morbos*, 1. *Calculus* repræsentant, Miliun solis, radix saxifragiæ albæ, cortices nucle-

nucleorum lapidei, nuclei adeoque ipsi. 2. *Exanthemata*, lentes. 3. *Excrefcentias*, Agaricum, gallæ. 4. *Ictericam*, Chelidonia, Crocus, Centaurea. 5. *Polypum*, Chelidonia minoris, & polypodii radix. 6. *Lentigenes*, Betulæ cortex albis interlitus maculis, Lichen arboribus innascens. 7. *Maculas*, Allium, Arum, Arisarum, Persicaria, Pulmonaria, &c. 8. *Vulnera*, Perforata, Millefolium.

ARTICULUS III.

De Medicamentis Animalibus.

Medicamenta Animalia sunt, quæ vel ab animalibus totis, vel ipsarum partibus desumuntur.

Animalia tota sunt in quintuplici differentia: sunt enim vel *Aves*, vel *Quadrupedes*, vel *Pisces*, vel *Reptilia*, vel *Exanguia*.

I. *Aves* sunt ex *Terrestribus*. I. *Carnivora*, Aquila, Vultur, Accipiter, Milvus, Harpa, Cuculus, Falco, Psittacus, Corvus, Cornix, Graculus, Pica, Noctua, Vespertilio, Struthiocamelus. II. *Phytivora*: & hæc I. Vel *pulveratrices*, tam *sylvestres*; ut Pavo, Phasianus, Attagen, Gallina corylorum, Tarda, Perdix, Corurnix, Ortygometra: quàm *domestica*, ut Gallus gallinaceus, Gallina. 2. Vel *pulveratrices & lotrices simul*, Columba, Turtur, Palumbus, Passer. 3. Vel *Canora*; ut Carduelis, Spinus, Fringilla, Linaria, Alauda. 4. Vel *Baccivora*, Turdus, Merula, Sturnus. III. *Insectivora*, I. *Non canora*, Picus Martius, Troquilla, Merops, Regulus, Hirundo, Upupa, Parus, Motacilla, Rubetra, Rubecula. 2. *Canora*, Luscinia. Ex *Aquaticis* I. *Palmipedes*, I. *Piscivora*, Pelecanus, Catharacta, Cephphus, Phalacrocorax, Mergus, Colymbus, 2. *Herbivora*, Cygnus, Anser, Anas, Fulica. II. *Fissipedes*, I. *Carnivora*, Ciconia, Ibis, Phœnicopterus, Ardea, Porphyrio, Alcyon, Ispida.

2. *Ex*

2. *Insectivora*, Arquata, Crex, Totanus, Gallinula aquaticæ, Scolopax, Tringa, Junco, Cinculus, Vanellus, &c. 3. *Granivora*, est Grus.

II. *Pisces* sunt I. *Marini*, & hi I vel *Pelagii*, tam *squammosi*; Afellus, Harengus, Liparis, Aper, Glaucus Hippurus; quam *Læves*, Thunnus, Pompius, Amia, Xiphias, Remora, Congrus, Muræna: tam *Cartilaginei longi*, ut Canis Aristotelis, Galeus, Catulus, Mustelus, Asteria, Glaucus, Centrina, Simia marina, Zygaræna; quàm *plani*, ut Torpedo, Pastinaca marina, Aquila, Raja, Rana marina, Squatina, & Squatinoraja. II. Vel *Saxatiles*, *Squammosi*, Scarus, Turdus, Pavo, Lepras, Merula, Phycis, Perca marina, Channe, Hepatus, Melanurus, Coracinus, Adonis, Scioena, Glaucus, Anthias, Gobi, Sphyræna, Acus, & Faber. *Læves*, ut Alauda, & Pholis. III. Vel *Litorales*, & hi *Squammosi non plani*, Mullus, Hirundo, Cuculus, Milvus, Lyra, Phagrus, Erythrinus, Acarnanes, Orphus, Dentex, Synagris, Chromis, Aurata, Sargus, Sparus, Mormyrus, Cantharus, Salpa, Scorpius, Bleennus, Peecten, Apua, Encrasicholus, Atherina, Sarda, Moena, Smaris, & Boops. *Squammosi plani*, Solea, Citharus, & Passer. *Læves non plani*, Sandilz Anglorum, Draco, Dracunculus, Uranoscopus, Trachurus, Scombrus, Lacertus, Saurus, Corax & Milvus. *Læves plani*, Passer & Rhombus. II. *Marini & fluviatiles simul*, & hi, I. *Squammosi*, ut Salmus, Lupus, Latus, Alofa, Ziga Albis fluvii, Mugil, Caper, Sturio, & Galeus Rhodius. 2. *Læves*, Huso, Eperlanus, Lampetra, Anguilla, & Orbis. III. *Fluviatiles*, & hi I. *Squammosi*, Trutta, Thymallus, Umbra fluviatilis, Barbus, Capito, Leuciscus, Gobi, Asper, Cobitis, Phoxinus, &c. *Læves*, Atilus Padi, Antacæus Borythenis, Ichtyocolla, Glanis, Mustela fluviatilis, Picis fossilis,

H 5

fossilis, Phoxinus & Salmo. *IV. Fluviatiles & aliarum dulcium aquarum*, ut Perca major, Scrolus, Pungitus Alberti, Alburnus Ausonii, Epelanus fluviatilis, Lucius, Cyprinus, Tinca, &c. *V. Lacustris*, ut Umbla vulgaris, Carpio, Trutta lacustris. Lavaretus Allobrogum, Sarachus, &c.

III. Quadrupedes sunt *I. Solidipedes*, seu *ῥαχιδόχοι*, ut Equus, Asinus, Mulus, Elephas, Zebra, & Unicornu. *II. Bisulca*, seu *διχιδόχοι*, ut, Alce, Boum omne genus, Camelus, Camelopardalis, Capra, Cervus, Gulo, Rangifer, Rhinoceros, & Sus. *III. Digitata* seu *πολυδάκτυλοι*, quæ sunt, *Vel vivipara*, ut Pardus, Tigris, Ursus, Lupus, Hippopotamus, Vulpes. Simia, Cercopithecus, Cynocephalus, Taxus, Castor, Lutra, Ichneumon, Mustela, Mars, Genetha, Lepus, Cuniculus, Sciurus, Glis, Mus, Talpa, Erinaceus, Hystrix, Canis & Felis: *Vel ovipara*, seu illæ corio membranaceo tegantur, seu tegumine testaceo; ut, Ranæ, Lacertus, Salamandra, Stellio, Scincus, Cordylus, Chamæleon, Crocodilus, & omne testudinum genus.

IV. Reptilia sunt *Serpentes*, tam *ἄποδοι* quàm pedati, tam minores quàm majores, ut: Vipera, Ammodites, Cerastes, Hamorrhous, Aspis, Dispas, Scytale, Amphibæna, Cæcylia, Cenchrus, Acontias, Dryinus, Elope, Anguis Æsculapii, Hydrus seu Natrix, Boa, Hydrus marinus, Scolopendra marina, Draco, Basiliscus, Draco Pythius, Draco alatus.

V. Exsanguia, sunt in quintuplici differentia, *I. Mollia*, Polypus, Sepia, Loligo, Lepus marinus. *II. Crustacea*, Locusta, Astacus, Squilla, Cancro- rum omne genus, & Crustacea in conchis degentia. *III. Testacea*, Nautilus, Purpura, Murex, Buccinum, Turbines, Trochi, Cochlearum omne genus, Margaritæ, Chamæ, Ostrea, Pectines, Myrtili, Tellinæ,

linæ, Pinna, Byssus, &c. *IV. Zoophyta*: de quibus vide Authores. *V. Insecta*, quæ *I* Vel sunt *Terrestria*, tam pedata; ut sunt, Apis, Vespa, Papilio, Muscarum omne genus, Gryllus, Scarabæus, Formica, Pediculus, Araneus, Millepeda, Afellus: quam pedibus carentia, ut Vermis, Limax. *II. Vel Aquatica*, ut Hirudo, Hippocampus, Stella marina, &c.

Partes quibus animalia in Medicina inserviunt, vel sunt omnibus speciebus communes, vel cuique propriæ. De his & illis alibi videbimus.

ARTICULUS IV.

De Medicamentis Microcosmicis.

Medicamenta microcosmica sunt medicamenta simplicia, quæ ex corpore humano, ad depellendos humani corporis affectus desumuntur.

Medicamenta hæc vel ex *vivo* homine desumuntur, vel ex *mortuo*. Ex *vivo* habemus Capillos, Ungues, Salivum, Aurium sordes, Lac, Semen, sanguinem menstruum, Secundinas, Galeam, Urinam, Stercus, Pediculos, Lumbricos, Calculum. Ex *mortuo* desumuntur, Cutis, Pinguedo, Cerebrum, Cranium, Dentes, Ossâ, Muma; de quibus consule Danielem Beckerum in Medico Microcosmo, & Johannem Hartmannum.

CAPUT II.

De Medicamentis Compositis Naturalibus.

ARTICULUS I.

De Acidulis.

Hactenus simplicia medicamenta fuere: sequuntur *Composita*, quæ vel à *Natura*, vel ab *Arte* sunt talia. Illa sunt *Acidula*, & *Therma*.

Acidula

Acidula sunt aqua, quæ sapore acido & viribus aliis à Mineralibus imbuta, morbos convenienter adhibita depellunt.

I. Sapor ille acidus, non est in omnibus æqualis. Aliæ sunt acidæ, aliæ vinosæ, aliæ vix sensibili acore sentiuntur. Aliquando etiam eadem numero acidulæ sunt tam acres ut dysenterias excitent, aliquando effœtæ, aliquando palato gratissimæ; quod sit, vel propter ingentem æstum, qui optimam illarum partem evocat; vel propter pluviolosam cœli constitutionem, quæ pluvias aquis mineralibus miscet; vel propter nebulosam, caliginosam, & austrinam aëris dispositionem, quæ in viscera terræ delatus, & ductus quos aquæ medicatæ currunt pererrans, easdem lutosas, turbidas, & crassas facit; vel propter ejusdem pestilentem, eumque epidemiale & publicum ejusdem statum; vel propter fluminum inundationem; vel denique, quod tamen rarò fieri solet, propter terræmotum.

II. Minera quæ aquas imprægnare solent, sunt: Ochra rubiginosa; Ochra ferrosa, Sal, Nitrum, Chalcitis, Melantheria, Myfi, Sory, Lapis ferreus, Chalcanthum, Alumen, Cuprum & Ferrum; sed hæc quatuor posteriora inprimis. Chalcanthum & alumen singularem acorem habere, certum est: ferrum habere ex vitriolo Martis colligi potest; & in Arduenna sylva multi sunt fontes acidi, in quibus copiosum ferrum. Cuprum verò acoris non esse expers, vel inde pater, quoniam Chalcanthi particeps est, idè ubi cuprum est, ibi & Chalcanthi aliquod genus. *Explorabis* eas mineras vel *salvâ aquâ*, per naturæ loci ex quo emanat, saporis odoris, qualitatis tactilis, & contentorum, considerationem; vel *consumtâ*, per ejusdem insolationem, destillationem, & decoctionem. *Imprægnatio* au-

tem

tem sit, 1. A substantia *halituosa*, seu spirituosa. Inde aqua fit tenuis & levis, bullas nullas habet, facile alteratur: pota, vel nares statim ferit, vel oculos lancinat, vel ructus mover, vel caput implet, vel vertiginis quandam speciem excitat, nec diu in hypochondriis hæret. 2. Ab *humida*, cum minerales, succi liquidi imbibuntur. 3. A *solida*, quæ suas qualitates & *diversis* aquis communicat, si inter aquas & ramenta est proportio; si aquæ illis diu sunt imbutæ, nec aliæ aliunde affluunt; si denique metallorum fragmenta in minutissimas partes conciduntur. Ex imprægnationis diversitate oritur *aciditatis diversitas*. *Acida* sunt, in quibus quantitas acidarum mineralium utraque continua atque discreta, est major, & qualitas acoris intensior. *Vinosæ*, in quibus earum quantitas est parior, & qualitas remissior. *Obscurè acidum*, in quibus talium mineralium quantitas infra mediocritatem est, & acida qualitas languida.

III. De Viribus acidularum nota, 1. Depellere eas morbos *Alteratione*, *Corroboratione*, *Evacuatione*, per alvum si laxa est; per Uriaam, si facilius mingunt; per sudorem, si cutis rara, & habitus Corporis laxus; per vomitum, si ventriculus frigidus, & acidulæ multum sulfuris continent; imò per plures meatus simul, ut Heer in sua Spadacrene testatur. 2. *Plus* mineralium virtutum habere illas, quæ in loco nativo & ubi minere nascuntur vel in canalibus occurrunt; quæ succos liquidos imbibere; quæ terras & lapides friabiles in se habent; quæ per mineram copiosam, mollem, raram, porosam, viâ longâ, angustâ, inæquali, anfractuosa, per præceps & cum impetu labuntur; *Minus*, quæ uno tantum in loco mineris associantur, succos minus concretos, lapides, & metalla

metalla abradunt, paucam mineram imbibere, & brevi, amplâ, æquali, & rectâ viâ decurrunt. 2. Præsciri posse, bonæ an malæ sint futuræ, salubritatis prognostica sunt, Constellationum in cœlo bonitas, naturalis quatuor anni temporum constitutio, aëris puritas & salubritas, pluviarum moderatio, ventorum salubrium flatus modicus, &c. Malitiæ, è contra.

I V. *Convenienter adhibebuntur*, 1. *Ratione Personarum*, si non dabuntur senibus decrepitis, pueris, gravidis, rabidis, tympaniticis, anasarcticis, dysentericis, asthmaticis, menstruatis, renum exulceratione laborantibus. 2. *Ratione Temporis*, si non propinabuntur cum mutantur, si non tempore hyberno, nisi extraordinariè & cæteris paribus: si propinabuntur, cum bonæ ex signis suis esse præsumuntur, si tempore verno maximè, si manè & vespèri, si in loco suo vel non longè inde remoto. 3. *Ratione antecedentium usum*, si corpus præparabitur alvi lenitione, sanguinis detractione, viarum resecratione, noxiorum humorum depulsione. 4. *Ratione Circumstantium usum*, si bibentur ita ut sensim ad summam dosin ascendatur; si ita ut in summa dosi paululum persistatur, & gradatim ad minimam descendatur; si ita, ut mensura præscripta in partes distribuat, si diætæ ratio habebitur, &c. 5. *Ratione insequentium usum*, si corpus moderatè movebitur. Si diligenter attendetur, quo natura vergat; id est, an sint operaturæ per alvum, an per urinam, an per cutis spiracula, an per plura emissaria simul; si retentæ per Clysteres convenientes deturbabuntur; si Symptomatibus, quæ occurrere solent, obviam ibitur.

I V. Sunt autem plurimi in Europa fontes acidi, inter quos præcipui sunt in Germania: 1. *Spadani*, & hi quatuor, Geronsterius, Pouhontius, Savinarius & Tonnetius. 2. *Griessbachiensis*, in aditu sylvæ

sylvæ Herciniæ situs, qui ferro, chalcanto, Sale crystallino, bitumine & sulfure imbutus est. 3. *Petrinus*, in Alsatia quarta miliaris parte à Griessbachiensis diffusus, qui mineras superiori pares habet. 4. *Antegastensis* in introitu sylvæ Herciniæ ad vicum Antegast situs, qui alumine, sulfure, modicoque chalcanto imbuitur. 5. *Ribelsavensis*, juxta eandem Sylvam in comitatu Furstenbergico, qui spirituosas subtilitates ferri, nitri, vitrioli, chalcitros, & bituminis habet. 6. *Gebersveilensis* in Alsatia superiore, qui alumine, nitro & ferro constat. 7. *Schmalbacensis*. 8. *Ægrani* in Bohemia. 9. *Nideravensis* prope Rottenburgum ad Neccarum. 10. *Deinachsensis* in Hercynia sylvæ. 11. *Federanus* in Rhetia, qui alumen & cuprum cum pauxillo sulfure continet. 12. *Trevirenses*, qui tres sunt, & quorum unus terram luteam & ferrum præterfuit. De reliquis taceo. De *Hornhausensi*, in inferiore Saxonia, dum hæc scribo, multa, & quidem miraculosa, spargi incipiunt. Vide de Acidulis, *Sebizium*, *Baccium*, & alios quos ex Lindano de scriptis medicis petere poteris.

ARTICULUS II.

De Thermis.

Therma sunt aqua calida, quæ à terra perpetuo prosiliunt, ab igne subterraneo effervescunt, & morbos vires à fossilibus sortita depellunt, si convenienter adhibeantur.

I. *Calida* sunt, vel in principio, vel in canalibus; vel magis, vel minus.

II. *E terra prosiliunt*, quia habent ortum in loco altiori, vel in montibus, vel ad radices, ut experientia comprobatur. Perpetuo ut plurimum prosiliunt, quia terra semper madefit, semper calor subterraneus

neus effert vapores ad montium concavitates, qui qua exhalare non possunt, densantur, comprimuntur, & in guttas ex quibus aqua abeunt. Inveniuntur tamen thermæ, quæ ex fluxu & refluxu maris incrementum & decrementum patiuntur. Nec ex uno semper loco profluunt; quia cuniculi vel corrumpuntur, vel obstruuntur.

III. *Fervor* ab igne subterraneo est, qui ab exhalatione mediocri, calidâ, rarefcente & accensâ, sulfuri vel bitumini se ingerente accenditur, & ab iisdem fovetur. Vel aquæ per æstuaria illa subterranea decurrunt; vel in via flammis æstuique junguntur; aut supra juxta canales tam diu decurrunt, donec incalescant; vel dum ab ignibus subterraneis terra calefcit, vapores inde multi elewantur, qui tandem in amplo aliquo loco in aquam conversi, alicubi exitum querunt: vel denique aquæ metallicæ duæ vel plures naturâ ad tactum frigidæ, in concursu, ob Spirituum repugnantiam incalescunt; cujus rei exemplum in Spiritu vitrioli & oleo vel sale tartari, item aqua forti & Tartaro, butyro Antimonii & Spiritu Nitri habemus.

IV. *Fossilia, quæ vires suas Thermis communicant*, sunt varia: partim mineralia, partim metalla; quod ex singularibus thermis colligi potest. Quomodo autem id fiat, & quomodo fossilia in iis cognoscantur, superius dictum est.

V. *Morbi qui depelluntur*, sunt quoque varii. Colica, Hysterica, Calculus, Sterilitas, Dolor capitis, &c. quorum aliis per se, aliis per accidens optulantur.

VI. *Adhibentur in potu*, ad quem ineptæ sunt illæ, quæ in se habent aliquid metallicum noxium, in balneis, fomentis, stuffis, & in luto: de quibus omnibus vide præter Fallopium, Horstium & Rulandum in Balneario restaurato.

VII. Ther-

VII. Thermæ præcipuæ in Italia sunt, *Pataвина*, ex quibus famosissimum Balneum Ebani, ex sulfuris, aluminis, nitri, salis, & calcis mixtura constans; *Porretana*, quadraginta à Bononia milliariibus; *Lucana*, quarum præcipuum balneum de Corfeno dictum; *Sante Maria in Bagno*, quæ in Romandiola sita sunt; *Aquea* in Pisarum Comitatu; *Petriola*, in Ducata Senensi, alumine turgidæ; *Grotina*, in Comitatu Viterbii, quæ ex ferro & ære constans; *Perusina*, quæ sulfure non multo & asphalto participant; *Montis Catini*, quæ omnes salsæ, &c. In Germania laudantur *Plumbaria*, in Lotharingia, ob copiosam plumbi mixturam ita dictæ; *Badenses* in Helvetia, quæ copioso sulfure & exiguo alumine constans; *Ferina* in Ducatu Wirtenbergensi; *Cellenses*, haud procul à Martiana sylva; *Awenses*, propè Rotenburgum ad Nierum situm; *Embsenses*, in finibus lacus Constantiensis; *Carolina*, in Bohemia, *Wishadenses*, non procul à Moguntia ultra Rhenum sitæ; *Gastainenses*, in Bavaria, quæ vehementi adstrictione, imprægnandi facilitatem pariunt; *Abudiaca*, supra Reginoburgum, quæ odore ova frixa referunt, &c. Vide de omnibus Rulandum & Weckerum. De fonte Bollenfi, potu & balneo utilissimo, scripsit Ioannes Bauhinus.

CAPUT III.

De Medicamentis compositis artificialibus in genere.

Medicamenta composita artificialia sunt, quæ ab arte ex simplicibus, prævia aliqua preparatione componuntur, & in aliquam formam rediguntur. Occurrunt circa ea consideranda. 1. Necessitas compositionis. 2. Structura, 3. Preparatio. 4. Fermentatio. 5. Divisio.

I

I. Ne-

I. *Necessitatem Compositionis* indicant, 1. Affectus ipsi præternaturales, qui cum sæpè sint compositi, non poterunt à simplicibus medicamentis depelli. 2. *Partes affectæ*, quarum situs, temperamentum, conformatio, & actionis dignitas, adde constitutionem ægri, ostendunt mixturâ opus esse. 3. *Qualitas Medicamenti*, quæ aliquando intentioni necessaria, sed affectioni non proportionata est; aliquando debilior, vehementior, aliena qualitate inficitur; quæ omnia compositionem exigunt.

II. *De Structura* nota, 1. Modum ipsius requirere, ut morbi speciem & magnitudinem, conditionem ægri & partis affectæ, simplicium denique ipsorum naturam, facultates, gradus, & doses præcognoscamus. 2. Accommodatissimam putari, si morbo sit planè æqualis, & secundum qualitatem cuius idoneitas ex morbi specie petitur, & secundum quantitatem sive gradum, quæ ex morbi magnitudine, & natura partis affectæ æstimatur. 3. Omne compositum medicamentum ex quinque constare: 1. *Basi*, quæ si in genere consideretur, 1. Facultatis, graduum, & doses compositi mensura est: 2. Pro ratione temporum morbi, Symptomatum urgentium, naturâ partis affectæ, constitutione ægri; quantitate & qualitate cæterorum componentium variat. 3. Quantitatem determinatam, ex suæ facultatis vehementia sumit, sed simul ad naturam ægri, magnitudinem, sensum, & dignitatem partis affectæ, actionis celeritatem & tarditatem respiciendum est: Si in specie Vel est *Simplex*, quæ aut unum usum præstat, licet ex pluribus ejusdem facultatis constet; aut uno simplici medicamento constat; quæque vel est sufficiens, vel remissa, vel intensa, vel maligna aliqua, vel aliena qualitate, ut odore, sapore, &c. instructa: vel *Composita*, quæ vel plures usus præstat, vel ex pluribus simplicibus diversa contrariaque

trariaque facultate præditis componitur; de qua observa, 1. Talem adhiberi, quando in simplici non datur gradus quem cupimus, sed vel remissior, vel intensior. 2. Habendam in ejus compositione primarum, secundarum, & tertiæ qualitatum rationem. 3. Aut ex pluribus simplicibus ejusdem facultatis & gradus constare; & tum ejusdem facultatis & gradus esse: vel ejusdem facultatis & gradus diversi; & tum remissum remittere intensum, & intensum intendere remissum ad medium utriusque: vel contrariæ facultatis & gradus ejusdem; & tum temperatum esse: vel contrariæ facultatis & gradus diversi; & tum ad medium utriusque reduci; quæ omnia ita sumi debent, ut & quantitatis æqualitas observetur, & fermentatio excludatur. II. *Corrigentibus*, quæ vel basin ignavam exstimulant, & acuum; vel vim medicamenti tenuis substantiæ in unum cogunt & augent; vel vim in materia crassa per extenuationem excitant; vel violentiam ejusdem refrenant; vel malignitatem contemperant; vel odorem & saporem jucundum conciliant. Semper minori quantitate ratione baseos esse debent, & communiter basis ad hæc proportio tripla esse putatur: quamvis certum sit, naturam baseos, & ipsorum corrigentium, nec non variam Medici intentionem eandem variare. Si baseos malitia temperanda est, æquali quantitate sumuntur. III. *Dirigentibus*, quæ medicamenta parti affectæ appropriata reddunt, vias ductusque aperiunt, humores præparant, & concoquunt, & ad quæ basis debilior octupla, vehementior æqualis aut minor esse solet. IV. *Conservantibus*, quæ dirigentia & corrigentia basi affigunt, & formam idoneam toti composito tribuunt; quæque, nec nimia quantitate basin obrudere, nec alienâ qualitate pervertere debent.

III. *Preparatio Medicamentorum*, vel est Communis,

munis, ut sunt Elixatio, Infusio, Assatio, Ustio, Calcination, &c. vel *Chymica*, quæ I. Vel est *Diacritica*, quæ corporis compagem resolvit, seu per *Purificationem*, ad quam *exsiccatio* & *ustio* spectat; seu per *Calcinationem*, quæ aut igne actuali, aut potentiali peragitur, ad quam & *sublimatio* pertinet; seu per *Resolutionem*, qua corpus in partes diversas & heterogeneas dissolvitur, & quæ *extractione* & *Tincturâ* peragitur; seu per *Putrefactionem*, seu denique per *Destillationem*. II. Vel *Syncritica*, quæ diversa & separata in unum corpus conjungit, seu id fiat per *precipitationem*, seu per *Reductionem*, seu per *Coagulationem* & *Concretionem*, seu per *Digestionem* & *Circulationem*, seu denique per *Cohobationem*, seu repetitam liquoris ad materiam in vase relictam affusi destillationem. III. Vel *Immutatoria*, quæ rei novum substantiæ modum vel qualitatem inducit, seu id fiat per *Deliquium*, seu per *Fixationem*, seu per *volatilisationem*, seu per *vitrificationem*. Consule de his *Beguinum*, *Sennertum* circa finem de consensu & dissensu Chymicor. & Galenicorum, & alios.

IV. *Fermentatio* Medicamentorum nihil est aliud, quàm eorundem per mutuam alterationem unio, qua singulorum pristinæ vires integræ non permanent. Ejus in Theriaca & Mithridatio inprimis habetur ratio.

V. *Divisionem* quod attinet, sunt Medicamenta composita artificialia, vel *Interna* vel *Externa*. Illa vel sunt *Fluida*, vel *Solida*, vel *Media*. Hæc in totidem dividuntur species.

C A-

CAPUT IV.

De Medicamentis compositis artificialibus
in specie.

ARTICULUS I.

De Medicamentis Internis.

PUNCTUM I.

De Medicamentis internis fluidis.

Medicamenta Interna ea dicuntur, quæ per os intra corpus sumuntur; Fluida vero, quæ instar aquæ fluunt, & sunt. I. *Decocta*. 2. *Infusa*. 3. *Potiones*. 4. *Vina Medicata*. 5. *Cerevisia medicata*. 6. *Oxymel*. 7. *Aqua hordei*. 8. *Acetum medicatum*. 9. *Aqua destillata*. 10. *Syrupus*. 11. *Tulepus*. 12. *Emulsio*. 13. *Essentia*. 14. *Spiritus*. 15. *Tinctura*. 16. *Olea*.

I. *Decocta* fiunt ex vegetabilibus, animalibus, & mineralibus interdum, si opus est, incis, contusis, vel rasis, in aqua vel simplici vel præparata, ad ignem lentum vel clarum, in instrumento aperto vel clauso, ad partis tertiæ vel quartæ consumptionem decoctis, ita ut cocta colentur, aromatizentur, clarificentur. Celebriora sunt, *Decoctum aperitivum majus* Augustanum cum *Rhabbarbaro* eorundem, *Capillorum Veneris*, *Fumaris*, *Carminativum*, *Gallina consummatum*, *Caponis*, *Vulnerarium*.

II. *Infusa* fiunt ex vegetabilibus, vel mineralibus, purgantibus vel vomitoriis, proportionem sesquialtera vel dupla in liquorem aliquem coniectis, & in eodem certo spacio maceratis, post colatis.

III. *Potiones* fiunt, quando liquoribus evacuantia electuaria, extracta, pulveres, rotulæ, &c, sine decoctione miscentur.

IV. *Vina medicata* parantur, quando vinum

defecatum aut mistum, sine saccharo, vel cum eo, viribus medicamentorum simplicium; vel subito, per olea, spiritus, & tincturas; vel per infusionem longam imprægnatur. Præcipua sunt, Berberorum, Cydoniorum, Granatorum, Ribium.

V. *Cerevisia medicata* eadem ratione fiunt.

VI. *Oxymel* fit, quando acetum cum melle miscetur, & plantæ in eo interdum immerguntur. Celebre est *Simplex*, *Scilliticum*, *Helleboratum Gsneri*.

VII. *Aqua hordei* fit, quando hordeum in aqua vel solum, vel cum passulis, aniso, cinnamomo, ad crepaturam decoquitur, colatur, & gutta unâ vel alterâ spiritus vitrioli, vel sulfuris acidi acefcit.

VIII. *Acetum medicatum* fit, quando in aceto simplicia vel composita macerantur, vel ex eorundem succis idem elicatur. Fit ex plantarum 1. *Floribus*; quale est Anthosatum, Calendulatum, Caryophyllatum, Lavendulæ, Papaveris, Rhæados, Rosatum, Sambucinum. 2. *Foliis*, ut Menthæ, Rutaceum Scordii. 3. *Fructu*, ut corticum citri, Fragorum, Rubi Idæi. 4. *Radicibus*, ut scilliticum. Sunt & Aceta composita, Alexicaca, Prophylactica, Bezoardica, &c.

IX. *Aqua destillata*, vel in Cucurbita per Balneum Mariæ ex viribus plerumque & potentiâ frigidis plantis, iisque vel totis, vel contusis & in succos redactis; vel in vesica, ex calidis & quorum vis non faciliè evocatur, iisque fermentatis eliciuntur. Fiunt *vel cum vino*, ut Aqua Absinthii, Agrimonice, Betonicæ, Cardui bened. Cinnamomi, Eupatorii, Avicennæ, Lavendulæ, Liliorum Convallium, Melissæ, Pulegii, Salviæ hortenensis, Veronicæ; *Vel sine vino*, ut sunt Acetosæ, Acetosellæ, &c. de quibus consule Pharmacopœam Augustanam. Fiunt etiam

etiam ex Animalibus, ut Capone, Canoris, Renibus, Sanguine humano, stercore animalium, &c.

X. *Syrupi ex decoctis*, infusus, succis depuratis, aceto, parantur; saccharo aut melle condiuntur, ad mellis ferè consistentiam decoquuntur, & tam ad alterandum, quàm ad purgandum, rarò soli, sæpius duplo aquarum distillararum diluti, usurpantur. *Officinales* sunt Syrupus de Absinthio, Acetositaris Citri, de succo Acetosæ, de succo Acetosellæ, Acetosus simplex, Acetosus compositus, Acetosus diarrhodon Mesuæ, Adiantinus Fernelii, de Agrestia Mesuæ, de Althæa Fernelii, Aperitivus magistralis Mindereri, Aurantiorum, de Corticibus aurantiorum, Florum aurantiorum de Artemisia, de Betonica simplex, de Betonica compositus, de Berberis, de Boragine, de Buglossa, Byzantinus simplex, Byzantinus compositus, de Calamintha Mesuæ, de Chamæmelo, de capillis Veneris simplex, de iisdem compositus, de succo Cardui benedicti, Ceraforum acidorum de Cichorio simplex, de Cinnamomo, Corallorum, de Corticibus Citri, Cydoniorum, de Endivia simplex & compositus, de Eupatorio Mesuæ, de Farsara, de Fragis, de Fumario simplex & compositus, de Glycyrrhiza, de Granatis dulcibus & acidis, de succo Hederae terrestris, florum Hyperici, de Jujubis, de Hyssopa, de Limonibus, de Lupulo, de succo Melissophylli, de Mentha, minor & major, de succo Mercurialis, Myrtinus, de Nymphæa simplex & compositus, Nephrocatacticus Jouberti, de Papavere simplex & compositus, de Papavere erratico, florum paralyseos, de Pœonia, de Pilosella, de succo Plantaginis, de Pomis simplex & compositus, de Portula, de Prasio, de duabus Radicibus, de quinque Radicibus, de Ribes, Rosatus simplex, de Rosis siccis, de Rubo Idæo, de Scabiosa, Scelotyrbius, de Scolopendrio Fernelii, de Scordio simplex,

& compositus, de sempervivo simplex & compositus, de Stœchade simplex & compositus, de Symphyto Fernellii, florum Tunicæ, de succo veronicæ, Violatus, simplex, & compositus.

XI. *Iulepi* fiunt ex aquis destillatis, succis, conservis, & saccharo, vel sine decoctione, vel cum decoctione.

XII. *Emulsiones* ex seminibus, nucleis, margaritis, coralliis, cornu cervi, fructibus etiam nonnullis, liquore affuso contusis & expressis, parantur.

XIII. *Essentia* ex viridum herbarum succo, cum S. V. expressio, & in B. M. digesto, colorato, per inclinationem separato fiunt, & cum pauxillo sacchari in Syrupi formam coquantur.

XIV. *Spiritus* in aquarum tam simplicium, quam compositarum destillatione una cum aquis descendunt, ab iisque postea per cucurbitam, phialam, &c. separantur. Sed hoc de volatilibus sumendum est. Fixiores retortâ, igneque fortiori, arenæ scilicet vel nudo, eliciuntur. Præcipui ex *Mineralibus* sunt, Aluminis, Coralliorum, Mercurii, Salis ammoniaci, Communis, gemmæ, nitri, Saturni, Succini, Sulfuris, Tartari, Vitrioli: *Ex vegetabilibus* sunt, Absinthii, Aceti vini, Angelicæ, Anisi, Cardui benedicti, Centaurii minoris, Ceraforum nigrorum, Cochleariæ, Cydoniorum, Ebulli ex granis, Fœniculi, Fragorum, Guajaci, Juniperi, Liliorum convallium, Melissæ, Rorismarini, Rosarum, Salviæ, Sambuci, Tiliæ florum, Veronicæ vini &c.

XV. *Tinctura* ex siccis plantis, plerumque calidis, contusis, menstruo, id est, Spiritu vini, rore majali, vel alio interveniente, in loco calido, vase clauso tam diu extrahuntur, donec menstruum non ampliùs coloretur, & vel per chartam filtrantur, vel digestionem depurantur. Famosiores sunt I. *Ex Mineralibus* Solis, Lunæ, Martis, Saturni, Antimonii, Vitrioli,

Vitrioli, Sulfuris, Smaragdi. 2. *Ex vegetabilibus*, & maximè ex floribus, Alkekengi ex baccis, Croci, Ceraforum nigrorum, Fragorum, Hypericonis, Pæoniæ, Rhæados, Rosarum, Violarum, Granorum Sambuci, Ebuli, &c.

XVI. *Olea*, vel sine aquis ex gummosis & resinosis eliciuntur, vel cum aquis in destillatione descendunt, vel ab iis, aut per separatorium, aut per filam lineam crassiora, vel per chartam bibulam separantur, in quibusdam subsident. *Excellentiora* sunt, Oleum Absinthii, Anethi, Angelicæ: de quibus vide inferiùs Articulo tertio, puncto primo.

PUNCTUM II.

De Medicamentis internis Solidis.

Medicamenta interna solida sunt I. *Pulveres*. 2. *Salia*. 3. *Croci*. 4. *Flores*. 5. *Præcipitata*. 6. *Vitru*. 7. *Fecula*. 8. *Confecta*. 9. *Rotula*. 10. *Morsuli*. 11. *Trochisci*, &c. 12. *Pillula*.

I. *Pulveres*, ex medicamento uno, vel pluribus contusis constant. Sunt vel *Subtiles*, qui si ex meris aromatibus & saccharo constant, in specie *Tragemata* vel *Trages* vocantur; quo & *sales sacerdotales* pertinent, qui cum cibo sumuntur: vel *Crassiusculi*, & *Trages grossæ*, ac *species incisa* dicuntur, paranturque vel ex simplicibus: iisque vel saccharo obductis, vel non obductis; vel ex compositis, tabulis scilicet, seu rotulis officinalibus aromaticis. Utimur iis tam in evacuatione, quam in alteratione. Inter *Purgantes* sunt, senæ præparatæ. Tartari CrySTALLINI solutivus, solutivus de tribus, Cholagogus simplex, Cholagogus infuccatus, Comitæ de Warwick Species, *Electuarii* Benedictæ laxativæ, Confectionis Episcopi, Hieræ picæ Galeni, Confectionis Diaphanici, de succo Rosarum, Diaturbith cum Rhabarbaro. Inter

Alterantes sunt, species Aromaticæ Caryophyllatæ, Dianthon Nicolai, Diacalaminthes Galeni, Diacinnamomu, Diagalangæ, de gemmis calidæ, frigidæ, de Hyacintho, Imperatoris, Diareos simplex, Lætificantis Rhâsis, Liberantis, Diamargariti calidi, frigidi, Diamoschu dulcis, Diatrion pipereon, Diarhodon Abbatis, Rosatæ novellæ, Diatrion fantalon, Diatragacanthi frigidi, Diaxylo Aloës, &c. Huc pertinent *Pulveres Alexipharmaci*. Saxonicus, Cæsaris rubeus, gryseus, & Bezoardicum animale, quod ex serpentibus nostris paratur.

II. *Sal* rebus ferè omnibus inest duplex, *Volatilis*, nonnullis Essentialis dictus, qui ignem & calorem non sustinet; sed avolat, & calcinatione discutitur: & *Fixus*, qui paratur è cineribus plantarum & lignorum, dum ex iis lixivium paratur, idque coquitur, donec omnis aqua exhalet, tum Sal relinquatur. *Purificatur*, vel crebrâ solutione & filtratione, iterumque coagulatione: vel si per deliquium in loco humido in liquorem solvatur, filtretur, iterumque coaguletur. *Præcipui sunt*, Sal Absinthii, Artemisiæ, Cancrorum, Cardui benedicti, Centaurii minoris, Cheresfolii, C. Cervi volatilis, Cranii volatilis, Euphrasiæ, Fabarum è stramine & corticibus, Fragariæ, Fumariæ, Guajaci volatilis, Hederae terrestres, Juniperi è baccis, è ligno, Majoranæ, Matricariæ, Melissæ, Nitri crystallini, fixi, Ononidis, Perficariæ, Pimpinellæ, Rutæ, Salviæ, Sanguinis humani, Scordii, Succini volatilis, Tamarisci, Tartari, Vitrioli vomitivum, Urinæ, Urticæ, Zedoariæ, Jovis, Saturni, Corallorum, Perlarum, &c.

III. *Croci* sunt subtiles pulveres, vel tincturæ in pulveris formam redactæ, crocei coloris. *Præcipui sunt*, *Crocus Metallorum*, qui nihil aliud est quam antimonium cum nitro calcinatum, & in pulverem crocei coloris redactum, cui affine est *Sulphur*

phur auratum Antimonii: & *Martis*, qui variis modis paratur, de quibus Chymicos consule. Terra vitrioli huc non incommode refertur.

IV. *Flores* Chymicis nominantur plerumque subtiliores corporis partes, à crassiore per sublimationem separatæ. Vulgatissimi sunt, *Flores sulfuris*, Antimonii, Benzoës, quo & reliqua *sublimata* pertinent, inter quæ præcipuè Mercurius sublimatus simplex, & sublimatus dulcis, Arcanum corallinum, &c.

V. *Præcipitati* nomen præcipuè tribuitur Mercurio; qui postquam in aqua forti solutus est, ab aqua solvente separatur, subsidetque, *Mercurius præcipitatus*, vel *turbith minerale* nominatur; cui si in præcipitatione aliquid auri additur, *aurum vitæ* appellatur. Huc pertinet *Bezoardi*, cum *minerale*, Mercurius vitæ, & alia nonnulla.

VI. *Vitrum* ex calcibus rerum paratur, si cinis aut calx validissimo igne fundatur, addaturque ad fusionem maturandam nonnunquam Borax, vel alii pulveres fusorii, fusa materia super pelvim calefactam, vel aliam tabulam effunditur. Sic paratur vitrum & succinum Antimonii; ex quibus calices, annuli, & nummi purgatorii fieri possunt, si fundo calicis, vel annulo, aut auro inferantur. De vitro aurato Antimonii, & ejusdem Regulo, vide Chymicos, inprimis *Schroderum in Pharmacopœa*.

II. *Fecula* est pulvis quidam farinaceus instar amyli, & fit ex succo radicum quarundam expresso, vel cum liquore extracta, qui si in loco frigido collocetur, fecula spontè subsidet, quæ effuso humore supernatante in umbra siccat. In usu *præcipuè* sunt, fecula Bryoniæ, Ari, Pæconix, Iridis, Serpentariæ, Liliolum alborum, Scillæ.

VIII. *Confecta*, sunt Pharmacopœis condita arida, ob saporis gratiam inventa, & parantur tam ad alterandum

terandum quàm evacuandum. *Præcipua* sunt, *Amygdalarum dulcium*, *Anisi Laxativi*, *Calami aromatici*, *Cardamomi minoris*, *Carvi*, *Caryophyllorum*, *Cichorii*, *Cinæ seu Santonici*, *Cinnamomi*, *Coriandri*, *Corporis sine anima confectio moschata*, *Cubebæ*, *Foeniculi Lavendulæ florum*, *Pimpinellæ radicum*, *Pinearum*, *Zedoariæ*, *Zingiberis*. Huc pertinent confecta candifata, seu saccharo candi incrustata, ut *Acori*, *Aurantiorum corticum*, *Caryophyllorum*, *Cinnamomi*, *Citri corticum*. *Nucis Moschata*, *Pyrorum muscatellinorum*, &c.

I X. Rotula, à figura rotunda sic dictæ, sunt etiam vel alterantes, vel purgantes, & parantur cum saccharo, cujus proportio vulgarissima est octupla in alterantibus, quadrupla in purgantibus, in oleis stillatitiis, major. *Palmam obtinent*, *Rotulæ de Berberis*, *Manus Christi simplices*, *perlata*, *Sulfuris*, &c.

X. Morfuli, eodem ferè modo fiunt. Sunt vel *Alterantes*, ut *Bezoardici*, *Cephalici*, *Cephalico-stomachici*, è succo & corticibus citri, *Imperatoris*, *Pectorales*, *Saccharum*, rosatum tabulatum, &c. Vel *Purgantes*, ut, *Diacarthami*, *Diaphænic*. Aug. *Diatrion laxativi*, *De Manna Tartarizata*, *De Mechocanna*, *de Jalapa*, *Diaturbith cum Rhabbarbo*, &c. Vel *Nutritivi*, qui parantur ex pulpa caponis, perdicis, testiculis gallorum, carne cancrorum & testudinum, &c. Ad Morfellas pertinent, 1. *Pandaleon*, materiâ & sine cum eclegmatis, formâ cum tabulis ferè conveniens, nisi quod informe maneat. 2. *Turiones*, quasi torrones à torrendo dicti, qui ex amygdalis dulcibus, avellanis, pineis contusis vel torrefactis, melle despumato exceptis, parantur. 3. *Confectiones restaurantes*, ut *Diamygdalatum*, *Pineatum*, *Testudinatum*, *Panis saccharatus vel bis-coctus*, &c. 4. *Holippa purgantes*, *Oblata laxativa*, & *Melitomata purgantia*, &c.

XI. Tra-

XI. Trochisci seu pastilli, sunt medicamenta solida coherentia, ex convenientibus cum liquore exceptis constantia, figurâ feminis lupinorum, & superficie planâ, eo fine inventa, ut medicamenta pulverizata sub hac solidâ figurâ adversus aëris injurias, tutius conserventur. Parantur ex omnis generis medicamentis, non solum pulveribus & speciebus, sed etiam additis succis inspissatis, conservis, extractis, aut similibus confectioibus, dosi ad pulveres subquadrupla, &c. Sunt vel *Alterantes*, de *Absinthio*, *Aliptæ moschata* cum ambra & moscho, *Aliptæ moschata* sine ambra & moscho, *Bechici albi nigri*, *rubri*, de *Berberis*, de *Camphora*, de *Capparibus*, de *Carabe*, de *corallio*, *Cypheos Democratis*, de *Lacca*, de *Myrrha*, de *spodio*, de *terra sigillata*, de *viperâ*, &c. Vel *Purgantes*, de *Agarico*, *Alhandal*, &c.

XII. Pillula seu *ὑγρὰ πόνια*, sunt medicamenta in formam globulorum redacta, ut integra deglutiantur, & insuavitas minis gustu percipiatur. Fiunt ex pulveribus, massâ pilularum usualium extractis, simplicibus cum humore commixtis. Sunt, Vel *Alterantes*, de *Bdellio*, *Bechicæ*, de *Castoreo*, de *Cynoglossâ*, *Narcoticæ Plateri*, &c. vel *Purgantes*, de *Agarico*, *Aggregativæ majores*, *Alephanginæ*, de *Aloë lota rosata*, de *Ammoniaco*, *Arthriticæ*, *Aslâjeret*, *Auræ Nicolai*, *Benedictæ*, de *Colocynthide*, de *Hermodyctylis*, *Marocostinæ*, *Mastichinæ*, *Panchymagogæ*, &c. Distinguuntur quoque in *Hippoglottides* & *Narcoticæ*.

PUNCTUM III.

De Medicamentis internis mediis.

Medicamenta interna media inter fluida & solida habent sub se. 1. *Extracta*. 2. *Resinas*. 3. *Conservas*. 4. *Condita*. 5. *Rob.* 6. *Electuaria*. 7. *Eclegmata*. 8. *Saponeas*, & 9. *Bolos*.

I. Extra-

I. *Extractum* perinde ac tinctura extrahitur, & ad consistentiam vel mellis, vel pillularum, vel pulveris redigitur. *Visitationes* sunt, Absinthii, Acori, Agallochi, Angelicæ radicum, Aristolochiæ rotundæ, Cardui benedicti, Caryophyllorum, Castorei, Centaurii minoris, Chelidonii majoris, Croci, Cubebarum, Dictamni, Enulæ, Galangæ, Gentianæ, Guajaci, Imperatoricæ radicis, Melissæ, Menthæ, Macearis, Majoranæ, Petasitidis, Poconia, Rutæ, Sabinæ, Satyrionis radicum, Scabiosæ, Scordii, Symphyti, Tormentillæ, Valerianæ, Zedoariæ.

II. *Resina*, ex gummosis extrahitur, & aquâ rosarum in extractionem cum spiritu vini factam, & à facibus per inclinationem separatam instillatâ, præcipitata, calore lento siccatur.

III. *Conserva*, fit ex floribus, interdum herbis & radicibus mollioribus contusis, & cum sacchari duplo conditis. *Visitationes* sunt, *Summitatum*. Absinthii Romani, Cardui benedicti, Euphrasiæ, Fumariæ, Majoranæ, Pulegii, Veronicæ. *Foliorum* Acetosæ, Acetosellæ, Cochleariæ, Menthæ, Portulacæ. *Florum*, Acaciæ, Betonicæ, Borriginis, Buglossæ, Calendularum, Cichorii, Genistæ, Liliorum alborum, Lavendulæ, Liliorum convallium, Malvæ, Melissæ, Menthæ, Nymphææ albæ, Papaveris erratici, Persicorum, Primulæ veris, Prunellæ, Rosarum albar. rubrar. vitriolata, Salviæ Sambuci, Tiliæ, Cunicæ, Tusilaginis.

IV. *Conditum* fit ex radicibus, corticibus, fructibus, aut durioribus aquâ maceratis vel coctis; aut mollioribus saccharo aut melle conditis, ut diutius durent, & gustui gratiores sint. *Visitationes* sunt sequentia. *Radicum*, Calami aromatici, Borriginis, Cichorii, Consolidæ majoris, Enulæ, Eryngii, Pimpinellæ, Rhabarbari, Satyrii, Scorzonæræ, Zedoariæ, Zingiberis, tam Chinenfis quàm communis,

Florum,

Florum, Aurantium, Citri. *Fructuum*, Aurantium, Berberum, Cerasorum amarenorum, Citrorum, seu integrorum, seu in taleolis, seu siccorum, seu carnis, Cydoniorum, Cynosbati baccarum, Malorum Armeniacorum præcocium, Mespilorum integrorum, Myrobalanorum Belliricæ, Chebulæ, Citrinæ, Emblicæ, Nucum Indicarum seu cum involucris, seu sine involucris, Nucum juglandium, Persicorum, Piperis nigri in racemis, Prunorum sylvestrium, Prunorum citrinorum, Pyrorum muscatellinorum, &c. *Corticum*, Aurantium, Citri. *Caulium* Lactuæ Hispanicæ.

V. *Rob* seu succus inspissatus ex fructibus, nonnunquam ex floribus, vel cum expressione, vel sine expressione, coquitur, sacchari subduplo aut pari quantitate addita. *Præcipui* sunt, Berberis, Cerasorum, fructuum Cynosbati, Ribes, Sambuci. Huc pertinent *succi inspissati*, Absinthii, Acaciæ, Agrimonie, Aloë, Cardui benedicti, Granorum Kermes, Centaurii minoris, Cydoniorum, Enulæ, Fumariæ, Glycyrrhizæ, Gratiolæ, Hyperici, Hyosciami, Hypocistidis, Ireos nostratis coeruleæ, Liquiritiæ, Mercurialis, Myrtillorum Germanicor. Nicotianæ, Opii, quod lacryma est, Papaveris domestici & erratici, Plantaginis, Rosarum incarnatarum & rubrarum, Scrophulariæ, & Solatri. Adde his Mel Ebulinum, Sambucinum, Juniperinum, & Passulatum.

V. *Electuarium* fit ex conservis, speciebus, rotulis, trochiscis, additâ succi vel syrupi proportionata quantitate. *Palmam obtinent*, Theriaca Andromachi, Mithridatium Damocratis, Electuarium Alkermes, Confectio Anacardina, Archigenis, Aurea Alexandrina, Athanasia magna Nicolai, Electuarium è baccis lauri, Chalybeatum, de scoria ferri, Guidonis contra pestem, de Ovo Maximiliani Imperatoris, Philonium Mesuæ, Persicum, Majus seu Roma-

Romanum Nicolai, Tharsense Galeni, Diasatyrium Nicolai, Electuarium magnanimitatis, Diafcordium Fracastorii, Tryphera magna Nicolai, Minor Phœnonis Mesuæ, Saracenica ejusdem, nomen inde sortitæ, quod totius corporis colorem ac oris odorem commendent, & delicatam quandam commendabilis speciei ostentationem præ se ferant.

VI. *Eclegma*, seu Looch, ex speciebus, pulveribus, conservis, succis, cum liquore vel Syrupo mistis fit, & ad pulmonum ac thoracis vitia adhibetur. *Vsualia* sunt, ad asthma seu Scillæ compositum, de Cautibus, de Farfara, de Papavere, Passulatum, de Pino, de Portulaca, de Pulmone vulpis, sanum & expertum, è succo Scillæ, &c.

VII. *Saponea*, est linctus ex amygdalis decorticatis, contrusis, & cum saccharo in aqua conveniente dissoluto, ad mellis consistentiam coctis, additis ad finem amylo & aquâ rosarum.

VII. *Bolus* ex electuariis, pulpis, conservis, speciebus, pulveribus cum pauxillo syrupi componitur, in globosâ figuram redigitur; & vel ad purgandum, vel vomendum, vel alterandum, vel aliam intentionem adhibetur.

ARTICULUS II.

De Medicamentis externis.

PUNCTUM I.

De Medicamentis externis fluidis.

Tantum de Medicamentis compositis internis: sequuntur *externa*, quæ sunt vel *Fluida*, vel *Solida*, vel *Media*, vel *Indifferentia*. *Fluida* sunt 1. *Clysteres*. 2. *Διυκλυσματι*. 3. *Gargarismi*. 4. *Olea*. 5. *Epithemata*. 6. *Stillicidia*, & 7. *Lotiones*.

I. *Clysteres*, qui & *Enemata*, sunt medicamen-

ta, quæ per anum in intestina, instrumento idoneo injiciuntur. Fiunt è radicibus, corticibus, foliis, floribus, fructibus, in aqua coctis & colatis, additis quibusdam quæ intentioni Medici inserviunt. *Ufus* ipsorum est in alvo laxanda, abstergendo, flatibus discutiendis, adstringendo, glutinando, renum & intestinorum dolore sedando.

II. *Διακλύσματα*, seu collutiones oris sunt medicamenta, quæ in ore detinentur, & sine deglutitione, linguæ beneficio, hinc & inde agitantur. Doloribus dentium & gingivarum affectibus inprimis destinata sunt.

III. *Gargarismi* sunt medicamenta, quibus fauces sine deglutitione colluuntur, humorque ore contentus, reciproco motu ad fauces agitur. Fiunt ex aquis destillatis vel decoctis convenientibus, nec sapore nec odore ingratis, aut venenositate aliquam foventibus, in quibus Rob aut Syrupi dissolvuntur. Utimur iis in repellendo, discutiendo, maturando, abstergendo, consolidando.

IV. *Olea* parantur vel per *distillationem*, ut superius dictum; vel per *expressionem* succi oleaginosi, quando fructus & semina contusa vapore aquæ calidæ tepescunt, & in sacculum inclusa torculari premuntur: vel per *infusionem*, vel quando simplicia medicamenta cum aqua simplici, vel destillata, vino, alioque liquore conveniente, in oleo communi coquantur, ad humoris consumptionem: vel quando eadem simplicia lento calore, vel ad solem macerantur; vel quando plantæ siccatae, in oleo in B. M. digeruntur, postea oleum exprimitur, & clarificatur. *Olea expressa* sunt hæc. Oleum Amygdalarum amararum, dulcium, Avellanarum, Balaninum, Cannabis, Ceraforum, Citri è granis, Erucæ, Hyosciami, Juglandium, Laurinum,

Macis, Nigellæ, Nucis moschatæ, Olivarum, Omphacinum, Ovorum, de Palma, Papaveris, Persicorum nucleorum, Pinearum, Pistachiorum, Raporum, Ricinum, Sefaminum. *Olea insolata* ac simplicia sunt ista: Oleum Absinthii, Abrotani, Anethi, Chamæmelinum, Cheirinum, Cydoniorum cum Omphacio, Enulæ, Euphorbii, Formicarum, Hederae terrestres, Jasminum, Irinum, Ligustrinum, Cyprinum de Alcanna, Lilinum, Lilliorum Convallium, Lumbricorum, Mastichinum, Menthae, Meliloti, Momordicae, Myrtillorum, Myrtinum, Nardinum, Nicotianæ, Nymphææ albæ, Populeum, Ranarum, Rosatum, Rutæ, Sambucinum, Scorpionum, Styrcis, Verbasci, Violarum. *Olea cocta* Composita sunt sequentia: de Capparibus, Castorei, Costenum, Croci, Hyperici, Lilliorum, Majoranæ seu Sampfuchinum, Mandragoræ, Moschellinum, Nardinum compositum, Papaverinum de Piperibus, Resolutivum Scorpionum compositum, vulpinum. *Olea stillatitia* usitatoria sunt ista. Absinthii, Anethi, Angelicæ, Anisi, Aurantiorum, Bulyri majalis, Benzoin, Calami aromatici, Camphoræ, Cardamomi, Carvi, Caryophyllorum, Ceræ rectificatum, Chamæmeli, Cherofolii, Cinnamomi, Citri cortic. Cymini, Cubebæ, Euphorbii, Fœniculi, Galbani, Guajaci, Hyssoï, Juniperi è baccis, & è ligno, Laterinum philosophorum, Macis, Majoranæ, Mastichis, Melissæ, Menthae, Myrrhæ rectif. Nucis moschatæ, Origani, piperis, Pulegii, Rorismarini, Rosarum vulgare, Omphacinum, compositum Mesuæ, Salviæ, Saponis, Sabinæ, Serpilli, Smegmatis, Spicæ, Succini albi, flavi, Tartari, Terebinthinæ, Zedoariæ.

V. *Epithemata* extremis corporis partibus applicantur, & fiunt ex aquis destillatis succis, infusis, parti & affectui convenientibus. Pertinent ad ea

Oxyr-

Oxyrrhodina, quæ fronti peculiariter perpetim ad refrigerandum & repellendum applicantur. Fiebant olim ex oleo rosaceo & aceto; hodie olea & aquæ destillatæ, succi & pulveres interdum adduntur.

VII. *Stillicidia* parantur ex aqua communi, thermis, decoctis, lacte, oleo, &c. Adhibentur, vel pro lutione ex vasculo proboscide inclinata, aut destillatione ex gutturnio facta, tribus præcipue locis: super futuram coronalem, ad principium spinalis medullæ, & ad ventriculum calefaciendum.

VII. *Lotiones* sunt vel totius corporis, & vocantur Balneæ; vel partium, capitis, manuum, pedum, ventris, &c. Parantur ex iis, ex quibus fomenta.

PUNCTUM II.

De Medicamentis externis solidis.

Medicamenta externa solida sunt: 1. Glandes. 2. Pessi. 3. Emplastra. 4. Cerata. 5. Cauteria.

I. *Glandes*, βάλανοι, vulgò suppositoria, sunt medicamenta solida, quæ ano immittuntur, figurâ terebri, instar candelæ ceræ; quatuor vel quinque digitos transversos longa. Parantur ex melle ad eam spissitudinem cocto, ut digitis tractari possit, cui adsparguntur alia quibus opus. Adhibentur ad alvum laxandam, ægro debiliore, ulcus in intestino recto detergendum & consolidandum, dolorem sedandum, humores versus superiora ruentes retrahendos, & ascaridas necandas.

II. *Pessi* parantur vel ex lana carpta, benè carminata, atque ad digitum figuram contortâ. succo vel liquore aliquo, aut solo aut admixtis pulveribus, imbuta: vel ex medicamentis tritis, convenientibus liquoribus, ut adipe, oleo, cerâ, ladano, galbano, melle exceptis, in pila subactis, & in pessi formam redactis: vel ex herbis viridibus paululum confusis, filo-

que in formam pessi ligatis. Vel ex pulveribus tenui lana vel gossypio exceptis, & tereti sacco ex panno raro confecto inditis, qui etiam argenteo instrumento tereti, & multis foraminulis pervio includi possunt.

III. *Emplastra*, propriè ita dicta, sunt medicamenta, quæ linteis vel pellibus tenuibus inducta, cuti corporis tenacius adhærescunt, & materiâ cum cerotis conveniunt, nisi quod metalla & mineralia, & plerumque lithargyrum, quæ solidam iis consistentiam tribuunt, accedunt. quæ omnia ad justam consistentiam coquuntur, & ex refrigeratis Magdaleones parantur. Interdum massæ non planè refrigeratæ telæ emplasticæ ex linteis usu detritis immerguntur & eximuntur. Minus propriè ita dicta seu media quasi inter emplastra & cataplasmata, quæ sine cera, pice, & glutinosis illis, & sine igne parantur, ac cum melle, mucilaginis, & viscido quodam Cremore, aut solùm pauxillo ceræ oleo liquatæ, fiunt. *Præcipua* sunt, Album coctum, Apostolicum, Arthriticum, Asclepiadis, Barbarum majus, minus, Basilicum majus, minus, è lapide Calaminari, Ceroneum, de Cerussa Renod. Diachylon simplex, magnum, parvum, cum gummis, Citrinum, de Crusta panis, ad fracturas ossium Renod. de Janua ejusdem, de baccis lauri, Mastichinum Renod. Magneticum, de Meliloto, de Minio, Mundificativum, Nervinum, Oppodeldoch, Oxycroceum commune, Vigonis, Diaphanicum calidum, frigidum, è canis Vigonis, de Rhabarbaro, Sparadrap, de stercore canis Vigonis, Spleneticum, Sticticum, Diafulphuris, Tetrapharmacum, Tripharmacum, ad tophos, de Tacamahaca, Vescitorium, Filii Zachariæ.

IV. *Cerata*, quod majorem partem ceræ recipiant, emplastro minus duram habent consistentiam. Vel fiunt ex cera, oleo, resinâ tantum; vel ex

iisdem,

iisdem, additis præterea pulveribus, ita ut oleorum ad pulveres proportio sit octupla, ad ceram tripla vel sextupla, ad resinam duodecupla. Præter hæc omnia adduntur Pinguedines & gummi, succi, radices, fructus, vel semina, quæ prius coquenda, colatura postea cum oleo ad humoris consumptionem coquitur. *Præcipua* sunt, Cerotum ex Beonica, Capitale, Diachalcitros, diapalma, de Galbano seu matricale, infrigidans Galeni, Ocsypii, Diapiper, ex pelle arietina, pro Herniosis, sacrum seu Diadictamnium, Santalinum, Sparadrappum Vigonis, Stomachale.

V. *Cauteria*, sunt medicamenta, quæ adurendi corpus, crustamque excitandi vim habent, & sunt vel *Actualia*, quæ candente metallo fiunt, de quibus in Chirurgia; vel *Potentialia*, quæ per medicamenta urentia fiunt, & parantur ex lixivio, è quo sapo conficitur, in salis seu lapidis ferè consistentiam cocto, qui *lapis corrosivus* vulgò appellatur. Ulcus cauterio excitatum, vulgò *Fontanella* dicitur.

PUNCTUM III.

De Medicamentis externis mediis.

Medicamenta externa media sunt, 1. *Balsama*. 2. *Linimenta*. 3. *Unguenta*. 4. *Cataplasmata*.

I. *Balsama* conficiuntur ex oleis incorporatis vel cera alba depurata, vel oleo nucis moschatæ expresso, vel medulla vituli lota, vel manna depurata. Possunt & extracta rerum, quarum balsamum expeditur, admisceri. *Usitatiores* ista sunt, Angelicæ, Anisi, Apoplecticum cum moscho & Zibetta, Arantiorum, Caryophyllorum, Cinnamomi, Citri, Cubebæ, Lavendulæ, Maceris, Majoranæ, Menthæ,

K 3

Nucis

Nucis moschatæ, Roris-marini, Rosarum, Rutæ. Succini, Zedoariæ. Sunt verò & *Balsami destillati*, qui nihil aliud sunt quàm destillati spiritus cum olei portionē, ex resinis, gummatibus, aromatibus, & similibus, interveniente spiritu vini prolekti. Usitatiorēs sunt, Vitæ, Nervinus, Antiarthriticus, Petri de Ebano, Saponis.

II. *Linimenta*, sunt medicamenta mediæ inter oleum & unguentum consistentiæ, paranturque quando oleis, buryro, pinguedinibus, sevo, medullis, adduntur pulveres, succi, resinæ, & lacrymæ arborum, eâ ferè analogiâ, ut ad Oleorum unc. j. pinguedinum dr. ij vel iij, Specierum dr. j. rarò Cera dr. j. assumatur, miscenturque omnia, vel sine igne & decoctione; vel ad ignem, ut gummi & pinguedines liquefiant; vel etiam, ebullitione aliqua, ad succorum scilicet additorum consumptionem.

III. *Unguenta* à linimentis consistentiâ crassiore differunt, & parantur vel sine igne, vel cum igne, ex pinguedinibus, oleis, gummatibus, pulveribus, unguentis usualibus, herbis, radicibus, feminibus in aqua, vino, succis, oleo maceratis, & ad consumptionem liquoris decoctis. *Usitatiora* sunt Agrippæ, Ægyptiacum, Alabastrinum, Album Avicennæ, Album Camphoratum, Althææ simplex, compositum, Anodynum Cordi, Apostolicum, Arthanitæ majus, minus, Aureum de Bdellio, de Calce, ad Carunculas penis, de Cerussa Avicen. Citrinum, Comitissæ, de Cyclamine, de Cynoglossa, Fuscum, Infrigidans Galeni, Jovis seu de verbenæ, de Lithargyro, Martiatum magnum, parvum, Mercuriale, de Minio camphoratum, de Nicotiana, Nihili ad oculos, Pectorale, Pediculorum, Pomatum, Populeum, Porabile, Resumtivum, Rosatum, Rubeum Camphoratum; ad Scabiem, de succo Arantii, Sympatheticum, Terebinthinæ; ad Vermes, Violatum, Viride Reginæ.

IV. *Cata-*

IV. *Cataplasmata* sunt medicamenta, pulvis ferè formâ. Parantur vel *sine igne*, quæ Cruda dicunt, quando planta virides confusæ in pulvem rediguntur, vel siccæ pulverizatae. Cum duplo vel triplo olei vel liquoris idonei miscentur: vel *cum igne* seu coctione, quando aut plantæ contritæ aut confusæ, ad mollitiem coctæ, per cribrum trajiciuntur, liisdem mucilagines, farinæ, olea, adduntur, aut plantæ mox in oleo coquuntur. Huc referri debent, 1. *Dropax* seu picatio, quæ ex pice cum oleo liquata & aliis paratur, ut cuti valentiùs adhæreat. 2. *Sinapismus*, seu cataplasma, quod ex sinapi & aliis ejus vires æmulantibus fit. si est mitior, vocatur *Phanigmus*, quod cutim rubificet: si fortior, *Vesicatorium*, & paratur ex vesicatoriis.

PUNCTUM IV.

De Medicamentis externis indifferentibus.

IN differentia voco, quæ aliquando parantur liquida, aliquando solida, aliquando media, suntque
1. *Apophlegmatizantia*. 2. *Dentifricia*. 3. *Errhina*. 4. *Piarmica*. 5. *Odoramenta*. 6. *Smegmata*. 7. *Suffitus*. 8. *Collyria*.

I. *Apophlegmatizantia* sunt, quæ ore detenta, pituitam è capite & vicinis locis proliciunt. Parantur sæpe eodem modo, quo gargarismata: aliquando medicamenta teruntur, & cum liquore convenienti in formam electuarii rediguntur: sæpe simplicia integra vel nonnisi ore detenta masticantur: nonnūquam trita cum melle vel cera in trochiscos rediguntur: quandoque in nodulum conformantur.

II. *Dentifricia*, ad dealbandos, extergendos, & stabiliendos dentes, gingivæque laxas comprimendas parantur, vel fluida, vel formâ linimenti pulveris, trochiscorum.

III. *Errhina* adhibentur intra nares, formâ vel humida, quæ aut infunduntur, aut illinuntur; vel arida, & tum vel ex radicibus, aut caulibus convenientibus, ut betæ, ireos, in formam pyramidalem figurantur, & aqua macerata immittuntur; vel pulveris simplicium naribus insufflatur; vel turundæ ex lana vel petia, succo vel aqua imbutæ, & pulveribus aspersæ, naribus intruduntur; vel pulveres cum mucilagine, gummi, aut terebinthina, vel oleo & cera, in pessulos pyramidales formantur.

IV. *Pearmica* ab his non multum differunt, & sternutationem excitant.

V. *Odoramenta* fiunt ex illis, quæ suavem odorem spirant, & vel sunt fluida, vel pomi, pulveris, linimenti forma parantur.

VI. *Smegmata*, seu sapes, parantur ex sapone raso, cui pulverum convenientium subseptuplum, aut suboctuplum additur, & omnia cum liquore in unam massam commiscuntur, ex eaque globi formantur.

VII. *Suffitus* ad odoramenta pertinent, & formâ pulveris, trochiscorum, & pyramidum parantur.

VIII. *Collyria* adhibentur externè oculis, & parantur vel sicca, minutissimè in marmore trita; vel humida, quæ vel formâ liquoris oculis instillantur, vel unguenti illinuntur; vel Vaporosa, quæ in aqua coquuntur, vapor exhalans, capite linteo recto, oculis excipitur. Sed de his omnibus consule *D. Iohannis Schroderi Pharmacopœiam Medico-Chymicam*, quam Medicinæ studiosis præ omnibus aliis commendo.

C A

CAPUT V.

De Medicamentis à facultatibus denominatis.

ARTICULUS I.

De Medicamentis Alterantibus.

PUNCTUM I.

De Medicamentis calidis.

HActenus de Medicamentis simplicibus & compositis actum est. Medicamenta à facultatibus denominata, vel sunt *Alterantia*, vel *Motum conciliantia*, vel *aliquid producentia*, vel *aliquid corrumpentia*, vel *aliquid auferentia*, vel *venenis resistantia*.

Alterantia Medicamenta sunt in multiplici differencia: sunt enim *Temperata*, *Calefacientia*, *Frigefacientia*, *Humectantia*, *Siccantia*, *Digerentia*, *Emollientia*, *Indurantia*, *Laxantia*, *Raresfacientia*, *Condensantia*, *Stegnotica*, *Anastomatica*, *Attenuantia*, *Aperientia*, *Incrassantia*, *Emplastica*, *Ecphrætica*, *pūnūg* seu *Abstergentia*, *Anodyna*, & *Narcotica*.

I. *Temperata sunt*, quæ in qualitatibus primis non excedunt, ut sunt: *Adiantum*, *asparagus*, *glycyrrhiza*, *pini nuclej*, *jujubæ*, *ficus*, *sebesten*, *uvæ passæ*, *daçtyli*, *gummi elemi*, *tragacanthum*, *sebum vitulinum*, *caprinum*, *pinguedo suilla*, *oleum dulce*.

II. *Calida sunt* in primo, secundo, tertio, vel quarto gradu.

I. *Calida in primo sunt*, quæ vix sensibilibiter calefaciunt, ut *Radices*, *althææ*, *brancæ ursinæ*, *betæ*, *buglossæ*, *glycyrrhizæ*, *satyrii*. *Folia*, *absinthium*, al. 2. *althæa*, *borrago*, *buglossum*, *beta*, *brascica*,

K §

fica, Chamæmelum, Cuscuta, Eupatorium seu agri-
monia, fumaria, linaria, melilotus, malabathrum,
nardi spica, scolopendrium verum, symphytum,
tussilago. *Flores*, borraginis, buglossi, betonicae,
buphrthalmi, meliloti, chamæmeli, populi nigrae,
stoechados arabicae, senecionis. *Semina*, Coriandri,
foenigræci, lini, lithospermi, sesami, Oryzae. *Fru-
ctus*, Amygdalæ dulces, castaneæ, jujubæ, nuces
cupressi, nuces juglandes virides, uvæ maturæ, mo-
ra matura, poma dulcia suave-olentia. *Cortices*, ma-
cis, guajaci, tamarisci. *Liquores, succi & gummata*,
saccharum, bdellium, ladanum, al. 2. gummi he-
deræ. *Serum*, Capreoli, damæ, cervi, butyrum
recens.

II. *Calida in secundo sunt, quæ manifestè, sed ci-
tra læsionem calefaciunt*: ut, *Radices* Apii, Cappa-
rum, peucedani, pimpinellæ, napi, zedoariæ, rho-
dia. *Folia*, Absinthium, anagallis, anethum viride,
angelica, apium, artemisia, betonica, calamus o-
doratus, chamæpitys, scœnum græcum, hypericum,
hedera, lupulus, melissa, marrubium, matricaria,
myrrha, ocymum, al. 3. pimpinella, peucedan-
um, polium, rosmarinus, satureja, salvia, scabiosa,
scordium, al. 3. stoechas, parthenium. *Flores*, amo-
mi, croci al. 1. Caryophyllorum, schænanthum,
lavendulæ, lupuli, melissæ, rosmarinii. *Semina*,
anethi, apii, oroti, erucæ, ocymi, urticae. *Fructus*,
capparidis, nux moschata, pistacia, ficus sicca, nu-
ces sicca. *Cortices*, cassiæ ligneæ, cinnamonum,
al. 3. thuris, capparum radice. *Liquores, gummi*,
resinæ; vinum non antiquum, ladanum, aloë, galba-
num, myrrha, mastiche, thus, pix arida, resina, sty-
rax. *Adeps*, leonina, pardi, ursina, vulpina.

III. *Calida in tertio sunt, quæ vehementer qui-
dem & cum molestia, sed citra corruptionem calefa-
ciunt*: ut, *Radices* acori, al. 2. asari, ari, scillæ, di-
stamni,

stamni doronici, scœniculi, galangæ, hellebori utrius-
que, helenii, iridis, petroselinii, raphani. *Folia*; abro-
tanum, al. 2. asarum agnus castus, arum, amomum,
ammi, anethum siccum, baccharis, dictamnium, ca-
ryophyllata, chamædrys, cnicus, id est, carda-
mum, centaurium majus, minus, chelidonium, ca-
lamintha, conyza, menthastrum, scœniculum, epi-
thymum, helenium, juniperus, hyssopus, laurus,
majorana, marum, mentha, nigella, ænanthe, peri-
clymenum, petroselinum, ptarmica, pulegium, res-
ta bovis, ruta, sabina, serpillum, Sisybrium, al.
2. thymum, trifolium, verbenaca, urtica. *Flores*,
agni casti, epithymi, leucoion, ænanthe, periclyme-
ni. *Semina*; ammi, anisi, amomi, cari, cardamomi,
cardami, al. 2. scœniculi, dauci, cumini, nigellæ, na-
pi, petroselinii, seselios, staphidis agriæ, viticis. *Fru-
ctus*; baccæ juniperi, Caryophylli, carpopallamum,
anacardia, piper, al. 4. *Cortices*; macis. *Liquores*,
lacryma, gummi; vinum vetustius, asa dulcis, fœ-
tida, ammoniacum, cedria pix, opopanax, moschus.
Metallica; flos æris, æs ustum, squamma æris, æru-
go, diphryges, alumen, sal, nitrum, sulphur,
chalcitis.

IV. *Calida in quarto sunt, quæ cum gravissima
corporis humani læsione calefaciunt*: ut, *Radices*; al-
lium, cepa, costus, porrum capitatum, pyrethrum.
Folia; lepidium, nasturtium utrumque, al. 3. por-
rum capitatum, struthium, thapsia, tithymallus. *Sem-
ina*; Nasturtii, sinapi. *Fructus*; piper, *Gummi*,
Euphorbium: *Metallica*; Vitriolum, auripigmen-
tum, sandaracha, chrysocollo, misy, sory, melan-
theria.

PUNCTUM II.

De Medicamentis frigidis.

Medicamenta frigida sunt, quæ frigefaciendo corpus humanum alterant, suntque talia, in primo, secundo, tertio, & quarto gradu.

I. *Frigida in primo gradu sunt, quæ corpus humanum vix sensibilibiter frigefaciunt*, ut, Radices, Malvæ. Folia; atriplex, oxylapathum, mala, myrtus, parietaria. Flores; malvæ, rosæ, violarum. Semina, hordeum, milium. Fructus; citrii caro, cydonia mala, pyra, pruna. Succi concreti; acacia, al. 2. sanguis draconis. Lapidēs, hyacinthus, sapphyrus, smaragdus.

II. *Frigida in secundo sunt, quæ manifestè sed citra læsionem frigefaciunt*, ut Folia; bliti, chondrylæ, lactucæ, lentis palustris, hyacinthi, acetosæ, plantaginis, polygoni, psyllii, solani. Flores; anemonæ luteæ; Semina; acetosæ, Cichorii, alkekengi. Fructus; cucurbita, cucumis, galla, aurantia mala, mala punica, pruna damascena, pepones, persica. Lignum; santali.

III. *Frigida in tertio sunt, quæ vehementer quidem, sed sine corruptione frigefaciunt*, ut Radices mandragoræ. Folia; portulacæ, mandragoræ, sempervivi, hyoscyami, al. in 4. Flores; balaustia. Semina; Cicutæ, hyoscyami, papaveris. Fructus; mala aurea, mala insana. Succus; hypocistidis.

IV. *Frigida in quarto sunt, quæ frigefaciendo corrumpunt*, ut Folia; Cicutæ, papaveris. Fructus; stramonæ. Succi; Meconium, Opium, secundum vulgarem sententiam. Vide de eo Dœringium, Hartmannum, & Freytagium.

PUN-

PUNCTUM III.

De Medicamentis humidis.

Medicamenta humida sunt, quæ humefaciendo corpus humanum alterant. Suntque primi & secundi gradus pleraque talia.

I. *Humida in primo sunt, Radices*; satyrii, buglossi, glycyrrhizæ, malvæ, rapi, Herbæ; buglossum, helxine, malva. Flores; buglossi, malvæ, intybi. Semina; malvæ, sesami. Fructus; Citri caro, jujubæ, amygdalæ dulces.

II. *Humida in secundo sunt. Herbæ*; viola, nymphaea, atriplex, blitum, lactuca, lens palustris, portulaca. Flores; nymphaeæ, violarum. Fructus; Cucurbita, melones, pepones, persica, pruna damascena, uvæ maturæ, saccharum.

PUNCTUM IV.

De Medicamentis siccis.

Medicamenta sicca sunt, quæ siccando corpus humanum alterant; suntque talia primi, secundi tertii & quarti gradus,

I. *Sicca in primo sunt Radices*; bryoniæ, rubiæ, ænanthæ, tamarisci, althææ, avi. Folia; Betæ, brassicæ, chamæmeli, foeniculi, hyacinthi, malabathri, myrti, verbasci. Flores; bupthalmi, chamæmeli, croci, hyacinthi, meliloti, rosarum. Semina; fabæ, scenogræci, hordei. Fructus; baccæ juniperi, castanæ. Gummi, thus.

II. *Sicca in secundo sunt, Radices*. Capparum, Cichorii, Raphani. Herbæ; Anagallis, artemisia, al. primo, anethum viride, betonica, cuscuta, calamus odoratus, intybum, marina brassica, bursa pastoris, equisetum, gingidium, mentha, mentastrum, plantago, rosma-

rosmarinus, spica nardi, symphytum, fumaria, pimpinella, oxalis, verbenaca, virga pastoris. *Flores*; balaustia, pæoniæ, anemones, chamæpityos, periclymeni, stœchadis. *Semina*; foeniculi, cardami, lentes, ervum, milium, oryzæ, papaveris, folani. *Fructus*; balanus myrepfica, cappares, cydonia mala, nux cupressi, nux moschata, pyra, pistacia. *Lignum*; santali. *Lachryma*, *gummi resina*; galbanum, opopanax, pix arida, myrrha, styrax, mastiche, mel.

III. *Secca in tertio sunt*: *Radices*, Acori, asari, apii, cinnamomi, daronici seu carnabadii, galangæ, heliebori, pentaphylli, radices cavæ, scillæ, oxytriphylly, trifolii. *Folia & Herba*; Filix, millefolium, quinquifolium, polium, trifolium, abrotanum, absinthium, anethum ustum, apium, ammi, asarum, calamintha, chamædrys, chamæpitys, epithymum, hyssopus, juniperus, majorana, marrubium, origanum, peucedanum, petroselinum, ptarmica, ruta, sabina, salix, sisymbrium, thymus, serpillum. *Flores*; balaustia, epithymi, chamæpityos, periclymeni. *Semina*; grana tinctorum, anethi, apii, ammi, amomi, anisi, carvi, cumini, coriandri, nigellæ, petroselini, milii, viticis. *Fructus*; Caryophylli, carpopallamum, galla, piper, baccae juniperi. *Succi & gummi*; aloë, acetum, acacia, camphora, moschus. *Metallica*; flos æris, æs ustum, squama æris, ærugo, diphryes, alumen, sal, nitrum, sulphur, chalcitis.

I V. *Secca in quarto sunt*: Ex *herbis*; ruta sylvestris, allium, nasturtium, sinapi. Ex *Metallicis*; chalcantum, auripigmentum, sandaracha, chrysocolia, misy, sory, melantheria.

P U N

P U N C T U M V.

De Medicamentis digerentibus, emollientibus, indurantibus, & laxantibus.

I. **M**edicamenta digerentia sunt, quæ naturam in coquendis humoribus præternaturam peccantibus, juvant.

Dicuntur & præparantia. Faciunt id vel impedimenta tollendo, vel qualitates quæ caloris nativæ actioni resistunt, mutando, habitum tamen partis in quæ hærent ratione.

Diversitatem ex diversitate humorum sortiuntur. *Bilis flava*, refrigerantia & siccantia; & si tenuis, incrassantia exposcit. *Pituita*, calefacientibus, siccantibus & attenuantibus indiget. *Melancholia*, moderatè calefacientibus & humectantibus, ac attenuantibus castigatur. *Atra bilis*, frigidis, multum humectantibus & attenuantibus corrigitur.

Syllabus medicamentorum ex illis medicamentis quæ à parte denominantur, & de quibus inferius agemus, peti poterit; ne actum agamus, hic ea omittimus.

II. *Emollientia sunt, quæ id quod concretum est & obduruit, seu primario, ut in musculorum sinibus viscidum recrementum; seu secundario, ubi nimirum, vel digestis partibus tenuioribus resolventium intempestivo usu, vel iisdem fugatis repellentium importuno, reliqua concreverunt.*

Dicuntur Græcis *μολαινα*: & debent esse calida in secundo gradu, nonnihil sicca, vim emplasticam habentia, & distensionem prohibentia, humectantibus denique admista. Suntque vel *Mediocris*, vel *Fortiora*.

I. *Mediocris emollientia*, I. Ex simplicibus sunt, *Radices*

Radices, Lilior. altheæ, Cucumeris agrestis, bryoniæ. *Folia*, Malvæ, parietariæ, violariæ, ebuli, sambuci. *Flores* Chamæmeli. *Semina*, Fœnogræci, lini, sesami, malvæ. *Fructus*, caricæ pingues. *Adipes*, butyrum recens, pinguedo gallinæ, suilla, vitulina, hœdina, sebum vervecinum, medullæ omnes, &c. 2. *Ex Compositis*, olea seminis lini, amygdalar. dulcium, lilior. alborum, lumbricorum. *Unguenta*, de althæa, refumtivum. *Emplastrum*, de mucilagini-
bus.

II. *Fortiora* sunt, Adeps urfinus, oleum vetus, bdellium, styrax liquida, resinæ pingues, ammoniacum, galbanum, Emplastrum diachylon simplex & cum gummi.

III. *Indurantia* sunt, quæ emollientibus opponuntur. Dicuntur Græcis σκληροποιῦντα ἢ σκληροῦντα, suntque frigida & humida, ut, sempervivum, portulaca, psyllium, lenticula palustris, solanum.

IV. *Laxantia* sunt, (Græcis χαλαστικὰ) quæ ei σπαστικὰ, quam materia quædam, vel vapor, vel flatus, partium spacia replens & dilatans causatur, medentur. Sunt modicè calida, largius humectantia, & substantiæ tenuioris, ut faciliè penetrent, ut lilium, semen lini, fœnogræci, adipēs, butyrum, oleum chamæmelinum.

PUNCTUM VI.

De Medicamentis rarefacientibus & condensantibus, Stenoticis, & Anæstomoticis.

Medicamenta rarefacientia, (Græcis ἀραιωτικά) sunt, quæ cutis meatus aperiunt, porosque ampliores reddunt, ut vapores melius diffusi possunt. Sunt moderatè calida, partium tenuium,
& non

& non siccantia, ut sunt *Ex herbis* althæa, mercurialis. *Flores*, chamæmeli, meliloti, sambuci. *Semina*; fœnigræci, lini. *Oleum* vetustius, butyrum.

II. *Condensantia* (πυκνωτικά) sunt, quæ tenues quidem poros constringunt & densant, sed totam partem undique & valentius constringere non possunt. Sunt aqueæ naturæ, ut, aqua frigida. *Ex herbis*, portulaca, sempervivum, psyllium, myofotis, lenticula palustris, tribulus viridis, sedum majus & minus.

III. *Stenotica crassitie sua foris ita poris incumbunt*, ut frigiditate & siccitate suâ partem contrahant: sunt ex eo genere, quæ adstringentia dicuntur. Sunt verò *Ex simplicibus*, *Radices*; Tormentialæ, plantaginis, consolidæ majoris, nymphææ exsiccatæ, acetosæ, alceæ, filipendulæ, pæoniæ, caryophyllatæ, fragariæ, bistortæ, rhapontici veri, rhabbarbari tosti. *Folia*; plantaginis, centumnodiæ, gnaphalii, lysimachiæ, sanguinariæ, equiseti, burfæ pastoris, pilosellæ, quercus. *Flores*; rosæ, granatorum, hederæ. *Semina*; plantaginis, portulacæ, acetosæ, rosarum. *Fructus*, Cydonia mala, mespila, berberis, sorba, corna, gallæ, acini uvar. passarum, nuces cupressi, baccæ myrti. *Cortices*, granatorum, thuris, myrobalanorum, mori. *Gummi*, mastiche, sanguis draconis. *Succi*; hypocistidis, agrestæ, acaciæ. *Mineralia*; Terra figillata, bolus Armenus, lapis hæmatites, alumen, corallium, ferrum. *Ex Animalibus*; Cornu Cervi præpar. genitale cervi exsiccatum, &c. *Ex Compositis* sunt, *Aqua*, Rosar. portulacæ, plantaginis, ligustri. *Syrupus*, rosarum rubrarum, cydoniorum, berberis, Miva Cydonior. Diacodium narcoticum, Crocus Martis adstringens, pulvis ossium humanorum calcinatorum, Spermiolæ compositum, Theriaca recens, succus granatorum acaciæ, conserva rosarum rubrarum
L
vetus.

vetus. Ex his *Validiora* sunt, balaustia, myrtilli, acacia, hypocistis, thus obsoniorum, malicorium, mespila, &c.

IV. *Anastomatica* vasorum ora aperiunt, & ideo à *Gracis* ita appellantur, quia ad interiora penetrare, crassosque humores attenuare debent; ideo & in secundo gradu calida, & crassiore substantia prædita, ut calorem diutius conseruent, esse debent. Amara maximè conveniunt.

PUNCTUM VII.

De Medicamentis attenuantibus, aperiuntibus, & incrassantibus.

I. **M**edicamenta attenuantia sunt, quæ dissolvunt & extenuant crassos, viscidos, & glutinosos humores, ut vel spontè sua evanescent, vel trahentium vi facile dissipentur. Debent esse tenuis substantiæ, in tertio gradu calida; quod tamen non semper est necessarium. Nam succus limonum, acetum, oxymel, attenuant & incidunt, cum tamen sint frigida. Catalogum vide inter Aperiencia.

II. *Aperientia* internas obstructions reserant, Tenuia quidem esse debent: ideo inter ea, quæ olfactui & gustui mordicantia & calida apparent, quæ nitrosum, salsum, amarum, & acidum saporem habent, recensentur: sed cum & corporum & materiæ obstruentis aliqua sit varietas, aliquando tenuia, aliquando minus talia adhibentur. Sunt autem ista. Ex simplicibus, Radices; quinque aperiennes dictæ, (apii scilicet, sceniculi, asparagi, petroselinii, & rusci) graminis, cichorii, eryngii, gentianæ, filicis, rubiæ, tinctorum, rhapontici vulgaris, seu centaurei magni, asari, cappari, tamarisci, fraxini. Herba, fumaria, absinthium, eupatorium, capilli Veneris, hepatica,

patica, ceterach, chamæpitys, chamædrys, cuscutha, marrubium, calamintha, pulegium, cochlearia, beccabunga, nasturtium aquaticum, lupulus, marrubium album, absinthium. Semen anisi, feniculi, ameos, agni casti, Ciceris, rubri, lupini. Fructus, amygdalæ amaræ, cappares, nuclei persicorum, malorum Armeniacorum. Aromata; Cinnamomum, Cubebæ. Gummi & succi; Ammoniacum, Acetum, succus limonum. Ex Compositis sunt, Aqua ex his paratæ, Oxymel simplex, scilliticum, Syrupus de quinque radicibus, Trochisci de Rhabbarbo, absinthio, Eupatorio, lacca. Tartarum vitriolatum, ejusdem cremor, Crystalli, Tinctura. Tinctura chalybis, pulvis, Crocus aperiens, pillulæ.

III. *Incrassantia*, succos tenuiores & liquidiores crassiores reddunt. Sunt frigida, aut temperata citra acrimoniam, & crassiæ substantiæ; ut sunt, portulaca, acetosa, papaver, oryza, lentes, mala cydonia, pyra agrestia, amyllum, lac chalybeatum, succus granatorum.

PUNCTUM VIII.

De Medicamentis Emplastis & Ecphracticis, seu De obstruentibus.

I. **M**edicamenta emplastica sunt, quæ suâ substantiâ meatus corporis oblinere, oppilare, & offerire possunt, eidemque illita tenaciter adhaerent, & vel consistentiam siccam & terream circa mordicationem tamen obtinent, vel aqueo & aëreo humore persusa sunt. Suntque I. Ex simplicibus, I. Radices; Althææ, Liliorum alborum. Semina; Triticum, amyllum, pineorum nuclei aquâ macerati, focnigræci, mucilagines omnes. Fructus; Ficus, Passulæ. Gummi; Arabicum, Tragacanthæ, sanguis Draconis. Terra; sigillata, bolus Armena.

Succi; Alumen. *Lapides*; Calaminaris, hæmatites, gypsum. *Mineralia*; Lithargyros utraque, plumbum, cadmia; pompholyx, cerussa. *Animalia*; Mumia, Adipes recentiores, & medullæ, butyrum recens, caseus, ovi albumen, cera. II. *Ex Compositis* sunt; Unguentum album, Rhasis, Nutritum.

II. *Deobstruentia* lentos & glutinosos humores corpori adhærescentes eluunt, ipsa calida vel frigida, salsa, amara, nitrosa. Sunt I. *Ex simplicibus*, Radices; aristolochiæ, iridis, gentianæ, figilli Salomonis, tamarisci. *Folia*; Apii, absinthii, centaurei minoris, abrotoni, hyssopi, nasturtii, marrubii, agrimonie, chamædryos, tanacetii, scolopendriæ, anagallidis utriusque. *Semina*; Lini, fœnigræci, hordei, orobi, lupinorum, è quibus farina. *Succi*; Aloë, saccharum; *Gummi*; Myrrha. *Resina*; Terebinthina. *Mineralia*; Ærugo, vitriolum. *Animalia*; serum lactis, fel animalium.

III. *Extergentia*, quæ Græcis *πυρρῆ*, secundum minus tantummodo differunt. Spectant huc Oxymel. Aqua aluminis, Unguentum Ægyptiacum, &c.

PUNCTUM VIII.

De Anodynis, & Narcoticis.

I. *Medicamenta anodyna* sunt, (Græci etiam *παινητικά*, & *πᾶνωγὰ* vocant) quæ calore suo moderato cum mollitie substantiæ juncto, dolorem, meatus referando, & tenuitate substantiæ subeundo, leniunt; ipsiusque causam per *ἀνὰ τὸν Ἀγγῶνα*, discutunt. Sunt I. *Ex simplicibus*, Radices; Altheæ, Liliorum. *Folia*; Malvæ, sambuci. *Flores*; Chamæmeli, Meliloti, Crocus. *Semina*; Lini, fœnigræci. *Animalia*; Adipes, suillus, galli-

gallinaceus, anserinus, humanus, vitulinus. *Medulla*, bubula, vitulina. Lac, butyrum. II. *Ex Compositis* Olea liliorum alborum, chamæmeli, violarum, amygdalorum dulcium, feminis lini, lumbicorum, quod laudatissimum, Rosatum, Dulce, mediæ ætatis.

II. *Narcotica*, quæ & *καταλῆξις*, stuporem parti, ne sentiat id quod dolorificum est, inducunt. Faciunt id partim frigiditate, partim qualitate occulta. Ex his sunt I. *Simplicia*, Radices Mandragoræ. *Folia*; Hyoscyami, Mandragoræ. *Semina*; Papaveris albi. *Succi*; Opium. II. *Composita*; Olea, Mandragoræ, Unguentum Populeum, Ladanium osfiatum, Trochisci narcotici Fernelii. *Spiritus*, Lollii, &c.

ARTICULUS II.

De Medicamentis motum conciliantibus.

*M*otum conciliantia medicamenta sunt vel *Attrahentia*, vel *Repellentia*, vel *Adstringentia*.

I. *Attrahentia*, Græcis *ἐλκυστῆς* & *ἐνσπαστικῆς*, sunt, quæ non solum tenues & serosos humores, sed & crassiores & partibus altè infixos, ex alto in superficiem inducunt. Sunt vel calida in secundo, quæ moderatè id faciunt; vel in tertio, quæ fortius; vel in tertio, quæ cutem in tumorem attollunt. Sunt verò I. *Ex simplicibus* Radices; aristolochiæ utriusque, anemones, cyclamini, dracunculi, gentianæ, pyrethri, ranunculi, narcissi, arundinis, arithapsiæ, Allii, cæpæ. *Folia*; Iberidis, Calaminthæ, Anagallidis purpureæ, Nepetæ, Thlaspios, Hederæ. *Semina*; Urticæ, Napi, Nasturtii. *Gummi*; Euphorbium, Ammoniacum, galbanum, sagapenum. *Resina*; Pix, Resina vulgaris. *Animalium*; Stercus columbinum, gallinaceum,

cantharides. II. *Ex Compositis*; Emplastrum oxycroceum.

II. *Repellentia illa voco, quæ humoris in parte influxum frigiditate suâ aquosa prohibent, vel eum qui recens influxit, atque in eo nondum impactus fluctuat, reprimunt. Sunt I Ex simplicibus*; Radices; plantaginis. *Cortices*; radicem mandragoræ. *Folia*, sempervivi, portulacæ, lenticulæ palustris, endiviæ, lactucæ, solani, tribuli aquatici, umbilici Veneris, lentisci, fumach, hyoscyami. *Flores*; rosæ rubræ. *Semina*; psyllii, plantaginis. *Ex compositis*, Aqua Rosarum, solani, plantaginis.

III. *Adstringentia sunt, quæ ex crassa & terrea substantia constant, meatus partis contrahunt, tenuiores partes elidunt, & sic etiam repellunt. Sunt vel Frigida, vel Calida. Frigida Ex simplicibus sunt, Radices*; pruni sylvestris, pentaphylli, bistortæ, tormentillæ, consolidæ majoris. *Cortices*; myrobalanorum, granatorum, thuris, berberis. *Folia*; Equiseti, bellidis minoris, auriculæ muris, centinodiæ, burfæ pastoris, pilosellæ. *Flores*; Rosæ, balaustia. *Semina*; Acetosæ, portulacæ, myrtillorum, papaveris alibi, *Fructus*; sorba, cydonia, mespila, myrtilli, mora immatura. *Gummi*; Mastiche, sanguis draconis. *Terra*; figillata, bolus Armena. *Ex Compositis* sunt *Aqua*; Rosarum, plantaginis, florum ligustri. *Syrupi*; Rosarum rubrarum, cydoniorum. *Conserva*; Rosarum siccarum, Mala cydoniorum, Theriaca recens. *Succus*, granatorum, trifolii, malorum agrestium, uvæ acerbæ. *Pulveres*; Diacorallium, Crocus martis, Cornu cervi ustum, osium humanorum, spodii, succini. *Pilula*, de cynoglossò narcotica. *Calida* adstringentia sunt, Cyperus, absinthium, juncus odoratus, aloë, thus, myrrha, spica, cortices thuris, nuces cupressi, alumen.

ARTICULUS III.

De Medicamentis aliquid generantibus.

PUNCTUM I.

De Maturantibus, Pus moventibus & Sarcoticis.

Medicamenta aliquid generantia sunt in sexuplici differentia: 1. *Maturantia*, seu Pus generantia. 2. *Sarcotica*. 3. *Glutinantia*. 4. *Cicatricem inducentia*. 5. *Lactis generantia*, & 6. *semen producentia*.

I. *Maturantia*, Græcis μαλῆς, quæ & pus generantia seu ἐκπύοντες & ἐκπύοντες sunt, quorum adjuvamento calor natus sanguinem corruptum in pus convertit. sunt temperatè calida & humida, temperamentoque parti cui applicantur similia. Eadem meatus occludendo, calorem cohibent. In duplici autem sunt differentia: *Alia* sunt merè temperatè calida, & viscosa, quibus in tumoribus calidis utimur, ut sunt, Mucilagines seminis lini, fœnigræci, mallvæ, althææ, hydrelæum, farina tritici, lac, medulla panis tritici, pinguedo suilla, butyrum recens, Unguentum dialthea. *Alia* calidiora, quæ in frigidis tumoribus & partibus adhibemus, ut sunt, Gummi, Ammoniacum, Bëllium, galbanum. *Resina*; Terebinthina, pix, refina vulgaris. *Lacryma*, abietina, laricea, pinea. *Olea*, chamæmelinum, liliorum alborum. *Vnguenta*; Agrippæ, basiliconis majus & minus. *Emplastrum*; diachylon simplex & cum gummi. II. *Sarcotica* sunt, quorum ope natura, in sanguinis in carnem commutatione, quod & calorem partis custodiant, & excrementa opus hoc remorantia summoveant; utitur.

Calefaciunt moderatè, & sicant; sordes etiam

circa morsum, sine adstrictione ulla, detergunt. *Triplix* sunt *Ordinis*. In *primo*, farina hordei, fenigræci, fabarum, thus, manna thuris ponuntur. In *secundo*, Resina terebinthina, laricea, abietina. Mel despumatum, rosatum. Aloë, farina lupinorum, orobi, pompholyx. In *tertio*, farina ervi, mel crudum, radic. aristolochiæ, iridis, myrrha, chalcitis.

PUNCTUM II.

De Glutinantibus, & Cicatricem inducentibus.

I. **G**lutinantis, Græcis *ἑπιδερμικά*, sunt medicamenta, quæ recentium vulnerum diducta labra conjungunt, & ne quidpiam inter ipsa influat, aut succrescat, impediunt. Sunt verò *Ex simplicibus*, Radices, Tormentillæ, pentaphylli, bistortæ. Folia; pilosellæ, plantaginis, hyperici, bugulæ, faniculæ, pyrolæ, fideritidos, herniariæ, falcis, verbenæ. Gummi; myrrha, thus, sarcocolla, succi densati; aloë, hypocistis. Resina; pix, terebinthina. *Ex Compositis*; Unguenta de lithargyro, de betonica.

II. Cicatricem inducentia, quæ Græcis *ἐπιδερμικά* sunt medicamenta, quæ & id quod confluit, & humorem qui in ipsa carne continetur, consumunt, ut caro in cutis similitudinem mutetur. Sunt crassioris substantiæ, vehementer siccant, adstringunt, & contrahunt. Præcipua sunt, Radices; tormentillæ, pentaphylli. Herba; symphytum, perfoliata, equisetum, plantago. Flores; balaustia. Succo concreti; corallium, aloë, succus draconis. Terra; Alumen, Bolus Armenus. Metallica; Plumbum, Cadmia, Lithargyrum, Æs ustum lotum, Antimonium.

III. Huc pertinent *Vulneraria*, Græcis *αἰμαρογόνα*, ex quibus potiones vulnerariæ parantur. Suntque Radices; consolidæ majoris, bistortæ, tormentillæ.

Folia;

Folia; alchimillæ, burse pastoris, virgæ aureæ, balsamini, verbenæ, veronicæ, hyperici, millefolii, faniculæ, caudæ equinæ, ulmi, plantaginis, betonice, cupressi, pilosellæ. Flores; rosarum rubrarum hyperici, balaustia. Fructus; nuces cupressi. Gummi, Lacryma; thus, aloë, mastiche, lacryma abietina, resina terebinthina, pini, laricis, pix arida, liquor folliculorum ulmi, gummi elemi, juniperi, hederæ, tragacanthi, tacamahacæ, carannæ, sarcocolla, sanguis draconis, &c.

PUNCTUM III.

De Lactificis & Seminificis.

I. **L**actifica medicamenta illa propriè hinc sunt, quæ cum ad probi sanguinis constitutionem faciunt, tum idem modicè attenuant, & ad mammas deducunt, qualia sunt quæ sequuntur: Foeniculum viride, ejusdem semen, Anethum viride, Apium, Pulvis crystalli, Brassicæ decoctum, Butyrum cuni lacte & fœniculo sumtum, Smyrniium, Polium, Eruca, &c.

II. Seminifica medicamenta sunt tum ea, quæ ad vasa spermatica materiam deferunt, tum quæ ad seminis excretionem impellunt, siue flatu repleant, siue stimulum addant. Præcipua sunt hæc, Radices; Eryngii, Satyrionis, Zingiberis. Semina; Erucae, Sinapi, Urticæ, Piper. Fructus; Nuclei pinei, pistachia, avellanæ, medulla nucis Indicæ. Animalium partes; Scincorum renes, Passerum cerebella, Cervi genitale, Gallorum testes.

ARTICULUS IV.

De Medicamentis corrumpentibus.

Medicamenta corrumpentia sunt 1. Rubefaciencia. 2. Vescientia. 3. Crustam inducentia. 4. Adurentia.

urentia. 5. *Corrodentia.* 6. *Putrefacientia.* 7. *Psilothra.* 8. *Lac absumentia.* 9. *Semen exstinguentia.*

I. *Rubefacientia* cutem rubefaciunt, & altius delitescencia ad cutem evocant. ut sunt, Radices thapsiæ, *Semen nasturtii*, urticæ, sinapi.

II. *Vesicantia* vesicas excitant, & humorem ardoris vi proliciunt. Præcipua sunt, *Radices*; cyclaminis, pyrethri, scillæ, allii, thapsiæ. *Herbæ*; pes columbinus, flammula, ranunculus. *Semen* nasturtii, sinapi. Euphorbium, fermentum, sapo, fumus columbinus, cantharides.

III. *Crustam inducentia*, Græcis *εγκαρσύνει*, non solum cuticulam attollunt, sed etiam cutim adurunt, ultra tamen vim non extendunt.

IV. *Adurentia*, Græcis *καυσίνει*, crustam densiorem inducunt, & sæpè in subjectam carnem agunt, præcipua sunt: Helleborus abus, cinis facum vitis ficulneus, fraxini, sabinæ. *Æs* ustum, æris flos, calx viva, vitriolum, auripigmentum, arsenicum, mercurius sublimatus, sal è lixivio, è quo sapo conficitur.

V. *Corrodentia*, Græcis *καταρσύνει*, excrecentem carnem mollem tollunt, extrimamque ejus superficiem sensim liquefaciunt. *Mitiora* sunt; *Radices* vitis albæ, hellebori nigri. *Cinis*, quercus, ficus, conchylum. Aloë, alumen; plumbum ustum, antimonium calcinatum. *Fortiora*; Calx viva, flos æris, æs ustum, vitriolum calcinatum, argentum vivum præcipitatum, sublimatum, oleum vitrioli, sulphuris, &c.

VI. *Putrefacientia*, Græcis *συνλύνει*, carnem duriorē colliquant. Talia sunt: Arsenicum, auripigmentum, chrysocolle, dryopteris, pityocampe, aconitum, Sandaracha.

VII. *Psilothra*, pilos exstirpant, partemque glabram reddunt, ut sunt. lixivium forte, calx viva, ova formicarum, sandaracha, arsenicum, auripigmentum, &c.

VIII. *Lac*

VIII. *Lac absumentia* nimium refrigerando sanguinem incrassant, vel exsiccant eundem & digerunt, vel denique totā substantiā illud ipsum operantur. Ut sunt, Mentha, salvia, calamintha, coriandrum, hyoscyamus, omphacium, acetum, camphora.

IX. *Semen exstinguentia*, idem vel refrigerant, vel incrassant, vel discutunt, vel arcana proprietate absument. Talia sunt: Mentha, Ruta, agnus castus, anethum, *semen* Cannabis, psyllii. Lactuca, Portulaca, camphora, &c.

ARTICULUS V.

De Medicamentis aliquid auferentibus.

PUNCTUM I.

De Medicamentis purgantibus.

Medicamenta aliquid è corpore auferentia sunt: 1. *Purgantia.* 2. *Vomitória.* 3. *Diuretica.* 4. *Hydrotica.* 5. *Diaphoretica.* 6. *Cerebrum purgantia.* 7. *Expectorantia.*

Purgantia sunt, quæ humores in corpore humano præter naturam stabulantes per inferiora extrudunt. Suntque, 1. *Cholagoga.* 2. *Phlegmagoga.* 3. *Melanogoga.* 4. *Hydragoga.* 5. *Catholica.*

I. *Cholagoga* bilem præter naturalem deturbant. Et sunt 1. *Mitiora.* Ex simplicibus, Cassia fistularis, quæ quia ventriculo, & alvo lubricæ, ut obest, flatulentaque est, uno & altero grano piperis, anisi, vel cinnamomi corrigitur, & in bolo plerumque à dr. vi. ad unc. ij. pueris ad dr. ij. datur. *Tamarindi*, seu *Dactyli* Indici, temperaturis calidioribus amici, qui ob frigiditatem cinnamomo & mace castigantur, ob tarditatem sero lactis caprini acuantur. Dantur in pulpa

pulpa ab unc. j. ad ij vel iij. in infuso etiam ad v. *Manna Calabrina*, quæ omnibus tuta est, arden-tes febres si excipias; acuitur Syrupo rosarum so-lutivo. Sumitur ex iusculo prunorum, vel galli gal-linacei, ad unc. iij vel iv. *Aloë Soccotrina*, quæ ni-mium si fumatur, hepar incendit: quia venarum orificia aperit, prægnantibus tuta non est. Sed nec naturis calidis & siccis. nutritur succo rosarum. Corrigitur mastiche ob acrimoniam. datur à tr. f. ad dr. j. & ultra. Vide de ea Solenandrum f. 3. Conf. 29. *Rhabarbarum* jecinoris anima, quod non debet solum, quia fumosum & facile exhalat, dari, sed cum aqua endiviæ, vel Syrupo rosarum solutivo, nec stranguria affectis, nec ad fluxum hæmorrhoidum pronis. Corrigitur cinnamomo, spica nardi, schæ-nantho. datur à dr. j. ad ij. *Rosa* pallidæ, moscha-tæ, incarnatæ, odoræ, amaræ, & detergentes. Virtus ipsarum intenditur, si succi unc. j. misceatur cum unc. ij seri lactis, adjecta spica & cinnamo-mo. *Viola*, quæ paris sunt cum rosis valoris, in pectoris morbis, ut & cephalalgia calida com-modissimæ. *Terebinthina*, pistica inprimis, quæ cum pulvere glycyrrhizæ, vel saccharo in bolos coacta, renum etiam extergendorum causa, sumi-tur. Lemnius potionem commendat. *Ex Compo-sitis sunt, Syrupus rosarum solutivus*, prægnantibus, quod venas uteri aperiat, noxius, ab unc. ij ad iv. Folia rosarum matutino rore delibuta colligi de-bent. Vires nec ultra sextum propemodum men-sem durant. Syrupus florum Acaciæ, de Manna laxativus, de Tamarindis cum fenna Horstii. *Pilu-læ Angelicæ*, Benedictæ Bejeri. *Hiera mellita*, quæ à dr. j. ad unc. f. datur. *II. Fortiora sunt ex simpli-cibus, Asarum*, quod diutius coctum vim suam ex-uit, accuratius tritum vomitum movet. Datur cum sero lactis, nullo aut vino. *Scammonium*, quod nunquam

nunquam vomibundis, febricitantibus, invali-dis, æstivo tempore, in iusculis, solum, quia acri-moniam turbat, spiritus inflammatur, principibus par-tibus incommodat, dandum est. Corrigitur succo cydoniorum mucagine tragacanthæ, spiritu sul-phuris vel vitrioli. Correctum Diagrydium vo-catur. Exhibetur à gr. v. ad xv. *Ex Compositis*, sunt *Pilulæ Rudii* apud Mullerum ad scr. j. *Aureæ*, quæ maximè sunt in usu. *Extractum scammonii*. Eiusdem *Magisterium*, quod apud Mynsichtum, & Grulingium vide.

II. Phlegmagoga medicamenta sunt, quæ pi-tuitam excrementitiam à corpore educunt. Sunt-que I. Benigniora ex simplicibus, Myrobalani, Che-bula & Emblica, quæ in obstructione intestinorum vel viscerum vitari debent, in iusculo pulli ad unc. j. macerantur, vel eidem cum vino malvatico in-coquuntur. *Cnicus*, seu *Cardami semen*, quod aquam crudam & pituitam educit, ac flatu ciet; quia vomitum ciet, aniso, zingibere, & mastiche corrigitur. *Mechoacanna*, quæ subtilium cum ter-restri portione partium. Ex febrilibus tertianis ex-quisitis duplices facit. In forma pulveris felicissimè operatur, si in vino, vel iusculo per noctem macerata ebibatur. *Ex Compositis* sunt, species Hieræ picre sim-pl. Morfuli de Mechoacanna Horstii. *II. Vehemen-tiora sunt, ex Simplicibus, Agaricum*, quod pulmones peculiari ratione à viscosis, crassis, & putridis humo-ribus liberat: in infusione tutior est quàm substantia. *Salapa*, quæ commodissimè ubi bilis pituitæ est ad-mixta, adhibetur. Dosis est à scr. j. ad ij cum cremore Tartari. Habet quippiam acriusculum. *Turpethum*, gummosum & candidum, quod quia ventriculo nocet, & vomitum concitat, Zingibere, Pipere, & Cin-namomo, corrigitur. Squallore suo corpora in tabem perducit. In decocto feliciter operatur. *Colocynthis*, quæ

quæ crassa & lenta à remotis partibus ejicit; & quia villis ventriculi internis. adhæret, vomitum ciet. Adstringentibus quia pharmacum violentum detinent, corrigi non debet. Præparationem vide apud Freytagium in Aurora Medicor. p. 338. *Hermodactyli*, qui materiam crassam ab artubus purgant, & attenuantibus corriguntur. *Euphorbium*, quod calidum & siccum in quarto gradu: quia fauces inflammant, stomachum & hepar lacescit, sudorem frigidum excitat, cordialibus, & stomachicis, optimè verò oleo rosarum, corrigitur. Nonnisi annotinum intus fumendum est. *Sagapenum*, quod lentos & crassos humores educit. Ex *Compositis* sunt, *Pilula* de Sagapena Horstii & Camilli. *Syrupus* Diacolocynthidos Freytagii. *Morselli* de Jalapa, &c.

III. *Melanogoga sunt, quæ melancholiam excrementitiam ex corpore deturbant.* Suntque I. *Benigniora.* Ex *Simplicibus*, *Myrobalani Indæ*, quæ quartanariis inprimis exhibentur, & adustam bilem deturbant. *Epithymum*, quod singulari proprietate præ aliis humorem istum attrahit, sed imbecilliter. Ejus usus tutior est hyeme, quàm æstate. Optimum est Creticum. *Polypodium* quernum, quod cum inveteratum stringat, novum esse debet. quod in ruderibus vetustis provenit, nimia humiditate ventriculorum subvertit. *Sena*, quæ in educendis ex menterio humoribus adhibetur, in diluto prunorum, passularum, feri lactis, &c. Folliculi ejus ante plenam maturitatem succulenti, si decerpantur, idem faciunt quod folia; sed in proprio caule arefacti, omnem virtutem amittunt. Ex *Compositis* sunt, *Syrupus* de Polypodio, & Epithymo. *Pilula* de fumo terræ. *Pulvis* Senæ Montagnanæ, &c. II. *Vehementiora sunt,* Ex *simplicibus*, *Lapis Armenus*, qui aquis cordialibus tam diu abluendus est, donec non amplius inquinetur. *Lapis lazuli*, cujus eadem ratio.

tio. *Helleborus niger*, qui in decocto minus periculi habet. Optimè corrigitur phlegmate vitrioli. Elegantissimè præbetur, si pomum radicibus hellebori nigri & Caryophyllis transfigatur, & sub cineribus coquatur. Ex *Compositis* sunt, *Confectio* chamech, *Extractum* hellebori nigri, *Syrupus* ejusdem, apud Heurnium.

IV. *Hydragoga sunt, quæ aquas ex corpore humano deturbant.* I. *Benigniora sunt,* Ex *simplicibus*, *Soldanella* seu *Brassica marina*, quæ Rhabarbari consortio vehementer gaudet, nec vires in decocto amittit. II. *Iris Germanica*, quæ menses aperit, & coctione vim deponit. Radicis succus cum ovi vitello miscetur, & in ejus testâ una coquitur, dum forbilis fiat. Ex *Compositis*, sunt *Conserva* florum perficorum, *Pulvis* Soldanellæ Faventini, &c. III. *Vehementiora sunt,* *Elaterium*, quod & extra venosum genus elapsam aquam educit. potest ad ægrana robustis exhiberi, si benè correctum sit. Corrigitur Cinnamomo, spica, &c. *Gummi gotte*, quod quia nauseam leviolem excitat, spiritu salis & macece corrigitur. biliosis naturis ejus usus noxius est. Vide de eo *Reudenium* & *Lotichium*. *Gratiola*, quæ per superiora & inferiora agit. Exsiccata infunditur lacti, denuoque siccatur, ut in pulverem redigi possit. *Esula*, cujus lac, semen, folia validissima sunt, mitior radix. A tempore collectionis intra mensem non debet usurpari. Optima quæ quinque vel sex mensium ætatem vidit. Radicis cortex maximè in usu est. Corrigitur tridui infusione in aceto. Ex *Compositis* sunt *Magisterium* gummi gotte. *Pilula* Freytagii Auroræ Medic. p. 345. *Oleum* ex acinis baccarum sambuci, &c.

V. *Catholica, quæ & panchymagoga dicuntur, sunt, quæ omnes humores peccantes à corpore expellunt.* Sunt ex *Simplicibus*, *Sena*, *Elleborus*, *Antimonium*,

nium, &c. Ex *Compositis*, Panchymagogum Crollii, vegetabile Theophrasti, Extractum Catholicum majus & minus. Electuarium Diacatholicon, &c. Vide de Medicamentis purgantibus accuratè & eleganter agentem Freytagium in Aurora Medicorum.

PUNCTUM II.

De Vomitoriis, & Diureticis.

Vomitoria sunt, quæ humores per superiora eji-
ciunt.

Faciunt, id vel quia inclinationem suam sursum habent; vel quia ventriculo innatant, & ipsum gravant; vel quia orificium superius ventriculi laxant. Sunt verò ex his, 1. *Benigniora*, Aqua simplex, tepida, hordei, pinguis jura, oleum simplex cum aqua, butyrum, hydromel. *Radix* Atriplicis, Cucumeris fativi, Melonum, Narcissi, Afari. *Flores* persicorum, è quibus conserva paratur. *Semen* Erucæ, Atriplicis. *Cortex* medius juglandis arboris cum succo turget, siccatus, & maximè ejus juli. *Electuarium*, Diasaron Fernelii. 11. *Validiora* sunt, Helleborus albus, Vomitorium Cunradini, quod à guttis iij ad x. datur. Gilla Theophrasti, vitriolum album vomitivum, Sal vitrioli Salæ, *Flores* Mercurii argentei. Mercurius vitæ, dulcis, Manna Mercurii, Aquila. Imperialis *Antimonii* flores, oleum, Electuarium, Crocus Metallorum. Aqua benedicta Quercetani, Formicarum, Plateri vinum, helleboratum Heurnii, &c. Vide de hisce Hartmannum in Crollium & in Chymiatria, & Grulingium in Florilegio.

II. *Diuretica* sunt, quæ urinam cient, perque eandem peccantem materiam evacuant.

Duplicia sunt ista: 1. *Propriè dicta*, quæ facile ad venas penetrant, inque iis humores calore suo fundunt, suntque *Radices* Petroselinii, Apii, Eryngii, Rusci,

Rusci, asparagi, pimpinellæ. *Herbæ*, Afarum, Eupatorium, Chærefolium, Scordium. *Semina*, Milii foliis, chærefolii, saxifragiæ. *Fructus*, amygdalæ amaræ, nuclei persicorum, &c. Ex Chymicis est spiritus salis, & quæcunque è Tartaro componuntur. 11. Impropriè dicta, & illa *vel calida*, ut Capilli veneris, terebinthina, Radix Ambona, de qua apud Zacutum. *Vel humida*, & vias lenientia, ut semina malvæ, althæa, glycyrrhiza. *Vel frigida*, ut fraga, hordeum, semina quatuor frigida, Aquæ thermales, serum lactis, succus limonum. Laudantur quoque, Aqua ex nucleis Persicorum cum vino Malvatico, Silices albissimi igniti in vino generoso extincti, Oleum cereæ à gutt. v. ad vj. Sal succini, dr. f. pondere. Li-
quor diureticus Rivii, Aqua fructuum Cynosbati, Oleum baccarum juniperi Grulingii, &c.

PUNCTUM III.

De Hydroticis, & Diaphoreticis.

I. **H**ydrotica sunt, quæ materiam peccantem per ambitum corporis sensibiliter pellunt. Dicuntur aliàs Sudorifera. Agunt calore & partium tenuitate, resolvendo in halitum materiam; quæ autem frigida sunt, propriâ substantiâ operantur. Sunt autem 1. *Vel Simplicia*, ut Angelica, Pimpinella, Fumaria, Tormentilla, Zedoaria, China, Sarsaparilla, Sassafras, Lignum Guajacum, Cornu cervi, Lapis Bezoar Orientalis & Occidentalis.

2. *Vel Composita*, ut, Aqua florum aurantiorum, Theriacalis. Liquor Rhizoticus Zuingeri, Sebaldi. Spiritus terræ sigillatæ, Tartari, Carduibenedicti, de tribus, seu Diaphoreticum in peracutis, quod & Mixtura simplex. Theriaca, Mithridatium. Sal scabiosæ, Carduibenedicti, Absinthii, fraxini. Ex Chymicis est Aurum diaphoreticum, Flores Antimonii

monii fixi, Turpethum minerale, Diaphoreticum, Bezoardicum Joviale, Sulfur auratum, &c.

II. *Diaphoretica sunt, quæ per insensiles corporis meatus materiam educunt.* Sunt omnia calida, materiamque in halitum convertunt, & poros cutis aperiunt. *Præcipua sunt,* Melilotus, scœnumgræcum, ruta, majorana. *Cognata his sunt Flatus discutientia,* ut sunt, *Radices* galangæ minoris. *Folia,* lauri, dictamni, pulegii, origani, rutæ, majoranæ. *Semina,* Anisi, fœniculi, Carvi, Cumini, Dauci. *Fructus,* baccæ lauri, juniperi. *Cortices* citri, aurantiorum, &c.

PUNCTUM IV.

De Medicamentis Cerebrum purgantibus.

Medicamenta Cerebrum purgantia sunt, quæ materiam in eo stabulantem per nares vel palatum evacuant. Illa *Errhina* & *Ptarmica*; hæc *Apophlegmatizantia* dicuntur.

I. *Errhina* pituitam circa meninges hærentem nitrositate suâ, circa Cerebri agitationem, fundunt, detergent, & in nares proliciunt. *Præcipua sunt,* *Radices,* iridis, cyclaminis. *Folia,* Betæ, Anagallidis purpureæ, Majoranæ, Salviæ, Betonicæ, Hederæ. *Succi* Elaterium, quod validissimum, Pulsatillæ. Possunt & ex prædictis radicibus & foliis depromi.

II. *Ptarmica*, seu *Sternutatoria*, acrimonia facultatem Cerebri expultricem ita irritant, ut & ea quæ in ipso cerebro hærent, excutiant. *Præcipua sunt,* *Radices,* Zingiberis, Pyrethri, Iridis, Hellebori albi. *Folia,* Ptarmicæ, Nicotianæ. *Semina,* Piper, Sinapi, Staphisagriæ, Nigellæ. *Gummi,* Euphorbium, cujus solus odor sufficit.

III. *Apophlegmatizantia* seu masticata, seu gargarizata, seu palato illita excrementa è cerebro in palatum & os detrahunt. Parantur è *Radicibus,* Zingiberis,

beris, Pyrethri. *Seminibus,* Piperis, Nasturtii, Sinapi, Staphidis, Agriæ. *Gummi,* Mastiches.

PUNCTUM V.

De Expectoantibus.

Medicamenta expectoantia sunt, quæ humores in thorace & pulmone contentos evacuant.

Parantur ex *Radicibus* Helenii, Aristolochiæ, Angelicæ, Iridis, Ari, Scillæ, Glycyrrhizæ. *Foliis,* Hyssopi, Capillorum Veneris, Scabiosæ, Prassii, Ungulæ Caballinæ. *Semine,* Bombacis, Nasturtii, Erysimi, Seseleos, Urticæ. *Fructibus,* Uvis passis, Jujubis, Sestensis, Amygdalis, Ficubus, Pistaciis. Huc & Sperma ceti facit. Sed de his vide in Thoracis.

CAPUT VI.

De Medicamentis à partibus denominatis.

ARTICULUS I.

De Medicamentis Cephalicis.

PUNCTUM I.

De Medicamentis Cephalicis Calefacientibus.

Tantum de Medicamentorum à facultatibus denominatorum serie: sequuntur illa, quæ à partibus corporis humani appellationem suam habent, quæ iisdem totâ substantiâ & specifica proprietate conveniunt.

Sunt verò hæc, *Cephalica*, *Ophthalmica*, *Thoracica*, *Cardiaca*, *Stomachica*, *Hepatica*, *Splenetica*, *Nephritica*, & *Vesicaria*. Et hæc vel *Calida*, vel *Frigida*; vel *Interna*, vel *Externa*.

I. *Cephalica Calefacientia interna sunt* 1. Ex simplicibus. *Radices,* Pœoniæ, Caryophyllatæ, Aristolochiæ, Imperatoriæ, Calami aromatici. *Folia,* Primulæ veris,

Betonica, Rorismarini, Majoranae, Centaurii minoris, Salviae. *Flores*, Tunicae, Stoechados Arabicae, Lili Convallii, Paeoniae, Primulae veris, Betonicae. *Semina*, Amomi, Paeoniae, Sileris montani, Coriandri. *Fructus*, Grana Kermes, Anacardia, Baccae lauri & Juniperi. *Aromata*, Cubebae, Nux moschata, Cardamomum, Caryophylli. *Ligna*, viscum quercinum, corylinum. *Lacryma*, Thus, Storax. *Marina*, Ambra, Succinum. *Ab Animalibus* Moschus, Castoreum. 11. *Ex Compositis* sunt: *Aqua*, Ceraforum nigrorum, Lilior, convallium, Paeoniae, Tiliae, Tunicae, Primulae veris, Florum arantium Theriacalis. *Tinctura*, Elixir proprietatis, Paeoniae, Ligni sassafras. *Olea destillata*, Rorismarini, Majoranae, Salviae, Ruta, Succini, Spicae, &c. *Syrupi*, de Stoechade, Betonicae, florum Tunicae, Paeoniae. *Conserve*, Betonicae, Salviae, Anthos, Lilior, convallium, Centaurii minoris, Stoechados. *Condita*, Nucis moschatae, Nucis Indicae, Nucum juglandium. *Electuaria* Confectio Alkermes, Theriaca, Mithridatium, Diacastoreum. *Species* Diambra, Dianthos, Diamoschum dulce, Diacastoreon.

11. *Cephalica calefacientia externa* sunt, 1. *Ex Simplicibus*, ea ferè omnia quae superius ex simplicibus allata sunt. Folia Ruta, serpilli; nec non *verberna recta*, vehementer laudantur. 11. *Ex Compositis* sunt, *Olea*, ligni sassafras, Rutaceum, Nardinum, Laurinum, de Castoreo. *Balsama*, Rosar. Rorismarini, Nucis moschatae, Majoranae, Salviae, Succini. *Emplastra*, de Betonica, de Mucilaginibus, de Baccis lauri.

PUNCTUM II.

De Medicamentis Cephalicis externis.

Medicamenta Cephalica frigesacienda sunt etiam vel Interna, vel Externa.

I. *Interna* sunt 1. *Ex simplicibus*, *Radices*, Mandragorae, *Folia*, Lactuca, Pertulacae, Plantaginis, Solani,

lani, Nymphaeae Hyosciami, *Flores*, Rosarum, Papaveris albi, rhæados, violarum purpurearum, Nymphaeae. *Semina*, quatuor frigida majora & minora. *Fructus*, Cucurbitae, Cucumeres. *Ligna*, Santalorum. 11. *Ex Compositis*. Aquae Rosarum, violarum, Lactuca, Nymphaeae, Solani. *Succi*, Opium, Acetum rosatum. *Syrupi*, Papaveris albi, Rhæados, Rosarum, Nymphaeae. *Conserve* Lactuca, & ex floribus. *Electuaria*, Diacodion simplex & compositum, Diabolibanum, opiatum, Ladanum opiatum. *Species*, Diatrion santalon, de gemmis frigidum, Diacorallium.

II. *Externa* sunt, 1. *Ex Simplicibus*; *Folia*, salicis, vitis, umbilici Veneris, Mandragorae. Reliqua ex superioribus sumi possunt. 11. *Ex Compositis*; *Aqua*, Hyosciami, Lactuca, Nymphaeae, Plantaginis, Solani, Sambuci, Rosarum. *Succi*, Betulae arboris, Semperivi, &c. *Olea*, papaveris, violarum, Nenupharium, seminum lactuca, Mandragorae, Ranarum. *Unguenta*, Rosarum, Alabastrinum, Album Camphoratum, Refrigerans Galeni, Populeum.

ARTICULUS II.

De Medicamentis Ophthalmicis.

Medicamenta ophthalmica sunt vel Calefacientia, vel Frigesacienda. *Virga*; *Interna* vel *Externa*.

I. *Calefacientia Interna* sunt, 1. *Ex Simplicibus*, *Radices*, Valerianae, Foeniculi, Chelidoniae, Napi, Raporum. *Folia*, Chelidoniae majoris, Fumariae, Euphrasiae, Pimpinellae, Rorismarini. *Flores* Euphrasiae, Chelidoniae, Calendulae. *Semina*, Anisi, Ruta, Sileris montani, Raporum. *Aromata*, Crocus, Xyloloës. 11. *Ex Compositis*; *Aqua*, verbenae, Chelidoniae majoris, Foeniculi, Verbenae, Ruta, Centaurii minoris. *Syrupi*, Betonicae, Euphrasiae. *Electuaria*, Theriaca, Mithridatium. *Conserve*, Euphrasiae, Anthos,

Betonica, Salvia, Florum Tunicae. *Extractum*, ligni aloës.

II. *Externa* sunt. I. *Ex Simplicibus*, Radices, verbenæ, Valerianæ. *Folia*, quorum supra mentio. *Flores* Hyperici, Meliloti, Confolidæ regalis. *Semina*, Galitrici, Lini, Fœnigræci. II. *Ex Compositis*, *Aqua*, faccharata, Calendulæ, Mellis, verbaſci, Sambuci, Panis. *Unguenta*, Pomadæ, Dialtheæ.

III. *Frigeſcientia interna* sunt. I. *Ex Simplicibus*, Radices, Cichorii, Fragariæ, Raparum. *Folia*, Fragariæ, Cichorii, Plantaginis. *Flores*, Roſarum albar. Violarum, Nymphææ. *Semina*, Cydoniorum, Papaveris albi. II. *Ex Compositis*, *Aqua*, Fragariæ, Portulacæ. *Syrupos*, *Conſervas*, *Species*, &c. vide in Cephalicis.

IV. *Frigeſcientia Externa* sunt. I. *Ex Simplicibus*, *Folia*, Taraxaci, Querci, &c. *Flores*, vide ſuperius. *Semina*, Fabarum, Pſyllii, Cydoniorum. *Fructus*, Pulpa pomorum. Pomum dulce cum ſaccaro. *Terra*, Bolus Armenus, Terra ſigillata. *Metallica*, Ceruſſa, Lithargyrum argenti, Lapis Calaminaris, ſaccarum Saturni, Spodium. II. *Ex Compositis*, *Aqua*, florum cyani cœruleorum, Fabarum, Anſerinæ, Fragorum. *Mucilagines*, ſeminum Pſyllii, Malvæ, Altheæ, &c.

ARTICULUS III.

De Medicamentis Thoracicis.

PUNCTUM I.

De Thoracicis caleſcientibus.

Medicamenta thoracica quoque ſunt vel Caleſcientia, vel Frigeſcientia.

I. Caleſcientia interna ſunt. I. *Ex Simplicibus*. Radices, Helenii, Scillæ, Ariſtolachia rotundæ, Tuſſilaginis, Pimpinellæ, Scordii, Scabioſæ, Dracunculi, Saponariæ. *Folia*, Herbarum quinque Capillarium, Marrubii, Calaminthæ, Scabioſæ, Veronicæ, Hederæ terre-

terre-

terreſtris, Tuſſilaginis, Botryos, Pulmonariæ maculoſæ, Hyſſopi, Scordii, Nummulariæ. *Flores*, Scabioſæ, Pulmonariæ maculoſæ, Hyſſopi, Tuſſilaginis, Spicæ, Graminis marini. *Semina*, Rutæ ſylveſtris & horteniſis, Sileris montani, Seſelios Maſſilienſis, Chæreſolii, Cardui Mariæ, Abrotoni. *Fructus*, Caricæ pingues, Daſtyli, Uræ paſſæ, Nux Indica. *Aromata*, Crocus, Caſſia lignea, Cinnamomum. *Ligna* Saſſafras, Guajaci, Cortices arantiorum. *Terra* & *Gummi*, Bolus Armenus, Gummi Ammoniacum, Myrrha, Terebinthina, Thuſ electum. II. *Ex Compositis*, *Aqua*, Hyſſopi, Præſſii, Capillorum Veneris, Veronicæ. Hederæ terreſtris, Scabioſæ, Cardui Mariæ, Ireos, Vitulina. *Spiritus*, Terebinthina, Sulſuris. Hederæ terreſtris. *Olea deſtillata*, Aniſi, Fœniculi, Macis, Salviæ, Serpilli. *Tinctura*, Elixir proprietatis, Tinctura ſulſuris, Baſamus ejuſdem vel cum oleo fœniculi, vel Amygdalorum dulcium. *Extracta*, Croci, Ireos Illyricæ, Veronicæ, Calami aromatici, Hederæ terreſtris. *Decocta*, Peſtorale, de Rapis paſſis, Galli decrepiti, Ligni Guajaci. *Syrupi*, de Hyſſopo, de Præſſio, Capillorum Veneris, de ſucco hederæ, Veronicæ, Scabioſæ, Nicotianæ, Oxyſmel ſimplex, Scilliticum. *Looch*, de Farſara, de pulmone vulpis, Sanum & expertum, de Paſſulis, de althæa. *Conſerva*, Botryos, Veronicæ, Pulmonariæ maculoſæ, Hederæ terreſtris. *Electuaria*, Theriaca, Mithridatium. *Species*, Diaireos ſimplicis, Diatragacanthi calidi, Diapenidii, Diathamari. *Fecula* Aronis. *Flores* ſulſuris, Benzoini. *Trochiſci*, Bechici albi & nigri, Diaireos.

II. Caleſcientia externa ſunt. I. *Ex ſimplicibus*, illa ferè omnia, quæ ſuperius adduximus. II. *Ex Compositis*; *Olea*, Irinum, Rutæ, Coſtinum, Cheiri, Amygdal. dulcium & amararum, Liliorum, Lini. *Adipes*, Anſerinus, qui maximè penetrat, *Sevum*

cervinum, Pinguedo gallinarum. *Mucilagines* seminis lini, fœnigræci, Althææ cum Croco. *Vnguenta*, Dialthææ, Pectorale Auguftanorum, Refumtivum Fernelii.

PUNCTUM II.

De Thoracis Refrigerantibus.

Thoracica refrigerantia sunt vel Interna; vel Externa.

I. Interna sunt, 1. *Ex simplicibus*; Radices, Scariolæ, Arnoglofiæ, Endiviæ, Polypodii. *Folia*, Portulacæ, Nymphææ, Brassicæ. *Flores*, Violarum, Malvæ, Nymphææ, Buglofiæ, Cichorii, Papaveris rhæados, Rosarum. *Semina*, quatuor frigida majora & minora, papaveris, malvæ, cydoniorum, hordei. *Fructus*, pruna Ungarica & Hispanica, Mora, jujubæ, sebestæ, tribuli aquatici, cynosbati exsiccati. *Ligna*, santalum rubrum, Citrinum album. *Gummi*, Tragacanthum Arabicum. *Animalia*, Cancris fluviatilis, serum lactis, lac caprinum. II. *Ex Compositis*; *Aqua*, Caponis simplex & Composita, Vitulina, Malvæ, Violarum, Nymphææ, Papaveris rhæados. *Olæa destillata*, violar. purpurearum, amygdalorum dulcium. *Emulsiones*, Papaveris albi, Portulacæ, seminum frigidorum. *Decocta*, Pectorale Auguftanorum, Caponis. *Syrupi*, Violar. de jujubis, Nymphææ, Cucurbitæ, Papaveris rhæados, portulacæ, dialthææ Fernelii. *Looch*, de Psyllio, pasfularum, caulium brassicæ, de portulaca, de althæa. *Electuaria*, Diacodium Auguftanorum, Theriaca recens. *Conserve*, Rosarum, Violarum cum bolo Armeno, Lactuæ Hispanicæ. *Species*, Diatragacanthi frigidi, Diamargariti frigidi, Diapenidii. *Rotula*, Diatragacanthi frigidi, diapenidii, saccharum rosarum tabulatum.

II. Externa sunt, 1. *Ex simplicibus*; *Folia* superius enumerata. *Animalia*, Butyrum majale recens non salitum, adeps porci masculi, gallinæ. *Mucilagines*,

cilagines, semines psyllii, cydonior. fœnigræci, althææ. *Olæa*, violarum, liliorum alborum.

ARTICULUS IV.

De Medicamentis Cardiacis.

PUNCTUM I.

De Cardiacis Calefacientibus.

Medicamenta Cardiacæ sunt, quæ cordi, tam intrinsecus data, quam extrinsecus applicata, conveniunt; Sunt quoque vel Calida, vel Frigida.

I. Interna, sunt. 1. *Ex simplicibus*; Radices, Scordii, Daronici, Angelicæ, Morfus Diaboli, Ostrutii seu Imperatoricæ, Vincetoxici, Scorzoneræ, Dictamni, Tormentillæ, Contrajervæ. *Folia*, Melissæ, Scordii, Salviæ, Tormentillæ, Carduibenedicti, Scabiosæ, Veronicæ, Cardiacæ, Rutæ caprariæ, Sisymbrii domestici & sylvestris. *Flores*, Tunicis, anthos, Scabiosæ, Centaurii minoris, Melissæ, Tormentillæ, Borraginis, Buglofiæ. *Semina*, Citri, Aurantiorum, Cardui benedicti, Rutæ, Levistici, Napi. *Aromata*, Nuxmoschata, Cassia lignea, Crocus, Caryophylli. *Ligna*, Agallochum. *Gummi*, Myrrha, Camphora, Benzoë, Mastiche, Marina, Succinum, ambra. *Terra & Lapides*. Bolus Armenus, Terra sigillata Turcica & Strigensis, Margaritæ, Corallia, fragmenta quinque lapidum pretiosorum. *Animalia*, Lapis Bezoar, Cornu cervi, Rhinocerotis, Os de corde cervi. II. *Ex Compositis*, Spiritus, baccarum sambuci & juniperi, rosarum, melissæ, mistura simplex, Elixir Citri cum spiritu vini Malvatici. *Aqua destillata*, Carduibenedicti, Melissæ, florum Citri, Scabiosæ, virtutum, Calendulæ, Scordii, Carbunculi, Cinnamomi cum floribus cordialibus, Bezoardica Sennerti, Tophorum cervi. *Olæa destillata*, Cinnamomi, Citri, Melissæ, Succini, Caryophyllorum, Nucis moschata. *Tinctura*, Succini, Elixir pro-

prietatis. *Extracta*, Angelicæ, Cardui benedicti, Corticum Citri, Lignii aloës, Vincetoxici, Zedoariæ, Croci. *Essentia*, Magisterium Cinnamomi, Ambra essentificata, Essentia Citri, Margaritarum, verbenæ. *Succi*, Citri cum corticibus, Granatorum, Gelatina, cornu cervi, cum aceto Carduibenedicti & scordii parata. *Syrupi*, de corticibus citri sine & cum ambra & moscho, Scordii, Carduibenedicti, Arantiorum, Melissæ, Tunicæ, Granatorum, Veronicæ, Borriginis, Buglossæ, Galangæ; *Conserve*, Melissæ, florum citri, arantiorum, tunicæ, Calendulæ, Borriginis, Buglossæ. *Condita*, Corticum citri, Arantiorum, Nucis Indicæ, Radicum Scorzoneræ, Helenii. *Electuaria*, Theriaca, Mithridarium, Confectio Alkermes, Diascordium Fracastorii. *Species & Pulveres*, Diamargariti calidi, Diamoschi, Diambæ, Pulvis rubeus Pannonicus, Cæsaris, Saxonicus, Bezoardicus aureus Döringii, Alexipharmacus Montagnanæ.

II. *Externa* sunt I. *Ex simplicibus* ea, quæ superius enumerata sunt. I. *Ex Compositis* eadem quæ sunt, aquæ nimirum, succi, olea destillata. Ex his Epithemata, sacculi, fomenta & linimenta fiunt.

PUNCTUM II.

De Cardiacis Refrigerantibus.

Cardiacæ refrigerantia sunt quoque vel Interna, vel Externa.

I. *Interna* sunt I. *Ex simplicibus*; Radices, Taraxaci, Acetosæ. Folia, Acetosæ, Acetofellæ, Nymphææ. Flores, Violarum, Cichorii, Nymphææ. Semina, quatuor frigida. Fructus, Rubi Idæi, Ribes, Berberis, Mala Citria, arantia, granata, odorata, Cynosbati exsiccati. Ligna, santala tria. Terra, &

ex

ex Animalibus sumta, sunt illa quorum superius mentionem fecimus. II. *Ex Compositis*; Aqua, Acetosæ, fragorum, cerasorum nigrorum, cydoniorum, tophorum cervi. Succi, Citri, Granator. Rubi Idæi, Acetum rosaceum, Gelatina C. C. cum aceto florum sambuci parata. Syrupi, Acetositatis citri, Granatorum, Acetofellæ, de succo Ribium, fragorum, Corallor. Quercetani Julepus rosatus, violatus. Conserve florum Citri, Arantiorum, Carnis citri, Rosarum, florum acaciæ. Condita, Ribium, berberorum, carnis citri, cynosbati. Species & Pulveres, diamargariti frigidi, Diatron santalon, Magisterium, perlarum, Corallorum.

ARTICULUS V.

De Medicamentis Stomachicis.

PUNCTUM I.

De Stomachicis Calefacientibus.

Medicamenta Stomachica sunt, quæ ventriculum calefaciunt, vel refrigerant: idque seu intrus assumta, seu extra applicata.

Interna calefacientia sunt, I. *Ex Simplicibus*; Radices, Pimpinellæ, Rhapontici veri, Galangæ, Zedoariæ, Calami aromatici, Caryophyllatæ. Folia, Absinthii Pontici & vulgaris, Menthæ rubæ & hortensis veræ, Crispæ, Saracenicæ, Cardiacæ, Cichorii, Agrimonie, Majoranæ. Flores, Betonicæ, Salviæ, Spicæ, Majoranæ. Semina, quatuor calida majora & minora, Coriandri præpar. Dörnerellii. Fructus bacæ juniperi, lauri, mala arantia, nux Indica. Aromata, Nux moschata, Zingiber, Macis, Caryophylli, Cinnamomū, Galanga, Cubebæ, Piper omne, Cassia lignea. Ligna, Agallochum, Guajacum, Cortices citri, arantiorum. Gummi Mastiche, Marina, succinum, ambra.

II. Ex

Ex compositis; Spiritus, vini malvatici, Rhenani-
salis, vitrioli, mastichis, absinthii, anthos, cinnamo-
mi, panis. *Aqua destillata*, Menthae, betonicae, sal-
viae, cinnamomi sine & cum vino, Elixir vitae, Me-
lissae cum vino, Zedoariae cum vino. *Olea destillata*,
piperis, calami aromatici, caryophyllorum, macis,
Cinnamomi, carvi, foeniculi, absinthii, corticum au-
rantiorum. *Tinctura*, Elixir proprietatis, succini, Co-
rallorum, ligni sassafras. *Extracta*, Xyloaloës, ab-
sinthii, calami aromatici. *Essentia*, Rorismarini, Ci-
tri, absinthii, aurantiorum; quo pertinent, Sal ab-
sinthii, juniperinum. *Syrupi*, Cinnamomi, Menthae,
Absinthii, Betonicae, Mastiches, Oxymel scilicetum,
florum hyperici. *Conserve* absinthii, menthae, beto-
nicae, rosarum rubrarum vitriolata. *Condita*, Zin-
giberis Chinenfis, Acori veri, Galangae, Corticum
citri, aurantiorum, Nutis moschatae, Nucis Indicae,
Myrobalanorum. *Species & pulveres*, Aromaticum
rosatum, Diatrion pipereon, Diaxyloaloës, species
Imperiales, pulvis stomachicus Birckmanni, Tra-
gae grossa stomachalis.

II. *Externa* sunt, I *Ex Simplicibus* haecenus e-
numerata, & ex *Gummatibus*, Ladanum, Tacama-
haca, styrax, calamites. II. *Ex Compositis*, sunt prae-
ter superius dicta, *Balsama*, Peruvianum, Chamae-
meli Rordani, Mastichis Strobelbergeri. *Unguenta*,
Stomachale, Martiatum magnum. *Emplastrum &*
Cataplasinata, Stomachale, de crusta panis, de bac-
cis lauri, de mastiche.

PUNCTUM II.

De Stomachicis Refrigerantibus.

Stomachica refrigerantia sunt quoque vel Inter-
na, vel Externa.

I. *Interna* I. *Ex Simplicibus*, Radices Cichorii,
Aceto-

Acetosae, Asparagi, Nymphaeae. *Folia*, Intybum
omne, acetosae, portulacae, myrti. *Flores*, Rosa-
rum, violarum, Balauftiorum. *Semina*, quatuor fri-
gida, hordei, acetosae, rosarum. *Fructus*, Mala ci-
tria, cydonia, aurantia, granata, myrtili, mespila, ta-
marindi, ribes, melones, cucumeres. *Ligna*, Santalum.
Lapides, Corallia rubra. II. *Ex Compositis*, *Aqua*
Rosarum, Acaciae, fragorum, plantaginis, portula-
cae, cydoniorum. *Succi*, quorum inter Cardiaca re-
frigerantia facta est mentio. *Syrupi*, de Coralliis, A-
cetositare Citri, de Agresta, Cydoniorum, Acaciae,
Granatorum, Julepus Rosarum, & violarum. *Con-
serve*, Rosarum vitriolata, florum acaciae, summita-
tum quercus, florum Citri. *Condita*, radicum Ci-
chorii, Cydoniorum, lactuca Hispanica. *Diacydo-
nium simplex*. *Species & pulveres*, Diatrion fanta-
lon, Diarrhodon Abbatris, diamargariti frigidi.

II. *Externa* sunt I. *Ex Simplicibus* illa, quo-
rum in internis mentionem fecimus. II. *Ex Com-
positis*, Oleum rosarum, violarum, cydoniorum, Nym-
phaeae, Omphacinum.

ARTICULUS VI.

De Medicamentis Epaticis.

PUNCTUM I.

De Epaticis calefacientibus.

Medicamenta Epatica sunt Calefacientia, vel
Refrigerantia. Illa, vel Interna, vel Externa.

I. *Interna* sunt I. *Ex Simplicibus*, Radices, quin-
que aperientes majores & minores, pimpinellae, ra-
phani rustici, scillae, rhapontici veri, rhabbari.
Folia, Agrimoniae, Eupatorii Mesuae, herbae Kuni-
gundis, Chamædryos verae montanae, centaurii mi-
noris, nasturtii, betonicae, hepaticae seu lichenis,
Chamae-

Chamæpityos. *Flores*, Centaurii minoris, spicæ, squinanthi, sambuci, epaticæ nobilis, lupuli. *Semina*, Arantiorum, Citri, Aquilegiæ, seselios. *Fructus*, Mala arantia, passulæ, baccæ juniperi. *Aromata*, Cinnamomum, Crocus, Acorus, Zedoaria, Spica Indica, Cassia lignea. *Ligna*, Xyloaloës, Guajaci, Santali citrini. *II. Ex compositis*; *Spiritus*, Sambuci, Guajaci, Absinthii, Centaurii minoris. *Aqua*, ex prædictis herbis destillatæ. *Olea* salviæ, arantiorum, absinthii, juniperi, macis, nucis moschatae. *Tinctura*, Elixir proprietatis, Ligni sassafras. *Extracta*, Gentianæ, Carduibenedicti, Agalochi, Absinthii, Guajaci, Veronicæ, Calami aromatici. *Syrupi*, Chamædryos, Byzantini, Lupulorum, Absinthii, *Conserua*, Chamædryos, Salviæ, Absinthii, Fumaricæ, Anthos. *Condita*, Acori, Corticum arantiorum, Citri, radicum pimpinellæ. *Species & Pulveres*, Diacurcumæ, Dialacæ, Diaxyloaloës, Diamargariti calidi.

II. Externa sunt, *I. Ex Simplicibus*, ea quæ adducta sunt, ex quibus decocta, sacculi, fomenta, parari possunt. *Vnguenta* sunt, Nardinum, Martiatum. *Emplastra*, Diaphanici calidi, de baccis lauri, Oxyroceump.

PUNCTUM II.

De Hepatis Refrigerantibus.

Hepatica refrigerantia sunt vel Interna, vel Externa.

I. Interna sunt, *I. Ex Simplicibus*; *Radices*, Asparagi, Graminis, Nymphææ, utriusque fragariæ, Acetosæ, Cichorii. *Folia*, Acetosæ, Fragariæ, Asparagi, Taraxaci, Scariolæ, Portulacæ, Lactucæ, Nymphææ. *Flores*, Rosarum, Cichorii, Buglossæ, Balaustiorum, Nymphææ, Acaciæ, Papaveris, rhæados.

dos. *Semina*, quatuor frigida majora, & minora, hordei, papaveris albi, violarum. *Fructus*, Poma granata, &c. quæ inter stomachica refrigerantia retuli. *Gummata & Lapides pretiosos* vide ibidem. *Ab Animalibus*, Rasura eboris, C. C. serum lactis caprini. *II. Ex Compositis*, Spiritus vitrioli, sulphuris acidus, salis. *Aqua destillata*, Cichorii, Acetosæ, Nymphææ, Fragorum. *Syrupi*, ex succo Cichorii, Endiviæ, Acetosæ. Acetosellæ, acetositatis Citri, & reliqui inter stomachica frigida. *Conseruas*, *Condita* & *Species* ibidem vide.

II. Externa sunt, *I. Ex Simplicibus*, eadem quæ superius. *II. Ex Compositis*; *Olea* Rosatum, Cydoniorum, Nymphææ, Omphacinum. *Vnguenta*, santalinum, Refrigerans Galeni, Rosatum Mesuæ. *Emplastra*, Cerotum santalinum, Diaphanicon frigidum, Emplastrum de succo Cicutæ.

ARTICULUS VII.

De Medicamentis Spleneticis.

PUNCTUM I.

De Spleneticis Calefacientibus.

Medicamenta Splenetica sunt vel Calefacientia, vel Refrigerantia. Vtraque vel Interna, vel Externa.

I. Interna Calefacientia sunt. *I. Ex Simplicibus*; *Radices*, Filicis, quæ appropriata est, Scorzonaræ, Iridis florentinæ, Polypodii querni, Caryophyllatæ, Raphanirusticani. *Folia* Scolopendrii veri, Linguae cervinæ, cochleariæ, Tamarisci, Cuscutæ, Lupuli, Fumaricæ, Beccabungæ, Chærefolii, Galio-psidis, Chamædryos, *Flores*, Lupuli, Genistæ, Sambuci, Chamæmeli, Fumaricæ, Hepaticæ. *Semina*, Traxini,

Fraxini, Ammios veri, Nasturtii, Chærefolii, Sina-
pi, Urticæ, pastinacæ sylvestris, Cochleariæ. *Aro-
mata*, Crocus, Epithymum. *Ligna*, Sassafras, Xy-
loaloë. *Cortices*, radic. Capparum, medi. rad. fraxi-
ni, Sambuci, Tamarisci. *Gummi*, Ammoniacum in
aceto scillitico dissolutum. II. *Ex Compositis*; *Spi-
ritus*, Vini tartarizatus, Centauri minoris, vitrioli
Martis, Tartari simplex & Compositus, Nasturtii,
Cochleariæ, Guajaci, Juniperi è baccis. *Aqua*, Cu-
scutæ, Melissæ composita, Lupulorum, Nasturtii
aquatici, Cochleariæ, Fumariæ. *Tinctura*, Martis.
Extracta, splenis Jovis, Scolopendrii, Linguae cer-
vinæ, Scordii, Fumariæ, Polypodii. *Essentia* Coch-
leariæ, Epithymi, Chamædryos, Fumariæ, Cuscu-
tæ, Capparum. *Syrupi*, de Scolopendrio Fernellii,
de Epithymo, Cochleariæ, de Pomis, Sceletyrbicus
Foresti. *Conserve*, Cochleariæ, Scolopendriæ, flo-
rum genistæ, fumariæ, veronicæ, Chamædryos, Pim-
pinellæ. *Species*, Dialacæ, Diacurcumæ, Diacap-
parum Hollerii, Tartarus vitriolatus.

II. *Externa* sunt I. *Ex simplicibus* ea quæ hac-
tenus sunt enumerata, II. *Ex compositis*, *Olea*, de
Capparibus, Irinum, Cheiri, Rutæ, Nucleor. Per-
ficorum, Amygdalorum, Scorpionum. *Vnguenta*,
Dialthææ, Martiatum, de Arthanita, de Ammo-
niaco, spleneticum. *Emplastra*, de Meliloto. Dia-
chylum ireatum, Emolliens Foresti, Diafulphuris
Rulandi.

PUNCTUM III.

De Spleneticis Refrigerantibus.

Splenetica refrigerantia sunt vel Interna, vel
Externa.

I. *Interna* sunt I. *Ex simplicibus*. *Radices*, Ci-
choracæ, & quarum in Epaticis mentio. *Folia*, Flo-
res,

res, *Fructus*, *Semina*, inde quoque peti possunt. His
Cortices radicum salicis adjicias. II. *Ex Compositis*,
sunt etiam eadem, quibus accedunt medicamenta
è Tartaro & chalybe præparata. *Trochisci*, de fanta-
lis, spodio, Carabe, Berberibus.

II. *Externa* sunt I. *Ex Simplicibus*; *Radices*,
Mandragoræ. *Folia*, Hyoscyami albi, Cicutæ, Sa-
licis, Nymphææ. II. *Ex Compositis*, quæ sunt inter
refrigerantia hepatica videantur.

ARTICULUS VIII.

De Medicamentis Nephriticis.

PUNCTUM I.

De Nephriticis calefacientibus.

Medicamenta nephritica sunt vel Calefacien-
tia, vel Refrigerantia. Vtraque vel Interna,
vel Externa.

I. *Interna calefacientia* sunt I. *Ex Simplicibus*;
Radices, Ononidis, Saxifragiæ, Filipendulæ, Pim-
pinellæ, Liquiritiæ, Althææ, Polypodii, Levistici.
Folia, Capillorum Veneris, Rutæ murariæ, Veroni-
cæ, Chærefolii, Urticæ, Hedera terrestris, Parieta-
riæ, Matricariæ, Ononidis. *Florum*, Genistæ, spi-
cæ, Sambuci, Betonicæ, flavedo florum violarum,
hyperici. *Semina*, quatuor calida majora & minora,
petroselinii, milii solis, saxifragiæ, nuclei cerasorum,
perficorum, botryos, fabarum. *Fructus*, baccae ju-
niperi, hederae, alkekengi, amygdalæ amaræ, cynos-
bati, passulæ minores. *Aromata*, Cassia lignea, spi-
ca Indica, Crocus. *Ligna*, sanctum, Nephriticum,
Tamarisci. *Gummi*, Terebinthina, Myrrha, Ma-
stiche, olibanum. *Mineralia*, Lapis Judaicus, ne-
phriticus. *Ab Animalibus*, Lapides percarum, ocu-
li cancri, lumbrici terrestres, testæ ovorum, man-
dibulæ lucii. II. *Ex Compositis*, *Spiritus* salis,

terebinthinæ, è baccis sambuci, fragorum, cerasorum, vitrioli, matricariæ. *Aqua destillata*, Ononidis, Saxifragiæ, Petroselinii, Hederæ terrestres, Alkekengi, Matricariæ, florum sambuci. *Olea*, Aurantiorum, juniperi, nucleorum persicorum, cerasorum, amygdalorum amarorum. *Tinctura*, Elixir proprietatis, succini. *Extracta*, Veronica, hederæ terrestres, liquiritiæ. *Syrupi*, Adiantinus Fernellii, Byzantinus, Capillorum Veneris, Dialtheæ, Oxymel. *Conserve*, Hederæ terrestres, veronicæ, cynosbati ex fructibus. *Species & Pulveres*, Lithonthripticon, Tartarus vitriolatus, sal ononidis, straminis fabarum, Cherefolii, urticæ.

II. *Externa*, sunt I. *Ex simplicibus*, ea quæ superius allata sunt. II. *Ex Compositis*, *Olea*, Scorpionum, Liliorum alborum, costinum. *Unguenta*, Martiatum, Agrippæ, Aregon, Dialtheæ. *Emplastrum*, Diachylon simplex, Oxycroceum, Meliloti.

PUNCTUM II.

De Nephriticis Refrigerantibus.

Nephritica refrigerantia sunt vel Interna, vel Externa.

I. *Interna* sunt, I. *Ex simplicibus*, Radices, Graminis, Fragariæ, Nymphææ. *Folia*, Portulacæ, Salicis, Labri Veneris, Jaceæ seu herbæ Trinitatis, Lactucæ. *Flores*, Nymphææ, violarum, Rosarum, Fabarum. *Semina* quatuor frigida, papaveris albi, violarum purpurearum. *Fructus*, vide inter stomatica & hepatica frigida. *Lapides*, Crystallus. II. *Ex Compositis*, *Aqua*, Fragorum, violarum, Hordei, Portulacæ, Lactucæ. *Succi*, Citri, Fragorum, Portulacæ. *Syrupi*, Nymphææ, Fragorum, Portulacæ, Acetositatis Citri. *Conserve*, Acaciæ, violarum Portulacæ.

II. *Externa*, sunt eadem, quibus *Ex Compositis* adde, *Olea* rosarum, nymphææ, sacchari Saturni. *Unguenta*, Rosatum Meliæ, Infrigidans Galeni.

ARTI-

ARTICULUS IX.

De Medicamentis Vterinis.

PUNCTUM I.

De Uterinis calefacientibus.

Medicamenta Vterina sunt vel Calefacientia, vel Refrigerantia. Vtraque vel Interna, vel Externa.

I. *Interna* sunt, I. *Ex simplicibus*, Radices, Pæoniæ, Valerianæ, Ostrutii, Angelicæ, Pimpinellæ, Bryoniæ, Aristolochiæ rotundæ. *Folia*, Artemisiæ, Rutæ, Aristolochiæ rotundæ, Mercurialis, Matricariæ, Sabinæ, Betonicæ. *Flores*, Betonicæ, Cheiri, Sambuci, Hyperici, Stœchados, spicæ. *Semina*, quatuor calida, fileris montani, Cicerum rubrorum, Rorismarini, Pæoniæ. *Fructus*, Nux Indica, Baccæ juniperi, Mala aurantia. *Aromata*, Cinnamomum, Cassia lignea vera, Nux moschata, Cubebæ, Grana paradysi, crocus. *Ligna*, Agallochum, Fraxini, Guajaci. *Ab animalibus*, Castoreum. II. *Ex Compositis*, *Aqua*, Artemisiæ, Hyssopi, Sambuci, Cinnamomi, Zedoariæ, Leucoji lutei, Betonicæ cum vino. *Olea* Cinnamomi, Angelicæ, Succini, Caryophyllorum. *Tinctura*, Elixir uterinum Crollii, omisso sale matris perlarum. *Extracta*, Hystericum majus & minus. Quercetani, Hepatis & splenis bovis, Melissæ, Lignialoës. *Syrupi*, de Artemisiâ, Matricariæ, Aurantiorum, Melissæ, Cinnamomi. *Conserve*, Majoranæ, Betonicæ, Melissæ, Anthos, Calendulæ. *Condita*, Acori, corticum citri, arantiorum, Nucis moschata, Indicæ, radicum Zedoariæ. *Pulveres*, Diacalaminthæ, Diaxyloaloës, Diacinnamomi.

II. *Externa* sunt I. *Ex simplicibus*, pleraque superiora, quibus accedunt, Gummi Olibanum, sty-

N 2

rax,

rax, calamites, bdellium, myrrha, ladanum, asa foetida, galbanum, Opopanax, Sagapenum, Succinum. *Ab Animalibus*, Castoreum, Zibethum, Moschus. **II.** *Ex Compositis*; Olea, Cheiri, Angelicæ, Rutæ, Castorei, Nardinum, Scorpionum, Nucis moschatæ. *Vnguentum*, è baccis lauri, Ceroneum, ex gummi Carannæ, Ceratum matricale, vel de galbano, & alia.

PUNCTUM II.

De Uterinis refrigerantibus.

Uterina refrigerantia sunt etiam vel interna, vel externa.

I. Interna sunt, **I.** *Ex Simplicibus*, Radices, Bistorta, Symphyti majoris. Folia, Fragariæ, Bursæ pastoris, Vincæ pervincæ, Plantaginis, Quercus, Consolidæ majoris, Portulacæ, Urticæ, Lyfimachia. Flores, Rosarum, Cydoniorum, balauftiorum, Nymphææ, Lyfimachia, Hyperici, Symphyti, Salicis. Semina, Portulacæ, plantaginis, hyoscyanti, papaveris albi. Fructus, Acaciæ, Mala granata, Mespila, Myrtili. Ligna, Santalum. Gummi, Sanguis draconis. Terre & Mineralia, Bolus Armenus, Corallia rubra, Margaritæ, Crystallus. **II.** *Ex Compositis*, quæ sunt, ex præteritis componuntur, & ex antehac dictis nota esse poterant.

II. Externa sunt eadem, quæ attulimus ex simplicibus. Composita maximam partem in Nephriticis & Hepaticis exposita sunt.

CAPUT VII.

De Medicamentis vegetabilibus planetariis.

Medicamenta planetaria sunt, quæ secundum quorundam placitum, à planetis appellationes suas sortita, ab iisdem vires suas accepisse, & in operando pendere existimantur.

Sunt

Sunt totuplicia, quot planetæ numerantur, Saturnina nempe, Iorvialia, Martialia, Solaria, Veneræ, Mercurialia, Lunaria.

I. Saturnina illa vocantur, quæ sunt ad spectum horrido, odore ingrato vel etiam venenato, sapore stiptico, forma macilenta; & crescunt in uliginosis, sordidis, nemorosis, solitariis & tenebrosis locis: suntque ex his Aconitum, Agnus castus, Antirrhinum, Apium, Asplenium, Aster, Atriplex, Blitum, Bursa pastoris, Cannabis, Cappares, Cicuta, Cuminum, Cupressus, Cuscuta, Epithymum, Equisetum, Filix, Fumaria, Helleborus, Hyoscyamus, Lappa major, Lupinus, Mandragora, Muscus, Opium, Pinus, Polypodium, Pruna sylvestria, Ruta, Salix, Scolopendria, Scrophularia, Sena, Serpentina, Sefeli, Solanum, Tamariscus, Taxus, Verbena.

II. Iorvialia illa sunt, quæ saporem & odorem habent gratum, florem rubeum vel coeruleum, substantiam oleaginosam, folia plana, & gaudent locis pinguibus, ut sunt: Caryophylli, Cerasa, Fraga, Olea, Betonica, Linum, Centaurium, Berberis, Ribes, Caryophyllata, Persicaria, Fumaria, Teucrium, Verbascum, Symphytum, Galanga, Betula, Chamædrys, Amygdalus, Rubia tinctorum, Prunella, Rhabarbarum, Lyfimachia, Borrago, Buglossa, Morus, Triticum, Perfoliata, Sophia, Mala granata, Viola, Corallum.

III. Martialia sunt formâ aculeata & aspera, sapore caustico, colore ad rubedinem tendente, locaque amant sicca, ut sunt: Urtica, Carduorum genera, Ononis, Efula, Rhamni, Rubi, Flammula, Cæpe, Porrum, Allium, Raphanus, Piperitis, Napellus, Hyoscyamus, Persicaria, Asparagus, Basilicon, &c.

IV. Solaria sunt formâ regali, colore florum flavo vel fulvo, odore fragrante, sapore grata, & loca amant aprica ac meridionalia, ut sunt:

N 3

Heli-

Heliotropium, Flos, Crocus, Chelidonia, Melisso-
phyllon, Cardiaea, Milium folis, Rorella, Lilia,
Gentiana, Laurus vitis, Enula, Helenium, Hyperic-
um, Fraxinus. Caltha, Heliochrysum, Rosmarin-
us, Mentha, Citraria, & quædam alia.

V. *Veneræ* sunt, quæ habent florem album, hu-
morem lentum, saporem dulcem, odorem lasciv-
um, formam foliorum glabram non laciniatam; *ut*
sunt, Satyria, Pifa vulgaris, Boletus cervinus, aron,
fructus pini & quercus, Ciceres, Nymphææ, Nar-
cissus, &c.

VI. *Mercurialia* sunt, quæ varium florum colo-
rem habent, siliquas gerunt, & loco plerumque are-
noso nascuntur; *ut sunt*, Fabæ, Chamæmelum,
Trifolium, Bellis, Juniperus, Juglans, Corylus,
Sambucus, Serpentaria, Numularia, Pulmonaria,
Anisum, Cubebæ, Majorana.

VII. *Lunaria* sunt quæ folia habent crassa, suc-
culenta, saporis aquei vel subdulcis, cito in justam
magnitudinem crescunt, & loca palustria & aquatica
amant; *ut sunt*, Brassica, Cucurbita, Melones, Pe-
pones, Mandragora, Papaver erraticum, Lactuca,
Rapa, Tilia, Lens aquatica, &c. Vide de his *Etzle-*
rum in Ifagoge Physico-Magico-Medica, & *Helvi-*
cum, Dietericum in Novo orbe: quibus adde Cor-
nu salutis *Toxita*, & *Carrichterum* de plantis. Inve-
nies & in *Turnheissero* plurima.

MEDI-

MEDICINÆ PRACTICÆ

Generalis, & specialis

LIBER IV.

De Methodo Medendi.

TITULUS I.

De Methodo medendi in genere.



ETHODUS medendi est ars invenien-
di per indicationes auxilia corporis hu-
mani sanabilis.

Tria ergo in ea obveniunt: Indica-
tio nempe, Indicans, & Indicatum.

I. *Indicatio* est methodus inveniendi ex natura
Indicantis indicatum sive juvamentum, quod pro fi-
nis sui assécutione, Indicans expetere deprehendi-
tus. Et hoc de Indicatione habitualiter sumta, ut
nempe est in mente artificis, sumendum est. Si ve-
rò suâ naturâ, ut est in Indicante, consideretur, non-
nisi *ἡσίων* quandam, seu relationem Indicantis ad in-
dicatum, seu signi ad signatum, antecedentis ad con-
sequens indicat; quo respectu, *ἡμερῶς τῆς ἀντοξίας*, à Galeno definitur.

II. *Indicans* est illud, quod per se & suâ naturâ
medicam opem sollicitat, sibi quæ utile quoddam ad
prosequendum bonum expetit, & veram indica-
tionem curativam præstat. Debet autem hoc 1. No-
tum esse intellectui. 2. Esse agens, & instinctu naturæ
suæ ad bonum ferri. 3. Esse in corpore humano. 4. Esse
permanens, ne essentiam suam in fieri habeat. 5. Quâ
unum, non nisi unum indicare, quod per naturam

suam indicet, & quā unum non nisi unam naturam habere possit. Tale, verum & unicum Indicans, nec est Morbus, nec Causa morbi, nec Symptoma, sed corporis sanabilis vires, seu virtus & facultas sanativa in corpore sanabili, eaque activa, quæ naturaliter ad sanitatem, tanquam actum *ἐν τέλει*, & perfectionem suam movetur. *Non Morbus*. Illud enim est primarium Indicans, ad quod omnia referuntur. Eadem conditio finium & Indicantium. At Medicus sanitatis non morbi causa omnia peragit. Indicans est permanens in corpore. At morbus extra suam causam *ὁρίζον* non permanet. Indicanti debetur juvatium, quia sui causa indicat. At morbus non sui causa, sed sanitatis, &c. *Non causa*. Nec enim quaecunque, sed sanativum tantum auxilium quaeritur. Causa, ut corporis humani corruptionem meditatur, sic non nisi ejusdem corruptionem indicare potest. *Non Symptoma*, quia non permanet. *Vires sunt unicum & primarium Indicans*, Nam prius vires sunt consulendæ, quam curationem aggrediaris. Leviores morbi naturæ committuntur; periculosi & ad crisin spectantes non attinguntur; deploratorum nulla est curatio. Vires autem *nec prostrata*, tum namque nihil indicatur; nec *valide*, tum etiam nihil ipsis invium. Sæpe per medium ossis, materiam natura transmittit, & abscessum gignit, pulmonis sanienem per urinam vel alvum deturbat, detenta menstrua per oculos; dentium præsepiola, digitos pedum &c. ejicit: sed *Tirubantes*, quæ auxilium poscunt.

III. *Auxilium*, quod & juvans, utile, *αεσ-φροδον*, conferens, præsidium, & Indicatum dicitur, est id quod tutò, sine metu recidivæ, vel corporis injuriæ, jucundè, citra nauseam & molestiam nimiam, & citò sine procrastinatione, juvare;

juvare, & corpori sanabili conferre debet. De eo nota, 1. Nullum proprio Marte sanitatem reducere, sed beneficio caloris innati, seu ipsius Naturæ, ita ut hæc *κρῆσις* & formaliter id faciat, hic opera succenturiata. 2. Morbo non esse contrarium, si simpliciter & ut Ens talis naturæ sumatur: Contrarium, ut animato corpori adjungitur, & à natura actuatur. non tamen primariò & sua natura, sed obliquè & secundariò; tum quòd non congenitis viribus morbos adoriatur; tum quòd sæpe vomitus vomitu curetur, alvi profluvium fluxu concitatore, tetanus, perfusione aquæ frigidæ; tum denique, quòd morbi ex iisdem ex quibus fiunt, ferè etiam curentur. Lumbrici, pulvere lumbricorum fluxus arteriosi sanguinis guttis aliquot haustis, vel post exsiccationem adpersis. 3. *Vsum* eorundem in debita quantitate, tempore, & loco, modum quidam addunt.

TITULUS II.

De Methodo medendi in specie.

CAPUT I.

De Methodo *αεσθενειν*.

HActenus de Methodo medendi in genere: sequitur methodus in specie, quæ vel est *αεσθενειν*, vel *ἀφαισθενειν*.

Methodus *αεσθενειν* est, quæ quantum viribus natura deest, tantundem supplere, per augmentationem & multiplicationem virtutis docet.

I. *Necessaria* est, quia cum nullus morbus accidat, nisi lapsa facultate: imò, forma aggritudinis

tudinis cuiusque imbecillitate agendi contineatur, consequens est, ut illa redintegrata, forma quoque morbi ad sanitatis habitum revocetur.

II. *Indicans* hic est, principium sanativum; quod nec est *Anima*, quia ista sibi similis, ἀψιχῆς, ἀπληγῆς: nec *Corpus*, quia hoc merè passivè se habet, & indefinitè ad utramque valetudinem; sed *Calidum innatum*, ῥόνικον, δόξηγονον, & ἔμφυτον θερμόν, quod potentiae sanativæ πρῶτον δεικνύει, jure dicitur. Eo sanè partes vivunt & agunt. Ideò ψυχικὴ θερμότης, ἔμφυτον θερμόν Aristoteli, hominis anima quæ semper producitur usque ad mortem Hippocrati dicitur. Hoc μετὰ τὸ ὁδμήσαν totius corporis occupat, & ministeria singula moderatur. Omnes excessus ad Geometricam & naturæ convenientia æquabilitatem revocat: & quia συσχεῖται καὶ συνορᾷ τὰ ὁμόφυλα, πρὸ δ' ἀλλήτερον ἐξέρπει, cruditates omnes maturat, impuritates secernit, siccum cum humido temperat & unit.

III. *Indicatum* hic est aliquid simile & familiare indicanti. Conveniens à conveniente cohæret, à dissentaneo discrepat. Natura naturâ lætatur, eandem amplectitur & fovet. Est autem hoc auxilium, definiente Petraræ, essentia quinta spiritualis, hoc est, tenuissima & subtilissima quædam substantia, media quasi inter formam & materiam, animam & corpus, eaque alia ab elementis & eorum qualitatibus, calore cœlesti perfusa, humidoque primigenio suffulta, multis nobilioribus virtutibus instructa, in prima creatione à Deo unâ cum forma & semine insita, ut sit proprium & proximum formæ receptaculum & instrumentum, per quod individuum, adjuvante temperie qualitatum, in sano statu omniumque functionum integritate conservetur, & species propagetur, &c. Vide eum in Dissertatione inaugurali, & socerum meum Vechnerum in Anathe-

cephala-

cephalæosi typica Therapeutices Catholicæ, cujus vestigia hic premimus.

CAPUT II.

De Methodo ἀφαιρέτικῇ in genere.

Methodus ἀφαιρέτικῇ vel in genere vel in specie consideratur. In genere considerata, docet potentiam sanativam ab impedimentis liberare, & eandem ad actum promovere.

I. *Indicans* hic est, natura corporis sanabilis præpedita & stimulata, à qua causæ & morbi auferendi sunt. Finis est horum ablatio.

II. In *Indicatis*, seu auxiliis auferentibus, *Materia*, *Rationis formalis*, & *Ufus* seu *Administrationis* habenda est ratio.

I. *Ratione materiae* debent esse communiter affectibus opposita, causaliter saltem & effectivè. Ideò tot eorum sunt differentia & genera, quod affectuum præternaturalium, secundor. quor. seriem elegerant, quòd aliquando ostendimus, distinguuntur.

II. *Ratio formalis* auxiliorum ἀφαιρέτικῶν est, quatenus illa virtuti sanativæ ad actum manifestandum conferunt. Optima verò illa sunt, quæ ad naturalem constitutionem quàm proximè accedunt, & calidum innatum juvant, vel illud minimè lædunt, seu quæ secundum naturam subiecto sanabili congruunt. Habenda hic ratio *Virium* & illorum, quæ secundum naturam subiecto sanabili congruunt, & latitudinem juvantis ad certum subiectum & partem affectam restringunt. De *viribus* nota, 1. Non tantum considerandas præsentis, sed etiam quales sint post medicationem futuræ. 2. Robustos validiores Medicinas perferre posse. 3. Vacillantes non sine gravi periculo, quæ multum commovent, perferre, & alimentosa ac balsamica medicamenta reposcere.

scere. 4. Exhaustas, balsamicis refocillari debere. 5. Pressas à copia & ideo invalidas, subitanam & ideo copiosam evacuationem exigere. *Circa subjectum* examinare oportet Nationem, Sexum, Aetatem, Regionem, Aërem, Coeli statum, anni & morborum tempora. Idiosyncrasia, quia multa singularia habet, & singularem, utpote in finitum nulla detur scientia, diligentem, in educationem, parentes, victum, non naturalium usum, morbos, medicamenta, inclinationem naturalem, quæ imaginationem secum trahit, consuetudinem in primis, inquisitionem requirit. *De Parte* observa, 1. Auxilium appropriatum illam requirere, seu tale, quod à proprietate se respiciat, quo & vesicula pertinet. 2. Maximè principes partes ita tractandas, ne resolutis fibris, ac robore intereant. 3. Earundem quoque qualitates & temperies observandas. 4. Nec non situm, connexionem, *ἐνσυννοίαν*, quæ acria respuit, &c.

III. *Ufus* seu Administratio auxiliorum, *quantitate, tempore, & loco* circumscribitur. 1. De *Quantitate* cum queritur, queritur, An parum an multum: Vel, in quo pondere & dosi. *Illud* causæ seu morbi quantitas ostendit. Igitur ad-amussim præcognoscenda, quæ secundum naturam sunt. Tantum exigendum è corpore, quantum exorbitat. Ne quid tamen nimis. Tutius semper esse in dubia proportionem aliquantulum infra æqualitatem subsistere, quàm audendo limites debitos transilire. De hoc sic habet: 1. Quæ altas egere radices, validioribus remediis indigent; quæ *ἐπιπολέες*, leviores. 2. In mitiore malo *ἢ πολὺ* & *ἐλαττωτέρως* agendum; in extremo & periculoso quoque, quia hæc celeriter historiam suam absolvunt, & brevi internecionem adferunt. 3. In mediocribus, Chronicis, sensim & lentè depellendum esse, sed simul videndum, ne, dum ingentem flammam exiguâ aquæ potiuncula

tiuncula restinguere satagimus, eandem excitemus. 11. *Tempus* respicit 1. *ἐννοεῖαν*, de qua nota: 1. Agendum quando cum *εὐφορίᾳ* agi potest. 2. Naturæ motum semper promovendum, nisi periculosus sit. 3. Turgentia, vel eodem die exhaustienda. 4. Circa initia & finem morborum fortiores medicinas exhiberi posse; quia tunc *πάλιν ἀδυνάτεος*: in statu, quia omnia *ἰσχυρότερον*, satius esse quiescere. 5. Coeli constitutiones, id est, tum astrorum *συζυγίας*, ortus occasusque, tum magnas tempor. mutationes in Chronicis præsertim languoribus considerandas esse, &c. 11. *Εὐνοσίῳ*, seu Ordinem in pluralitate agendorum. Hic observa, 1. Disjunctos morbos distincta requirere remedia, postæque vel simul ambos, vel seorsim alterutrum tractari. 2. Connexis & Complicatis, si consentiunt, vel simul, vel seorsim succurrere, ab utrovis incipiendo, posse: si dissentiunt. Contra utrumque modiocritate quadam agi debere, si partim consentiunt, partim dissentiunt ab illo, cuius medicatio alteri si non prodest, tamen nec officit, incipiendum esse. 3. In omnibus affectibus, si sint disjuncti sive conjuncti, præ omnibus tum urgentiæ, tum causæ seu concomitantæ rationem habendam, primumque curandum, tum illud quod urget, tum unde reliqua pendent. *Causæ* seu concomitantæ rationem habent, tum *impedimenta* omnia, sine quorum remotione nulla cura procedit; tum *fomenta*, unde concatenatæ cæteræ læsiones in fieri dependent & producantur. *Vrgere* verò dicitur, quod cætera nocumenta, suâ vel magnitudine & cacoethiâ, vel lædendi vehementiâ & celeritate exsuperat. 111. De *Loco* hæc obveniunt. 1. Sequendam esse Naturæ *πόσιν*, & vasa confertentia. 2. Educendam esse materiam compendiosissimo tramite, per partes ignobiles; meatum naturalem; & vias expeditas & planas. Sed de his Deo volente,

volente, ordinatissimè & accuratissimè in Syntagma-
te nostro agemus.

CAPUT III.

*De Methodo ἀφαιρέτην in specie; & primò
de ἀφαιρέσει Causarum.*

ARTICULUS I.

De ἀφαιρέσει Causarum quantitate peccantium.

Aφαιρέσει Causarum respicit tum humores quanti-
tate, qualitate, motu & loco peccantes; tum i-
psos status: quorum tamen illa, non ita scorsim ex-
actè sumenda sunt, ut non inter se aliquando com-
plicantur.

Αφαιρέσει causarum quantitate peccantium, per
venæ sectionem, frictions, inediam, balnea, hamor-
rhoidas, menses, scarificationem, cucurbitulas, & hi-
rudines absolvitur.

I. Circa Venæ sectionem occurrunt consideranda,
1. *An sit faciendum, nec ne.* 1. *Non secanda est vena,*
1. si vires ab exhaustu, id est, à febribus, morbis lon-
gis, ambientis & rerum quarumlibet irruentium in-
temperie, venenata qualitate, immodica humoris
evacuazione, labore, doloris atrocitate, & animi
pathematibus languescunt. 2. Si ægra est mulier,
& quidem albidior. 3. Si puer, quia dissipabilem
calorem habent. 4. Si æger nimis timidus. 5. Si
morbi summus vigor est, qui crisin excipit. 6. Si
intemperies cruda absque sanguinis vitio affligit, &
aliter corrigi potest. 7. Si crudi succi toto corpore
diffluunt, præsertim si æstivo tempore, stomacho
fracto, corpore molli, febris accesserit. 8. Si cru-
dus frigidusque succus os ventriculi infestat, unde
propter viciniam cordis Cardialgia. 9. Si succi æ-
stivosi in toto corpore abundant, qui spiritus va-
stant,

stant, & ad stomachum delati deliquium pariunt.
10. Si morbi venenati affligunt. 11. Si evacuatio
critica sufficiens fuit. 11. *Secari potest vena,* 1. Si
vires ab oppressione languescunt. 2. Si morbus
magnus est, qui vehementer & paucò tempore cum
fervore sanguinis febrili affligit. 3. Etiam septuage-
nario, modò pulsus emicet, & affectus, ac copia
sanguinis jusserit. 4. Etiam prægnanti, tam primis
mensibus, quàm ultimis, si morbus acutus urgeat.
11. *Quo tempore;* de quo nota. 1. Quorum morbo-
rum causa est plethora, his confestim, quacunque
diei vel noctis horâ venam secandam, priusquam
se in nobilem partem transferat, & vires langueant.
2. In febribus tempore remissionis & intermissionis
agendum. 3. Si morbi magnitudo non urget, præ-
stat manè incidere venam, horam ante vigilantibus.
4. Iteratæ detractionis tempus, si evacuationi stu-
demus, idem dies esse debet. 111. *Quantum;* ubi
1. *Liberalius vena secanda est,* 1. Viribus vividis.
2. Hominibus roseo colore, habitu denso ac fusco,
venis amplis, & quibus antea vena secta est. 3. In
morbo vehemente & magno, cum virium constan-
tiam. licet tum ad animi deliquium mittere, sed
& hoc expectandum non est, sed labascente faciei
colore, pulsu imminuto, sanguine minore cum im-
petu, nisi pinguedo, crassities, vel simile quid ob-
ster, fluente, sistendum. 11. *Parcius mittendus est,*
1. In impura plethora. 2. In Melancholia, quia non
usque aded calida, ut refrigerantia postulet. 3. In
pituitosa, quia impensè frigida, crudior sectâ venâ
redditur. 4. Pueris & senibus, æstate inprimis.
5. Viribus prostratis, & morbo urgente. Tum enim
parienda est.

II. *Frictions, Sudores, & Balnea,* quantitatem
humorum imminuunt: quia calorem excitant, qui
substantiam nostri corporis dissipat & dissolvit.

III. *Inedia*

III. *Inedia* idem facit, quia nil in locum dissipati reponitur, dum alimenta negantur. Quia universum corpus æqualiter evacuat, in universali Caco-chymia adhiberi debet. Quia lenta nimis, in subitanea evacuatione inutilis est. Senes quoque eam melius ferunt, quàm pueri. Homines etiam biliosi & graciles, pares diuturnæ non sunt.

IV. *Hæmorrhoides* externæ ad plethoram minuendam, & affectus renum, uteri dorfi, coxendicis adhibentur. Frictionibus, hirudinibus, foliis ficus, pannis asperis, succo cæpæ, centaurii, &c. aperiendæ sunt. Internæ, ad affectus hypochondriacos, jejcoris, lienis, ac mesenterii, Clysteribus, & suppositoriis acris, referantur.

V. *Menses*, eo tempore, quo per naturam fluunt, movendi.

VI. *Cucurbitula*, in minore sanguinis copia adhibentur. Commodissimus earum in revellendo usus. In ingravidatis brachiis benè affiguntur. Si ratione totius adhibentur, partibus inferioribus; si ratione partis, eidem apponendas esse.

VII. *Scarificatio*, si venæ-sectionis est vicaria, in erubus præcipuè, sed & brachiis, & dorso, instituitur: sic & à capite revellit. Si ratione propria, ad evacuandam materiam malignam & acrem adhibentur: quod etiam in gangræna & callosis sit affectibus.

VIII. *Hirudines*, si totius corporis evacuandi gratiâ apponuntur, magnis & prominentibus in cruribus & brachiis venis apponendæ sunt. In prægnantibus solis brachiis applicantur.

ARTI-

ARTICULUS I.

De ἀφαιρέσει Causarum qualitate peccantium.

PUNCTUM I.

De Alteratione.

Causarum qualitate purgantium ἀφαιρέσεις, consistit in Alteratione, Purgatione, Vomitione, Diuresi, Sudatione.

Alteratio est causarum qualitate peccantium per convenientia remedia temperatio.

Totuplex verò est, quoruplices sunt Causæ seu humores. Itaque

I. *Bilis*, quia caliditate & siccitate peccat, refrigeratione & humectatione indiget; & si simul crassa est, incisione & attenuatione; si tenuis, incrassatione. Medicamenta vide superius. Ad commodiorem verò horum usum notandum, 1. Infusiones in ferventem aquam esse optimas, ita ut decoctio ad tertias fiat. 2. Si fluxus abortus fuerit, acetosis super-sedendum, ne intestina mordeant; Syrupos tamen de Ribes, Berberis, adhiberi posse.

II. *Pituita* quia frigida & humida est, calefactionem & siccationem reposcit: quæ si simul crassa & viscosa, incisione & attenuatione. Medicamenta superius attulimus. De eorum usu hæc nota, 1. A valide calidis in principio abstinendum, ne materia liquata majore motu turgescat, & tenuibus partibus absumentis, crassiores remaneant. Itaque Viridia decoctis imponi debent: in ipsorum defectu frigida siccis admisceri. 2. Valida aperientia in muliere ingravidata cavenda. 3. Quia, ubi pituita molesta est, ibi stomachus languet, iis, qui assueti non sunt, potus actu calidos offerendos. 4. Si viribus integris remedia in distantissima

O

loca

loca transferri debent, cocta aut trita in juscule Guajaci, & cum magna liquoris copia exhibenda esse.

III. *Melancholia*, in qua ab immodico aceti usu temperandum, maxime si materia fuerit ferventior. Nigra enim ab aceto fermentantur, ac majorem acquirunt molem. Quare si illo utendum est, Ferri debet Oxymel, cum decocto Corticum Citri, vel simile quid.

IV. *Si plures inter se misti fuerint humores*, cum illis maxime pugnandum est, quæ vim suam maxime exserunt, aliis non omnino vel intra, vel extra neglectis. Id fiet, si venæ immunes fuerint ab obstructione. Corporis meatus omnes pateant. humores a temperatura non longè secesserint. Viscera nobilia sint affectuum exsortia. In aperientibus Syrupis, hunc servat ordinem Heurnius: 1. Datur Syrupus acetosus, mox de duobus radicibus sine aceto: hinc acetum adjici debet; dein Syrupus de quinque radicibus subsequi, quem Syrupus Byzantinus sine aceto excipiet. Tandem & acetum ipsi immisceri potest.

PUNCTUM II.

De Purgatione.

Purgatio, est humorum qualitate peccantium, concoctorum tamen & preparatorum, ex corpore, per inferiora, per medicamenta purgantia, conveniens educatio.

I. *Humores illi*, vel sunt pauci, vel copiosi; vel febrem faciunt, sive languidam, sive vehementem, vel non: vel vagantur per totum corpus, cum symptomatum vehementia, quod Hippocrati est *ὀξυπύρεξις*, vel non.

II. *Coctio* hic nec illa intelligitur, quæ *πύρεξις* dicitur, & est rei coquenda: in coquentis naturam trans-

transmutatio: nec illa, quæ cruditati opponitur, significanti, vel alimentum in ventriculo, epate, & venis incoctum; vel humores, mediocritatem coctionis prætergressos, ut in bile flava & atra; vel humores frigidos redundare: sed coctionem illam, quæ *pepasini* vocabulo indigitatur, & nihil aliud est, quam humorum in substantia & qualitatibus dissimilium, corruptorum & putridorum, ad similitudinem reductio, & corruptorum ab aliis separatio; quod caloris bonum ab inutili segregantis efficaciam peragitur. Nec tamen necesse est, ut omnes humores concoquantur. Nam *pepasini* sunt expertes segregati à concoctione sanguinis, ut in catarrhis, in colico dolore, piritu, in hydropes aqua; & occultâ qualitate peccantes.

III. *Preparatio humorum* est duplex: 1. *Ad Coctionem*, quæ fit impedimentorum omnium remotione, humorum imminutione, Caloris nativi augmento, & virium refectione. 2. *Ad evacuationem*, quod fit, dum humores ad expulsionem prompti fiunt, viscerum inciduntur, crassi attenuantur: dum viæ liberæ & patentes, clysteribus, jusculis emollientibus, & similibus, redduntur; quod Hippocrati est, corpora *ὀξυπύρεξις*.

IV. *De Medicamentis* hæc observanda sunt. 1. Esse vel moderata, quæ inferiores tantum partes tangunt: vel vehementia, quæ ultra jecur, & in habitum corporis penetrant: esse vel Catholica, quibus omnes humores simul eliciuntur: vel particulari humori dicta; eaque cholagoga, phlegmagoga, melanagoga, hydragoga. 2. Debere esse parti expurgandæ addictæ, & accomodata. Et sanè Capiti agaricus, Cassia pectori, ventriculo & intestinis aloë, jecori Rhabarbarum, lieni senna, Articulis Hermodactyli appropriati sunt. 3. Debere esse & *ὀξυπύρεξις*, ne celeritate alia alia prævertant; & odoratis tenui-

bus permista, ne stomachum evertant, & ut flatus discutiant: non tamen in tanta mole odorata esse debent, ut urinam provocent. 4. Semper aliquid virium exhaustire. 5. Adjumento facultatis expultricis ita agere, ut totam massam sanguineam concurbent, post humores separent, sive aliquid ex ipsorum substantia in venas trahatur, sive tantum vapore emissio subeant.

V. *Convenientia eductionis*, An, Quantum, Quando, & Quomodo, respicit.

I. De *An faciendum sit*, nota. 1. *Non esse purgandum*, 1. Si humorum adest paucitas. 2. Si corpus est sanum & bonæ temperaturæ. 3. Si ægri solo odore purgantur. 4. Si vires sunt per viam resolutionis imbecilles; & tum arteria prona tribus digitis compressa non resilit; vel uno digito remoto, ab alio sequente non sentitur; vel plures sunt pulsus parvi quam magni, plures languidi quam vehementes, plures tardi quam celeres. 5. Si ventriculus imbecillis, quo in casu Clysteres commodi sunt. 6. Si crudorum succorum copia adest, quia torsiones inducuntur, nihil ratione dignum evacuat. 7. Si intestina apostemate laborant. 8. Si præcordia tensa sunt, elata, æstuantia, inflammatione correpta, & urina ignea. 9. Si membrum, à quo purgare intendis, dolore valido molestat. 10. Si alvus constipata est, nec clyster præmissus. 11. *Purgandum est*, 1. Si citra febriæ tormina adsunt, genuum gravitas, & dolor lumborum. 2. Si membro concepta materia mobilis est. 3. Si æger est ægrè vomens, & modicè carnosus. 4. Si ad crisin se natura non convertit. 5. Si superiores conditiones absunt. 111. *Cautè sunt purgandi*, Sani & puri corporis, Otiosi, Continué animo deficientes. Difficiles, Pueri, Senes, Mulieres, qui facile vomunt, Macilenti & rari corporis, Humidi & frigidi temperament.

II. De

II. De *Quanto* nota. 1. Semper potius in parva quam magna dosi purgandum. 2. Partes in regione elvina lenientia, in venosa, mediocriter purgantia, in habitu corporis vehementia exposcere. 3. Vires robustas, exundante humore, medicamentum, quod confertim & tumultuosè educit, prohibere, ne spiritus dissipentur; non ita grassante, contra. 4. Vires ex repletionem imbelles, propter Spirituum inediam, parciorem purgationem erigere, restitibili per *ἐπιπλοσιν* absumto. 5. Vires ex resolutione languidas solam *ἐπιπλοσιν* reposcere. 6. Septimestres prægnantes minus purgandas, ne fœtus gravitate sua à valida agitatione præcipitetur. 7. Senes, quia decursu ætatis, succis benignis sunt exhausti, validiora non ferre. 8. Sed nec pueros: quia crescent, & humidum ipsorum facillimè evaporat. 9. Raræ texturæ homines, si valida purgantia illis admoveantur, infirmitatem occupare. 10. *Gracilium*, quia venas latas habent, facilem esse medicationem. 11. Qui longas habent ribias, facillimè purgari. 12. Dura vitæ assuetos levem pharmaciam aspernari. 13. Melancholicos naturâ, diætâ, vel morbo, quia viribus maximam partem, sine infirmitatis metu valent, corpusque solidum & succi plenum habent, *ἀδυσχερως* purgandos esse. 14. At balbutientes, quia alvi fluxui sunt obnoxii, leviter. 15. Cum solus stomachus affectus est, leniora deberi, ne plus pravorum humorum ad stomachum attrahatur. 16. Majorem humorum copiam, profundiorum situm, copiosioribus vel separatim, vel conjunctim indigere. 17. Ubi pluribus egemus evacuationibus, à mitioribus semper inchoandum esse. 18. Purgantibus efficacioribus tum demum utendum, cum debiliora non satisfaciunt.

III. De *Quando*, seu de *Tempore*, hæc occurrunt.

O 3

I. Præ-

1. Prægnantes non citius debere purgari, quam fœtus moveatur, idque si humor turgat. Puerperas non citius quam tempus elapsum fuerit. 2. In peracutis. Si materia turgat, eodem ipso die purgandum, ob materiæ tenuitatem & fluxilitatem. 3. Tempore paroxysmorum abstinendum medicamenti: tempore remissionis & intermissionis danda esse. 4. In diuturnis morbis, non esse purgandum, priusquam materia attenuetur, & fluxilis reddatur, ac meatus pateant. 5. Tempore æstivo, ante diem; brumali, in die exhibenda medicamenta. 6. Succos qui in motu sunt, vel jam jam movendos, quatiendos esse, ut morbi incrementum prohibeatur, & ne pars nimia succorum mole pessundet, præcaveatur. 7. Sub cane & ante canem non purgandum. Nam externi caloris incendio, flagrantia viscera facile febrem concipiunt.

IV. *Modus*, his nititur regulis. 1. Unicuique humori suum adhiberi debet educens. 2. Vicinis partibus, ut & melancholicis, liquida competunt: in remota, solidis, quæ diutius hærent, agendum. 3. Vomitus, qui interdum oboriri solet, post sumtum pharmacum, corroborantibus ventriculum, vel cucurbitulis umbilico apposis, vel succo granatorum, in illis qui imbecilli sunt ventriculo, & calido epate, sistitur, ne fiat, ovo ad gulam, aut tosto pane ad nares adhibito, impeditur. 4. Nausea linteo aceto madente supra poculum posito, vel ore succo granatorum prius abluto tollitur. 5. Torsionem ventris faciens pharmacum, Clystere subductivo, potioneve decocti mastice, aut aqua tepida, iuvatur. 6. In melancholici prædominio Cararthica cum lenientibus, & humectantibus misceri debent. 7. Purgantia si cum aqua hordei propinata fuerint, propter hujus absterisionem parum aut nihil operantur. 8. Hypercatharsis the-

riacæ

riacæ novâ, aut vetere, cum opii grano uno & altero, tribus vini unciiis permistis, sistitur. Sed & crusta panis aceto macerata, & ventriculo imposita. 9. Æstate cum frigidis medicamenta dari debent. Nam æstivus calor foras evocat succos, quos initio rapit pharmacum. 10. Algor hyemis, quia difficulter humores dimittit, densato corporis habitu; præparantia præmittenda esse, incidentia commiscenda, indicat. 11. Aër cubiculi si nimis caler, propter raptum humoris in peripheriam purgationem sistit. 12. Lenius medicamentum vel paullo ante cibum vel post cibum sumendum est, ne illo in alimentum natura abutatur. 12. Assumpto cathartico quiescendum, ut natura pharmacum amplectatur: tum mediocris motus confert, ut humores fundantur, & expultrix exciteretur. Alii medicamento forti statim indormire jubent, moderato non item. 13. Validius medicamentum incunte purgandi motu, cibis intra tres horas excipiat: validissimum inedia transigatur, quia stimulo non eget. 14. Si non sufficit æger, & inter excernendum fame tanta urgeatur, ut debilitari videatur, hauriat illico à sumptione jusculum aut panem vino madidum. Cæterum sitis finitam purgationem indicat, propter absumptionem aliquam humidi roralis, modò levi catarrho non irritetur, nulla excusatio æstuantis ventriculi adferatur, nec inflammantis pharmaci aut biliosi humoris nullo suspicio oveniat. Excretionem celebrata, brodium pulli cum saccharo ad obluenda intestina dari potest.

PUNCTUM III.

De Diuresi, Vomitione, & Sudatione.

I. *Diuresis est humorum per urinas medicamentis diureticis convenienter exhibitis eductio.*

Convenienter exhibebuntur, 1. Si propinabuntur in illis morbis, qui sensim evacuantur. 2. Si medicamenta diuretica, propriè ita dicta in crassis humoribus, impropriè dicta in crassis & adustis, qui ita fluidiores redduntur, cavendo siccas affectiones, tabem, maniam, &c. exhibeantur. 3. Si non in copiosis, sed primò purgatione imminutis, ne sua crassitie & copiâ, dum ad vias angustas ruunt, eas obstruant. 4. Si medicamenta sceminis dulcia non offerantur, ne ad uterum rapiantur. 2. Si viâ nec sint inflammata, nec exulcerata.

II. Vomitio est humorum medicamentis vomitoriis convenienter datis & applicatis per superiora ejectio.

Humores illi sunt, quicumque tandem biliosi, pituitosi, melancholici, sed illi præcipuè, qui vel in capacitate ventriculi resident, vel in liene, cavis jejunis & pancreate continentur: (quædam vomitio totum corpus evacuat) qui tenues sunt & biliosi, & ad superiora sua spontè feruntur, quod ex amaris ructibus, dolore, morfu, & gravitate præcordiorum percipitur.

Medicamenta vomitoria vomitum concitant, vel quia inclinationem suam sursum habent, vel quia ventriculo quasi innatant & ipsum gravant, vel quia orificium superius ventriculi laxant.

Convenientia præparationis & applicationis requirit, 1. ut dentur gracilibus temperamento & habitu, non morbo, modò vomant ex facili, id est, sint
amplè

amplè pectore, capito firmo, nec hæmoptoici sint, nec rabidi, nec suffusioni oculorum, vel lipothymia, vel uterinis affectibus obnoxii. 2. Ut non facile exhibeantur senibus. 3. Ut æstate, quia tum humores sursum feruntur. 4. Ut sint leviora, quo vehementior morbus; vehementiora, quo à remotiori parte. 5. Ut in febribus nullum oleum sit in usu, propter ventriculi laxationem, cujus robur in febribus servari debet. 6. Ut ante Cibus in tenuibus & biliosis; post cibum in pituitosis, quia tenaciter pituita adhæret, exhibeantur. In specie de Helleboro observandum. Ut corpus sit ab omni febre immune. Ut æger assuescat quasi vomere ad tres, imò & viginti dies, ne evomat nisi cocta materia morbifica. Ut singultus, qui in media vomitione oboriri solet, datâ rutâ cum mulsa, sistatur. Ut convenienti quantitate exhibeatur. Nam minor agitat succos, & naturæ negotium facessit.

III. *Sudatio est humorum per ambitum corporis medicamentis sudorificis convenienter exhibitis expulso.*

De *Medicamentis* notandum. Majoris eos esse tenuitatis, quàm diuretica. Facere id, humores in halitum vertendo, & ad summa corporis detruendo. Frigida, qualitate occulta agere.

Conveniens exhibitio his præceptis nititur. 1. Biliosi difficulter sudationes propter nimiam dissipationem caloris ferunt. 2. Ex cavitatibus ventriculi, intestinorum, uteri, & similibus, incommodè humores ad habitum corporis detruduntur. 3. Vires imbecillæ sudatione magis franguntur. 4. In inveteratis & frigidis affectionibus, ut destillationibus, paralyfi, ischiade, articularum doloribus, maxime sudorifica profunt. 5. Post universalem purgationem in declinatione adhibenda
O 5 sunt

sunt. 6. In pestilentibus morbis potissimum sunt in usu, nec tum vel morbi tempus, vel vires adeo observare opus. 7. Humor evacuandus debet esse vel tenuis natura, vel attenuatus: Materia verò multa sudoriferis tentanda non est, ne ad cutem delata, exigua ejus spiracula occludat, & putredinem vel gignat, vel augeat.

ARTICULUS III.

De aëre & Causarum motu peccantium.

PUNCTUM I.

De Revulsione & Repulsione.

Aër & Causarum motu peccantium, habet sub se Revulsionem, Repulsionem, Derivationem & Interceptionem.

I. Revulsio est materia in aliquam partem fluentis in contrarium conveniens aversio.

I. Aversio ista fit, vel ratione vacui, per venæsectionem, cucurbitulas & hirudines; vel ratione caloris & doloris, per ligaturas dolorificas, frictiones oppositæ partis validas, enemata, glandes, lotionem calidam, & vesicantia.

Dum in Contrarium aversionem esse debere dico, observandum. 1. Debere esse ad partes remotas, ut differat à derivatione, quæ sit ad vicina. Ubi notandum, partes illas præter contrarietatem debere habere rectitudinem, non quidem Mathematicam, sed Naturalem, secundum fibras & filamenta venarum. Et hoc est quod vocatur *rectitudo*, tum ratione fibrarum & venarum, quæ sunt à parte affectâ remotæ, & cum mittente communionem habentes; tum sequendo rectitudinem Diametri & situs in longitudine, latitudine, & altitudine. II. Contrarietatem

rem illam esse, vel respectu totius corporis, ut cum à capite revellimus ad crura, quod fit in revulsione universali, à dextris ad sinistram, ab internis ad externa: Vel in uno membro tantum, ut cum à parte anteriori ad posteriorem, vel vice versâ revellitur, quæ particularis dicitur. III. Debere etiam esse ad principium suum nisi ignoretur. Sic itaque, in inflammatione cruris dexteri sinistrum secatur. Partibus supra claviculas affectis, si morbus jam est, ac irruit materia, vena Cephalica; si futurus, quæ in manu inter pollicem & indicem. Partibus quæ inter repes sunt & claviculas laborantibus, vena basilica; si metus imminet, rami illius inter annularem & medium. Partibus utrisque supra & infra claviculam, vena media. Renes sunt ancipites. Partes infra renes vena poplitea, malleoli, & saphana exonerant.

Conveniens & commoda revulsio erit, 1. Si fiat incipientibus fluxionibus, nisi sint diuturniores. 2. Si per loca commoda ne materia per membrum nobile trahatur. 3. Si dolor affecti loci prius mitigetur, & minor sit tractionis violentia.

II. Repulsio est humoris influentis per medicamentum repellentia conveniens resectio.

Conveniens resectio erit, si attendatur, An, quantum, quando.

De An observa. Non esse adhibendam repulsionem, 1. In partibus nobilibus. 2. Quando fluxio parti principi vicina est, ne materia repulsa ad partes feratur. 3. In partibus nimium in profundo sitis. 4. Materiam malignam & venenatam assilgentem. 5. Eadem crassa & tenace, ne crassior & resolutioni inepta reddatur; in profundo hærente, ut in ilchiadica, ne sanguis ex vicinis & ambientibus musculis, ad convexum in alto situm impellatur. 6. Vulnere venenato à bestia inflictio. 7. Humore exundante & corpore

pore pleno. 8. Humore jam parti impacto. 9. Dolo-
re vehemente præsentē. Nam tum adstringentia
præsertim valida, tunicas exasperando, fuligines
mordaces & humores acutos detinendo, majorem
dolorem inferunt. 10. Naturâ rectē agente, & Cri-
ticē materiam in partem propulsante. 11. Visceri-
bus affectis, ut in apostemate in emunctorio enato,
æc metastasis symptomatica fiat.

De *Quanto* hoc sciatur. 1. Partes tenellas valida
nimis repellentia non ferre. Hinc in oculis lacte mu-
liebri è mammis emulcto, Aqua rosarum cui semen
papaveris interdum incoquitur, medullis pomorum
&c. utimur. 2. In augmento cum discutientibus
repellentia esse miscenda, ne humor indurescat, vel
cutis spiraculis oclufis restagnet. 3. Frigida & hu-
mida adhiberi, cum humor est tenuis, & superfi-
ciem corporis occupat: cum fluxiones ob nimium
partium calorem accidunt, & calor magnus, vel dor-
lor vehemens affligit. 4. Adstringentia in usu esse,
si ob debilitatem partium fluxiones fiunt, nec dolor
ita urget. *Tempus* repulsiois, est morbi initium.

PUNCTUM II.

De Derivatione, & Interceptione.

I. *D*erivatio est humoris parti incumbentis ad
vicinam conveniens averso.

Humor ille ita parti incumbit, ut nondum extra
venas in partis spacia effusus sit, sed in venis flu-
ctuet.

De *Convenientia* hæc nota: 1. Non instruendam
nisi plenitudine primò demta. 2. Tantum esse de-
mendum, quantum vires ferunt & morbus reposcit;
quod ex coloris mutatione in sanguine cognoscitur.
Eo enim usque auferendus est, donec rubicundior
& fla-

& flavior multum, vel pro rubro lividus fluxerit. Pi-
tuitosior enim in toto corpore, in latere à phle-
gmone obsesso, rubicundior erit: rubicundior autem
in eodem, adustus in nigrum mutabitur. 3. Insti-
tuendam esse antequam parti impingatur. 4. Per
venæ sectionem fieri: per errhina, sternutatoria, si
materia sit in Cerebro. 5. Communionem venarum
cum parte affecta observandam. Sic in phrenitide se-
catur vena frontis; in mania, linguæ; in dolore oc-
cipitis, humeris & interscapulis cucurbitæ affligun-
tur. In auribus inflammatione obsessis ac parotidi-
bus, vena sub aure; in gingivarum & maxillarum
calidis affectibus, in labiis, in angina, sub lingua,
venæ duæ. Axillis humerisque inflammatis, ma-
nus venæ; Utero, poplitis; Cruribus, pedum.

II. *Interceptio*, est aditus humorum in ipsa
via ne ad partem pertingant, per medicamenta
conveniens interclusio. *Medicamenta* illa sunt ex
repellentibus. Nec enim interceptio à repulsione
differt, præterquam sola replicatione ad locum.
Repellentia loco inflammato applicantur: inter-
cipientia partibus & viis, per quas humor fertur.
Dicuntur & *Defensivæ*. Suspecta autem sunt in il-
lis pingua & unctuosæ. Nam partes emolliunt, &
si diu hærent, calefaciunt. Ideò melius est pulve-
res interceptantes, cum aqua rosarum & albumine
ovi miscere.

Conveniens erit interclusio, 1. Si interceptientia,
ex carnibus locis, in quibus vasa patentiora, appo-
nantur. 2. Si fortiora in habitu corporis duriori,
ubi vasa ampliora sunt, ærisque status calidior, qui
vias laxat & dilatat, ac affluentis humoris major
impetus. 3. Si mitiora, vel contratio modo se ha-
bentibus, adhibeantur.

ARTICULUS IV.

De ἀφαιρέσει *Causarum loco peccantium.*

PUNCTUM I.

De Emolitione, & Discussione.

Aφαιρέσις *Causarum loco peccantium*, continet *Emolitionem, Discussionem, Suppurationem & Attrahionem.*

I. *Emollio est humoris indurati & crassi per medicamenta malactica alteratio.*

Induratus est humor, vel ex siccitate valida aut blanda; vel ex plenitudine, vel ex congelatione.

Alteratio prioris est per calida moderatè & humida, ne humor in auras vi caloris expiret; *Alterius per laxationem spiraculorum ab aëreo humido: Hujus à calido moderatè sicco.*

Medicamenta exquisitè emollientia, membris principalibus & quæ iis vicina sunt administrata, vitæ periculum adferunt.

II. *Discussio est humoris in parte harentis & emolli per insensilem transpirationem, medicamentorum Diaphoreticorum beneficio, conveniens dissipatio.*

Dicitur *Digestio & Resolutio*. Emollii addidi. Non possunt enim indurata, nisi emolliantur, discuti.

Convenientia Dissipationis requirit. 1. Ut non adhibeatur, nisi evacuato corpore. 2. Ut non in illis, qui habent venas calidas & hepar tale. 3. Ut in statu & declinatione, in augmento cum repellentibus mixta applicentur. 4. Ut nec mordicantia sint, nec vehementer calida, ne pars subtilis evaporet, crassa exsicceetur & petrescat.

PUNCTUM

PUNCTUM II.

De Suppuratione, & Attractione.

I. *Suppuratio est humoris, qui discuti non potest, in pus per medicamenta maturantia conveniens mutatio.*

Convenientia requirit, 1. Ut maximè dum sanguis peccat adhibeatur. Hic enim optimè in pus convertitur: difficilius bilis & melancholia propter degenerationem talem, quæ cancerum & maligna ulcera excitat. 2. Ne in internis partibus temerè. 3. Ne, si in externis usurpatur, circa articulos id fiat. 4. Ne sit nimia, vel fortis, Aliàs membrum ad gangranosam putrefactionem disponetur.

III. *Attractio est materia pertinaciter infixa per medicamenta attrahentia conveniens motio.*

Medicamenta hæc vel sunt Leniora, quæ Rubefacientia dicuntur; vel *validiora*, quæ Vescientia, Crustam inducentia, & Cautifica.

Convenientiæ præcepta respiciunt *Cautifica*, & *Vescientia*. *Ratione illorum* exigit, 1. Ne deveniatur ad cauteria, nisi prius rubefacientibus & vescicantibus tentatis. Aliquid enim naturæ abscindunt. 2. Ut tum fiat cum pars in periculo versatur, ne à mole materiæ putrescat os maximè. 3. Ut si paucâ unctione opus, aneum sit instrumentum; si copiosâ, ferreum. 4. Ut ætatis, virium, & scrophularum ratio habeatur. Nam multi loco ipsarum, venas jugulares offere. *Ratione Vescientium* requiritur, 1. Ut, nec acutis morbis, nec exulceratis partibus externis, nec pulmonum regioni si ulcere afficiuntur, quòd his ulcera efferantur, nec partibus cartilagineis, & carne spoliatis, quod uredine nigrescant, apponantur. 2. Ut postquam caro intumuit, Cicatricosa livefcit, æger dolet, desistatur, ne pars stupeat. 3. Ut antequam

quam imponantur, locus primò ut rubescat fricetur.

ARTICULUS V.

De æquælibris flatuum, seu Carminatione.

CArminatio, est flatuum, per medicamenta carminativa, in corpore humano, conveniens dissipatio.

Ut conveniens sit dissipatio, Non debent medicamenta flatus discutientia admoveri, nisi imminuta materiâ. Aliàs, majores flatus ob rarefactionem materiæ excitabuntur.



MEDI-

MEDICINÆ PRACTICÆ

Generalis, & specialis

LIBER V.

De æquælibris morborum.

TITULUS I.

De Morbis partium similiarum, & eorum curatione.

CAPUT I.

De Methodo intemperiei sine materia.

INTUM de Methodo Causarum æquælibris, quæ separatim à Causarum ipsarum deductione tractari debebat: sequitur Methodus morborum generalis æquælibris, quæ necessariò cum primis morborum differentiis combinatim tractari debet; cum non tantum ipsos affectus, sed & affectuum causas, signa, & differentias complectatur.

Primariæ itaque & essentielles morborum differentię sunt, quibus Morbi distinguuntur in *Morbos Partium similiarum, Partium Organicarum, & Vtriusque communes.*

Morbi partium similiarum vel sunt *Intemperiei, vel occultarum qualitatum.* Intemperies vel est *absque materiâ, vel cum materiâ.*

Intemperies absque materiâ, est temperamenti in corpore humano à naturali sua constitutione per suas causas inducta declinatio.

P

Tempe-

Temperamentum intellige non *ad pondus*, in quo ea est qualitas proportio, ut æquis omnibus viribus concurrant: sed *ad justitiam*, in qua quædam est qualitas in viribus inæqualitas; sed ea tamen actionibus peculiaribus sui generis conveniens est. 2. Intellige temperamentum tum *simplex*, tum *compositum*. 3. Temperamentum corporis humani, non tantum quatenus *mistum* est: sed etiam, idque præcipuè, quatenus *vivens*, sive *insitum* illud sit, sive influens.

Signa ex Differentiis desumuntur.

Causæ sunt, Externæ præsertim; de quibus ibidem.

Curatio fit Alteratione, si intemperiem ipsam præcisè spectes, sed non diu iste morbus absque materia persistit.

Dividitur in quatuor Species.

I. Alia est *Calida*, in qua calor exsuperat. *Cognoscitur* ex illis, quæ calorem exaltare, vel eundem insequi possunt. *Oritur* à quinque præcipuè, nempe Motu animi & corporis, Putredine, Vicinia rei calidæ, Eiusdem permissione, & Corporis constipatione. *Curatur* Medicamentis refrigerantibus, sive simplicibus sive compositis, sive *intus assumtis*, sive *extra applicatis*. Ubi notandum, 1. Facillimas esse ad curandum alterationes, quæ ex calido & frigido consistunt. 2. Morbum calidum in corpore natura frigidore valentioribus expugnandum remediis. 3. Frigida medicamenta quatuor gradus habere.

II. Alia est *Frigida*, in qua frigus excedit. *Cognoscitur* ex causis frigus inducentibus, & Symptomatibus idem insequentibus. *Oritur* ab illis, quæ vel propriâ vi refrigerant; vel calorem innatum suffocant; vel obstruunt, vel dissipant, vel ei pabulum subtrahunt. *Curatio* instituitur per medicamenta calida primò benigniora, post fortiora. Medicamenta vide in Institutionibus.

III. Alia

III. Alia est *Humida*, quando humiditas vincit. *Cognoscitur* ex antecedentibus & consequentibus. *Oritur* à vicinia humidorum, & quæ humidorum effluviis transpirationem impediunt. *Curatur* per Medicamenta siccantia.

IV. Alia est *Sicca*, in qua Siccitas prævalet. *Cognoscitur* ex iisdem fontibus. *Oritur* à contrariis causis, nempe alteratione exsiccantium, & nimia resolutione ac paucitate alimenti. *Curatur* per Humectantia.

V. Alia *Composita*, id est vel calida & sicca, vel calida & humida: vel frigida & sicca, vel frigida & humida. De ea non est quod multa dicamus. Facile enim, quid sit, & quomodo curari debeat, ex simplicibus colligi potest.

CAPUT II.

De Morbo intemperiei cum materia.

Intemperies materialis est temperamenti naturalis in corpore humano ad præternaturalem, propter materia præsentiam, deviatio.

Signa Differentiæ insequentibus dabunt.

Causa est Humor præternaturalis, illeque 1. Vel *Congestus sensim*, seu ob partis imbecillitatem, seu ob alimenti vitium. 2. Vel *Affluens*, seu ob attractionem: seu ob transmissionem vel à toto corpore, vel à partibus aliquibus.

Curatio perficitur 1. *Alteratione* per contraria, si morbus spectetur. II. *Evacuatione*, si causa; idque per sanguinis missionem, si Plethora peccat: per Purgationem, si Cacoehymia: per sudorem, si materia ad cutem vergit: per vomitum, si ad superiora: per Diuresin, si ad vias urinæ. III. *Diaeta opposita*.

Dividitur in tot intemperies, quot materialis.

I. Alia est à *Sanguine* seu *Plethora*, quando humores alendo corpori destinati exundant, &c. *Cognoscitur* ex lassitudine, &c. *Oritur* à bono alimento, &c. *Curatur*

P 2

I. Venæ

I. *Vena sectione.* II. *Alteratione* per refrigerantia & humectantia, hepatis præsertim appropriata. Dividitur dupliciter. I. Alia est à *Plethora exquisita*, cui præcedentia omnia conveniunt. Alia à *Plethora notha*, in qua Curatio etiam purgatione opus habet. 2. Alia est à *Plethora ad Vasa*. Alia à *plethora ad vires*: de quibus superius.

II. Alia est à Bile excrementitia, quæ calida & sicca. *Curatur difficulter*, si est à flava bile. *Nunquam ferè*, si à porracea, vitellinâ vel æruginosâ; &c. *Perficitur curatio*, I. *Alteratione* per medicamenta refrigerantia & humectantia, & si sit nimis tenuis, incraissantia; si crassa, incidentia. Inter illa obtinent palmam, *caules Lactuca Italica, flores Nymphae, Portulaca, plantago, Tamarindi, Iujuba, papaver erraticum*. Inter hæc *Cichorii & Taraxaci radices, Accosâ*, & quæ ex illis parari possunt, *Spiritus vitrioli, salis*. 2. *Evacuatione*, seu per venæsectionem, quando bilis cum sanguine permiscetur, vel per purgationem *Cholagogis* per inferiora institutam. *Cholagoga* præcipua sunt, *Rhabarbarum*, quod nec solum, quia fumosum, nec stranguriâ affectis dandum; *Tamarindi Aloë rosata*, quæ in pillulis duntaxat sumitur. *Syrupus florum Acacia, Rosarum solutivus* prægnantibus non exhibendus, *Pillula Ruffi, Aquapendentis, Bejeri benedicta, &c.* 3. *Diatâ refrigerante & humectante*.

III. Alia est à *Pituita præternaturali*, quæ frigida & humida. *Curatur*, I. *Alteratione* per medicamenta calida & sicca, attenuantia & incidentia. ubi nota, A validè calidis in principio abstinendum, ne materia liquata majore motu turgescat, & tenuioribus partibus absumentis crassiores remaneant. Valida aperientia in muliere gravida caveantur. Validissima sunt *Lignum guajacum, Radix China, Sassafras, Salsaparilla, & Oxytel scilliticum*. Vtui decocto-

rum

rum stomachica calefacientia, quia ventriculus nimis pituitâ languet, interponenda sunt. I. *Evacuatione* per Medicamenta *phlegmagoga*. Præcipua sunt ex mediocribus, *Mechoacanna*, ex qua morbelli quoque fiunt, in forma pulveris felicissimè operatur; *semen Carthami, & Agaricus trochiscatus*. Ex fortioribus *jalapa* radix cum cremore Tartari exhibitâ, *Syrupus diacolocynthidos Freitagii, Pillula de sagapeno*, Horstii Observ. T. I. p. 295. *Spiritus aureus Rulandi*. De colocynthidis singulari maceratione, vide *Freitagium* in aurora Medicor. III. Venæ sectione, sed ne calor à phlegmate oppressus dissipetur; & ut plethora addit. IV. Diætâ calefaciente & siccante, Aer sit calidus & siccus, Cibi aromatibus condiantur, Vinum sit generosum purgato corpore. Capparum cum aceto & passulis frequens usus.

IV. Alia à *melancholia præternaturali*, seu crassa seu diluta, seu in atrum succum degenerante. *Curatur*, I. *Alteratione* per Calefacientia & siccantia, modò atra bilis non sit. Laudantur, *Radices Eryngii, Glycyrrhizæ, Herbæ scolopendr. Melissa, Cuscuta, Flores borragin. Tamarisci, Cappar. Cordiales. Syrupus pomor. redolentium, &c.* Acetum vitetur; quod si illo utendum, *Oxymel* cum decocto *Corticum Citriorum* offerri debet. II. *Evacuatione* per *Melanagoga*. Præcipua sunt, *Polypodium, Senna, Extract. Ellebori nigri*: de quo vide *Heurnium* in Methodo, & *Codronchum* in speciali tractatu. *Diatâ* calefaciente & humectante. Aer decocto malvæ & violarum temperetur, cibi sint potius elixi, ova forbilia, Carnes gallinacæ, vitulina, perdicum, passulæ minores, balnea aquæ dulcis temperata, &c.

V. Alia est à *Sero*, seu aquosâ tenui & salâ, copiâ & qualitate corpus humanum afficiente humiditate. *Curatur Evacuatione*, per *hydragoga, Sudorifera, & Diuretica, &c.* *Hydragoga* præcipua sunt, ex mediocribus,

eribus *summitates sambuci* primum erumpentes, len-
to calore exsiccatae. *Acinorum sambuci* Emulsio,
Radix iridis. Ex validioribus *Gummi gotte*; de quo
vide *Reudenium*, in peculiari tractatu. *Ialapa*. *Extra-*
ctum Elaterii. *Conserva esulae Bejeri*, *Pillula de Sa-*
gapeno Camilli apud Quercet. in pharmacop. resti-
tuta. *Sudorifera* primaria sunt. *Spiritus Ebuli*, *Sam-*
buci, *Sal Centaurii minoris*, *Absinthii*, *Fraxini*,
Scabiosae, *Cornu cervi* præpar. *Antimonium Dia-*
phoreticum. *Bezoardicum Ioviale*. Inter Diuretica Li-
quor & Syrupus. *Diureticus Rivii* in Renod. phar-
macop. sal *urinae*, *succini*, *fabarum*, apud Hartman.
Spiritus salis, *Liquor ex Tartari vitriol. scrup. f.* Cum
aquæ *Cinnamomi* unc. f. & *Iulepi rosati* unc. ij, com-
positus. v. r. Alia est *Composita*, ab uno & altero ho-
rum inter se commixtis. In *Curatione* ita agendum
est, ut cum illis maximè pugnemus, quæ vim suam
maximè exserunt, cæteris nec intra nec extra negle-
ctis. Id fiet, si venæ immunes fuerint ab obstructio-
ne, corporis omnes meatus pateant, humores à tem-
peratura non longè secesserint, viscera nobilia sint
affectuum exortia. Habent hic locum *Panchymago-*
ga *Paracelsi*, *Crollii*, *Pillula imperiales* *Fernelii*.

CAPUT III.

De Morbis occultarum qualitatum.

Morbus occultarum qualitatum est morbus à
causis maligna & venenata vi, nec ad quali-
tates manifestas referendâ, agentibus, exortus.

Signa sunt, morbi symptomata rara, magna, in a-
liis non obvia: præcessit aliqua suspicio, vel summi
gradus putredinis in corpore exorti, aut aëris infe-
cti, aut contagii: vel veneni seu sumti, seu extra
communicati.

Causa est varia, prout in Differentiis explicabitur.

Curationis eventus sumitur ex causæ magnitudi-
ne,

ne, partis affectæ nobilitate, Symptomatum vehe-
mentia, & multorum mortib. *Instituitur* 1. Per *Vene-*
ni sublationem, quæ pro ratione differentiarum variat.
II. Per *Alexipharmaca*, tum communia, tum cuique
parti appropriata; ubi tamen nec manifestarum qua-
litarum est obliviscendum. Probatissimum est *Ele-*
ctuarium ex radic. Imperatorie. Angel. odorat. Gen-
ziana, Carline ana manip. II. *Terra sigillata* unc.
vi. *Myrrha* unc. i. *Theriaca Andromachi* unc. iv. *Roris-*
marini, Ruta ana manip. i. *Aristolochie* libr. 3. *bac-*
carum lauri manip. i. mellis virginei desumpti triplo
confectum.

Differentia sumuntur à Causis.

I. Alii sunt ab humoribus internis.

II. Alii ab aëre infecto. *Curatio* consistit in *Aëris*
talis præcautione. Infecti pro ratione causæ *purifica-*
tione. *Alexipharmacorum*, quibus cor muniatur, &
per sudores malignitas pellatur, adhibitione.

III. Alii sunt ab *Aqua*. Sunt enim fontes qui-
dam metallici, venenati vel à natura, vel aliunde,
sed & potus aquæ multis hydropem intulit, & a-
quæ vitio *Scorbutus* inducitur. Fugiendi sunt tales
fontes: Aquæ verò vitiosæ corrigendæ, coctione,
colatione, polentræ vel alii injectione, &c.

IV. Alii à Contagio.

V. Alii à *Venis*, quorum *Curatio dubia spei*, si præ-
sentaneum venenum sumtum: & si in magna copiâ.
Nullius ferè, si nec per vomitum, nec per alvum, nec
per sudores expelli potest. *Respicit* 1. *Expulsionem* per
Alexipharmaca, quæ pro ratione veneni variant. 2. *E-*
vacuationem, per vomitum præsertim, ut facilius Me-
dicamentâ illa ad cor penetrare possint. 3. *Somni pro-*
hibitionem, ne ad cor & interiora facillimè penetret.
Differentia sunt plures. 1. *Alia* sunt *venena* intrò sum-
ta, quæ curantur vomitu leniore ex pinguioribus pa-
rato. *Purgatione*, si in intestinis superioribus hæreat.

Diuresi, si ad vias urinæ pergat: & nullibi Alexipharmacor. obliviscendum. *Diaeta*, in qua lac vehementer laudatur. *Alia Extra applicata*, quorum *Curatio* respicit *Extractionem*, tum per medicamenta attrahentia, tum per illa quæ similitudine quadam id faciunt; quæ continuanda, donec vitiosus color, dolor, & Symptomata cessaverint. *Interceptionem*, quæ injecto loco superiori vinculo optimè perficitur. *Alexipharmacorum usum*, si venenum in corpus penetravit; prout superius dictum est.

TITULUS II.

De Morbis organicis.

CAPUT I.

De Morbis confirmationis.

Morbus Organicus est partium corporis humani à structura naturali deviatio.

Quia verò ad illam *Conformatio*, *Numerus*, *Situs*, & *Connexio* requiruntur; tot etiam morborum organicorum erunt differentiae, & huic Titulo quatuor subijciuntur Capita: sed & quia in *Conformatione* tria reperiuntur, *Figura* nempe, *Cavitas*, & *superficies*, dabuntur etiam tot morbi.

ARTICULUS I.

De Morbis Figuræ.

Morbus figura est partium corporis humani à naturali figura, ex causis suis dependens deviatio.

Signa sunt conspicua, ita ut non sit necesse de illis dicere. *Causæ* sunt, quæcunque figuram vel componendo, vel laxando, vel distorquendo, vel exhauriendo violare possunt.

Curatio non est difficilis in iis, qui ob ossium humilitatem

miditatem crescunt. *Vix tentanda* in adultis, in quibus ossa, propter quorum figuram partes externæ talem figuram habent, duritiem & siccitatem majorem contraxere. *Perficitur* I. *Ἀπὸ χειρῶν*, manibus contrectando & in oppositum ducendo. 2. *ἐπιθεσίᾳ*, per fascias & ferulas. *Potest repeti*, si prior non successit, si insignis est læsio & æger validus; & quidem per calli ruptionem præmissis emollientibus. *Non debet repeti*, si æger senex, læsio minor, & callus durus.

Differentia à tempore deviationis sumuntur.

I. Vel sit *ante natiuitatem* in utero, & tum in Conformatrice est vitium, difficulter curatur.

II. Vel *in partu*: & tum, aut infans nimis magnus fuit, aut uteri orificium nimis angustum.

III. Vel *post natiuitatem*: ubi sunt præcipuè in causa, *Nimia repletio*, quæ inanitione curanda. *Alimenti defectus*, qui facilis coctionis, boni succi, pauci excrementi cibos reposcit. Vide caput de Atrophia. *Motus violentus*, seu ab ipso homine, seu ab artifice causatus, ubi ossium fracturæ præcipuè obveniunt. *Partis in aliam partem ob nervorum seu resolutionem, seu convulsionem declinatio*, ubi ad ipsum nervorum affectum respiciendum.

ARTICULUS II.

De Morbis cavitatum.

PUNCTUM I.

De Morbis cavitatum in excessu.

Morbi cavitatum sunt, in quibus naturales partium meatus laeduntur. Cavitatum nomine intelligitur, tum venter seu magna cavitas, ventriculi nempe, cerebri, cordis, uteri: tum meatus venarum, arte-

arteriarum, Ureterum, &c. tum orificium, seu caput vasorum & cavitatum quarumcunque.

Quia verò cavitates vel in *excessu*, vel in *defectu* læduntur; morbi etiam cavitatum, vel in *excessu*, vel in *defectu* erunt.

Morbi cavitatum in excessu sunt, cum cavitates sunt majores, quam per naturam esse debebant.

Signa in particularibus ponentur.

Causa est quicquid cavitates vel aperire, vel distendere, vel erodere, & dividere potest.

Curatio perficitur *Occlusionem*.

Dividuntur in *Anastomosin*, *Diapedesin*, & *Diarefin*.

I. *Αναστόμωσις* est quando oscula vasorum nimium aperiuntur & dilatantur. *Cognoscitur* per effluviū humoris vel materiæ, quæ contineri debebat copiosius. *Oritur* ab illis, quæ laxare vel distendere possunt, sive illa sint externa, sive interna. *Curatio*, occlusionem per Medicamenta adstringentia, de quibus suo loco, & causas respicit. Præcipua adstringentia sunt. Folia *burse pastoris*, semina *portulacæ*, flores *balaustii*, bellidis minoris, *bolus Armenus*, succus *prunorum sylvestrium*, *Theriaca recens*, pulvis *ossium humanorum*, *Crocus Martis*, &c. Quantum ad *Differentias*, 1. Vel est ab externa causa, ut Medicamentis *ἀναστομωτικῆς* vel *χαλαρωτικῆς*; tum causæ præcessere. Removendæ sunt. 2. Vel à copia humorum, sanguinis præsertim, facultatem onerante; & tum signa humorum adsunt. Venæ sectione & purgatione agendum. 3. Vel à qualitate humorum facultatem irritante; & tum signa eorundem sunt præsentia. Evacuationibus præmissis, adstringendum.

II. *Διαρρηξις* est, quando vasa dividuntur. *Cognoscitur* per effluviū materiæ cum dolore copiosum. *Oritur* à causis, quæ erodere, distendere, vel rumpe-

rumpere possunt. *Curatio* unionem per adstringentia Medicamenta reposcit. *Differentia* sumuntur à Causis. 1. Vel est ab *Externis*, motu nempe vehementi, pondere gravi, clamore, saltu, contusione, vulnere, Medicamentis acribus & crassis. 2. Vel ab *humoribus acribus*, tum signa humoris biliosi vel falsi adsunt. *Curatio*, alteratione per medicamenta refrigerantia & acridinem obrundentia; Evacuatione per cholagoga, & hydragoga, &c. & Dieta refrigerante & demulcente perficitur. 3. Vel ab *humoribus copiosis*, ubi curationis eadem quæ in anastomosi ratio. 4. Vel à *Flatibus*, & tum signa flatuum absunt; nempe, tensio sine gravitate, dolor vagus, prægressus causarum generantium, subitaneus affectus exortus, urinæ bullositas, &c. *Causa* sunt cibus multus & humidus, calor imbecillis, qui materiam digerere non potest. *Curatio* reposcit Evacuationem causæ. Dispulsiōnem flatuum per medicamenta carminativa. Laudantur interea, succinum album, *Theriaca* & *Mithridatium annosa*, confectio *baccarum lauri*, *Conserva salvie*, spiritus *Therebinth*. *Diacorum nobile*, Oleum *feniculi*, *anisi*, pulvis *corticum citri*, &c.

III. *Ἀγ. πιδνωσις*, quando vasa rarefunt. *Cognoscitur*, ab humorum exudatione, minus copiosa, *Oritur* à causis rarefacientibus & humectantibus. *Curatio* causas respicit.

PUNCTUM I.

De Morbis cavitatum in defectu.

Morbi cavitatum in defectu sunt, quando cavitates angustiores, quam par erat, redduntur.

Signa in particularibus occurrent.

Causa angustiae sunt, *Obstructio*, *constipatio*, *coale-*

coalescentia, compressio, subsidientia, de quibus in differentiis.

Curatio Angustiae remotionem requirit, quæ pro varietate differentiarum variat.

Differentias quod spectat, quinque sub iis continentur.

I. *Obstructio*, quæ nihil aliud est, quàm *meatum ab humoribus vel aliis rebus occlusio*. Oritur ab humoribus, rebus toto genere præter naturam, &c. *Curatur*, per medicamentorum deobstruentium convenientem applicationem. *Dividitur* pro ratione causarum. 1. Alia est ab *Humoribus multis*; & tum Diæta in causa. *Ἀποκρίσις* inservit; illaque, si humores multi, magna, rationem locorum habens. Ex thorace tussis, ex ventre superiore vomitu, ex inferiore alvi subductione, perficitur. 2. Alia ab *Humoribus crassis & viscidis*; & tum abstergendum, incidendum, & attenuandum: absterfio interdum, si cavitas patens sola sufficit. Medicamenta esse debent *vehementiora*, in maiore visciditate, remotiore loco; *mitiora*, si contrarium est, utrobique partibus appropriata. 3. Alia à *Calculo, Vermibus, Purre, Facibus*, de quibus suo loco videbimus: & tum, *παντελὴ κενώσις* agendum; sive una vice, sive pluribus. Locorum ratio, in quibus humores hærent, habenda. 4. Alia à *grumo sanguinis*, tum Medicamentis sanguinem dissolventibus, ut sunt, Magist. oculorum cancri, pulv. Rhabarbari, Tormentilla, *Sperma ceti* non rancidum, &c. agendum. Medicamenta incidentia & deobstruentia supra l. 3. habes. præcipua in particularium obstructionum cura ponentur.

II. *Conspicatio*, quando *meatus à carne vel tumore in cavitate enatis occluditur*. Oritur à Caruncula, membrana, inflammatione, tunica, tuberculo, quod concoquendum. *Curatio* absorptionem & materiæ evacuationem poscit.

III. *Con-*

III. *Coalescentia*, quando *meatus parietes post ulcus vel vulnus cœunt*. Oritur à carne cavitati adnata, cicatrice, &c. *Curatio* Rruptionem requirit.

IV. *Compressio*, quando *meatus à causis extrinsecutis incidentibus, & parietes ejus impellentibus, occluduntur*. Oritur, vel ab *Externis*, ut frigore & siccantibus, ubi laxantia & humectantia profunt: vel à *Tumoribus* vel ossibus, sedibus suis motis. *Curatio* remotionem illorum requirit, & diversitatem causarum respicit.

V. *Subsidentia*, quando *meatus ob parietum laxitatem & conniventiam coarctantur*. Oritur ab humiditate nimia. *Curatur* siccantibus.

ARTICULUS III.

De morbis superficiali.

Morbi superficiali sunt, quando partes in qualitatibus secundis à naturali sua constitutione declinant.

Præcipui inter ipsos sunt, *Asperitas, & Levitas*.

I. *Asperitas est levitatis debita inesse carentia*. Fit vel per *additionem superficiali* in partibus solidioribus, ut in fracturis squammæ quædam exstant; & tum *abrasione* per medicamenta abstergentia opus est: vel per *ademptionem*, & tum res acres tam *externæ*, vapores, venti, fumi, cibi, medicamenta venenata, quàm *internæ*, siccitas nimia partium post humiditatis absorptionem, bilis amara, pituita salsa, &c. peccant. In *Curatione* replendum, quod excavatum erat, humorum acrimonia temperanda, quæ nondum exasperata sunt, defendenda. Medicamentis humidis & lentorem habentibus agendum.

II. *Levitas est asperitatis debita inesse defectus*. Oritur ab humoribus lentis. *Curatur* medicamentis

mentis abstergentibus , quæ simul adstrictionis aliquid habent , ut tonus fibrarum restauretur ; & spacia in partis superficie , ab humoribus dilatata , rursus contrahantur.

CAPUT II.

De morbis Numeri.

Morbus numeri est , cum in numero partium est vitium.

Dividitur in morbum numeri in defectu , & excessu.

I. Morbus numeri in defectu est , quando pars , quæ naturaliter adesse debebat , abest. Pars illa vel est sanguinea , vel spermatica , quæ eadem specie non regeneratur : vel simplex , vel composita ; nec debet esse partis particula , sed pars integra. Causa est , quicquid vel efficienter , vel privatione materiæ , partis carentiam inferre potest. Curatio indicat Restitutionem , quæ à sola natura fit ; Medico interim , robur naturæ , calorem nativum servando tuente ; materiam idoneam , id est , sanguinem subministrante ; & impedimenta , id est , sordes & similia removente. Quantum ad Differentias. Vel illud vitium est ab ortu , seu ex defectu materiæ ad generationem necessariæ ; seu ex imbecillitate facultatis naturalis , quæ materiam attrahere , retinere , & elaborare debet ; & sic restitui non potest. Vel post Ortum : sectione , erosionem , putredine , refrigeratione ; & tum Curatio ad suas causas dirigenda.

II. Morbus numeri in excessu est , quando res , quæ naturaliter non debebat adesse , adest. Curatio Remotionem requirit , quæ pro rerum , quæ remouentur , varietate varia ita institui debet , ne partes aliæ lædantur , vel ut quàm minimum lædantur. non extendenda ad illa , quæ hominî molestiam non

creant.

creant. Differentias si spectes , Res illa vel est toto genere præter naturam , ut Calculi , vermes , &c. & tum Curatio ad illa obvertenda : vel substantia aliqua integra , quæ aut ob materiæ nimiam copiam , & conformatricis imbecillitatem in ortu ; aut ob vitiosam qualitatem post ortum , exoritur. In his Remotio fit per Ignem , quo cauteria actualia pertinent. Ferrum , quo spectant omnis generis acuta instrumenta. Medicamenta , cathartica , vesicatoria , &c. de quibus suo loco in particularibus morbis dicitur. Emplastrum vesicatorium , quod componitur ex Cantharidum unc. j. Terebinth. unc. ss. Olibani , Myrrhe , Mastich. Camphora ana dr. j. Ol. rosar. Cera , ana. q. f. laudatissimum est.

CAPUT III.

De Morbis Magnitudinis.

ARTICULUS I.

De Tumoribus.

Morbus magnitudinis est partium corporis humani à magnitudine sua naturali , deviatio.

Dividitur in morbum magnitudinis auctæ , seu Tumorem , & magnitudinis imminutæ.

Tumor in genere est partium corporis humani à naturali statu aucta magnitudine recessus.

Signa non est quod apponantur. Nam si extra accidit , visu percipitur : si intra , vel externo aliquo signo se prodit ; vel aliis internis , de quibus in specialibus. Accedunt ad magnitudinis augmentum interdum , Intemperies , si materia in qualitatibus excedit , & easdem partibus largitur. Vnitatis solutio , si rodendo vel distendendo continuum solvatur. Conformationis vitia , si vel

si vel figura corrumpatur, vel cavitates comprimantur, aut obstruantur.

Causa sunt *Humores*, *Flatus*, *Substantia solida*: de quibus in suis differentiis agemus.

Curatio indicat imminutionem, quæ, si pars non est *salva*, per eadem Medicamenta, quæ in numero abundante conveniunt, perficitur: si *salva*, sit per alimentum subtractionem, digestionem, discussionem, &c.

Differentia sunt variae.

I. Alius est ab *Humoribus*, qui cognoscitur ex signis humorum; *Oritur*, à sanguine, bile, pituita, melancholia, seroso humore, si ve congesti sint, si ve affluerint; si ve peculiari membrana includantur, si ve non. *Curatur* & quidem *difficulter*, si subito imminuitur, nec per vias convenientes evacuat, si febris excitatur; quæ adfuit, augetur. *Curatio* pro ratione Differentiarum variat. *Dividitur* variè. Nam I. Vel est ab *Humoribus in parte congestis*; partim partis vitio, quatenus vel concoctrix vel expultrix suum officium non faciunt; partim alimenti, cum illud vitiosum & tale, ut à parte vinci non possit, & tantam excrementorum copiam faciat. Et *tum*, longiore temporis tractu tumor generatur: non aded magnum spacium occupat, nulla fluxionis causa aut signum præcessit. In *Curatione* respicienda *Alteratio* & *Evacuatio*, & hæc *sensilis*, si materia est copiosior, pars densior; *insensilis*, si materia minor, pars mollior. De *Congestione* verò *humorum nota*, 1. Materiam quæ in cavitatibus communibus acervatur, adauctam ut diutius retineri non possit, ad cavitates & poros loci particulares refundi. 2. Non tantum crassos & lentos humores. Sed & ichores ex crassis humoribus, præsertim cum extra locum proprium refrixerint, deduci & adhærere. 3. A spirituosâ quoque materia, unde debilitata ex icu pars perpetuo aliquando inflata manet, profi-

proficisci posse. 4. Humores etiam putres congeri, unde tubercula in ulceribus exsurgunt. 2. Vel est ab *humoribus allapsis*, seu per attractionem ob calorem vel dolorem; seu per transmissionem vel à toto corpore, vel partibus aliquibus. *Tum*, signa sunt congestioni contraria. Nullus in parte dolor fuit, si per transmissionem; fuit, si per affluxum contingit. In *Curatione* respiciendum, tum ad *Affluxum duxantem*, & tumorem fientem, ubi locum habet *Evacuatio*, seu per venæ sectionem, seu purgationem. *Revulsio* ad contraria. *Derivatio* ad vicina, *Repulsio*, *Interceptio*, &c. tum ad *Affluxum factum*, ubi obtinent eadem, nisi materia sit impacta, quæ *emolliri* & *maturari* debet. 3. Vel ab *humoribus peculiari membranâ & folliculo inclusis*, ubi humor in aliam ferè substantiam vertitur. 4. Vel ab *humoribus malignis*, ubi signa malignitatis adfunt.

II. Alius est à *Flatibus*, qui *Cognoscitur* ex eo, quod nulla gravitas sentiat, etsi interdum dolor sit; & pars modo in maiorem, modo in minorem molem atrollatur. *Oritur* à causis flatum generantibus, cumulanturque flatu vel sub cute & circa membranas musculorum, in ipsis. similium poris atque interpositis similaribus spatiolis: vel in membranis viscerum; vel in viscerum cavitatibus. *Curatur* & quidem *difficulter*, si in musculis detineatur, quod in omnes ipsius partes spiritus dispergatur, constringatur, & ab ambientibus membranis intercludatur. *Curatur* tamen per *Evacuationem* materiae, *Discussionem* ejusdem, & *Roborationem* partis.

III. Alius à *partibus solidis*, seu illæ Ossa cum extra suum locum in alium procidunt; seu partes molles suo loco motæ; seu arteriæ, seu venæ: de quibus suis locis agemus.

IV. Alius,

IV. Alius, qui *terminatur per diffusionem* ἀνάλων; & tum materia nec est multa, nec crassa; nec profundo loco sita, nec sub crassa & densa cute conclusa. Corpus non est impurum. Natura est fortis: membrum levius evadit: pulsatio molesta cessat.

V. Alius, qui *per suppurationem*; & tum Materia est copiosior, crassior; loco profundiore sub cute densa latens; dum pus sit dolor & palpitatio in parte cum febre affligit, postquam pus factum est, calor imminuitur, dolor sedatur, tumor in mucronem elevari, mollescere & albescere incipit, pus sub digito, nisi pars sit crassa, vel profundè lateat, fluctuat.

Alius, qui *per indurationem*; & tum materia est viscosa & dura, calor naturalis fortis, tumor ipse imminuitur, durities augmentum recipit.

Alius, qui *per corruptionem*; & tum pars livida & nigra apparet, calor & dolor imminuitur.

PUNCTUM I.

De Abscessu.

Tumorem ab humore profectum duo insequuntur, *Abscessus*, nempe, & hunc aliquando *sinus*.

Abscessus est purulenta materia ex humore tumorem excitante orta, in partis alicujus cavitate collectio.

Subjectum sunt partes, & ipsarum cavitates.

Signa ex tertia tumorum ab humoribus profectorum differentia petantur, ubi de suppuratione agitur.

Causa est Humor ipse, quem calor natus in pus maturat & vertit. Hinc pro ejus varietate variatur.

Curatio duorum temporum rationem habet.

I. *Quando pus conficitur*; & tum agendum I. *Anodynis*

dynis, & dolorem lenientibus. Oleum lumbricorum est laudatissimum. 2. *Maturantibus*, & quidem temperatè calidis & viscidis, in tumoribus calidis, & corporibus mollioribus & humidioribus; ut sunt, *Oleum dulce, farina tritici, lac, medulla panis triticeae: Calidioribus*, in tumoribus frigidis, ac naturis & partibus frigidioribus; ut sunt *Terebinthina, Lacryma abietina, laricea, pinea, carica, passula, Diachylon simplex*. II. *Quando pus confectum est*; ubi agendum 1. *Evacuatione*, vel *Insensili*, quod non tantum in magna puris copiâ propter indurationem; sed & in omni propter acredinem, quæ morâ intendi posset, periculosum. Vel *Sensili*; & hic abscessus aperiendus; vel per benigniora, inter quæ *Diachylon simplex cum semine sinapi, ficubus, & sale*: vel per validiora, id est, cauteria potentialia, & actualia. 2. *Mundificatione* per detergentia, succum nempe *Apii, Centaurii minoris, Aristolochie rotunda, Absinthii, Betonica, Agrimonia, &c.* 3. *Carnis generatione* per medicamenta sarcotica. 4. *Cicatricis obductione* per Epulotica, inter quæ *Emplastrum Diapalma*.

Quantum ad *Differentias*, illæ variae sunt.

I. Vel est ex *Sanguine*, & tum facilius maturatur, pus ubi maturuit, laudabile est. Vel ex *aliis Humoribus*, qui difficulter oritur, puri quid simile habet, viride & flavum, apparet.

II. Vel est pus *Purum*: vel *pulvi, mellis, sebo, olei amurce, & vini sacibus simile*, interdum multis aliis permixtum.

III. Abscessus, vel est *in partibus carnosiss*; & tum facilius in pus mutatur; vel *propè articulos*, in partibus nervosis ac debilibus, exiguum calorem habentibus; & tum difficulter maturatur.

IV. Vel pus in *Cavitate* fluctuat, & in finem colligitur: vel *peculiari membrana* & folliculo includitur.

PUNCTUM II.

De Sinu.

Sinus est, cum pure in profunditate se in latitudinem diffundente, cutis adiacens carni subiecta non coalescit.

Signum præbet abscessus qui præcessit, & turunda, quibus optimè explorari potest.

Causa ipsum pus, quod in profundo detentum, acrimoniâ suâ cuniculos molitur, & universi corporis excrementa allicit.

Curatio est Nulla, si callum & duritiem contraxit. Dubia, si multa & non concocta materia excernitur, & in sinu dolor percipitur. Bona spei, si pus paucum, bonum, album exit, & dolor nullus adest. Perficitur I. Evacuatione puris, quæ fit aut simplici mundificatione, si deorsum sinus tendit, per aquam hordei, melicratum, & mulsam: aut Apertione, ita uti vel tota cavitas dissecetur, si minor est; vel tantum inferius orificium, si major est, & pars sine periculo secari non potest. II. Carnis productione per medicamenta Sarcotica, ubi nota. Excrementum tam tenue quàm crassum removendum esse, ne in ulcere hæreat, Magis ficioribus, ut farina orobi, radice ireos, Aristolochia, myrrha, tuthia, pompholyge, in ficiis: minus, ut thure, farina hordei, fabarum in humidis utendum. Si sinus non pateat, liquida per syphonem injicienda, & aliquandiu linquenda. Ex carentia doloris, pauci & benè costi effluxione, de glutinatione, & è contra colligendum.

Quantum ad Differentias, Vel sunt breves & minores; vel profundæ & latæ. Vel rectæ, vel obliquæ. Vel sursum tendunt, vel deorsum, unde pejus pus evacuatur.

ARTI-

ARTICULUS II.

De morbis magnitudinis imminuta.

Morbis magnitudinis imminuta, est partium corporis humani in magnitudine naturali diminutio.

Signis opus non est, cum sit morbus ipse evidens.

Causæ sunt, Alimenti inopia, seu quia subtrahitur, seu quia canales sunt obstructi. Loci angustia, in qua pars augeri debet; sectio, putredo, refrigeratio, ustio: de quibus suis locis.

Curatio instituitur I. Refectione per bonum ac copiosum alimentum. Ubi locum habent vini potus, cibi crassi succi, exercitia pauca, frictiones medicæ. Dropax seu picatio, quam in Pharmacopœa vide. II. Regeneratione, si membrum avulsam, quæ solius naturæ est; Medicus duntaxat impedimenta removeret, &c.

CAPUT IV.

De Morbis situs.

Morbis situs seu Connexionis, est partium corporis humani, quæ conjungi debent, sejunctio; quæ sejungi debent, conjunctio.

Signa, quia per se patet affectus, non est quod attingam.

Causæ in illis consistunt, mediantibus quibus ligantur partes, & de luxatione quidem sub articulo sequente agemus. Connexio verò eorum, quæ sejungi debebant, fit, si partes mediæ laxentur, vel ligamenta rumpantur, aut vulnerentur. Curatio reposcit conjunctionem sejunctorum, & sejunctionem conjunctorum.

Quia verò luxationes frequentissimæ sunt, inter

Q 3

ter

ter morbos situs, placet hic *in genere de Luxatione* agere.

ARTICULUS I.

De Luxatione.

Luxatio in genere, est articuli à sua sede in alienam cum motus arbitrarii impedimento, prolapsus.

Signa sunt, Membri in situ, figura & longitudine dissimilitudo, motus læsio, quia propter illum articuli. Dolor, nervis, musculis & tendinibus compressis. Tumor partis, in quam prolapsus est articulus. Cavitas loci, è quo prolapsus est.

Causæ sunt omnia illa, quæ vel tensione, vel impulsione violenta valent; præcipuè partium, à quibus continentur laxitas vel unitas soluta, ligamentorum contractio, &c. Curatio est faciliior, in pueris & mollioribus. Difficilior, si dolor ingens, & inflammatio, vulnus, aut convulsionis periculum accedit. Si luxatio vetusta & callo obdurata. Si in pueritia accedit, nec curata est. Si ad tabem motu intermissio & vasis compressis vergit. Si articuli paucioribus motuum differentiis dicati sunt. Si longius à suo sinu discessere. Si osium supercilia fracta sunt. Perficitur per *ἔξωσπινος*, quæ absolvitur, 1. Extensione sufficiente, qua os in suum locum compellitur. 2. Repositione, seu per manum; seu per instrumenta vulgaria, seu per organa singularia. 3. Medicamentorum adstringentium appositione, ut inflammatio præcaveatur. 4. Diligenti per fascias & splenia deligatione. 5. Molli, & naturalem figuram servante collocatione.

Differentia sunt variae. Nam.

I. Alia est à causis externis, ictu, lapsu, extensione violenta ante partum, in partu: quæ caveri debent.

Alia

Alia ab Internis, dum humor in cavitatem articuli lapsus, eum è sede suâ expellit.

II. Alia Perfecta, quando articulus totus suâ sede excidit; quæ *ἔξωσπινος* dicitur.

Alia Imperfecta, quando articulus ad sinus seu acetabuli marginem prolabitur, quæ *παρὰσπινος* nuncupatur.

III. Alia cum inflammatione & dolore, ubi dolor prius leniendus, inflammatio sedanda, ne ex nervorum distentione convulsio oriatur; tum reponendum.

IV. Alia cum vulnere, quæ periculosissima, præsertim si articulo vulnus vicinum, & febris acuta exoritur. Hic Articulus si reponi potest, reponendus. Si repositus est, & repellendæ inflammatio accessit, exturbandus. Si reponi non potest, inflammationi ad septimum vel nonum diem incumbendum.

V. Alia cum fractura, ubi articulus primò reponendus; post fractura curanda: si non potest reponi, tum restituendus, cum callus generatur.

TITULUS IV.

De Morbis solutæ unitatis,

Morbus solutæ unitatis, est continuitatis & unitatis partibus corporis humani debita amissio.

Causæ illius sunt, 1. quæ erodunt, ut omnia acria, caustica, putrefactientia. 2. quæ secant seu punctim, seu cassim. 3. quæ frangunt, ut lapides, ligna, &c. 4. quæ tundunt & rumpunt, vel partem replendo, vel nimis tendendo. 5. quæ adurunt, ut res ignitæ, ferraamenta candentia, &c.

Curatio exposcit unionem. Medici est videre, ne quid in partem affectam conglutinationem impediens incidat. Ut labia rectè sibi mutuo applicentur. Ut extrema conjuncta servantur. Ut ipsius partis

temperamentum maneat, & ut Symptomata, quæ supervenire possunt, præcaveantur.

Quoniam verò inter præcipuos unitatis solutæ morbos sunt *Ulcera*, *Vulnera*, & *Fractura*; de his aliquid nobis in genere dicendum est.

CAPUT I.

De Ulceribus.

Ulcus, est continui, cum imminuta magnitudine, in parte molli à materia erodente, exorta solutio.

Subiectum est pars mollis seu carnosa, non solum carnem musculosam, sed eam quoque qua intestina, vesica, &c. constant, comprehendens.

Signis opus non est in externis: Interna ex particularibus facile colliguntur. *Tempora* ulcerum si spectes, *Principio*, sanies aquosa, tenuis, cruda, copiosa effluit; symptomata, nimirum dolor, pruritus, &c. affligunt. In *incremento*, symptomata augentur, sanies coqui incipit, & in copia minuitur: in *statu* sunt omnia maiora; in *declinatione*, minora.

Causa vel est *Externa*, medicamenta nempe caustica, contagium quod in lue venerea fit, &c. Vel *Interna* seu Humores, qui vel in parte affecta generantur; vel eò aliunde confluunt; quod verno tempore, aut per exercitationem, in Cacochymicis corporibus accidere potest.

Curatio est *Difficilis*, si ad partem nobiliorem, acquisiti sensus, humiditatibus à natura scatentem pertingit. Si morbis aliis succedit, quod tum natura humores vitiosos ad partem propellat. Si ulcus magnum, quia validè aër externus appellere potest. Si rotundum, quia extrema difficiliter conneſcuntur. Si diuturnum, quia os abſcedere necessarium est. Si ad viriditatem & nigredinem tendens,

dens, quia sic partis affectæ calor extinguitur. Si sanie multà, tenui, pallidà, lividà, nigrà, & mali odoris scatet. Si cum lienis vitio crura afficit, quia crassi & melancholici humores ad ulcus affluentes unionem impediunt. *Abſolvitur* I. *Evacuatione*, si corpus cacochymicum. II. *Vena ſeſione*, si est plethoricum. III. *Suppuratione*, cum in poris partis ex venis sanguinis effuſi hæreat. Ubi nota, Abstergentia suppurantibus optimè misceri, ne ulcus humidum nimis reddatur, & ut natura, quæ excrementa etiam tum segregat, juvetur. Ex illis sunt *Terebinthina*, *Ol. Maſtichinum*, &c. IV. *Abſterſione*, de qua modò dictum est, quæ per medicamenta detergentia perficitur. V. *Carnis generatione* per Medicamenta Sarcotica. Et hic observa, I. Nec valida nec imbecillia eſſe debere: ne, si illa, ulcus aridum reddatur, caro consumatur, sanguinolenta excernantur: si hæc, caro flacceſcat, & nimia saniei copia colligatur. 2. Humida mollioribus, ita tamen, ut emplastra, unguenta, linimenta ſint ita mollia, ne calore partis liquentur, & carnem nimis laxam & ſubjectæ diſſimilem generent: pulverata, duris & ſiccis corporibus, imponi debere. VI. *Cicatricis inductione*, per medicamenta epulotica. Ubi nota. Et actû & poteſtate vi ſiccandi prædita eſſe debere. Tum imponenda, cum ulcus carne non omnino repletum fuerit; ne, si jam repleto imponatur, cum & tum caro incrementum ſumat, Cicatrix eminentior evadat.

Differentia ulceris ſunt variæ.

I. Aliud est *magnum*, *parvum*, *longum*, *breve*, *reſectum*, *obliquum*. *Æquale*, in quo caro in omnibus partis affectæ partibus abſumpta eſt. *Inæquale*, in quo contrario modo ſc hæc habent. *Superficiale*, *Proſundum*, *Externum*, *Internum*.

II. Aliud est *cum Intemperie*. I. Vel *Calida*, quæ

cognoſcitur ex carnis in ipſo ulcere rubedine. Caloris

ris perceptione, dolore excrementorum acrimonia & mordicatione. *Oritur* ab aëre calido, fasciarum & involucrorum nimia copia, medicamentis nimis calidis. *Curatur* refrigerantibus, quæ simul anodyna & adstringentia, ut sunt *plantago, rosa, santalum, saccharum Saturni, bolus Armenus, Terebintina, æqua plantaginis sapius lota.* 11. Vel *Frigida*, quæ *Cognoscitur* ex carnis in ipso ulcere, albedine, lividitate, & mollitie. *Oritur* ab aëre frigido, vel medicamentis talibus. *Curatur*, non ita difficulter, quia ulceri & intemperiei simul occurri potest calefacientibus, ut sunt *Olea Hyperici, Nardium, Irinum, Rutaceum*, quibus accedere possunt fomenta cum vino parata. 111. Vel *Sicca*, quæ *Cognoscitur*, ex labiorum ulceris duritie & squalore, ulceris excrementorum paucitate. *Oritur* à similibus causis. *Curatur* difficulter, quia posthabito ulcere, intemperiei avertendæ interdum est studendum. Ad humectationem utilis est *aqua tepida.* IV. Vel *Humida*, quæ *Cognoscitur* ex carnis excrecentia, mollitie & flacciditate. Excrementorum in ulcere multitudine. *Oritur* à causis similibus. *Curatur*, fortioribus sarcoticis, sumtis ex *radice Cyperi, squamma ferri Marubio*, ita ut lotio ad sordes detergendas, in quo adstringentia macerata sint, præcedat.

III. Aliud cum *humorum affluxu*, seu illi à toto, seu à parte veniant. *Cognoscitur* ex tumore, qui in labiis & vicinis partibus apparet; dolore, si nervosæ partes afficiantur; excrementorum copia pro ulceris magnitudine majore. *Oritur* ab humoribus. *Curatur* 1. *Revulsione*, in cujus auxiliis primum locum habent fomiculi, si ulcera sint diuturna. 2. *Interceptione seu Defensione*, quæ supra partem exulceratam versus vasorum radicem applicentur. 3. *Repulsione*, cujus auxilia parti affectæ apponantur. 4. *Sarcoticis* vehementioribus. 5. *Epuloticis.*

IV. Aliud

IV. Aliud est *Sordidum*, quod crassum & mucosum excrementum emittit, cum putredine interdum & odore gravi, quæ interdum sphacelus & gangræna sequitur. Est autem sordidum, 1. *Vel ab Humoribus*; & tum partis color vividus non apparet. *Curatio* absolvitur victus ratione. Evacuazione. Deterfione per medicamenta validè abstergentia, inter quæ spiritus vini, decoctum cicerum, oleum ex ol. rosacei lib. 1. & Mercurii præcipitati Unc. 1. decoctum & aliis immistum, laudatur, 2. *Vel à medicamentis unctuosus*, & debiliter exsiccantibus. Tum ulcus album apparet, & albedo illa sicut tela totum ulcus ambit. Curandum est lenioribus abstergentibus. 3. *Vel à Medicamentis fortioribus.* Tum ulcus cavum efficitur, & rubicundius in dies evadit. Pus subtile paucum & calidum effluit. Curatur mitioribus & frigidioribus, ut unguento Diapompholygos.

V. Aliud *lividum*, quod *oritur* vel ab aëre, vel ab humorum affluxu. *Curatur*, scarificatione; ut sanguis extrahatur spongiarum siccarum impositione. Exsiccatione per medicamenta validiora, nempe *Aqua viridi Plateri, Hartmanni*: de qua in chymiatría cap. de Ozaena.

VI. Aliud *Callosum*, quod *oritur* à nimis siccantibus. *Removetur* callus per emollientia, si non cedit, vel erodentibus medicamentis; cautè ramen in nervosis partibus, vel sectione auferendus est.

VII. Aliud cum *Tumore*, quod *cognoscitur* ex aspectu. *Oritur* ab affluentibus humoribus. *Curatur*, pro ratione Tumorum.

VIII. Aliud cum *infectione carnis*, seu *Carnis excrecentia*. *Oritur* 1. vel ob *abundantiam sanguinis*. Tum caro se rectè habet. Inediâ, siccantibus simul impositis, tollitur. 2. Vel ob *sarcoticorum & exsiccantium debilitatem*. Tum caro laxa & spongiosa est. *Curatur*, ligno aloës confuso, in rigillo desiccato,

siccato, cum vini spiritu rectificato, bis accenso & præparato. Bartolinus de cauteriis.

I X. Aliud *Sinuosum*, quando pus nimis diu dentum cuniculos quasi agit. Curationem vide apud Valleriolam. lib. 5. Observationum.

X. Aliud *Verminosum*, cum vermes in eo generantur. *Cognoscitur* vel visu, si ulcus pater; vel, morsus punctiois, doloris & motus quodam sensu. *Curatio* reposcit 1. *Extractionem*, si sunt in propatulo. 2. *Necationem* per medicamenta, putredinem & humiditatem simul tollentia.

XI. Aliud *Varicosum*, seu cum varicibus conjunctum, quod *cognoscitur* ex signis varicum. *Curari* non potest, nisi prius varices sanentur, & adimantur.

XII. Aliud *cum ossis carie*, quod *cognoscitur* ex eo, quod caro ulceri superposita est flaccida & mollis. Ulcus sæpius renovatur, sanies copiosior quam pro ulceris magnitudine effluit. Os si specillum immittatur, inæquale deprehenditur. *Oritur* 1. *Ab externis*, aëre frigido, incisione, contusione, medicamentis acerbis. 2. *Ab internis*, nempe humorem acrium ad ossa affluxu, saniei pravitate, manifesta vel occulta, &c. *Curatio* est *difficilis*, præsertim, si caro livida; si caries juxta nervosas partes, vel in juncturis, vel circa musculorum capita & tendines, vel circa magna vasa. *Perficitur*, 1. *Ossis exudatione*, vel radice gentianæ immisâ, vel caustico, vel secturâ. 11. *Ossis ablatione*, vel per medicamenta valide siccantia, ex quibus *Euphorbium* optimum: Vel per Chirurgiam, si caries profundior, & cito *curatio* requiritur; quæ absolvitur, Abrasione per scalprum vel terebram. Ustione, postquam inflammatio leniendi & dolor prohibendus.

XIII. Aliud *cum Fistula*, quæ nihil aliud est, quam sinus angustus & longus. *Cognoscitur* stylo immisso, & caro

& caro quæ fistulam circumdat, est alba, sicca, & durior. *Oritur* vel ab humorum pravorum copia, vel Medici imperitia. *Curatio* est *difficilis*, si plures partes sunt erosæ. si fistulæ sunt profundæ, flexuosæ, membris nobilibus vicinæ. si ad musculorum capita, venas, arterias, nervos, ossa, articulos, thoracem, abdomen, &c. pertingunt. *Non adhibenda*, si fistulæ à partibus nobilibus remotæ; & si per eas humores superflui expurgantur. *Palliativa*, quæ præmissis universalibus, fistula, aqua thermarum, calcis &c. exsiccat, & consolidatur. Diæta bona servatur: *Vera*, quæ absolvitur 1. *Universali præmissione*, sub quibus & potiones vulnerariæ Tagaultii apud Sennerium, Agricolæ super Poppium T. 1. p. 123. comprehenduntur. Purgationes Mercuriales hic profunt. 11. *Calli remotione*, 1. *per medicamenta convenientia*, orifico fistulæ: per penicillorum ex spongia, medulla sambuci, radice bryoniæ, gentianæ, &c. immisionem, dilatato, per syphonem injecta, illaque vel liquida vel sicca. Talia sunt, Radix *serpentaria*, *Centaurium minus*, *Cinis sicum*, Unguentum *Apestolorum*, *Egyptiacum*, compositum *Agricola* ex spiritu Mercurii cum saccharo Saturni crystallini & spiritu nitri, &c. T. 1. p. 123. 2. *Per fistulæ apertionem*, quæ factâ callus scalpello detrahi, vel ferro candente tolli, munita defensivo parte, debet. 111. *Consolidatione*, deterfis per centaurium minus, pimpinellam, &c. fordibus. Quantum ad *Differentias*, 1. *Alia plures sinus habet*, & tum, plus puris quam unico sinu contineri potest, effluit. 2. *Alia plura orificia*, & tum, si liquor per syphonem injectus per omnia iterum effluit, si humiditas ejusdem est coloris, una fistula est. 3. *Alia in carnem desinit*, & tum quod stylo tangitur molle est, pus quod effluit est album. 4. *Alia ad nervum pertingit*: tum in exploratione dolor percipitur. 5. *Alia ad os*, & tum quod stylo tangitur, est durum. 6. *Alia ad venam & arteriam*.

arteriam. Tum, si sunt erosæ; erumpit sanguis: si non, quasi fax egreditur.

CAPUT II.

De Vulneribus.

V *Unus est unitatis in parte molli à re secante & acuta vel casum, vel punctum facta solutio.*

Subiectum, est pars mollis, illaque vel externa, vel interna, &c.

Signis opus non est.

Causa posita est in Definitione.

Curatio est *Nulla*, si cor vulneratum est, ut spiritus vitales dissipentur, si vas in pulmone, ex quo sanguis effusus cor obruit. Si magnum aliquod vas internum ita læsum, ut occludi non possit; unde sanguine copiose effuso, spiritus dissipantur. *Dubia*, si telum venenosum, si vulneratus imbecillis & cacochymicus. si inflammatio in internis nervosioribus & exquisitioris sensus partibus accedit, quam humorum affluxus, interdum & gangræna excipit. *Difficilis*, si cum cachexia & hydrope conjungitur, quia humiditas nimia curationi obest. si difficulter expurgatur. si alios affectus complicatos habet. si est in parte ad recipiendum humorum affluxum proclivi. si aliquid extranei, quod à principio statim extrahi non potest, in se habet. si diebus Criticis, quos quidem vulnera tantum eatenus habent, quatenus ipsis aliquid materiæ, quæ coqui debet, accedit, nulla in pejus fit mutatio. si vulnus obliquum vel orbiculare. si convulsio accedit, vel contusio simul adest. *Absolvitur*, 1. *Rerum alienarum* è vulnere *exemptione*. ubi nota, 1. Grumos sanguinis ad tertiam deligationem eximendos, quia orificia venarum obturando hæmorrhagiam inhibent. 2. Officula fracta ea tantum exigenda, quæ planè libera sunt. 3. *Te-*
lumi

lum evellendum, si æger extracto supervivere potest. 4. Eximi tela vel per impulsionem, si ductus ille est brevior, & neque os, nervus, vena prohibent; vel per extractionem, & uterque modus, vel sectione vel sine illa administratur; quæ aliter eximi non possunt attrahentibus medicamentis tentanda; quæ nullo modo Naturæ committenda. II. *Labiorum vulneris conjunctione*, ubi deligationis ratio habenda, ad quam fasciatio, spleniorum injectio, ferularum adaptatio, illaqueatio, & obligatae partis recta collocatio pertinent. III. *Digestione*, ut sanguis ille qui ex minimis venis in parte vulnerata effluxit, & in poris partis hæret, in pus quam primum mutetur. Ubi nota, 1. In humidis corporibus humidiora vulgaria cautè adhibenda, ne putredine inducatur, vulnus in ulcus sordidum facessat. 2. In siccioribus sicca temperiei corporis ipsius magis prodesse. 3. *Digestiva* sarcoticis castigari debere, nec uni medicamento fidendum esse. Medicamenta pus moventia, vide in Institutionibus. Hoc optimum: R. *Therebinthina clara*, Gummi Elemi ana Unc. II. Pinguedin. castrati unc. II. *Porcina antiqua* unc. I. Liquefiant ad ignem, fiat linimentum. IV. *Partium conglutinatione*, quæ fit vel per medium ejusdem generis in partibus mollibus & carnosiss, in quibus copiosus sanguis calore valido facilius in carnem mutatur; vel per callum in ossibus; vel per cicatricem in cute. Id administratur, per medicamenta sarcotica, & Epulotica, de quibus alibi; nec non *portiones vulnerarias*, de quibus notandum. Non esse usurpandas in principio, nec tum ubi externâ satisfaciunt, & febris ac inflammatio adest; semper illa adhibenda, quæ partibus appropriata sunt. Huc inferviunt, *Balsamus vulnerarius* Hartman. in chymia tria, *Pulvis glutinatorius ex canceris*, *Balsamus ex musco aurium*. ibid. *Emplastrum* & *Balsamus sulphuris*

phuris Rulandi idem, de *mamm. vitis*, *Aqua Agricolæ* T. 1. p. 124. in Popp. v. *Fluxionis aversione*, ubi locum habet, 1. *Venæ sectio*, si corpus plethoricum. si sanguis non nimium ante hac fluxit. si magnum est vulnus, nec ob dolorem oritur inflammatio. 2. *Purgatio*, si corpus est cacochymicum, si humores tenues, calidi & biliosi, ne sanguinem ad motum aptum reddant. si statim initio adhibetur. si nulla febris accessit.

Differentia vulnerum sunt variae.

I. Aliud est *Vasorum*, & quidem aut *Venæ*: & tum sanguis minore impetu fluit, & quidem crassior, nigrior, minus calidus: Vel *Arteria*, & tum sanguis flavus, calidior, tenuis; vires vehementer ob spirituum subtractionem dissipantur; difficulter propter arteriarum duritiem, perpetuum motum, & sanguinis impetum sanatur. *Curatio* indicat sanguinem esse sistendum, quod fit, 1. *Labiorum* vasis vulnerati *conjunctio* vel digitis vel fasciâ, quibus tamen modis difficulter sanguis sistitur. 2. *Orificii* vasis *obstructione*, vel digito applicato, vel per medicamenta sanguinem sistentia. *Externa* sunt *crepitus lupi*, *vitriolum* pulverizatum linteolo inditum, pulvis *Agricolæ* ex dr. ij. *salis saturni*, *thuris albi*, *myrrhæ rubræ*, dr. j. *Croci* contusi & *Camphoræ*, imbibitis *aqua spermatis ranarum*, & lentè ad ignem exsiccatis, vulnere injectis, *Quercetani unguentum*: de quo vide *sclopet.* ejusdem. *Interna* vide in capite de hæmorrhagiâ. 3. *Revulsio* per venæ sectionem, pluribus vicibus institutam, per cucurbitulas si vires non ferant. 4. *Interceptio* per medicamenta interceptientia, quæ vasis per quæ fluit sanguis, applicari debent. 5. *Sanguinis*, postquam substitit, & in grumos concrevit, *dissolutio*, *Medicamenta* vide superius.

II. Alia sunt *Tendinum*, quæ dolorem existant, sed

204

non magnum. Minus periculosa sunt. *Curantur* ut *Nervorum*. Vel totus tendo difsecatur, & tum motus aufertur: sin minus, motus debilitatur.

III. Alia *Nervorum*, quæ *cognoscuntur* ex anatomicis, dolore vehementi, cui convulsio & inflammatio succedere solet. *Curantur* *Difficulter* propter succedentia Symptomata, præsertim, si tumores nulli adsunt. si conspicui repente evanuerunt. si putredinem nervus concepit, & illa partibus vicinis & remotioribus communicatur. In *Curatione* 1. *Dolor & inflammatio* per venæ-sectionem & evacuationem *adimenda*. 2. *Vulnus* ut excrementa evomantur, *apertum* servandum. 3. *Medicamenta* temperata & *exsiccantia* tenuium partium, corporis & humorum affluxus habita ratione, calidè magis *imponenda*. 4. *Partes intermedia* ol. liliorum albor. &c. fovendæ. *Differentias* si spectes, 1. Alia sunt à *Punctura*, & tum Teli genus & vulneris conditio respondent. Symptomata superiora sequuntur. *Curatio* est difficilis, quia morbus periculosus. si præsertim in corpus impurum inciderit, & si tumor apparens dispareat, & delirium subsequatur. *Respicit*, 1. Corporis à vitiosis humoribus purgationem. 2. Doloris lenitionem per Olea anodyna vel cataplasmata. 3. Saniei eductionem, vel per medicamenta trahentia, vel per sectionem decussatam factam, vel per turundas, nervos tamen non attingentes. 4. Medicamentorum tenuium, mediocriter excalescentium, & siccantium, ut balsami Peruviani, hyperici, &c. impositionem. 5. *Dixtam*, in qua aer frigidus, vini potus, animi affectus, Venus, prohibentur. II. Alia ab *Incisione*, quæ fit 1. Vel *secundum longitudinem*, & tum dolor non est ita magnus, nec tantus convulsiois metus, cum fibræ ita non afficiantur. In *curatione*, Vulneris labia fasciâ adducenda. Saniei, quæ speciem lactis, aquæ, feri, albuminis ovi, interdum exitus relinquendus.

R

Medi-

Medicamenta superiora immittenda. Vulnus emplastro Diapalma vel alio tegendum: 2. Vel *in trans-versum*, ubi aut *totus diffecatur*; & tum, sine dolore motus & sensus aboletur: vel *non diffecatur*, & tum dolor non est ita magnus, Omnia Symptomata quæ in punctura adesse possunt. Sutura in *curatione* adhibenda, sed ne nervus lædatur.

IV. Alia *Articulorum*, quæ in cubito, genu, vel digitorum articulis accidunt. Sunt 1. Vel *sine luxatione*, Ubi *Curatio est difficilis*, quia articuli fluxiones facillè recipiunt, & doloribus tentantur: si præsertim in parte interna accidunt, ubi vasa majora. *Perficitur*, 1. Labiorum adductione, ita ut puri exitus pateat. 2. Affluxus præcautione, per evacuationem, interceptionem, rectam membri situationem. 3. Aëris frigidi repulsione, per cataplasmata & alia. 11. Vel *cum luxatione*, ubi majus periculum propter distractionem nervosarum partium. Claudicatio subsequitur. In *Curatione*, Articulus non est reponendus; quia exinde mors ægri. Cum vulnere ita ut cum aliis procedendum, solâ deligatione exceptâ: Fluxiones inprimis purgationibus & sudoriferis præcavendæ.

V. Alia sunt *cum Contusione*, quando telum aut retusum est, aut grave, aut homo alicui rei alliditur. In *curatione* respicienda 1. *Contusio*, ubi, 1. Affluxus per revulsiones defensiva & repellentia præcavendus. 2. Sanguis affusus in pus per medicamenta, sed non nimis humida, mutandus, & cataplasmata circum circa ubi pars contusa, imponenda sunt. 11. *Vulnus*, quod 1. Digestivis, ex resina, terebinthina & ovi vitellis &c. curandum. 2. Pure genito abstergendum & consolidandum. 3. Si suppurari nolit, & gangræna imminet, scarificandum, &c. *Differencia* sumuntur à partibus. 1. Vel est *Nervorum & Tendinum*, ubi oleis discutientibus pars calidè fovenda.

venda. si cutis simul contusa, primò dolor leniendus albumine ovi cum rosaceo mixto; mox pars vino adstringente tepido fovenda: tandem cataplasmata ex foliis ulmi oleo incoctis, vel cinere sarmentorum vitis cum pinguedine gallinæ, imponenda. Si in illis durities remaneat, emollientia & digerentia applicanda. 11. Vel est *Ligamentorum*, ubi Medicamentis calefacientibus, siccantibus, &c. agendum.

VI. Alia *Sclopetorum*, quæ vel ipso aspectu cognoscuntur. *Curatio est difficilis*, si corpus est caco-chymicum. si ossa simul fracta sunt. si à venenato globo infliguntur. *Perficitur*, 1. Globi extractione, per instrumenta idonea. 2. Contusi in pus mutatione, *Unguento Quercetani* in sclopet. p. 145. *Balsamo Parei* apud Sennert. l. 5. de sclop. vulneribus; ita ne gangræna oriatur. 3. Abstersione per detergentia vel fortiora si plus puris, vel mitiora, vide Quercet. d. l. p. 146. 4. Carnis generatione, per medicamenta, quæ ibidem. vide post *Ludovicum Borallum*, & alios, *Quercetani* sclopetarium.

VII. Alia *Venenata*, vel à telo infecto, vel ab animalis morfu: & tum, in loco vulnerato doloris & punctiōis major est sensus, symptomata gravia ingruunt. In *Curatione* ita procedendum, ut 1. Veneno iter ad interiora præcludatur, ejusdem extractione per cucurbitulas vel alia medicamenta; partis supra vulnus mediocriter stricta deligatione; carnis, nisi nervosa sit, excisione; vulneris vino cum theriaca mixto ablutione; causticis, &c. Cordis per externa & interna Alexipharmaca munitione. 2. Vulnus ipsum sanetur.

CAPUT III.

De Fracturis.

Fractura est ossis à causa externa violenter irridente divisio.

Signa sunt, Debiti motus in membro carentia. Dolor, antequam ossa componuntur, acerbus. Membri ob os fractum brevis. *Cause* sunt *Externe*. Dispositio tamen ad fragilitatem interdum est à constitutione naturali, interdum à carie acquisita, vel à luc Venerea, vel aliunde.

Curatio respicit 1. *Inflammationem*, si adest, quæ primò tollenda, habita partis ratione, per repellentia, ne affluant humores. II. *Fracturam ipsam*, Ubi 1. *Extendi* debent, cum dolore vel nullo, vel minimo: ab uno, si minora ossa; à duobus, si majora læsa sunt. 2. *Conformari* debent, seu in suum locum rectè reponi, ut extremitates rectè coaptentur, ita, Ut eminentiæ ossium cum impetu in suas cavitates non intrudantur, ne rumpantur. Ut, si extra cutem prorumpant, peculiariter tractentur. 3. *An rectè conformata sint, dispiciendum*, quod agnoscitur ex cessatione doloris, nulla cavitate; si pars fracta tangatur, similitudine cum sana crassitie excepta, quæ major esse potest, propter humorum affluxum. 4. *Deligari* rite debent, quod fit, si medicamentum ex albumine ovi conquisiatio cum pulveribus adstringentibus præmittatur, ad inflammationem arcendam, Si nec nimis laxa, nec nimis stricta sit deligatio. Illa fiet, si se leviter premi dixerit, si eadem nocte validius se adstringi sibi videatur, postridie verò tumor mollis in extremitate membri oriatur. Hæc, si contrarium. Si ante tertium diem non solvatur. 5. *Membrum* rectè collocari debet, id est, molliter, ne doleat; æqualiter, ne distorqueatur; sursum versus, ne humores affluant. III. *Corpus agri*, ubi, si opus, venæ sectio & purgatio adhibenda. IV. *Callum*, & tum cibi Euchymi sunt exhibendi. Medicamenta callum generantia propinanda & applicanda, præsertim in adultis Osteocollæ dr. i. cum aqua symphyti. Vide *Aquapendentem* & *Fabricium* in Observationibus.

v. Sym-

v. *Symptomata*. 1. *Inflammationem*, cuius in principio statim ratio habenda, nec pars deliganda, vel non tam arctè. 2. *Gangrenam*, quam in proprio capite vide. 3. *Pruritus*, & excoriationem, quæ à sanie; ubi sanies abluenda, & post unguentum album, Camphoratum, Rosaceum, &c. adhibendum. 4. *Dolorem*, qui vel fit à fasciarum nimia adstrictione, & tum tumor in extremitate partis apparet, ægerque se vehementer premi conqueritur. Fasciæ sunt solvendæ, & deligatio laxior instituenda. Vel ab *osse pungente*; & tum ex levi partis contrectatione dolor oritur. Os vel in locum reponendum, vel eximendum, vel præcidendum est. Vel ex *humorum affluxu*, & tum curatur, ut incipiens inflammatio. Vel ex *situ membri pravo*, & tum Æger id facile detegit. Situs membri mutandus. 5. *Membri gracilitatem*, & tum vel vitæ nimis tenuis, vel longa fasciarum adstrictio in causa. Attrahendum alimentum ad partem.

Differentiæ fracturarum sunt variæ:

I. Alia est *per transversum*, ut nullo pacto extrema cohereant, & hæc καυλῶν κλάσις dicitur. *Cognoscitur* ex eo, quia tactu ossis fracti extremitates separatæ deprehenduntur, & in fracturæ loco cavaras non naturalis deprehenditur, &c. *Facilius sanatur*, præsertim si est simplex & æqualis, & ossa fracta sedibus mota non sunt.

II. Alia est *συντέμνου*, quando os in plures partes conteritur. Hæc *difficilius curatur*, si præsertim eminentiæ acutæ partes vicinas pungant. Si ad pristinum statum reduci non possunt, membrum brevius & ad officium ineptum redditur.

III. Alia est *secundum Longitudinem*, quæ *Fissura* dicitur. Hæc ex membri crassitie præternaturali deprehenditur. *Facilius curatur*, quia operosa ossium repositione opus non est; sed sufficit, si ossa quasi hiantia iterum conjungantur.

R 3

IV. Alia

IV. Alia *Recens*, quæ facillè consolidatur.

V. Alia *Inveterata*, quæ difficilior; quia accedente inflammatione extensio periculosa. Extremities ossium occalescunt. Galenus dicit, si ultra septimum diem curatio protrahatur, periculum esse, ne os syderetur.

VII. Alia est *Sola*, de qua quæ hætenus dicta sumi debent.

VII. Alia cum *Carnis contusione* ac vulnus conjunctum habet. Hæc periculosa, si vulnus magnum & in grandioribus musculis. Inflammationes facillè accedunt. ferulæ & alia ad repositionem non tam benè adaptari possunt, sed foramen vulneris causa servandum est.

VIII. Alia, quæ *in medio Ossis* accidit, & tum divisio est levior.

IX. Alia quæ *prope caput superius* vel *inferius*; & tum; quia ibi plures nervi, hic plures tendines, major dolor provenit.

X. Alia *prope articulum*; & tum propter ligamenta, nervos, tendines, partis fractæ ligatio comoda non est. in loco exsanguis calor est debilis. motus membri ob callum, qui tendines aut musculos ligat, impeditur.

XI. Alia, quando *duo ossa conjuncta simul franguntur*, ut in brachio radius, aut ulna: & tum curatio difficilis.

XII. Alia quando *unum*, & tum muscoli minus contrahi possunt, quia ab integro osse tenfi servantur.

TITULUS II.

De Symptomatibus, & eorum acquisitione.

Symptoma est affectus præter naturam in iis, quæ extra constitutionem partium ad actionem necessaria sunt, aliquid aliud præter naturam sequens.

Dividi-

Dividitur multifariam, sed præcipuè *bisariam*. Nam,

I. Aliud est *Actionis læsæ*, seu hæc sit abolita, imminuta, depravata, vel aucta. Fit id vel *facultatis* vitio, quando instrumentum proximum malè affectum est; quo spirituum & caloris influentis absentia refertur: Vel *Erroris* externi causa, quando illa cum quibus fiunt, aut sine quibus non fiunt actiones, salunt. Aliud *Excretorum* & *Retentorum*. Aliud *Qualitatum mutatarum*, quæ ex actionum læsionibus, & ab iis provenientiis humoribus dependent.

II. Alia sunt symptomata *facultatis naturalis*, nimirum, Nutritivæ, Augmentativæ, Generativæ, Retentivæ, Attractivæ, Concoctivæ, Expultrivæ. Alia *facultatis vitalis*. Alia *facultatis animalis*, quo pertinent symptomata sensuum externorum, internorum, motricis, &c.

Curatio Symptomatum est *Mitigatio*, & quidem cita, quando urgent, id est, tale minantur periculum, ut non possit expectari morbi illius, vel causæ à quibus pendent, ablatio; sed si expectetur, vitæ discrimen aut magnum incommodum imminet. De his in particularibus agemus.

Cæterum quia inter symptomata frequentissimus est *Dolor*, de eo in genere aliquid hic dicemus.

CAPUT UNICUM.

De Doloris in genere.

Dolor est tristis & molesta, ex subita & vehementi in sensu tactus alteratione, exorta dispositio.

Subjectum, sunt partes nervosæ, membranæ præsertim crassiores, quæ vehementes dolores inferunt.

Signis opus non est. sensus ipse ostendit.

Causa est, quicquid vel excellenter & repente partem alterat; vel continuitatem ipsius solvit.

R. 4

Curatio

Curatio festinanda, ne fluxio concitetur; in vehementi præsertim, morbo etiam seposito, si aliter fieri nequit. *Perficitur* I. *Mitigatione* per Anodyna & Narcotica. Inter illa excellunt Olea liliorum alborum, lumbriarum, chamamel. Catapl. ex mica panis, lacte & croco invicem coctis, pulmentum ex radicibus Altheæ in lacte coctis. Unguentum Iovis Grullingii. Inter hæc, Extractum seminum stramonii, spiritus Lollii, Trochisci narcotici Fernelii, Laudanum Opiatum. II. *Causarum* per remedia tam interna, quam externa remotione.

Differentia, vel à causis, vel à partibus affectis sumuntur.

I. Alius est ab *excellenti & repentina qualitatis alteratione*, quæ contrariæ qualitatis remediis tollitur. Fit verò, vel à calore & siccitate: tum causæ præcessere, pars dolens rubet, frigidis & humidis agendum. Vel à frigidityte & siccitate: tum Causæ similes præcessere. Cutis albet, vel ex constrictione livescit. Calidis & humidis levatur.

Alius à *Continuitatis solutione*, quæ fit, Vel ab humoribus pluribus, qui distendunt. acribus, qui erodunt; ubi venæ sectio & purgatio locum habent. Vel *Flatibus*, qui divellunt; ubi carminantibus præmissis, universalibus agendum. Vel à *causis externis* contudentibus, incidentibus, exurentibus; ubi curatio ad singula obvertenda.

II. Alius est *Punctorius*, in membranis costas & musculos subcostales cingentibus. Alius *Pulsatorius*, arteriarum proprius, magnæ inflammationis index. Alius *Torpidus*, qui accidit in carnosâ membrana cuti subjectâ, quæ ex refrigeratione, externâ contusione vel compressione, oritur. Alius *Gravans* in renibus plerumque, in Epate & liene interdum. Alius *Tensivus, secundum longitudinem*, nervis proprius, qui in utramque partem nervorum se extendit. Alius

lius *Tensivus secundum latitudinem*, membranarum musculos tegentibus proprius. Alius *Vagans*, qui ut plurimum in majoribus capacitatibus, ventris, uteri, &c. à flatibus oritur. Alius *Terebrans*, in intestinis ex humoribus frigidis tunicis impactis. Alius *Perfultans*, qui in meningibus cerebri contigit, ubi tanquam ex radice ortus repente in circumjacentes partes profilit. Alius *Ulcerativus*, qui ut plurimum in cute & subcutaneis partibus, etiam in intestinis, ab acrimonia humorum & vermibus contingit, dysentericæque communis est. Alius *Profundus*, qui in periostio accidit, & imaginem quasi ipsa ossa dolerent, aut medulla in ossibus, sensibus offert. Et tantum de primis morborum differentiis.

I D E Æ

MEDICINÆ PRACTICÆ.

LIBER VI.

De Morbis Externis.

TITULUS I.

De Tumoribus in specie.



ANTUM de morbis in genere & ipsorum curâ sufficiat. Morbi in specie considerati, vel sunt *Externi*, vel *Interni*. Illi sunt *Tumores*, *Cutis affectus*, *capillorum vitia*, *ulcera*, *Luxationes*, & *Fractura*: Unde in hoc libro tot etiam erunt Tituli.

CAPUT I.

De Tumoribus à sanguine ortis.

ARTICULUS I.

De Corpulentia nimia.

Tumores alii sunt à Sanguine, alii à Bile, Pituita, Melancholia, aquoso & seroso humore, denique ab istis inter se mistis. A sanguine sunt, Nimia corpulentia, Inflammatio, Bubo, Phlegmon, Phyma, Furunculus, Paronychia, Perniones, Ecchymosis, Carbunculus.

Corpulentia nimia est molis corporea, ex carnis & adipis augmento, nimium incrementum.

Signis opus non est. Sequuntur enim, Morus ac operationis impedimentum, Respirationis ob viarum interceptionem difficultas, Mors interdum inopina, in illis qui prima ætate impinguntur, Infecunditas ob seminis aquositatem.

Causa est Carnis & adipis augmentum.

Curatio pro ratione Differentiarum variat.

Differentia à causis sumitur.

I. Alia est à Carnis augmento, quod fit ob sanguinis boni copiam, ab hepate temperato, ex boni fucci cibis productam, cui partium in corpore musculosarum temperatura calida & humida accedit. *Curatur* 1. *Evacuatione*, per liberaliorem venæ sectionem, cucurbitulas, jejunia, frictions. 2. *Absumptione* carnis, per valentius siccantia, & moderatè calida.

II. Alia ab Adipis, quæ incrementum sumit à sanguinis extra venas in partes membranosas excidentis, & ab ipsorum virtute & calore minus vehementi coacti unctuositate & oleaginositate. *Curatur*, 1. *Evacuatione*, sed non tam liberali, cum ra-

les

les in frigidos morbos sunt proni. 2. *Adipis absorptione*, per calida, amara, diuretica; ita tamen, ne nimia calefactione alius morbus excitetur.

ARTICULUS II.

De Inflammatione.

Inflammatio est partium carnosarum præter naturam tumor, à sanguine præter naturam affluente exortus.

Signa sunt, *Calor*, qui fit partim ob sanguinem; partim ob pororum à sanguinis copia & crassitie, unde fulgines exhalare non possunt, interceptionem; partim ob sanguinis putredinem. *Dolor*, tum ob intemperiem, tum ob continui solutionem, quam sanguinis copia replendo ac distendendo infert. *Rubor*, dum sanguis colorem parti communicat. *Tensio*, à copia sanguinis totam partis substantiam distendente. *Remittentia*, ob eandem causam. *Pulsatio*, ob partium inflammatarum ab arteria sese attolente, quæ liberum locum non habet, distentionem.

Causa est sanguinis copia vel acrimonia, ob humores biliosos; qui cum naturam vellicent, ab eadem, sanguine tanquam vehiculo utente, qui ob dolorem satis copiosus confluit, extruditur. *Modus generationis* hic est. *Calidâ* fluxione, ubi sanguis in musculos procubuit, venæ primò majores, post minores, tandem minimæ distenduntur. In his ubi fluxio diutius contineri nequit, partim per tunicas vasorum, quæ etiam suos poros habent, transsudat; partim per minutissima venarum orificia, quibus in partis substantiam venæ hiant, in ipsa spatia vacua, quæ inter prima sunt corpora, emittitur, Unde partes incallescunt.

Curatio peragitur, 1. *Venæ sectione*, ne plus affluat; si statim repellentibus ageretur, ad aliam partem

tem

tem materia deduceretur. II. *Purgatione*, quia humores acres occasionem fluxioni præbent. III. *Alteratione*, ut sanguis refrigeretur & incrassetur, modo venæ non sint angustæ, nec obstructiones viscerum affligant. IV. *Revulsione*, ut humor in contrarium revocetur; quæ per venæ sectionem tum optimè administratur, cum materia est copiosa & impetuosa; per alia media, si minor; imò *repellentibus* & *discutientibus* tum agi potest. V. *Repulsione*, per medicamenta repellentia, seu aquæ, seu simul adstringentia. *Illa* in humoribus tenuibus in superficie sitis, minùs copiosis, calore præsentem locum habent, & sempervivum, umbilicum Veneris, violas, &c. complectuntur. *Ista*, ubi dolor nimis urget, vasa sunt ampla, fluxio ob debilitatem partium accidit. In frequenti apud chirurgos est usu, *Albumen ovorum* cum aqua rosarum conquisitum. VI. *Interceptione* per medicamenta *defensiva*, quæ partibus ex carnibus, & per quæ vasa majora tendunt, benè apponuntur. Oleum in illis est suspectum. VII. *Derivatione* sanguinis illius, qui in partem influxit. VIII. *Discussionem* per medicamenta discutientia; inter quæ *mitiora* sunt, Radic. alth. Lilior. albor. flores chamæmeli. *Validiora*, Radix ieros. flor. sambuci, ammoniacum, bdellium, adeps ursinus, *Validissima*, Nitrum, sulphur, calx, &c.

Differentia sumuntur à subjecto & causa.

A subjecto. I. Alia est *partium carnosarum*, quæ decimo quarto die finitur. Alia *tendinum & ligamentorum*, quæ cum horum substantia sit densior & durior, difficilius terminatur: quadragesimum tamen diem non excedit.

A causa. Vel est à *sanguine bono*, & phlegmone absolutè dicitur; vel *non bono*, qui aut naturam suam planè mutat, unde nullum tumoris genas: aut humores alios admixtos habet; & tum, si bilis admiscetur,

miscetur, oritur φλεγμα ἑρυσιπιδανός; si *pituita*, phlegmone oedematodes; si *Melancholia*, phlegmone scirrhotodes.

ARTICULUS III.

De Bubone.

Bubo est inflammatio glandularum sub axillis vel inguinibus exorta.

Signa sunt Tumor cum renitentia, rubore, dolore, febris levicula.

Causa est sanguis, in glandulas, cum humore vitioso expultricem stimulantem, illapsus.

Curatio est dubia, si tardius maturantur, cum in fistulas periculosas abeant. Sequitur *Curationem* inflammationum. *Digestio* fit per validiora, quia pars affecta frigidior. *Suppuratio* appropere debet, ne novi oboriantur. Commendatur Rulandi Balsam. sulfuris & Emplastrum.

Differentia sunt variae.

I. Alius est Symptomaticus, cui jam dicta applicari debent. Alius *Criticus*, qui morbum alium sequitur, ægerque ad ejus eruptionem levatur. Naturæ est committendus, si crisis est perfecta: si imperfecta, humor per cucurbitulas & attrahentia medicamenta attrahendus.

II. Alius est *in inguinibus*, qui citius, quia à sanguine & plus calor affluit, maturatur. Alius in *Axillis*, qui ob adversam causam tardius.

III. Alius est *nec malignus, nec contagiosus*, qui quia in extremis partibus est, & statim suppuratur, periculosus non est. Alius, *Malignus, pestilentialis, venereus*: de quibus suis locis vide.

ARTICULUS IV.

De Phygetlo, Phymate, Furunculo.

Phygetlon seu Panus, est tumor durus interdum post febres vel dolores in adenum locis emergens. Oritur vel Externe ab ulcere, dolore, contusione: vel Interne, à sanguine bilioso, febris, tardius maturatur. Oleum Guajaci hic valet. Phyma est tumor glandularum rotundus, phygetlo minor ac planior, minusque rubens ac dolens, qui statim augetur & in suppurationem abit. Oritur à sanguine pituitoso. Affligit maximè pueros. Curatur maturatione per triticum tostum impositum, &c.

Furunculus seu Dothien, est tuberculum in acutum tendens, ovum columbinum magnitudine non excedens, rubore & dolore, dum in pus vertitur, conspicuum.

Signa ipsius definitio suppeditat, rarè solitarius crumpit. Oritur à sanguine crasso, sic ab inflammatione; nec multum exusto, sic à carbunculo distinguitur. Curatio est facilis, præsertim si est fastigiatus, non durus, nec bifidus. Peragitur maturatione. Est vel Miris, qui eum occupat; vel Malignus, qui carni infidet. Vel Pestilens & Epidemius, qui niger aut viridis, febris malignæ conjungitur.

ARTICULUS V.

De Parotide.

Parotis est glandularum circa aures inflammatio, à sanguine puro, vel vitiosis humoribus mixto, profecta.

Signa sunt, Tumor, dolor, rubor qui post aures apparet. Causa, sanguis seu solus, seu cum aliis humoribus vitiosis mistus, qui vel à toto, vel à cerebro missus

missus illabitur. In Curatione Repulsio locum non habet; sed Discussio per leniora, ne fortioribus dolor exasperetur. Suppuratio, si eo natura ducit.

Differentia sunt variae.

I. Alia est Critica, cum signis criticis exorta, quæ curatu facilior, nisi in fine morbi, post alias evacuationes, sine symptomatum remissione accidat. si non suppurata evanuerit, revertitur. Naturæ committenda, & reversa secundum reversionis rationem judicanda. Alia Symptomatica, quæ si ex cruda est materia, periculosa, propter locum cerebro vicinum. In Curatione ejus, Antecedens causa minuenda. Materia discutienda, emollienda, aperienda, ne pus damnum inferat.

II. Alia est sine Febre. Alia cum Febre, quæ plus periculi habet.

III. Alia sine malignitate: Alia pestilens & maligna.

IV. Alia, quando materia à toto corpore fluit: Alia, quando à cerebro.

ARTICULUS VI.

De Paronychia & Pernionibus.

Paronychia est tumor in extremis digitis ad latera unguium exortus.

Signa suppeditat situs, & dolor ob nervosarum partium, quæ vicinæ, affectionem; qui se ad totum brachium interdum extendit.

Causa est sanguis adustus, interdum malignus, quem natura eò detrudit.

Curatio instituitur Evacuatione, Doloris lenitione, Suppuratione. Repellentia fugienda, ne dolor exasperetur, humor impingatur: Laudatur ol. Saturni Agricola. p. 216. Mucus aurium cum corio anguillæ impositus, p. 246.

Pernion-

Perniones sunt tumores, tempore hyberno in calcaneis, digitis pedum vel manuum, exorti.

Signa sunt, Refrigeratio præcedens, dolor, pruritus, &c. *Causa*, frigus hybernum partem debilitans, & per illatum dolorem sanguinem attrahens. Diuturnum est malum interdum, & quamvis æstate cessit, hyeme tamen recurrit. In *Curatione*, 1. Frigus immersione membri in aquam frigidam pellendum. 2. Membrum lacte dulci tepido, in quo Rosmarinus, baccæ lauri, &c. efferbuere, fovendum: vel aquæ calidæ, in qua rapa congelata cocta sunt, immittendum.

ARTICULUS VII.

De Ecchymomate.

Ecchymoma est sanguinis in spacia vicina, unde pars lividum colorem sortitur, effusio.

Signis opus non est, cum affectus oculis pateat.

Causa sunt varix; Anastomosis nempe, Diapedesis, Diæresis, Contusio, &c.

Curatio peragitur 1. *Vena-sectione*, si affectus magnus, ne inflammatio excitetur. 2. *Repellentium*, non tamen humidorum, ne sanguis influat, *admotio*ne, quibus discutientia adjicienda. *Melrosatum* pappyro livido impositum; nec non terra *sigillata* cum aqua vitæ dissoluta, juvant. 3. *Digestione*, ubi locum habet radix *sigilli Salomonis* contusa, in vino vel alio liquore macerata. 4. *Cucurbitularum* applicatione, si digerentia non profunt. 5. *Maturantium* mediocrium appositione. 6. *Tumoris apertione*, ne pus vicina corrumpat, vel fistulas cavet. 7. Si membrum ad gangrænam tendit, scarificatur, & aceto calido, in quo radix sigilli Salomonis decocta, abluitur. *Intus*, sanguinem concretum solventibus agendum.

ARTI-

ARTICULUS VIII.

De Carbunculo.

Carbunculus est tumor ex sanguine adusto, crasso, ferventissimo, in atram bilem degenerante, qui partem corrumpit, exortus.

Signa se ita habent. Ulcus crustosum nigricans vel cinereum excitatur: mox brevi bubo rotundus, acutus, ardens, qui circa vesperam exasperatur, erumpit, & caro circumposita effervesct. Concurrent febris, nausea, vomitus, palpitatio cordis, Animi deliquia, deliria, &c.

Causa est sanguis talis, qualis in descriptione expressus est, qui in corpore generatus, & malignitatis gradum adeptus, foras ejicitur, & semper affluxu generatur.

Curatio in genere, Nulla ferè, si mox evanescent, qui crubuerunt. *Difficilis* illorum, qui nigri. & qui in emunctoriis & prope membra nobilia hærent. *Facilior* illorum, qui rubicundi, qui parvi, qui soli. *Modus procedendi* iste est. 1. *Dia*ta ordinetur humida & frigida. 2. *Vena-sectione* statim in principio sanguis fervens tollatur, modò per membrum nobilius non trahatur. 3. Humor malignus præparetur & mitigetur, ubi *scabiosa* præcipuè valet. 4. De *Purgatione* cautè propter febrim acutam deliberetur. 5. *Pars scarificetur*, ubi nota, Repetendam si sanguis id reposcit. Non *attrahendum*, si humor cum impetu affluit, ne febris & dolor augeatur. Imò modicè *reprimendum* medicamentis circa carbunculum spacio trium digitorum positis. Habere hic locum, medulla *pororum communium* cum aceto rosarum cocta & in pulvis formati redacta. *Linimentum* ex bolo Armeno cum q. f. ol. Rosarum, &c. *Emplastrum* Agricolæ T. I. p. 139. *Abluendam* partem scarificatam.

scarificatam aqua salsa calida. 6. Post ablutionem medicamenta putredini resistentia imponenda, præfertim ex *scabiosa* & *succisa*. 7. Si scarificatio non prodest, *urendum*; sed ita, ut crusta statim medicamento seu unguento *Ægypti*. seu catapl. ex *far. orobi* cum q. f. Oxymel. simpl. removeatur, ne inducta, humoris maligni exhalationem impediatur. 8. Crusta ablata, ulcus *detergendum*, &c. Curationem illius vide apud Agricolam T. I. p. 139. si placent.

Differentia est duplex.

I. Alius est *sine pustula*, qui signis illis se prodit, quorum fit in genere mentio, & in curatione nihil singulare habet. Alius *cum pustula*; qui *cognoscitur*, quod pruritus primò sentiatur, mox vel pustula exigua una, vel plures milii semina referentes erumpant, quibus ruptis ulcus crustosum apparet. In *Curatione* nihil singulare obvenit.

II. Alius est *Pestilens*, & tum constitutio est pestilens; *Symptomata*, sunt validiora. *Curatio* est *difficilissima*, si post febrem pestilentem erumpit, occupato ab humoribus malignis corde. *Facilior*, si ante, nisi symptomata superveniant valida. In *processu* ejus hæc notanda. 1. Non secandam venam, quia oritur viribus jam prostratis. 2. Alexipharmacis tam intra quam extra maximè agendum. 3. Vehementer prohibendum, ne putredo serpat. Ad ruptionem laudatur *Emplastrum* Heurnii ex opoponace in Aphor. Hippocr. lib. 4. aph. 55. *Oleum Butyri* Antimonii, *Emplastrum* magneticum. Hartm. chymiatr. cap. de peste. *Oleum* Mercurii Agricol. T. I. p. 139. *Elixir* pestilentielle Crollii, &c. *Cataplasma* ex radicibus raphani cum aceto rosato contusis Joëlis T. 6.

Alius *non malignus* & mitior, qui primum instar phlegmones ruber, deinde flavescit. De ejus curatione vide generalia.

CA

CAPUT II.

De Tumoribus à bile ortis.

ARTICULUS I.

De Erisipellate.

HActenus de Tumoribus à sanguine exortis. A Bile fiunt *Erysipelas*, & *Herpes*.

Erysipelas, seu ignis sacer, est tumor biliosus à sanguine bilioso in aliquam partem subcutaneam confluyente, cum macula rubra, lata, dispersa, exortus.

Signa sunt, Invasio cum horrore; quem febris subsequitur. Vehemens mordicatio & ustio, ita ut vesiculæ interdum excitentur. Color ex rubro flavescens, non ruber ad fuscum vergens; qui pressu subterfugit, moxque redit. Dolor nec pulsans, nec vehemens, & quidem sine tensione ad vicina progressus. Hæc in phlegmone desiderantur.

Causa est sanguis biliosus, qui à calidiore epate, qui quoque eum tenuiorem & mobiliorem facit, producit: vel à natura, propter malignam sæpe qualitatem, ad partes externas pellitur, vel à causis externis movetur, &c.

Curatio est *difficilior*, si osium denudationi aut fracturis supervenit. Si ab exterioribus ad interiora convertitur. Si putrescit, aut suppuratur. Si in facie aut capite oboritur, quia tumore adaucto anginam infert. Si in hepate aut utero gravidarum, quia foetum interimit. *Respicit* 1. *Morbi depulsionem*, ubi locum habet. 1. *Vena epaticæ aut medianæ sectio*, in corporibus plethoricis & crassioribus. 2. *Purgatio* per cholagoga frigidiora. 3. *Sudoris excitatio* per *Theriacam* Andromachi in aqua flor. sambuci, &c. 4. *Topicorum admotio*, quæ liquida & tenuia esse, & crebro renovari debent. *Præcipua* sunt *Lapis* medicamen-

S 2

camen-

camentosus Crollii. *Sanguis menstrualis* in aqua fecnecionis & aceto rosato dissolutus. *Balsamus* Lithargyri cum camphora in aqua spermatis ranarum. *Decoctum* Myrrhae rubeae, olibani ana Unc. i. in vini & aceti ana Unc. iv. *Saccus* lineus, in quo farina sigilliginis fuit, excalesfactus. Linimentum Sebizzii de Acid. in fine. II. *Præservationem*, ubi locum habet *Vena sectio* bis in anno administrata. *Purgatio* per cholagoga. Victus ad refrigerantem & humectantem declinans. *Tibialium* aqua spermatis ranarum imbutarum *portatio*. Præservantis Medicamenti apud Sennert. l. 2. de Febr. c. 16. usus.

Dividitur bifariam.

I. Aliud est *Exquisitum*, cui generalia competunt.

Aliud *Nothum*, idque vel phlegmonodes, OEdematodes, &c. in quo tumor major.

II. Aliud est *simplex*, in quo cutis summa attingitur, & crustulae furfuris instar excitantur. Topica hic refrigerantia præmissis præmittendis parti adhibenda, & discussio naturæ relinquenda.

Aliud *ulcerosum*, in quo ruptis pustulis sanies purulenta exit. conspicua fluxione derepente emergit. pustulas habet magnas humidas. brevi & sponte solvitur; & sic ab herpete distinguitur. Hic paribus cæteris, Topica remedia refrigerantia imponi possunt, donec color cutis alteretur. *Curationem* vide in Rulando.

ARTICULUS II.

De Herpete.

Herpes seu *Formica*, est tumor à bile flavâ, sincera, & ab aliis humoribus secreta, in superficie partis alicujus excitatus, & ad vicinâ serpens.

Signa sunt, Tumor latus & partem exasperans, durities, dolor, sensus ustionis; progressus, quasi in orbem, medio, dum extremitates procedunt, sanescente.

Causa

Causa est Bilis flava, sincera, crassior quàm in Erysipelate, à causis suis procedens.

Curatio respicit I. *Totum corpus*, cui per Evacuationes subveniendum. II. *Partem affectam*, ubi Refrigerandum leniter. Digerendum & discutendum per siccantia, si fervor remissit.

Dividitur in *Simplicem*, & *Exedentem*.

I. *Simplex* seu *miliaris*, qui summam cutem exasperat, & sub una epidermide consistit, exiguas illic pustulas excitans, quæ minimum exstant aut prominent, milio haud absimilis. In eo si pustulae sint, frigida & sicca adhibeantur. Si rumpantur, detergentia. Præstant, Aqua calcis viva cum saccharo Saturni. *Decoctum* *Periscariae*, *foliorum rubi Idaei* in aqua & vino, &c.

II. *Exedens* seu *Ferus* & *Επίδωρος*, raptis pustulis veram cutem exulcerat, serpit in latum & altum, sensim multoque tempore emergit, pustulas aridas habet, diuturnus est & febris expers. Sic ab *Erysipelate* ulceroso distinguitur. Validiora in eo medicamenta adhiberi debent.

CAPUT III.

De Tumoribus à pituita exortis.

ARTICULUS UNUS.

De OEdemate.

Tumor à Pituita est OEdema, & est tumor à materia pituitosa, in partes à facultate expultrice detrusa, exortus.

Signa sunt, tumoris mollities & laxitas, dolor vel nullus vel exiguus, calor subalbidus, calor nullus.

Causa est materia pituitosa; frigidior & humidior massæ sanguineae pars; quæ interdum à natura expellitur, interdum pondere suo deorsum tendit, &

S 3

ad ex.

ad extrema fertur. Occupat præcipuè manus & pedes, quæ membra à fonte caloris remotiora sunt.

Curatio perficitur i. *Diatâ*, quæ pituitam & cruditates non inducat. Pisces saxatiles permittuntur. ii. *Alteratione*, & *Digestione*, ubi profunt *Oxymel* & *Oxysaccharum*. iii. *Resolutione* per discutientia, sed prius pars calefieri frictionibus & fortibus debet. iv. *Suppuratione*, si eò tendere, ex pulsu & dolore percipiatur. v. *Abscessus apertione* & mundificatione, per sua medicamenta. vi. *Cavitatis impletione*. Vide de eo *Platerum*.

Differentia sunt variae.

I. Aliud est *à sola pirnita*, quod diuturnius est; per resolutionem ut plurimum discutitur. Aliud *ab eadem* cum aliis permixta; quod ad suppurationem interdum venit, si præsertim sit in loco calidiore.

II. Aliud est *Ex se*, quod non est periculofum. Aliud *alios morbos insequitur*, ut phthisin, Epatis refrigerationem, &c. quod periculosius est, & mortem minatur. In *curatione* ratio mali, à quo pendet, habenda est.

CAPUT IV.

De Tumoribus ab humore melancholico.

ARTICULUS I.

De Scirrho.

Tumores ab humore melancholico exorti, sunt *Scirrhus* & *Cancer*.

Scirrhus est tumor sine dolore durus, ab humore melancholico crasso, viscido & lento exortus.

Signa sunt, dolor exiguus vel nullus, durities nimia, sensus, quando premitur, carentia.

Causa est humor aut melancholicus: id est, vel sanguinis feculenta pars, vel naturale melancho-

licum

licum excrementum; aut interdum etiam *pituitosus*, qui vel à calore partibus tenuioribus dissipatis incrasatur; Unde inflammationes, Erysipelata, &c. sequitur: vel ab *immoderata* repellentium, adstringentium, & nimis discutientium *applicatione* induratur.

Curatio est Nulla, si sensu destituitur. *Aliqua*, si non. *Difficilis*, propter materiae contumaciam. *Peragitur* i. *Diatâ*, quæ bonum nutrimentum exigit. ii. *Humorum* præparatorum iterata *eductio*. iii. *Causa continentis sublatione*, per emollientia & discutientia, vel simul mixta, vel alternatim adhibita. *Mittiora* in teneris, recenti scirrho, mollioribus. *Validiora*, in durioribus, inveteratâ. Præstant *Emplastrum de cicuta Fabricii* Centur. 3. obs. 25. *Cataplasma* ex radice *bryoniae*, stercore caprillo & urina. iv. Si suppuretur, puris per *emplastrum Diachylon simplex* absterfione, omiffis calefacientibus & sectione, ne in cancrum facessat.

Dividitur in *Legitimum*, qui sensu destituitur, in quo pili supra partem crescunt, *Curari* non potest: & *Nothum*, qui contrario modo se habet.

ARTICULUS II.

De Cancro.

Cancer est tumor rotundus, lividus, aut subniger, venis circumcirca turgidis & repletis, pedes cancri referens, à bile atra exortus.

Subjectum sunt partes tam externæ, quàm internæ, præsertim verò humidiores & superiores, ut mammæ mulierum.

Signa exortus suppeditat ratio. In principio ciccris aut fabæ magnitudinem vix aequat, in processu juglandis & ovi superat, est durus, coloris plumbei vel lividi, vel nigricantis, cum calore, dolore, & pulsatione; venæ in orbem nigro sanguine turgent, & cancri pedes referunt.

Causa est bilis adusta & atra, in venis hærens, nec obcrassitiem penetrare potis; quæ oritur, partim ab alimento humorem talem suppeditante, & à liene non attracto, partim ab intemperie calidiore adurenti.

Curatio est *difficilis* in omnibus; tum quia causa pertinax & maligna: tum quia in profundis venis latet. *Non instituenda*, si occultus. Si in cavitate corporis, palato, sede, utero, exortus. *Nulla*, si confirmatus & in parte nobiliore sedet. *Alicujus spei*, si exiguus, recens, & in summa corporis parte hæret. Quomodo sit peragenda, vide in differentiis. Quantum ad *differentias*.

I. Alius est *Exulceratus*, qui facile *cognoscitur*, & ab acriore materia oritur. Exhibet autem corruptæ carnis speciem, cum fœtore, fordida illuvie, horrido aspectu, labris præduris & inversis. febris adest lenta, animi defectio, sanies nigra aut fulva, sanguinis profusio, &c. *Curatio* ejus vel est *palliativa* per exsiccantia & refrigerantia lenia: vel *vera*. 1. Per *incisionem* ad vivum usque; quam sequi debet sanguinis vitiosi expressio, ulceris concoctio, mundificatio, (vide pulverem apud Hartmannum de cancro mammillarum) per carnem repleto, &c. 2. Per *ustionem* seu actuaalem seu potentialem, si profundiora & majora vasa occupata sunt.

Alius *non ulceratus*, qui à mitiore fit materia. *Curatur*, 1. *Diaeta* humectante & refrigerante. 1. *Vena-sectione*. 3. *Humoris* per *fumariam*, *lupulum*, *succum pomorum redolentium*, &c. præparati, per extractum *hellebori*, pillulas lapidis *lazuli*, repetita *evacuatio*ne. 4. *Topicor. applicatione*, ubi occurrunt. *Repellentia* lenia, ut *Sperniolæ* compositum. *Discussientia* non mordacia, ut *Pulvis benedictus Hartmanni*, *Magister. testar. cancri*, &c. vide & *Agricolam T. I. p. 145.*

II. Alius

II. Alius est à *suppressione mensium*: Alius ab *Hæmorrhoidum*. *Curatio* ad affectus obvertenda est.

CAPUT V.

De Tumoribus ab humoribus serosis, salsis & biliosis, inter se mistis.

ARTICULUS I.

De Scabie.

Tumores ab humoribus inter se mistis exorti, vel oriuntur ab humoribus salsis, serosis, & biliosis: vel à pituita, melancholiâ & bile, ita ut conjuncta causa non amplius humor sit, sed alia materia ex humoribus genita. Ad illos spectant *scabies*, *Lepra Græcorum*, *Phlyctæna*, *Sudamina*, *Sirones*, *Vari*, *Epinyctides*, *Alphus*, *Leuce*, *Impetigo*, & *Gutta rosacea*.

Scabies, seu *Ψωρα*, est tumor à sanguine corrupto exortus, cum cutis intemperie & exulceratione affligens.

Signa in definitione exposita sunt.

Causa est sanguis corruptus, cum atra bile & pituita salsa mistus; qui vel à diætâ simili, accedente præsertim exsuperante epatis calore provenit; vel à contagio corrumpitur: ad cutem verò delatus, in ea hæret, & exulcerationem excitat.

Curatio peragitur 1. *Diaeta*, quæ cibos elixos exposit. 2. *Humorum contemperatione*, *evacuatio*ne, & hepatis per *Syrupum corallorum Quercetani* ad pristinum statum reductione.

Dividitur trifariam.

I. *Alia* est symptomatica, cui dicta applicari debent.

Alia Critica, post morbos tum acutos, tum diuturnos exorta.

II. *Alia* est *Humida*, quæ saniem humidam multam

tam fundit. *Apituita salsa* existit. *Curatur* facilius quàm sicca, & quidem, 1. *Evacuatione*, ubi serum lactis caprini, fumaria &c. probantur. 2. *Sudorum provocatione* vel per *Spiritus Ebuli* unc. f. & *Aquæ fumar.* unc. ij ss, vel *Antimonium Diaphoreticum*, vel *Spiritus Guajaci*, si contumacior est. 3. *Topicorum applicatione*. Habent hic locum balnea dulcia & sulfurata. Illitus ex frangulæ flavo & medio cortice cum aceto. *Vnguento Sennerti* l. 5. p. 1. c. 27.

Alia *Sicca*, in qua vel nihil excernitur, vel paucum & crassum, & ulcera sunt livida. *Oritur* ab humore adusto. *Curatur* difficilius, & quidem ut prior, habitâ ratione causarum. Alia *Volatica*, quæ totam cutem unicâ ferè nocte occupat. In hac, universalibus præmissis, valet ablutio ex sanguine in partu ex utero elapso, cum tota secundina, vel ejus parte. Vide Agricol. T. p. 280.

III. Alia *Malum Mortuum* dicta, quæ cum livore & nigredine, pustulis crustosis, nigris, siccis, sine sensu & dolore, in tibiis præsertim affligit. A succo melancholico & scorbutico *oritur*. Eadem ratione, habito diversitatis respectu, *curatur*. Alia *Lepta Gracorum*, quæ solo gradu ab aliis differt. *Cognoscitur* ex eo, quia profundiora cutis depascitur; & quasi squammæ piscium, seu scalpentibus seu non scalpentibus decidunt, sudor est foetidus. *Oritur* ab atra bile, cum pituita salsa sæpe conjuncta. *Curatur* iisdem, sed fortioribus, quibus scabies. Epar maximè corrigendum. Sudor decocto *sassæ parilla*, *Guajaci*, & *Chinæ* eliciendus.

ARTI-

ARTICULUS II.

De Phlyctenis, Sudaminibus, Sironibus,
& Varis.

Phlyctæna sunt vesiculae in cute ab humoribus acerrimis excitatae. *Cognoscuntur* inde, quod similes sunt iis, quæ ab aquis excitantur, & ruptas subflavus humor excipit. *Oriuntur* à bilioso serosoque humore, qui ad cutem vel à natura, vel à causa externa protruditur. *Curantur* universalibus, si opus, præmissis, decocto *lentium*, Epithemate ex *lixivio fortis cinerum fagi* cum ol. lini & nucum part. æqual. permixtis, & sæpius applicatis. 2. *Ruptione*, cataplasinata exsiccante statim imposito.

II. *Sudamina* seu ὀδῶνα. sunt exanthemata granis milii similia, quæ cutem ulcerosam exasperant. *Cognoscuntur* facillimè. *Oriuntur* à nimis sudoribus sub cute coercitis, æstate præsertim calida & humida, post diætam calidiorem. *Curantur* ablutione per aquam quercus, cui Camphoræ gr. i. vel alterum adjici potest.

III. *Sirones* vel *Chirones*, sunt pustulae in volis manuum vel plantis pedum, vermiculos intus habentes. Vermiculi effodendi sunt: post locus ablendus, decocto *quercus cum alumine*; vel *sulfuris* cum ana Tartari.

IV. *Vari* seu ἰόδοι, sunt tumores duri & parvi, in faciei cute, à crasso succo congregati. *Cognoscuntur* facile. Sunt magnitudine seminis cannabini, & adolescentes ad Venerem aptos, prolificos, sed continentés infestant. *Oriuntur* ab humore plerumque alimentari, qui se poris cutis insinuat, & interdum sanguinem atrabilarium admistum habet; & tum ichorem profundunt, & in ulcera abeunt. *Curantur* difficulter, si rubor in facie intensus cum pustulis. si idem

idem cum inflatione faciei & rauedine vocis jungitur. *Curatio* vero fit, præmissis sanguinem purificantibus, per discutientia, & emollientia. Laudatur *Ol. Vitrioli, sulfuris* aut *Tartari* illitum vesperi, manè aqua calida, in qua farina fabarum macerata, ablutum.

ARTICULUS III.

De Epinyctidibus, Alphi, & Leuce.

Epinictides sunt ulcuscula, sua sponte, nocturnè præsertim, in eminentibus partibus erumpentia, bullis similia, quibus disruptis cruenta sanies effluit. Cognoscuntur, ex colore sublivido, vel subnigro, vehementi inflammatione, dolore noctu se exacerbante, propter atri humoris motum, & frigus nocturnum poros cutis adstringens. *Oriuntur* ab humore seroso & pituitoso, carbunculi causam exceptâ malignitate & tumoris magnitudine imitante. *Curatio* in Evacuatione & Topicis ferocitatem causæ temperantibus, consistit.

II. *Alphi*, aliis *Morphææ*, sunt macule magne, cuti, cujus colorem mutant, sparsim cum asperitate quadam insidentes. *Oriuntur* à sanguine malè nutriente, & infestant viros magis quàm fœminas & pueros. Sunt vel *Nigra*, à melancholico sanguine vitio lienis exortæ, quæ curantur præmissis universalibus, bonâ victus ratione, balneis, illitione pulveris *sinapi* cum aqua misti: vel *Alba*, nec tamen exactè cum vicini albo colores interdum intercurrent, quæ à sanguine pituitoso, vitio inprimis epatis, fiunt. Cutis est ab illis alba, sed non pili, & si pungatur, sanguis exit. *Curantur* facilius, quàm nigrae. *Vena-sectionem*, propter sanguinis frigiditatem, non exigunt.

II. *Leuce* est macula continua, & cutis & carnis colorem ac substantiam mutans. Cognoscitur, tum ex

iis,

his, quæ in descriptione posita sunt: tum ex eo, quod in ea pili decidunt, & alii lanugini similes succrescunt. Cutis magis depressa est. Si acufiatur, humor aqueus & albus effluit. *Oritur* à pituitoso sanguine, quo caro nutrita primò media inter sanguinem & exsanguem post, ubi nutrimentum in rubram carnis speciem non mutat, instar ostrearum & locustarum carnis, evadit. *Curatio* est *Nulla*, si cutis dum fricatur non rubescit. Si, dum pungitur, sanguinem non emittit: si macula in horas incrementum sumit. *Difficilis*, si exigua: si ruborem aliquem fricata concipit, aut in manu vel pede hæret. *Abfolvitur*, 1. *Preparatione humorum* per calefacientia & incipientia. 2. *Evacuatione* per phlegmagoga. 3. *Topicorum applicatione*, fricatis primò panno aspero partibus.

ARTICULUS IV.

De Impetigine & Gutta rosacea.

Impetigo, seu *Lichen*, sunt pustulae in cute dura, & ad vicina serpentes, sicca cum asperitate & pruritu magno conjuncta. Cognoscitur ex iis, quæ in definitione posita sunt. *Oritur* à tenui, acri, seroso, & cum humore terrestri mixto succo, qui à diæta simili procedit, & interdum vere, interdum autumno, ad exteriora defluit, vel protenditur. *Curatur*, 1. *Diæta*, à qua falsa & acria abesse debent. 2. *Alteratione* & *evacuatione* humorum, si nimium peccent. 3. *Topicorum applicatione*. Laudatur, præmissa fomentatione, ex malva, verbasco, & fumaria, *Unguentum citrinum* cum oleo ovorum, sulphure vivo. *ol. ceræ*, *charyophyllorum* & *camphora*. Item *ol. Tartari per deliquium*, cum ana *ol. ceræ*. *Dividitur* in *Mitem*, qui saliva jejuni hominis inuncta, vel rad. *Oxylapathi* cum aceto trita, interdum tollitur: & *Ferum*, in quo, præter superiora, locum habet

Aqua

Aqua ex ol. Tartari destillatione cum Mercurio crudo, proportionem illius quadrupla. Joëlis experimentum ex ferri excremento l. 10. pract. f. 3.

II. *Gutta rosacea, est tuberosus, pustulosus interdum, & guttas rosaceas referens faciei rubor. Cognoscitur visu. Ortum* dat sanguis crassus, fervidus, vitio epatis ab ortu vel diæta tali genitus, ad faciem delatus, ibidemque ob crassitiam hærens. *Curatur* 1. *Epatis fervidi* ad temperiem suam per cichorii, fragorum, & corallorum Syrupos deductione. 2. *Ejusdem infarctionis deobstructione.* 3. *Topicorum,* id est, *menstrui virginis* in aqua calida soluti, Olei buffonum, &c. applicatione. Vide *Hartman. de rubore & pustulis faciei.*

CAPUT VI.

De Tumoribus, in quibus humor periculari membrana concluditur.

AD Tumores tales tria pertinent:

I. *Struma seu scrofula, scirrhusus glandularum tumor, peculiari membrana conclusus.* Eorum *subjectum,* sunt glandulæ in cervice, collo, mammis, axillis, inguinibus. *Cognoscuntur visu,* apud Alpinos præsertim homines. *Oriuntur* ab humore pituitoso, melancholico, misto, qui à cruditate ciborum provenit: seu à crassiore succo partes has nutriende eidem immisto, qui peculiari membrana à facultate formatrice productæ includitur. *Curationem* vide l. 5. peculiari capite. *Dividuntur* 1. *In simplices,* de quibus nunc, & *Cancrosas,* quæ cancro propter atrem bilem miscentur. 11. *In liberæ,* quæ nulli vasi junguntur, & *Infiltratæ,* quæ cum arteria, vena vel nervo aliquo insigni conjunguntur.

II. *Ganglion est tumor supra os situs, à nervi præter naturam convulsionem, qui in unum corpus coarctat,*

coarctat, exortus. *Subjectum* sunt partes, quæ non multâ carne, sed cute duntaxat teguntur. *Cognoscitur,* tum ex situ, tum ex eo, quod doloris sit expers, quod sit ovi magnitudine, ad latera tendi possit, pressus torporis sensum excitet. *Oritur,* cum occasione ictus, extensionis, aut laboris, nervus vel tendo extenditur, & quasi rumpitur. inde partis nervosæ excrementum exsudat, circa fibras & nervosas partes adhærescit, & à facultate illarum formatrice, in hanc substantiam mutatur. *Curatur,* Emollientibus, ut Emplastro de *Ammoniaco*; & Digerentibus: quod si ista non satisfaciunt, suppurantibus, & sectione; de qua vide Authores.

III. Tumores illi, qui ab eadem quidem causa sunt, humore nimirum pituitoso, vel succo alimentari, materia tamen folliculo inclusa distinguuntur, & inde sua sortiuntur nomina. Nam *Meliceris* dicitur, si materia inclusa mellis est similis, tumor rotundior, & ad pressum digitorum cedens. *Atheroma,* si pulti frumentaceæ similis, & tactu durior. *Steatoma,* si sebo.

CAPUT VII.

De Tumoribus à solida substantia.

AD Tumores tales tria referenda sunt:

I. *Verruca, seu tumores monticulorum instar in cute.* *Cognoscuntur* facillimè. *Oriuntur* vel à materia crassâ melancholicâ & pituitosâ, vel ex succo cuti & cuticulæ alendæ destinato. *Curantur* vel per applicationem appropriatorum, ut sunt, succus folior. *salicis, Cichorium verrucarium.* *Aqua supernatans truncis quercuum bipenne detruncatorum.* *Lac tithymalli, Cepa* cum sale confusa. *Dividuntur* in *Pensiles,* quæ *Acrochordones* Græcis dicuntur, parte summa latiores, ima quæ ad cutem tenuiores, quæ

quasi pediculo innituntur: *Thymia*, quæ colorem thymi repræsentant, ad cutem etiam tenues sunt, in summo latæ, duræ, & asperæ, pensilibus minores. & *Sessiles*, quæ Græcis *myrmecia*, humiliores thymiis, lupino vix majores, duræ, latiore basi, radices altè exigentes, dolorem cientes.

II. *Clavi*, qui in digitis plantisque pedum ex calcei pressu aut intertrigine nasci solent; acuto interdum dolore sponte ferientes, semper verò ingredienti molesti. *Inungi* debent sanguine anguillæ, Oleo *Mercurii*; & postquam emolliti fuerint, oleo *Limacum*. Si inciduntur, eluantur urinâ canis, superposito emplastro ex cera rubea.

III. *Callus* obdurata est summa cutis ex labore, in palmis aut in inferioribus pedis plantis fucrescens. Nullam radicem altè demittit, ac prorsus doloris expertus est. Possunt calli radi, præmissis lavacris frequentioribus.

CAPUT VIII.

De Tumoribus à partibus solidis aliò incumbentibus.

ARTICULUS UNICUS.

De Aneurismate, Varice, & Elephantiasi Arabum.

Tumores à partibus solidis procidentibus vel incumbentibus exorti, sunt plures: Nos hic duntaxat de *Aneurismate*, *Varicibus*, & *Elephantiasi Arabum* dicemus; reliqui suo loco occurrent.

I. *Aneurisma* est tumor ab arteria tunica interioris apertione, exterioris dilatatione exortus. Cognoscitur, quòd sit tumor mollis, pulsans, digitis plerumque

rumque cedens; & si non cedit, nec pulsus est, quòd in magno accidere potest: tamen strepitus quasi bullientis aquæ, ob spirituum per angusta meatum, percipitur, & sic ab Ecchymomate distinguitur. *Oritur* vitio arteriæ, quæ ratione tunicæ internæ, quæ dura & crassâ, aperitur; ratione externæ, quæ tenuis, mollis & rara, dilatatur. Id fieri solet, vel à sanguinis impetu, vel ab aliqua violentia; sæpissimè cum vel arteria pro vena secatur, vel cum vena simul arteria læditur. Tum enim exterior tunica utpote molli, & venarum tunicis cognata, coalescente, internâ apertâ, per foramen sanguis & spiritus erumpere conatur, & externam distendit. *Curatur*. Difficulter, si minus, si recens. Nullo ferè modo, si antiquum & majus; & si sectio fiet, periculum mortis infertur. *Instituitur* curatio, 1. *Repellentium* & adstringentium applicatione; ubi Emplastrum contra rupturam, & alia. 2. *Sectione*: de qua vide authores.

II. *Varix* est vena dilatatio. Fit præcipuè in cruribus, sub umbilico, aliquando & in temporibus. Accidit imprimis viris, vix tamen ante pubertatem. *Cognoscitur*, quòd venæ turgent, pars sit livida aut nigra. *Oritur* à crasso melancholico sanguine, eo vel pondere delapso, vel à causa violenta detruso. *Curari* non debent varices, si sunt critici, & ab aliis morbis, ut ab insania solent, liberant. Si curandi sunt, duriter sectione; optimè extractione (de qua Aquapendens) curentur.

III. *Elephantiasis Arabum* est tumor pedum à sanguine melancholico, pituitoso, & varicibus, exortus. Crura in eo sunt tumida, livida, nigra, ulceribus scatentia. *Curari* vix potest, nisi assiduè curetur.

CAPUT IX.

De Tumoribus malignis.

ARTICULUS UNICUS.

De Elephantiasi.

Tumores maligni varii sunt, *Bubones* nempe, *Carbunculi*, *Morbilli*, *Varioli*, *Elephantiasis*. De illis superius actum; de istis l. 3. agetur. restat *Elephantiasis*, de qua hic. *Elephantiasis*, quæ & *Leontiasis*, & *Satyriasis*, & *Lepra*, est tumor totius corporis canerosus, ex atra bile, venenata qualitate infecta, & in totum habitum corporis effusa, exortus, multa symptomata inferens.

Elephantiasin dico, non *Arabum*, nec *lepram* *Judæorum*.

Signa sunt, vel *incipientis*, maculæ crebræ in corpore, cutis asperitas cum tuberibus duris instar anseris deplumati, cum squammis & rimis plurimis, præsertim in facie, manibus, & pedibus, casus pilorum. Vel *ingravescentis*, impetigo summorum digitorum & menti, superciliorum crassorum, prominentium deorsum, vocis rauco, sudor facili in salem redigitur, qui in aqua non solvitur, sanguis lotus granulosa & arenosa post se relinquit. Examen *Elephantiacorum* vide apud *Horstium* Epistol. Medicar. f. 4. T. I.

Causa est humor melancholicus, & bilis atra; quæ vel à causis externis, constitutione aeris sicca & diæta simili; vel ab internis, intemperie nempe jecoris sicca & calida oritur, venenatam quoque & contagiosam qualitatem, unde & consuetudine morbus acquiritur, contrahitur. *Curatio* est *Nulla* confirmata, *Difficilis* incipientis. *Absolvitur* 1. *Diætâ*,
ubi

ubi locum habet *vinum viperinum*, & carnes ipsarum capite & cauda abscissis coctæ, pomaceum, pulli gallinacei viperarum vel colubrorum carnibus pasti. 2. *Præparatione humorum*, per herbam *Kunigundis* cum fumaria in sero lactis decoctam, *Aquam fragorum*, *cuscuta*, *Decoctum Tamarisci*. 3. *Evacuatione*, tum per *Vena-sectionem*, quæ vere instituenda, particulatim in utroque brachio, vel maleolo: tum per *purgationem*, ubi *Extractum hellebori*, serum lactis cum *Epithymo* valet: tum per *Hæmorrhoides*. 4. *Balneorum* usu tam dulcium, quam sulfurearum, &c. 5. *Appropriatorum* exhibitione, sanguinis nempe *leporini* calidi, salium *Theriacalium*, *Theriace*, *Bezoartici animalis*. 6. *Symptomatum mitigatione*: de quibus suis locis. 7. *Visione*: de qua videantur *Authores*.

Quantum ad *Differentias*, quatuor ipsius sunt species:

I. *Alopecia*, in qua rubedo est obscura, faciei tumor, oculorum rubor, narium hæmorrhagia. *Oritur* à sanguine & reliquis mitior est.

II. *Tyria*, à serpente squamoso tyro, qui vere spoliolum exuit. in qua albedo, squammæ, & furfures afficiunt. *Oritur* à phlegmate.

III. *Leonina*, à rugis frontis leonis dicta, in qua puncturæ, mordicationes, impetigines. *Oritur* à bile, & citissime ad augmentum pervenit.

IV. *Elephantiasis*, reliquis major, & tardior, à melancholia ortum ducit, nigredine turbata, nodis ac stupore se prodit. Hæ species rarò sunt separatæ, frequentissime complicantur.

TITULUS II.

De Cutis affectibus.

CAPUT I.

De Lentiginibus, Ephelidibus, Nævi materni, & Maculis infantum.

Alterum morborum exteriorum genus sunt cutis affectus, sub quibus comprehenduntur, *Lentigines, Ephelides, Nævi materni, Macula infantum, Macula hepatica, Pruritus, & malus odor.*

I. *Lentigines, sunt macula lentis magnitudine, modo faciem, modo pectus, modo manus defœdantes, ut plurimum fusco colore prædita. Cognoscuntur ex descriptione, & eo quòd sint familiares corporibus rubeis, & pilum rufum gerentibus. Oriuntur à sanguine, seu ab internis causis, seu à solis ardore adusto; cuticulam, frontis inprimis, quia ea densior, vapores diutius retinet, occupante. Curantur Aqua storum sambuci, fabarum, scrofularia, & tota planta destillata. hircino, vaccino & caprino lacte, cum vitri pulvere immisto. Gummi cerasorum in aceto forti cum pauxillo farinæ avenacæ dissoluto. His vel ablui vel inungi debent.*

II. *Ephelides sunt macula in gravidis fuscae, frontem inprimis, tempora, vel genas occupantes, sepe palmi longitudinem æquant. Cognoscuntur ex symptomatum, quæ gravidas afficere solent præsentia, præsertim vini & ciborum odio, frequenti salivatione, & ventriculi morfu. Oriuntur à menstruum suppressione: in virginibus interdum à betarum usu. Laudatur pulmentum ex bacis lauri pulverizatis, & aqua fungorum in balneo illitum.*

III. *Nævi materni sunt macula ab imaginatione maternâ fortè impressa. Abstergantur, vel secun-*

dina calente, vel sanguine ejus; facilius, si clanculum, ut vulgus opinatur: vel aqua Caryophyllata montanæ destillata, si infans eâ ablutus fuerit: vel sanguine menstruo.

IV. *Macula infantum volatica, sunt macula rubra & purpurea, hinc & inde serpentes; quod si orificium aliquod, puta os, nares, oculos, aures attingerint, malum lethale fieri existimatur. Ad præcautionem orificia aqua rosarum cum pauxillo croci illinenda sunt.*

CAPUT II.

De Maculis hepaticis, Pruritu, & malo Odore.

Macula hepatica, sunt macula fusca, interdum evanescentes, mox emergentes, cum levi quadam cutis asperitate, & squammarum emissionem. Cognoscuntur ex descriptione. Oriuntur à sanguine crassiore, qui cum assimilari non possit, excrementitium quod est ad cutem mittit: si diu durant, comites habent quartanas. Curantur Diaceta, & præmissis universalibus, balneis, quas antecedit Theriacæ usus; sequatur illitus seminis viridis sinapi, cum aqua in pulvis formam redacti, qui fervore exorto ablui statim debet. Sanguis humanus cum lacte humano destillatus, etiam valet.

II. *Pruritus, est dolor desiderium scalpendi excitans, sine cutis asperitate & ulceratione. Subiectum est interdum totum corpus; præcipue autem plantæ pedum, quia istæ chorda latâ, magnâ, & cute durâ, ut humores liberè exhalare non possint, obsectæ sunt. Cognoscitur ex ipso sensu. Oritur vel à bile, vel pituitâ salsa tenui, ut per minimas particulas sese insinuet; sed viscida & lenta, ut partibus tenacius adhæreat: quæ ortum ducit à cibis salis, calidis, Bpa-*

ris calidi & siccū vitio. *Curatio* est *rara* in decrepitis. *Nulla* in tabescentibus, si alvi suppressioni succedat. *Absolvitur*, I. *Attemperatione humorum* per serum lactis caprini cum syrupo fumariæ. II. *Evacuatione causæ* antecedentis per jalapam & Syrupum florum persicorum. per hæmorrhoides & menses, si horum detentio in causa. III. *Mitigatione* per balnea dulcia, quibus argilla furnacea injicienda, & Unguentum Hartmanni. IV. *Discussionē*, per eadem, quibus parietaria, malva, lapathum acutum, alumen, sulfur, vitriolum, &c. indi debent.

III. *Malus odor interdum è toto corpore, interdum ex partibus, ut alis, pudendis, pedibus, expirat.* Ex illo, seu ob quandam *idiosyncrasiam*, seu ob contaminatum in utero sanguinem & semen, seu ob aliquod tempore gestationis accidens. Ex his, ob affluxum humorum excrementitiorum, in corporibus humidis, qui eò detruſi, quod liberè exhalare non possint, putredinem & foetorem concipiunt. In *Curatione* ratio est habenda Universalium. *Dista* ad siccum vergat, & putredini resistat. *Partes* illæ sæpissimè, decocto scabiose, myrrha, guajaci abluntur, & unguento ex rad. irid. florent. ligno aloës, balsamo citri, nucis moschata compositum inungantur, vel *Αλγ. πικρ. μ. σ.* aspergantur.

TITULUS III.

De Capillorum vitiiis.

CAPUT I.

De Capillorum casu.

Tertium morborum externorum genus sunt Capillorum Vitia, sub quibus comprehenduntur Capillorum casus, Canities, Porrigo, & Plica.

Capit

Capillorum casus est, quando illi ob certas causas decidunt. Dividitur in aliquot species, Desfluvium nempe, Calvitium, Aream & Tineam.

I. *Desfluvium, est decidentia sparsim facta, ut vel omnes, vel plurimi hinc & inde decidunt. Cognoscitur facillimè. Oritur à diversis causis: 1. Ab alimenti defectu, qui fit in tabidis, & febre maligna laborantibus. Tum in tabe nulla ratione vitium emendari potest. In aliis, capitis frictions adhibendæ, ut nutrimentum eò feratur. Caput decocto herbarum capillarium abluendum. II. Ab humoris radices capillorum erodentis pravitate. Tum, præmissis universalibus discutientia moderatè adhibenda. Ladanum unguentis admiscendum. III. A Cuius raritate. Tum cutem densantia, ut ladanum, oleum lentiscinum & myrtinum, decoctum radicis bardanæ, in lixivio adhibendum.*

II. *Calvities est, quando pili in syncephite decidunt. Cognoscitur ipso adpectu. Oritur ab alimenti defectu, ob cerebri siccitatem, seu per ætatem, seu propter aliquam violentam causam, ut nimium Veneris usum, contractam. Curatio calvitiei nulla est: præcaveri tamen & retardari potest. 1. Bona dista, in qua acria, falsa, adstringentia, vinum potens, Venus nimia, fugienda. 2. Alimenti pilorum refectione, per medicamenta cerebri siccitatem corrigentia. 3. Alimenti ad capillorum radices attractione. Ubi locum habent frictions moderatæ, attrahentia moderatè adstringentibus juncta. Ladanum in oleo mastichino dissolutum. Capitis decocto sœnigræci lotio, &c.*

III. *Area, est capillorum areatim factum desfluvium, à pravo & corrupto humore, pilorum radices erodente, exortum. Cognoscitur ipso adpectu, & ex differentiis; de quibus postea. Oritur ab humore in descriptione posito, præsertim pituita falsa, adusta,*

adusta, & putrefacta, vitio cerebri & epatis calidig-
ris, ciborum ut fungorum, corruptorum, producta.
Curatio est facilis, si malum recentius. Si locus
fricatus, citò rubescit. Si arearum extremitates capil-
lis restantibus finitimæ iterum pilos emittere inci-
piunt. *Difficilis*, si densa cutis, subpinguis, & ex to-
to glabra. si malum antiquum. *Nulla*, si frictus lo-
cus non rubescit. *Peragitur* 1. *Humoris vitiosi eva-
cuatione*, per purgantia & apophlegmatismos. 2. *E-
jusdem*, dum in fluxu est, *repulsione*. 3. *Ejusdem cuti
impacti digestionem*, per medicamenta *pelagorum* &
ægæ, calida, tenuium partium, non admodum sicca,
ne alimentum discutiatur. *Debiliora* primò, ut *a-
brotanum*, *radices arundinis ustas*: post fortiora, *si-
napi*, *nasurtium*, *radic. liliorum alborum*, quæ in
principio liquidiora esse, & eo usque relinqui, dum
in cute aliqua alteratio percipiatur, debent. *Adeps
ursinus* à proprietate juvat. fieri ex eo cum pilis urfi
ustis, oleo lentiscino & superius positus, potest un-
guentum. *Dividitur dupliciter*. 1. In *Alopeciam*,
quæ sub qualibet figura dilatatur. in barba & capil-
lo fit. in qualibet ætate est. & *Ophiosin*, quæ inci-
pit ab occipite, duorum digitorum longitudinem
non excedit: ad aures duobus capitibus serpit, qui-
busdam etiam ad frontem, donec se duo capita in
priorem partem committant. infantes maximè affi-
cit. In ea etiam cutis superficialiter exoriatur, cutis
color mutatur, & si pungatur, serosus sanguis exit.
II. In eam quæ à lepra, insanabilem. quæ à *Lue ve-
nerea*; & quæ ab aliis mitioribus causis.

IV. *Tinea*, quando capilli frustillati & particula-
tim à vermicibus quibusdam erosi & absorti deci-
dunt. *Cognoscitur* ex eo, quod pili breviores & inæ-
quales sunt. vermiculi in extremitatibus eorum hæ-
rent. color pilorum cineritius evadit. *Oritur* ab ex-
crementitio humore cum alimento pilorum in capil-
los

los penetrante, & in iis à calore in vermiculos abeun-
te. *Curatur*, Universalibus præmissis, abstersione,
per decoctum *Vrtice majoris*, *centaurii minoris*, &c.

CAPUT II.

De Porrigine & Plica.

Porrigo, *furfuratio*, *πυρρα*, est, cum scalp-
tibus *furfuribus* similia ex capitis cute decidunt.
Oritur ab humoribus serosis & ichoribus biliosis ac
pituitosis, qui cum alimento pilorum ad caput effe-
runtur; partibus tenuioribus discussis, crassæ circa
pilos hærent, & in materiam furfurum abeunt. à ce-
rebro calidiore attrahuntur. *Curatur* Evacuacione
materiæ peccantis. Discussionem & abstersione, cum
pauculo adstringentium. Decoctum *Cicerum* &
malva hic locum habet.

II. *Plica est capillorum in cirrhus complicatio*, à
materia capillorum nutrimento utili, corpori inutili
exorta, multa symptomata invadens. *Cognoscitur*
ex capillorum cirrhis, doloribus, artus & ossa in-
festantibus, convulsionibus, pediculorum copia.
Ungues in pollicibus pedum sunt scabri, nigri,
instar cornu hircini. *Causa* sufficienter explicari ne-
quit. Putatur esse materia alimentum copiosum pi-
lis suppeditans, corpori verò noxia: illis ita fami-
liaris, quemadmodum materia in arthritide serosa ar-
ticulis; vel osteocolla ossibus; Unde si capilli radan-
tur, sanguinem fundunt. *Oritur* à peculiari loci æ-
ris & aquarum vitio. defertur eò cum sanguine. Acce-
dit interdum veneficium. *Curatio est bonæ spei*, si nul-
li dolores adsunt. sic enim excrementitia materia in
capillos deponitur, & virtus est fortior. Perfecta nul-
la, cum causæ non sint benè cognitæ. Purgationibus
& venesectione exasperatur. Quidam caput decocto
branchæ ursinæ ablunt. Adhibuit quidam rusticus &
balnea,

balnea, in quibus ægri primò hirsuti evadebant, post pilis absectis sanabantur. Vide *Herculem Saxoniam*.

TITULUS IV.

De Ulceribus in specie.

CAPUT IV.

De Gangræna.

Quartum morborum externorum genus sunt *Ulceræ*, sub quibus comprehenduntur, *Gangræna*, *Sphacelus*, & *Ambusio*. *Gangræna*, seu *Ignis S. Marcelli* & *Antonii*, est partium imprimis molliorum ad mortificationem tendens corruptio, à caloris nativi in parte corruptione, suffocatione, dissipatione, vel extinctione procedens.

Signa sunt, coloris in parte in lividum mutatio, pulsus & sensus imminutio, caloris abolitio. Motus manet, si caput musculi integrum est: nec semper tumor adest. ulcus necessariò accedit. *Causa est*, caloris nativi in parte corruptio, suffocatio, dissipatio, extinctio.

Curatio semper *Difficilis*, inprimis, si cum affluxu humorum est. si partibus humidioribus insedit. si cum hydropse conjungitur. *Peragitur*, I. *Dia* conveniente II. *Debita* per venæ sectionem & purgationem evacuatione. III. Cordis per cardiaca contra vapores putridos roboratione. IV. *Partis sanæ* contra serpentem putredinem per defensiva & *Ale-xipharmaca munitione*.

Differentia à causis sumuntur, quæ sunt vel *externe*, vel *interne*.

I. Alia est à *Frigore nimio calore* partis opprimente. *Cognoscitur* ex eo, quòd subito acutus & pungens dolor affligit. Rubor partis mox in lividum mutatur, frigus ac stupor quasi per quartanas percipitur.

pitur. *Curatur*, I. Partis frigidæ in frigidam immersione, vel per eandem frictione. 2. *Potionum* calidarum intus exhibitione, ut sudoriferis benignioribus excitetur. 3. Postquam calor redit, partis calidis liquoribus frictione, ubi decoctum raporum locum habet. 4. Si jam gangræna adest, *scarificanda* & *fovenda* sunt partes cardiacis calidis.

II. Alia à *ligaturis spiritus* & *sanguinem* interceptantibus. *Cognoscitur* facile, In *Curatione*, ligatura solvenda, Medicamenta putredini resistentia & discutientia imponenda. Si gangræna processit, ex sequentibus agendum.

III. Alia à *Defectu alimenti*, seu *atrophia*. *Cognoscitur* ex eo, quod præter maciem, nec tumor, nec calor, nec dolor adest. cum pustulæ excitantur, dolor & febris exoriantur. In *Curatione*, *Dia* tam calidam & humidam præscribe, *Corpus* oleis humectantibus illine. *Alimentum* ad partem per cucurbitulas non scarificatas, olei lumbricorum terrestrium &c. inunctionem attrahe. *Partem* si gangræna procedit, *scarifica*, & sicut inferius dicitur, age.

IV. Alia à *Calore externo*, quod post magnas *ustiones* accidit. Tum in *Curatione*, *Dia* tam frigidam præscribe. *Humores* calidos alteratos evacua. *Membrum* scarifica, mox ablue, &c. Ad *cauterium actuale*, nonnisi necessitate adactus procede.

V. Alia à *Venenatorum animalium morsu*. *Cognoscitur* ex relatione ægri. In *Curatione* I. *Attrahendum* venenum per cauterium actuale vel scarificationem. *Applicanda* medicamenta putredini resistentia & attrahentia. 3. *Ulceræ* ex scarificatione, vel ustione exorta *mundanda*, ubi *spiritus vini* non obliviscendum.

VI. Alia ab *Humorum malignorum ad externa affluxu*. *Cognoscitur* ex eo, quod in partibus maxime extremis vesica, cui macula nigra subest, apparet.

ret, febris continua, lipothymia &c. adfunt. *Curatur*, 1. *Diatra* siccante, cui cardiaca refrigerantia indantur. 2. *Vena sectione* & evacuatione, si opus. 3. *Sudoriferis*, quibus hic vehementer agendum. Dictamnum creticum, vincetoxicum, Theriaca valent. 4. *Scarificationibus*, cucurbitulis, hirudinum ad partem affectam, si sanguis scarificatione parcius educitur, applicatione. 5. *Partis* de cocto, inprimis scordii, *ablutione*. Defensiva hic obsunt.

VII. *Alia ab inflammatione, transpiratione prohibita, calorem suffocante. Cognoscitur* ex eo, quod color rubeus in lividum mutatur. dolor pulsans cessat. pustulæ grandiores ichorem loruram carnis referentem mittentes, oriuntur. In *Curatione* attende 1. Ad *Diatram* tenuem & refrigerantem. 2. *Humorum revulsionem* per venæ sectionem vel purgationem. 3. *Defensivi* circa partem affectam applicationem. 4. *Humorum* ex affecta parte per scarificationem & profundam incisionem, evacuationem. 5. *Ejusdem* post incisionem aquâ falsâ, vel aliquo alio foru, pro corruptionis magnitudine, ablutionem. 6. *Vnguenti Ægyptiaci*, vel alicujus post ablutionem, superposito cataplasmate resolvente, exsiccante & putrefactionem inhibente, impositionem. 7. Si malum non cedat, causticorum seu actualium seu potentialium, quale est *Butyrum Antimonii*, vel *Mercurius* in aqua forti solutus, & cum oleo Tartari præcipitatus, applicationem. 8. *Crustæ* inductæ per media legitima tempestivam sublationem, ne nova sub ea putredo oboriatur.

CAPUT II.

De Sphacelo.

Sphacelus est perfecta partis mortificatio, non molliores duntaxat, sed & ipsa ossa invadens.

Signa sunt, nullus in parte sive secetur, sive uratur,

tur, sensus Carnis frigiditas, flacciditas, nigredo. cadaveris tandem instar grave olet, cutis à subjecta carne digitis separatur.

Curatio in Abfissione sita est, cujus modum vide apud Practicos. Tum 1. Aliquid sanæ partis optimè ligatæ potius amputandum, quàm ut in ægra abfissio instituitur. 2. In digitis manuum pedumque debet fieri sectio. 3. In pedibus si malleolum transcendat, infra genu crus abscindendum. 4. In brachio quàm minimum sanæ partis amputandum, &c. Vide Fabricium Hildanum in tractatu de Gangræna, & Sphacelo.

CAPUT III.

De Combustionibus.

Combustio est continui, epidermidis, & cutis ut plurimum, nonnunquam carnis muscula, venarum, arteriarum, nervorum, vi ignis impressa, solutio.

De signis non est quod quicquam dicam, cum ipsa combustio per se sit manifesta. *Causa*, est vel ignis, vel aqua fervens, vel oleum, vel metallum liquefactum. *Curatio* pro ratione differentiarum variat. Primo, Empyreuma evocandum est. Mox, ne dolor humores & sanguinem attrahant, repellentibus & defensivis agendum. Tum victus ratione, purgationibus, venæsectione, cucurbitulis & aliis imminuendum. Mucilago seminis cydoniorum cum aqua rosarum extracta, & oleo lini subacta, mox in principio adhibita, omnibus indicationibus satisfacit.

Differentia combustionum sunt varæ.

I. *Alia est levissima*, quæ cognoscitur ex eo, quòd res ignita levis fuerit, cutis sit rubicunda, dolor acerbissimus & pungitivus, locus infletur, pustulæ, in quibus aqua clara & alba elevantur, tandem &

Epider-

Epidermis separatur. *Curatur* I. *Empyreumatis sublatione*, ne *pustula* oriantur. Id fit vel per membri in aquam calidam immersionem, vel liniei lixivio madidi applicationem, vel cæparum in mortario cum sale contrularum impositionem, quod tamen in combustione oculorum non convenit. Vehementer laudatur *unguentum* ex olei olivar. part. I. & albumin. ovor. part. II, si loco ambusto cum pluma galinæ sæpius illinatur. II. *Vesicularum*, si eleventur, tertio die, ubi cuticula regenerari incipit, *apertione*.

II. *Alia Mediocris*, quæ *cognoscitur* ex eo, quod pars illic inflatur, & uritur. *pustulæ*, in quibus aqua subtilis & flavescent continetur, eleventur, æger de tensione cutis conqueritur. *Curatur* I. *Pustularum incisione*, ut humor calidus & acris effluat. II. *Defensorum*, ne humor & sanguis ad locum affectum affluant *applicatione*. III. *Unguenti Fabricii ex butyri recent. & in aqua rosacea loti unc.* III. *Ol. violac. de vitell. ovor. Amygdal. dulcium ana unc. f. Farina hordei unc. i ss. Croci scr. i. Mucilagin. semin. cydonior. unc. i. cera q. f. compositi, appositione.*

III. *Alia Insignis*, quæ *cognoscitur* ex eo, quod ipso momento, quo res ignita adhæret corpori, eleventur *pustulæ*, sed illic postea decidunt. subiecta cutis nigra vel livida est. obtusè, si pungatur, sentit. crusta cum decidit, ulcus putridum & profundum oritur. *Curatur*, I. *Pustularum*, ut aqua quæ in iis continetur, exsicceetur, incisione. II. *Escharæ* primo vel secundo die separatione, quæ si fieri non potest, scalpello pluribus in locis incidenda est. *Unguentum Fabricii* vide apud authorem. III. Si gangræna incipit, curatio ad illam obvertenda est. IV. *Escharâ* separatâ, ulcus mundandum, carne implendum, & cicatrice obducendum est.

IV. *Alia est à pulvere tormentario*, in qua grana pulveris

pulveris acui vel alio instrumento eximenda. Si eximi non possunt, *pustulæ* ut eleventur permittendum. si non eleventur, vesicatoriis excitandæ, incidendæ; pulvis eximendus; & locus decocto fœnigræci &c. ablundus. *Alia à fulmine*, in qua Alexipharmaco aliquo fudor provocandus. Arteriæ, labia, lingua, nares, theriacali vino inungenda. *Escharâ* remotâ, mundificantia & sareotica bezoardicis castigata, adhibenda. si os fractum, caraplasmata vulgaris adstringentia viranda.

III. *Alia est Faciei*, in qua medicamentum ex album. ovor. ii. ol. Rosar. unc. II. *Aqua Rosar. unc. i.* locum habet. *Alia Oculorum*, in qua lac muliebri tepidum instillandum. Si crusta excitata est, ne palpebræ retrahantur, fomentis emollientibus agendum. Cutis sæpe utraque manu extendenda. *Alia Articulorum*, in qua affluxus humorum impediendus. Topica anodyna applicanda, ne nervi contrahantur vel articulus incurvetur, præcavendum, &c. Sed de his omnibus vide *Guilelmi Fabricii Hildani libellum de combustionibus*.

TITULUS V.

De Luxationibus in specie.

CAPUT I.

De Luxationibus Mandibulæ, claviculæ & vertebraarum.

Quantum morborum externorum genus sunt *Luxationes*; & quæ vel *superiorum artuum*, vel *inferiorum*. Ad illas pertinent, *Luxatio mandibulæ, claviculæ,*

vicula, spina & costarum, humeri, cubiti & radii, manus & digitorum.

I. *Mandibula* luxatio fit in partem anteriorem, processu anteriore & acuto rostro simili, infra os jugulare lapso. *Cognoscitur* ex eo, tum quod inferior maxilla in anteriorem partem promineat, & processus juxta eam exster: tum quod os maneat apertum. *Oritur* à nimia oris apertione & diductione, sive oscitando, sive aliquod onus dentibus apprehensum in altum elevando; id tamen difficulter propter musculorum, quibus superioribus partibus alligatur, robur. *Curatio* instituitur 1. *Repositione*, ne alvus bilem reddat, vel vomitus exciterur; & quidem cità, ne cerebrum per nervos musculis temporalibus infertos, in consensum trahatur: de qua vide authores. 2. *Inflammationis* & aliorum Symptomatum *præcautione*. Si cervix dolet, secunda est brachii vena. 3. *Repositi ossis retentione*, &c. *Dividitur* dupliciter. I. *In maxilla unius partis*; & tum ipsa cum mento in contrariam partem inclinatur, os distorquetur, dentes suis paribus non respondent. Et *in maxilla utriusque partis*; tum tota cum mento ad pectus prominet. muscoli temporales rigescunt. eminentia quædam in utraque parte conspicitur. II. *In eam qua Adultis duntaxat* obtingit, & hæc hic descripta est: & eam quæ *Infantibus*, in quibus quia mandibula inferior bifida est, & in medio mento cartilagine copiosa jungitur, illà ab affluxu humorum laxatà, vel ossè à cartilagine, quæ in adultis in os facessit, separato, in dextram vel sinistram partem luxari potest.

II. *Clavicula* fit vel *contra sternum*, vel *contra scapula acromium*; sed rarè propter firmam cum utroque ossè connexionem. *Cognoscitur* ex eo, quod humeri apex intumescit, & in loco unde clavicula excessit, manifesta est cavitas. *Curatur* Difficulter, & ple-

& plerumque brachium in aliquo motu deficit. *Deligatio* est instituenda fortis.

III. *Vertebrarum* luxatio vel est *extrorsum*, vel *introrsum*. In infantibus facilius, in adultis difficillimè curatur.

CAPUT II.

De Luxatione Humeri, Cubiti, Radii, & Digitorum.

AD Luxationem artuum superiorum etiam spectat, *Luxatio Humeri, Cubiti, Radii, & Digitorum.*

I. *Humeri luxatio* est, quando ipsius caput, quod rotundum, in sinum profunditate carentem insertum, ligamento laxissimo munitum est, è propria sede prolabitur. *Oritur* plerumque à causa violenta, brachii extensione, &c. *Dividitur* in eam, quæ fit sub alam, Tum, quid rotundum ac durum sub axilla sensibilibiter tactui obviat. cubitus à costis subito magis recedit. *Reponi* potest, vel circumducendo caput humeri circa scapulæ cervicem: vel per calcem, vel per scalam, vel per pistillum, vel per humeri suppositionem, &c. Et *in eam, quæ in anteriorem partem* fit. Tum, in parte posteriore insolita cavitas, & in anteriore nimia protuberantia conspicitur, humeri caput in pectus detorquetur. cubitus ad posteriores partes vergit. In *restitutione* faciendus est motus contrarius; & licet membrum brevius non sit redditum, quia tamen caput explicamus & solvimus, efficienda est aliqua extensio, sed modica. vide *Aquapendentem*.

II. *Cubiti luxatio* rarè accidit, tum quia articulus est multiformis & varius; tum quia ligamenta sunt ætissima; & ideo difficulter etiam reponitur.

Fit 1. Vel ad anteriorius. Tum extensum brachium flectere non possumus, brevior cubitus redditur. tumor insolitus in parte anteriore apparet, in posteriore cavitas. *Curatur* Extensione in obliquum, & repositione, cujus aliquot sunt modi. *Vel ad posterius*, Tum tumor apparet in parte posteriori, sinus in anteriori. *Extensione*, quæ hoc in casu difficilis, facta, solis manibus recens luxatio reponitur.

II. Vel in partem exteriorem. Tum tumor in parte est exteriori, cavitas in interiori. Aut *ad interiorem*, Tum omnia fiunt contraria. Et facta extensione impulsus cubiti in partem contrariam institui debet. repositionem medicamenta anodyna & adstringentia sequantur. *III. Vel radius subsequitur*, & tum tactu sequitur dissidentia cubiti à radio; vel *subsistit*.

III. Radii luxatio fit ad exteriorem partem. Tum in exteriore parte tumor apparet, cubitus & radius invicem dehiscunt. Facta extensione, prope-llitur intrò faciliè.

I V. Carpus luxatur, 1. Aut ad posteriora. Tum digiti non possunt extendi, quia tendines & nervi ab ossibus comprimuntur. Aut *ad anteriora*. Tum tumor est in partibus anterioribus. digiti non possunt flecti. *II. Aut ad interiora*, aut *ad Exteriora*. Tum tumor in ea parte, sinus in opposita apparet. Curationem vide apud *Aquapendentem*.

V. Digiti luxantur in partem anteriorem, posteriorem, & ad latera. *Signa* sunt manifestissima, quia articuli sunt excarnes.

C A-

CAPUT III.

De Luxationibus Femoris, Genu, Tali.

AD Luxationes artuum inferiorum pertinent luxationes Femoris, Genu, Tali.

I. Femur difficulter luxatur, tum propter musculos robustissimos & copiosam eorum carnem; tum propter profunditatem acetabuli; tum propter duo ligamenta arcta & brevissima. *Reponitur* etiam *difficulter*, præsertim si luxatio callo obdurerit, & humores circa caput femoris influxerint. *Repositio* fit, vel sine extensione, vel cum extensione seu manibus seu habenis facta. Luxatur femur, 1. Aut in *partem priorem*. Tum Crus extensum propter inflectentes musculos à capite femoris compressos, implicari non potest. Urina supprimitur. Nates rugosæ apparent. Aut in *partem posteriorem*. Tum Crus extendi propter extendentes musculos affectos non potest. Redditur altero crure, quod sinus in inferiori parte, caput in superiori consistat, brevius. Calx terram non contingit, per nates caput femoris eminet. *II. Aut Interiorius*, Tum genu, tibia & pes in exteriorem partem prominent. Crura non possunt inflecti ad inguina. E regione quæ est inter anum & testes, tumor manifestus in exteriore parte sinus apparet. Aut *Exteriorius*. Tum inter scrotum & anum pars in sinum dehiscit; juxta verò clunes in tumorem attollitur. Genu, pes, tibia interius spectant. Calx terram non attingit, sed planta.

II. Genu non adeò facile excidit, quia duo habet ligamenta; habet etiam caput & sinum duplicatum. Luxatur 1. Vel *imperfectè*, ubi sola ad partem contrariam impulsio requiritur. Vel *Perfectè*, & tum extensio est necessaria. *II. Vel in partem exteriorem*, vel *interiorem*, vel *posteriorem*. Tum Tumor

V 2

in loco

in loco insolito, sinus in loco contrario apparet: figura depravatur, motus debilitantur, & pereunt.

III. *Talus* luxatur, I. In *partem anteriorem*. Tum, ima pars pedis in partem anteriorem convertitur. & *Exteriorem*, tum contra. II. In *partem posteriorem*. Tum latus & robustus in calcaneo tendo, durus evadit & tensus. pes minor fit. In *posteriorem*. Tum, quia articulus ad calcem elapsus est, calx reconditur. planta major fit, pes longior. *Curatio* debet fieri *Extensione* & *Repositione*.

IV. *Pedii* & *Tarsi* ossa, nunquam patiuntur luxationem. *Digitorum*, quoniam & validissimis ligamentis suffulciuntur, & multis tendinibus, raro.

TITULUS VI.

De Fracturis in specie.

CAPUT I.

De Fracturis ossium frequentioribus.

SExtum externorum morborum genus, sunt *Fractura ossium*; quæ aut sunt *frequentiores*, aut *minus frequentes*. Ad frequentiores fracturas pertinent:

I. *Brachii* seu partis illius, quæ est à cubito ad carpum, fractura; quæ si in *utroque osse* accidit, cum nullum fulcrum & sustentaculum habeant; ac facile vicinæ partes lædantur, periculosior est: si in *uno*, eoque *superiore*, quod minore extensione indigeat, minus periculosa: si in *inferiore*, itidem; quia cubitus fulcri quasi loco est, & fasciâ tutius suspenditur. *Curatio* requirit *Extensionem*, & *ossis fracti directionem*, compositionem, & repositionem. Coalescit intra dies triginta.

II. *Humeri*, cujus os, cum grandius sit, & ad callum generandum longiore tempore opus habeat, xl diebus coalescit.

III. *Gris-*

III. *Cruris* seu partis, quæ à genu ad pedem extenditur. In hoc, vel *utrumque os* frangitur; & totum crus inflecti potest: vel *Tibia*, & totum os, ut in loco excarni, in conspectum facile venit. Curaturque, cum majore extensione opus sit, difficilius. Vel *Fibula*, & fracta pars ad interiora inclinatur, ac æger citius pedi insistere potest, cum tibia maximam oneris corporis partem sustineat. Ossa hæc plerumque intra quadragessimum diem coalescunt.

IV. *Femoris*, quod, si *versus genu* aut in medio frangatur, & diligens cura adhibeatur, sine claudicatione evadunt: si *versus coxam*, sequitur plerumque claudicatio. Tum, quia propter arcuationem ad externam partem vergentem, facile versus internam partem incurvatur, versus externam velut in arcum extuberat: tum quia, unicum cum sit, non facile in loco detineri potest. Coalescit quinquaginta dierum spacio.

CAPUT II.

De Fracturis minus frequentibus.

AD Fracturas minus frequentes pertinent fracturæ.

I. *Nasi*, qui vel in *inferiorem partem* æqualiter demittitur, ut sinus evadat; vel in *uno tantum latere*, frangitur: vel *juxta cartilaginem* in obliquum distorquetur: vel *ipsius ossa minutim consringuntur*. Accedit interdum vulnus, interdum ulcus intra nares excitatur. Nisi protinus nasus dirigatur, dirigi postea non potest.

II. *Maxilla inferioris*, cujus os vel ita per transversum frangitur, ut *tamen ossa aliqua ex parte inter se cohæreant*: vel ita, ut *os super os emineat*, & dens super proximum dentem excedat. Consolidantur intra

V 3

xx dies,

xx dies, nisi inflammatio accēdat. dentes etiam integri manent.

III. *Clavicula*, quæ vel per *transversum* frangitur, & facile digitorum extensione & compressione in naturalem sedem revertitur: vel per *longitudinem*, quæ semper quid eminentiæ habet, quod ægrè coaptari potest. Cognoscitur ejus fractura tactu & ex dolore. Intra dies xx ferruminatur.

IV. *Scapula*, & quidem, Aut *ratione acromii*. Tum inæqualitas quædam percipitur, si pars ægra cum sana comparetur: Aut *ratione latioris partis*. Tum tactu cavitas quædam deprehenditur. brachium è directo positum stupor prehendit. Si fractio est in *scapula cervicis*, aut *humeri dearticulatione*, facili, propter venarum, arteriarum, & nervorum ex cervicis vertebra ortorum præsentiam, inflammatio excitatur.

V. *Sterni*, cujus fractura ex ossis digito pressi cessione, difficultate spirandi &c. cognoscitur, & propter nobilium partium vicinitatem periculosa est.

VI. *Costarum*, quæ aut *franguntur*, ut fracturarum extremitates neque introcesserint, neque in exteriorem partem compellantur. Tum pauci vel febricitant, vel sanguinem spuunt. Aut, ut *extremitates loco moveantur*. Tum caro costæ superjacens inflatur. & si manu locus comprimatur, aëris cedentis strepitus auditur. Inflammatio, febris, abscessus plerumque succedunt. Aut *tota non franguntur*. Tum nec dolor magnus adest, nec febricula.

VII. *Spina dorsæ*, quæ plerumque ob spinalis medullæ & membranarum ac nervorum læsionem, inprimis si juxta vertebra cervicis fractura contingat, lethalis est: præsertim si vel brachiorum & manuum, vel crurum ac pedum paralytis accedat.

VIII. *Patella* in genu, quæ ex incedendi impotentia, cavitate quæ in loco fracturæ percipitur, cognoscitur.

gnoskitur. Fit vel *secundum longitudinem*. Tum facile ossa conjunguntur. Vel *in transversum* aut *obliquum*. Tum nulla industriâ curari potest, ut claudicatio nulla sequatur.

IX. *Ossum pedis*, quæ à re gravi & valida fieri solet. Visu & tactu, quia partes excarnes sunt, faciliè agnoskitur. Non adeò periculosa est. Vide *Galenum in Hippocratem de Fracturis & Articulis*.

Tantum de Morbis Externis.

I D E Æ

MEDICINÆ PRACTICÆ

LIBER VII

DE FEBRIBVS.

HACTENUS Externi fuere morbi. *Interni* vel sunt *Universales*, qui totum corpus afficiunt; vel *Particulares*, qui aliquas partes. Universalis morbus est *Febris*, quæ vel *in genere* vel *in specie* consideratur. Ista vel est *Non putrida*, vel *Putrida*, vel *Hæctica*, vel *Maligna*, vel *Pessilens*.

TITULUS I.

De Febribus in genere.

Febris in genere est *intemperies totius calida*, quæ à calore præter naturam in corde accenso, & mediantribus spiritibus & sanguine per venas & arterias in totum corpus diffuso oritur, & actiones naturales symptomatum congerie ladit.

Pars affecta est cor, in quo primum calor accenditur.

dicitur, mox totum corpus, saltem ratione nobiliorum partium interdum. Diffusus enim calor partes occupat, vel *per totum vel per partes*. Temperamentum etiam ipsarum ex calido insito & influente constans mutatur. *Intemperies* autem ista interdum cum *siccitate*, interdum cum *humiditate* conjungitur. Hinc licet calor febrilis semper ad siccitatem tendat: tamen sæpè corporis dispositio, in quod calor ille agit, & humiditas, impediunt, ne siccitas morbosa corpori inducatur.

Causa est, quicquid calorem in corpore accendit. Accenditur verò 1. *Motu*, dum ceteræ partes ex frequenti collisione, confluxu humoris majore, quam ut discuti possit, incalescunt. 2. *Putrefactione*, dum ab externo calore internus evocatur. 3. *Contactu & vicinia rei calida*. 4. *Constrictione pororum*, si aciores fulgines intercipiantur, corpus sit minus sanum; & hæc *præcipua causa* est, sine qua aliæ vix quicquam possunt. 5. *Permissione rei calida*.

Curatio febris in genere absolvitur *Alteratione*, in qua ita procedendum, ne causa foveatur: & *Symptomatum* mitigatione.

Symptomata præcipua sunt: 1. *Sitis*, interiora ventriculi tunica vel ardore inarescunt; vel acri, nitroso, calidoque humore imbuta. 2. *Singultus* humoribus acris & mordacibus ventriculum vellitantibus. 3. *Vomitus*, aut ab humore calido & bilioso; aut à frigidiore; aut à crassiore & tenaci materia; aut à vapore exortus. 4. *Alvi profusivum*, quum ventriculus vel copia, vel acrimonia, vel malignitate humorum, eo usque proripitur, ut minimè cibum vel amplectatur vel conficiat: & cum immoderatè frigida bibitur. 5. *Lingua ariditas*, *nigredo* & *asperitas*, à vaporibus fuliginosis eandem ita exurentibus, ut salivæ humiditas absumatur, qui interdum à lento humore sublevantur, circa dentes & fau-

ccs

ces hærent, ac linguam lentore quodam obducunt. 6. *Lipothymia & Syncope*, quæ modò ab humoris pernecie, modò ab æruginola, prassina aut atra bile turgente, & è venis in cor subeunte, procedit. 7. *Dispnoea*, quæ præcordiorum oppressione ab ardore bilis prassinæ circa cor exæstuantis, vel humorum copia procedentem, consequitur; nonnunquam cordis aut pulmonum æstum, quum bilis atque putredo circum eas sedes incenditur, aut cum turgens in venis materia cum imperu profliens ed incumbit. 8. *Dolor capitis*, *Vigilia*, *convulsiones Epileptica*, &c: de quibus suis locis.

TITULUS II.

De Febris non putridis.

CAPUT I.

De Febre Ephemera.

Febis non putrida, vel est *Ephemera*, vel *Synocha simplex*.

Febris Ephemera est febris, quæ à spirituum vitalium in corde incendio oritur, & spacio unius diei durat.

Ephemera dicitur, quòd diem naturalem non transcendat, ut animalculum ephemeron, & colchicum ephemeron.

Signa sunt: Incendium repentinum est, nullo cibi fastidio, aut spontanea corporis lassitudine, aut graviore somno, aut frequenti oscitatione præcedente, nullo aut admodum levi horrore fatigante, nisi sit corpus cacoehymicum, expirationem multam calidam & acrem diffundens, quæ ob cutem à frigore densatam, aut ob exilium meatuum constipationem suppressa, nervos ferit. Urina, colore, substantia, sedimento aut nihil aut minimum à naturali distat, nisi causa quæ febrem invexit, insignem aliam

V s

quam

quam in sanguine mutationem excitarit. Pulsus solito **quidem** celerior & frequentior est : sed tamen æqualis, ordinatus, magnus & validus. Inspiratio expiratione maior & celerior.

Cause sunt procatacticæ : de quibus in Differentiis.

Curatio est facilis, nisi vel in Synocham sine putredine, in corpore juvenili & plethorico ; vel in purridam die quarto vel quinto, in Cacoehymico : vel in hecticam in corpore calido, sicco, raro, abeat. *Absolvitur* 1. *Alteratione* per refrigerantia & humectantia, intra data, & extra ad cordis regionem, pulsus & frontem applicata. 2. *Evacuatione*, seu per venæsectionem, si plethora adest : seu per *Purgationem* blandam, si ab illuvie pravi humoris & levicula obstructione oritur. 3. *Ventriculi roboratione*, ratione humoris & Symptomatum habita.

Differentia febris Ephemeræ, à causis petuntur.

I. Alia est ab *Ære frigido, cutim constringente*. Tum invasio fit sine horrore, Urina & pulsus parum immutantur, calor in statu moderatior est. *Tollitur* sublata causa.

II. Alia à *Bubonibus*, quæ *cognoscitur* ex præsentia bubonum, pulsû veloci & magno, calore multo, facie rubicunda. *Curatur* venæ sectione, per quam si sufficienter sanguis detrahatur, bubo modicè apparens, vel repellentibus, vel relaxantibus evanescet : sin minus, fomentis ad suppurationem ducendus est. Vide l. 2. de Bubone.

III. Alia à *Cutis angustia*, quæ *Cognoscitur* ex cute dura & compacta cæteris paribus. *Oritur* à copia sanguinis, frigore adstringente, vel siccitate. *Curatur* 1. *Venæsectione*, si sanguis copiâ peccat. 2. *Purgatione*, præmissis incidentibus, si copia crassorum humorum adest, & sudor subsequi solet. 3. *Laxatione* per calida & humida, balneum temperatum,

rum, frictiones modicas, crebram lotionem, si à frigore procedit.

IV. A *Cruditate*, illaque *nidorosa*, quæ *cognoscitur* ex signorum affecti ventriculi præsentia. *Curatur*, 1. *Vomitu*, si nausea & vomendi facilitas adsit. 2. *Purgatione*, si vomitus difficilior tentari potest. 3. *Corroboratione*, per medicamenta qualitate humori peccanti opposita.

V. Alia ab *Æstu, Ira, Mœrore, Vigilis, Lassitudine*, &c. de quibus omnibus videndi Practici.

CAPUT II.

De Synocha simplici.

Febri Synocha simplex, seu Ephemera plurium dierum, est febris sine putredine, à Spirituum & tenuioris sanguinis effervescentia, sine remissione, tres, quatuor, vel plures dies perdurans.

Dicitur & *Inflativa*, quia cum sanguis effervescit, vasa distenduntur, & lassitudo corporis sentitur.

Signa ejus sunt, Lassitudo spontanea citra ullum corporis exercitium. Gravitas circa frontem & tempora. Narium quidam pruritus. calor blandus, cutis mador cum membrorum distentione. Pulsus magnus, plenus, frequens, celer. Respiratio difficilis, Urina solito crassior & rubicundior.

Causa est sanguinis tenuioris effervescentia, quæ à transpiratione prohibita, in corpore plethorico multos vapores calidos emittente oritur.

Curatio non est ita difficilis, quia robusta corpora magis corripit, vel temperata, vel calidiora, vel humidiora, ætatis mediæ, habitus carnosii ac verè quadrati, nisi in aliam transeat. *Solvitur* interdum sudore vel hæmorrhagia narium copiosa, intra quartum aut ad summum septimum diem, nisi insigni aliquo errore, quem vel æger vel Medicus, vel assistentes

dentes commiserint, in putridam vel morbum gravissimum ex plethora nasci solitum, abeat. *Absolvitur* 1. *Vena-sectione*, per quam refrigerium oritur, & vaporum minuitur proventus: sed illa celeri, parva, & aliquot vicibus facta. 2. *Evacuatione* primæ regionis, ne fumi porro coacerventur. Profunt *Tamarindi*, *Rhabarbarum*, *Syrupus rosarum solutivus*, *cremor Tartari*. 3. *Alteratione*, quæ institui debet per potiones refrigerantes, *spiritu salis* & *vitrioli* admisto. Clysteres, *Oxyrrhodina*, *Epithemata*, *Balnea* in iis qui uti consueverunt, sed non nisi post febris rigorem. 4. *Corroboratione*, per *manus Christi perlatas*, *Diamargariton frigidum*, *Conservam rosarum vitriolatam*, *Acetofella*, &c. 5. *Diaeta* refrigerantē & humectante.

TITULUS III.

De Febris putridis in genere.

Febbris putrida vel in genere consideratur, vel in specie.

Febris putrida in genere, est febris quæ à vaporibus calidis à putredine humorum excitatis, & cor præter naturam calefacientibus, exorta.

Signa illius sunt: *Invasio* cum horrore, & rigore, nulla antecedente causa prægressa; imò nullâ procatartica, nisi corpus ita dispositum sit, ut levi occasione moveri possit. Accessiones & paroxysmi, quod tamen omnibus non convenit. *Calor* ab initio non acris propter suffocationem, in augmento mordax propter fuliginosum excrementum. *Urina* cruda, vel obscurè cocta. *Pulsus* ab initio parvus, systole velociore quàm diastole, propter fuliginosorum excrementorum copiam. Sudore vel aliqua excretionē levatur.

Causa, & quidem *Immediata*, sunt Vapores putridi,

di, acres, mordaces, copiosi, ut diffiliari nequeant. *Mediata* est putredo humorum, cujus causa 1. *Inprimis invasione* febris, vel, *Natura ipsorum prava*, ex cibis pravi succi facili putrescentibus contracta, ciborum præparatione & usu pravis, Partium coquentium viriis; vel *Agens externum*, ubi habent locum, *Transpiratione* prohibita, seu ex pororum cutis angustia: calida enim in loco calido, nisi ventilentur, promptè putrescunt; seu ex vasorum & meatuum in corpore obstructione. *Febris Ephemera* in calidis præcipuè naturis. *Calor* à rebus non naturalibus profectus, *Occursus* putredinis humorum. 2. In *Continuatione*, est parvum coctioni destinatarum vitium. *placens* post paroxysmum relictum, quod humores instar fermenti corrumpit.

Curatio plerumque neglectâ causâ febrem non oppugnat, si præsertim præsidia contra febrem causam augeant, nisi ingens sit. Licet tamen aliquando causam neglectâ febrī oppugnare, si nimirum hæc sit remissa, Tutissimum ad alterum ita curam dirigere, ne alterum negligatur. *Absolvitur* 1. *Vena-sectione*, quæ peragenda, 1. Propter evacuationem, motus conciliationem & refrigerationem. 2. In continuis die tertio, in intermittentibus ultra; in omnibus mitiori leniente præmissa, si in primis viis aliquid resideat, & tempore mitiori. 3. *Cacochymia* non in primis viis, sed in venâ cavâ cum sanguine permista. 4. Plenitudine præsentē. *Repetenda* eodem die, si *evacuationis*: post intervallum, si *revulsionis* fiat gratiâ.

II. *Vomitione*, legitimè instituta, per Aquam benedictam Rulandi, Radices Asari, &c.

III. *Purgatione*, ubi *Lenientia* ob ventriculi imbecillitatem & humorum in mesaraicis copiam, alvi subsiditiam in initiis, sive per Clysteres, sive per potiones, præcedere debent. Fortiora subsequantur, 1. *Antegressis*, tum *Coctione*, quod in febribus præser-

præsertim continuis & acutis observandum, ex Hippocratis præcepto; qua humorum putridorum & cum sanguine permistorum, à natura, arte adjuta, facta separatio est: tum *Præparatione*, qua viæ & meatus per incidentia deobstruuntur; (hic *Cichoracea*, *ingibacea* & *acetosa* locum habent) & impedimenta in humoribus remouentur, ubi laudatur *Syrupus acetosus*, *acetositate citri*, *Spiritus Tartari compositus*. dr. j. sed in biliosis ob aquam theriacalem cautius adhibendus. 2. *Omissis*, si humores in venis non in primis viis cum sanguine sunt permisti. Si iidem turgent, id est, vel ad partem determinatam moventur, vel ita dispositi sunt, ut in partem ruere possint. Solet namque materia febrilis, initio, licet exigua, fermenti tamen instar reliquos humores corrumpens, à natura tanquam ipsi molesta moveri, & vel extra corpus ejici, vel ad partes ignobiles detrudi.

IV. *Sudatione*, excitata per medicamenta *sudorifica*, & quidem, *Non admodum calida*, ne febris augeatur; *sufficiens* tamen, ne materia duntaxat agitur. Post reliquas *evacuationes administrata*, ne transpiratio magis impediatur. Licet tamen in principio interdum fortiora sudorifera adhibere, ut fermentum illud discutiatur. Toto morbo illis corpus ad sudores disponere, ut libera corpori transpiratio præstetur. Quoties opus repetere, ut materia ad expulsionem assuefiat. Laudantur, *sal Absinthii*, *centaurii minoris*, *cardui benedicti*, *Spiritus & Rob Ebuli*, *sambuci*, *Magisterium matris perlarum*, *oculorum Cancri*, *Antimonium Diaphoreticum*, &c.

V. *Dieta*, in qua præcipuè occurrunt: 1. *Cibus*, qui debet esse boni succi, facili concoctionis, pauci excrementi; ita, ut summa virium morbi & causæ morbificæ ratio habeatur. Tempora ipsius morbi observentur, ne vires obruantur. Quantitas, qualitas,

tas, & modus utendi perpendantur. Licet tamen uti *Pleniore*, virtute ob evacuationem debili. *Tenui*, eadem ob suffocationem infirma, ut plenitudo imminuatur, & natura concoctioni humorum rectius incumbat. *Nutrimetoso*, pro virium conservatione. *Medicamentoso*, pro morbi & causæ depulsiōe. Quocunque tempore, virtute per evacuationem & inediam collapsa. In declinatione vel intermissione, virtute à morbi vehementia suffocata. II. *Potus*, qui debet esse *Nutrimetosus*, in virium imbecillitate. *Medicamentosus*, pro morbi & causæ intentione. Talis est, *Decoctum bordei*, *Oxymel*, *serum lactis aniso*, *foeniculo* & *cumino correctum*. *Julepi* refrigerantes. In continuis primis diebus *paucus*, posterioribus *copiosior*. In intermittentibus instante paroxysmo *nullus*: ne putrescentis humoris separatio & exclusio impediatur: instante sudore *calidus*, ut isti promoveantur. *Vinum* in *intermittentibus* austerum esse debet, quia tale humectat, excretionem promouet, facilius distribuitur: in *continuis*, circa concoctionis initium *paucum*; in *quartanis* ante; in *progressu*, majoris quantitatis. In *declinatione*, si virium imbecillitas adest. Calor febrilis, non est intensus. *Materiæ cruditas* non prohibet. *Capitis dolor* vel similes affectiones absunt.

CAPUT I.

De Febribus putridis continentibus.

ARTICULUS I.

De Synocho putrida.

Febres putrida in specie considerata, vel sunt *Continentes*, ut *Synochus putrida*, & *Causus*: vel *continua periodica*, vel *intermittentes*.

Synochus

Synochus putrida est febris à sanguinis in vena cava putredine exorta, sine remissione & intensione periodica, ab initio ad finem affligens.

Signa sunt, Absentia illorum quæ in intermittentibus occurrunt, nisi vel sit composita, in qua horror & rigor occurrit; vel restagnantes in ventriculo humores, vomitus in principio excitent. Calor acrior & vehementior. Urina ab initio interdum biduo quum nondum putredo invaluit, senum non multo dissimilis, sed quæ postea crescente putredine, est crassa, rubore multo perfusa, turbida, ac sine sedimento; quanvis interdum crassum, copiosum, ac rubescens sedimentum deponat. Pulsus magnus celer, frequens, inæqualis & inordinatus. Difficilis respiratio, capitis dolor, appetitus dejectio, &c.

Causa est putredo sanguinis, & quidem corpus nutrientis, sive is ex pluribus humoribus constat, sive non. In propria forma considerati. Non totius, sed Ichorosi & serosi, qui vitium ex prohibita transpiratione facillimè concipit. Oritur illa, vel à vehementi per impactos multos, crassos, viscidosque humores, in cute, interioribus jecoris, & aliarum partium venis obstructione: vel à contagio humores inficiente.

Curatio est levior, si statim decrescit. si Symptomata mitiora habet. Difficilior, si nullius evidentis causæ vi, sub noctis & somni finem excitatur. si extremos statim labores habet, & sævis Symptomatibus excipitur. Si ei fluxus alvi, initio magnus, vires dissolvens, ex materia prava nigricante, intervenit. Absolvitur, I. Causa ablatione, per Venæ-sectionem largam, nisi vires obstant. Purgationem per mitiora, Rhabarbarum nempe cum Tamarindis. II. Caloris febrilis temperatione, per Alterationem, ita ut obstructionum in cute summa habeatur ratio. Corroborationem per morsellos de citro, conservas, species refrigerantes.

frigerantes. *Diatam*, quam vide apud Practicos, & cujus superiore capite facta est mentio.

ARTICULUS II.

De Causo.

Causus seu febris ardens, est febris continua, à sanguinis in vasis majoribus putredine exorta, cum ingenti siti & calore urgente continuo affligens.

Dicitur etiam πυρ, quod flagrantissima sit. εὐδης, quod ægros maximè inquietos reddat. πικρὸς ὀδὺς, quod spectris quibusdam imaginatis ægri terreantur. & πικρὸς πυρετός, ob urgentis caloris copiam.

Signa pathognomonica sunt sitis ingens & calor urens, illa tamen tussi, quæ humorum fluxum causatur, mitigatur. His accedunt, magna corporis jactatio, à magno fervore renuiumque vaporum acrimonia corpus undique lacescente. Urina pauca, ob copiam sudoris & caloris urinam absumentis: interdum cruda & turbida, quæ subsidentibus partibus extraneis, & resolutio turbido Spiritu, postea clarescit; nonnunquam tenuis biliosissima & flammæa. Dejectio, nisi fæces ab ardore febris torreantur & indurescant, liquida & crocea, bile in ventrem effusa, fæcesque diluente. Pulsus celer, frequens & inæqualis. velocior enim systole, quia fuligines graviter urgentes, arteriæ, celeri compressione expellere conantur. Respiratio difficilis, & expiratio inspiratione ob auctam necessitatem ignei halitus emittendi, celerior. Oris amaritudo, quia bilis tunicam ventriculi internam ori communem imbuat. Lingua ariditas, scabrities, & nigror, quia ardor linguæ humiditatem absorbit, & suas fuligines in lingua deponit. Desipientia, ob bilis ad caput recursum; quæ si tremorem excipiat, transferri humorem biliosum à venis in nervos, à nervis in cerebrum indicatur.

Somni interdum profunditas, in minus exquisita præsertim; quia crassi vapores in cerebrum sublatis, ejus meatus obscuriunt.

Causa est sanguis putrescens, peculiari jecoris proprietate, ex alimentis nimia calefaciendi vi præditis: vel crudis, refrigerantibus, facile corrumpi aptis, &c. exortus. qui est vel *Biliosus*, & tum symptomata in definitione posita vehementiora sunt; ac *Causus exquisitus* vocatur: vel *Pituitosus*, & tum symptomata mitiora, ipse *Nothus* appellatur.

Curatio exigit, ut febris, causæ, & virium ægritudo habeatur. *Solvitur* febris variis excretionibus, præcipuè *Rigore*, die critico, signis coctionis apparentibus, superveniente: idque non propter rigorem, sed propter excretionem, cujus prænuncius rigor est. *Absolvitur* I. *Vena-sectione*, ut ardor sanguinis reprimatur, plenitudo sanguinis minuatur, vitium ipsius corrigatur. *Fieri debet initio*, validioribus adhuc viribus, & quia velocissimus motus, præcipitem occasionem ostendit. *Non fieri*, si ab inanitione, inedia, itinere æstivo, resiccatis venis, & consumto ichore febris oriatur, si ætas, sexus, vel aliud quidpiam non permittat. Tum scarificationes, cucurbitulæ, &c. vicariæ sunt. II. *Purgatione*, per medicamenta cholagoga refrigerantia, vel temperata, ut flores Cassiæ, Syrup. rosarum solutivum. III. *Vomitione*, si nausea adsit, & ventriculus humore bilioso, quem oris amaritudo prodit, infestetur. IV. *Alteratione* & præparatione per medicamenta refrigerantia, ubi nota, *Externis* demum locum esse, postquam ardor febrilis internis refrigerantibus repressus, & humor putrescens majori ex parte educus videtur. V. *Corroboratione* virium per potiones, condita, tabellas, &c. VI. *Symptomatum mitigatione*: de quibus vide in suis capitibus. VII. *Dietâ*: de qua superiora vide.

CAPUT II.

De Febre continua periodiaca
in genere.

Febbris continua periodica vel in genere, vel in specie, spectatur.

In genere spectata, est febris ab humoribus excrementitiis in venis, inter magnas & capillares medietas, putrescentibus, exorta, certis periodis, absque intermissione remittens.

Signa sunt, quod quidem remittat, nunquam tamen ad *anopsiam* deveniat, & certis periodis exacerbetur. Exacerbationem nullum frigus, horror vel rigor antecedit, neque remissionem sudor sequitur. *Remittit* sine intermissione, ob permissionem humoris cum sanguine, qui expelli non potest, nisi coctus. *Exacerbatur* certis periodis, tum ob appulsum materiæ inæquali copiâ ad eor, propter loci distantiam, si exacte eas non observet: tum ob communicationem materiæ novæ, à membris secunda coctionis, si statas attendat.

Causa sunt *Humores excrementitii*, qui nascuntur in liene & epate, vel suo, vel chyli vitio; possunt tamen & in melaëricis generari, & ad epar deduci. Non tantum confunduntur cum sanguine, sed & permiscuntur cum eo. *Locus* illorum sunt venæ, non majores quidem, sic enim esset continens; nec minores, sic enim intermittens: sed mediæ inter magnas & capillares.

Curationis ratio in speciebus videatur.

ARTICULUS I.

De Febre continua primaria.

PUNCTUM I.

De Febre Continua tertiana.

Fbris Continua in specie considerata, vel est *Primaria*, vel *Symptomatica*. Illa nullo antecedente morbo exoritur: & est vel *Tertiana*, vel *Quotidiana*, vel *Quartana*.

Tertiana continua est febris, à sanguine bilioso in vena cava propaginibus putrescente exorta, continuè sed tertio magis die affligens.

Signa sunt, febrium continuarum & ardentium symptomata, tertio die recurrens exacerbatio, ex ratione bilis, quæ ita movetur. Remissionis causa est; tum distantia loci, ubi vapores generantur: tum minor ipsorum copia, propter quam totum priusquam aliud in ejus locum succedat, dissipatur.

Causa est sanguis biliosus, & quicquid cacochymiam biliosam in venis cumulare, & cumulata putredinem inducere potest. Curatio absolvitur. I. Venæsectione, quia humor cum sanguine permiscetur, præmissis clystere. II. Alteratione, lenientibus præmissis, ubi Syrupo rosarum solutivo semper aliquid acetosi adjiciatur, ut facilius in venas penetret, nec calore ventriculi in vaporem vertatur, qui sitim excitet. Exhibeantur jejuno ventriculo, ne concoctio violetur. Modicè, ne cruditatibus sint causæ. Laudatur Spiritus Nitri salis, &c. Topica cordi quod maxime afficitur, sed non ante statum, applicentur. Non frigida, ne calor versus interiora collectus & repulsus magis urat. III. Evacuatione per inferiora, & quidem, in principio, si materia urgeat, si sit copiosior, & vires robustæ, mitioribus instituitur, ubi Rhabarbarum

barbarum & Myrobalani in infusione potius cum aquis refrigerantibus sumantur. Post concoctionem, si natura sit pigrior. IV. Evacuatione per sudorem, per *Diuretica*. V. *Victu*, qui oppositus sit morbo & causæ. Convalescentes, si febris evacuatione perfecta critica solvitur, nunquam ad satietatem plenam edant. sæpius, sed parùm. Inanitione omni, ventris dejectione excepta, abstineant. *Electuario Diarhodon* ad ventris corroborationem utantur. Si imperfecta, ita ut reliquæ mancant, eas evacuent, per urinas præsertim. Tenui cibo utantur.

Differentia ex Causis sumuntur.

Ala est *biliosa*, à sanguine bilioso, puro, & exquirit, quem epar peculiariter affectum producit. Hæc acriore calore, siti, & vigiliis magis infestat. in illos qui bile abundant, cadit. Pulsus est vehemens, velox, durus. Urina flammæ, tenuis, septem vel quatuordecim exacerbationibus terminatur. Non est *lethalis*, nisi vel error aliquis insignis committatur, vel malignitas aliqua adsit.

Alia est *Pituitosa*, vel *Melancholica*, quando sanguini bilioso pituitosus vel melancholicus miscetur, ubi refrigerantibus simul leniter calefacientia & incipientia jungi debent. Dicitur *Notha*.

PUNCTUM II.

De Febre continua quotidiana,

Continua quotidiana est febris ab humore pituitoso in vena cava propaginibus putrescente excitata, singulis diebus suas exacerbationes exercens.

Signum est exacerbatio quotidiana, quæ fit circa vespèram, propter pituitæ motum, cum calore primò tactu miti, post acriore, propter lentam & inæqualem, ex varietate partium pituitæ accensionem. Cum levi partium extremarum refrigeratione, quod tamen perpetuum non est.

Causa est Humor pituitosus putrescens, qui senibus ob frigiditatem, pueris ob *adunquarum* proprius est. tam pertinacem febrem inducit, ut ad *sexagesimum* interdum diem duret, principium ante vigesimum diem non absolvat. Ventriculus vehementer debilitat; unde *Cachexia* & *hydrops*.

Curatio ita instituenda est. I. *Prima via* clysteribus vel lenientibus medicamentis (*mel rosatum* hic valet) *evacuentur*; vel ventriculus vomitu purgetur. II. *Vena* secetur, si natura nimia humoris copia obruitur, & utinae sunt crassiores & rubicundiores. III. *Purgetur per inferiorem*, praemissis attenuantibus, quae minus calefaciunt, & signis coctionis apparentibus, leni primò, mox fortiori medicamento. Valent *Agaricus* trochiscatus, *hieria* picra, pillulae de *fumaria*. IV. *Sudores* ciantur, imminuta jam materia, per sal *Absinthii*, & *Carduibenedicti* cum pauxillo *Theriaca*. V. *Confortantia* adhibeantur, Trochisci videlicet de *Rhabbarbaro*, *Absinthio*, *Eupatorio*, &c. VI. *Victus* praebeatur, parciore tribus diebus, si cruditates in ventriculo & primis viis adsunt. In principio hydromel loco vini adhibendum, pisces semper vitandi.

Dividitur hæc febris tripliciter.

I. Alia est *Simplex* & *exquisita*, quæ à sola pituita exoritur, paroxysmos ad 18 horas protrahit. Alia *Notha*, quando pituita aliis humoribus jungitur.

II. Alia est *Epiala*, in qua per minimas corporis particulas (ad sensum tales intellige) uno eodemque tempore, calor & frigus sentitur. *Oritur*, vel à pituita cum bile conjuncta; vel à pituita vitrea, parte, qua putrescit, calorem; quæ non, frigus inferente. *Curatur*, eodem quo alia putrida modo, sed observandum, 1. *Vena-sectionem* esse noxiam. 2. Ad pituitæ incisionem, Spiritum *Nitri* in aqua Juniperi esse insignem. 3. Vomitionem, quæ Unc. vj

aqua

aqua juniperi per descensum destillata, excitari potest, non negligendam. 4. Ventriculi rationem habendam, cui vires afflabit, pituitam simul incidendo, ol. *Vitrioli* gutt. 1x. cum tribus cochlearibus vini generosi; vel *Aqua vita* ex granis *juniperi* per ascensum destillatae unc. duæ.

III. Alia est *Syncopalis*, à Symptomate nomen habens; quæ vel est *Minuta*, ab humore tenui, pauco, sed venenato & corrupto: vel *Humorosa*, à pituitosorum & crudorum humorum copia, cum oris ventriculi debilitate, & frequenti syncope. In *Curatione* optimè proceditur. 1. Per *frictionem*, in quibus cutis durior. 2. Per *laxationem*, adhibita manna cum cremore Tartari. 3. Per *concoctionem* & evacuationem humorum, illis quæ ad syncopen sunt necessaria adhibitis. 4. Per *Diatam* tenuem, in qua & vinum locum habere potest.

PUNCTUM III.

De Febre Continua quartana.

Febris quartana continua, est febris à sanguine melancholico in vena cava propaginis putrescente, exorta, cujus calor semper durat, sed quarto die intenditur.

Signa ejus sunt, *Calor* obrusus, sed acris & propter humoris per putredinem febrem excitantis densitatem & siccitatem pungitivus. *Pulsus* initio parvus, tardus, & submersus; postea magnus, plenus, & celerior, quàm in intermittente. *Exspuitio* interdum frequens, nimiam ventriculi humiditatem, vel lenis humorem melancholicum non seccantis vitium arguens.

Causa est sanguis melancholicus, in venis mediis putrescens, à propriis causis ortus.

Curatio est in totum *difficilis*, tum quod ad quæ-

dragesimum diem & ultra protendatur, nisi forte æstiva sit: rum, quod quia agrè putrescit, magnam causam subesse indicet. *Absolvitur* 1. *Vena* sinistri brachii interni *sectione*. 2. *Præparatione* humoris, quæ magis ad humectationem vergere debet. 3. *Purgatione* per melanagoga sæpius instituta, ad quæ sudorifera & Diuretica referantur. 4. *Virium roboratione* per buglossam, borraginem, Acetositatem citri, &c. 5. *Diaeta*, ubi victus debet esse incidens, humectans & refrigerans, &c.

ARTICULUS II.

De Febre Continua Symptomatica.

Febres Symptomatica sunt, quæ alios morbos insequuntur, iisque sublatis cessant.

Signa earum, *causa*, & *curatio* ex morbis, quos sequuntur, peti debent.

Differentia ipsarum sunt varia.

I. Alia est, quæ *partis alicujus interioris præsertim* & cordi vicina, vel *consensum cum illo habentis*, inflammationem sequitur, vaporibus è sanguine in partem inflammatam effuso & putrescente, cordi communicatis, & idem calefacientibus. *Totuplex* est, quotuplex est Inflammatio. *Curatio* inflammationem respicit.

II. Alia est *Lipyras*, in qua toto morbi decursu interiora quasi uruntur, exteriora frigent. *Oritur* ex vehementi alicujus partis interioris, in primis ventriculi, inflammatione, vel erysipelate, sanguine & spiritibus ad locum inflammationis concurrentibus. Vel non est *curanda*; vel si suscipitur, *intra* putrefactioni & refrigerationi resistendum; *Extra* post partium frictionem, calefacientia & poros aperientia applicanda. Valet hic ol. *Anethim.* & *irinum*, cum ol. vitrioli, & aqua cremabili Juniperi.

III. Alia

III. Alia *Lenta*, quæ *cognoscitur* exinde, quod calore lento, cum quo notæ putredinis in urina & pullu apparent, affligat. Nullo gravi Symptomate ægro molesta sit. *Vires* collabuntur, ut æger vix progredi possit. Corpus sensim contabescat. Ultra quadragesimum diem protrahatur. *Purgantium* usu exasperetur. Nullum ordinem servet. *Oritur* ex materia extra vasa in visceris alicujus substantiam effusæ, aut certè in capillaribus vasis per visceris substantiam dispersis, impactæ, putredine, visceris, substantiam labefactante. unde tanta copia, vapores versus cor ferri nequeunt. *Curatur* aperientibus, attenuantibus, & detergentibus, cuique parti appropriatis. *Purgandum* quoque leniter, &c.

IV. Alia, quæ *ex visceris alicujus putredine & corruptione* oritur, Unde putridi vapores per venas cordi insertas communicantur, illudque calefaciunt. Est modò *mitior*, modò *vehementior*. Accidit plerumque in *pulmonis putredine*, *fistulis* ad interiora penetrantibus, *Omenti*, *mesenterii*, *uteri*, &c. corruptione. *Rarè* sunt curabiles. *Curatio* ad internarum partium ulcera & fistulas dirigenda.

V. Alia, quæ vel ex *lacte corrupto*, quod sæpe infantibus accidit; vel *sanguine* alicubi extra vasa *putrescente*; vel vermibus; vel *cruditate*, Infantibus ex *dolorduzia*, cum hypochondriorum tumore & inflatione familiari, existit, vaporibus putridis cordi communicatis. In *Curatione* causarum & partium affectarum habenda est ratio.

CAPUT III.

De Febre intermittente in genere.

Febri intermittens est febris à vaporibus ex humoribus in venis mesaraicis genitis putrescentibus, & in venam cavam subinde emissis prodeuntibus, exorta,

exorta, certis periodis invadens, & cum excretionibus desinens.

Signa ipsius sunt, Invadere periodicè, cum rigore, horrore, vel frigore, vellicatis partibus sentientibus, à vapore acris. Desinere, per sudorem, urinas, vapores per poros cutis emissos; scabiem, si pars crassior in ambitum corporis protruditur. Invadere autem eam & recurrere certis periodis, necesse est. Manet enim *μιασμα* in foco putredinis, cum imbecillitate in parte. Hinc humor affluens etsi bonus sit, ab inquinamento tanquam fermento inquinatur, & ob partis debilitatem corrumpitur. Fit verò hic *recursus*, 1. Partim propter humorum diversitatem, cum perpetuo illis conveniat, nec unquam variet, in quodcumque tandem corpus inciderit: partim ob peculiarem eorundem qualitatem, quæ vel cœlestibus causis adscribi debet; vel ex peculiari corruptione oritur. 2. Fit vel æqualiter, aut ob aliquod externum humores commovens anticipando: vel humoribus imminutis postponendo. Paroxysmi etiam, vel sunt Breves, si materia sit pauca aut tenuis, corporis constitutio rarior, vires robustæ; vel Longi, si in contrarium.

Causa proxima est vapor putridus, ab humore exortus, & cor impetens. De Humore tria observanda. 1. Humorem istum esse putridum, quod ex urina putredinem præ se ferente apparet. Nectamen torus simul in primo paroxysmo putrescit, sed pars duntaxat, quæ putredini apta est: reliqua in reliquis, donec tota absorbumatur. 11. Humoris istius focus, seditum & locum, tam extra paroxysmum, quam in eo, Venas mesaraicas esse. Patet id tum ex nausea, vomitu, præcordiorum tensione & dolore, &c: tum ex bilis in initiis febrium, sæpe maximâ copiâ ejectione, quæ è venis remotioribus, hoc modo evacuari non potuit: tum ex eo, quod instans paroxysmus,

roxysmus ex pulsuum compressione initio paroxysmi, & tempore illo, quod Græci *ἐπιπρωσιον* nominant, colligatur, & materia per urinas evacuetur. 111. Humorem istum subinde in venam cavam & arteriam emitti. Sanè cruditas & coctio in intermittentibus deprehenduntur. In principio humores à circumferentia ad centrum moventur. Cùm verò venæ portæ rami in substantiam epatis inferantur, & horum oscula cum venâ cavâ communionem habeant, & arteriæ à corde progressæ, in ventriculo, intestinis, liene, & alibi vasis mesaraicis conjungantur, manifesti satis ductus, per quos hi humores eò deriventur, erunt.

Curatio intermittentium febrium instituitur, 1. Debilitatis in parte consistentis remotione per Alterantia. 11. Inquinamenti putridi subductione per Purgantia, Vena sectionem, si sanguis in vena cava abundet, & à vitiosis humoribus corrumpatur. Per Sudorifera, quæ maximè hic valent. Laudantur in principio præcipitantia, ut pulvis è cochlearum testis Crollii, Pulvis è matre perlarum calcinata scrup. 1v. pondere, & Magisterium Oculorum cancerorum. Extra applicantur, Telæ araneæ cum unguento populeonis, Tinca piscis soleis alligatus, &c.

ARTICULUS I.

De Tertianâ intermittente.

Febris intermittens in specie considerata, vel est Tertiana, vel Quotidiana, vel Quartana. Dantur tamen & quintana, septana, octava, nonana. Tales verò rariores typi, sunt species simplicium typorum, interpolata accessione una aut pluribus. Quintana est species tertianæ, in qua tertia dies est sine accessione.

Febris intermittens tertiana, est febris, à bile excremen-

crementitia in venis mesaraicis putrescente exorta, tertio quoque die, cum rigore, quem calor & alia insequuntur, affligens.

Signa sunt, *paroxysmus* alternis diebus cum rigore impetens. Rigore cessante *calor* multus, *Pulsus* initio accessionis parvus, tardus, post frequens. *Vrina* subrufa, &c.

Causa, est *Biliofa* colluvies in venis mesaraicis, vel sola, vel cum aliorum admistione putrescens, ab alimentis corruptibilibus, vel aliis eam generantibus exorta, & vapores putridos ad cor emittens.

Curatio perficitur, I. *Evacuatione* primarum viarum per medicamenta lenientia, vel Clysteres. II. *Vomitu*, si materia ad ventriculum tendit, & æger cardialgia, nausea, & desiderio vomendi molestat: sed ita, ne humores è venis ad primas vias trahantur. Laudatur *sal vitrioli*, *Asarum*, *Genista*, *Aqua formicarum*, sed cautè exhibita. III. *Vena sectione*, si humor è prima corporis regione in venam cavam penetravit, quod ex urinis rubicundis cognoscitur: quæ in intermissione institui debet. IV. *Præparatione* per medicamenta refrigerantia, humectantia, & primas vias extergentia. Valent *Taraxacum*, *Acetosa*, *Hordeum*, *Cichorium*, *Spiritus salis*, *vitrioli*, *Cremor Tartari*, *Tartarum vitriolatum*, *Syrupus de acetositate Citri*: nec non ex specificis, *Centaurium minus*, *Morsus Diaboli*, &c. V. *Purgatione* per alvum, & quidem die intermissionis ut plurimum; die paroxysmi, si materia alvum inclinet. Valet *Rhabarbarum*, *Syrupus de Cichorio cum Rhabarbaro*. VI. *Sudatione*, per *sudorifera*, salem *Absinthii*, *Centaurii minoris*, *Cardui bened.* *Cornu cervi* præparatum, *Magisterium matris perlarum*, quæ vel ante paroxysmum, vel in fine exhibenda sunt. VII. *Roboratione* Epatis & ventriculi. Valet

sal

sal absinthites in spiritu Nitri solutum, & rursus in Cryсталlos coagulatum ad scrup. j. viii. *Topicorum applicatione*. Talia sunt, *Cataplasma* Mynsichti p. 368. *Pulvis filigineus* cum virescente salvia, addito albumine ovi & aceti pauxillum contusus, & carpis alligatus. *Potentilla* herba cum sale & aceto soleis & pulsibus in paroxysmo applicata. *Cataplasma* ex radic. Bryoniæ, Hellebori nigri, sale nigro, pipere albo, croco, & ficubus. Dividitur in *Exquisitam*, *Notham*, & *Perniciosam*.

I. *Exquisita* est, quæ cognoscitur ex eo, 1. quod *Rigor* in prima accessione sit *vehemens* & pungitivus, ab halitu & humore tenuissimo & paucò, è venis excidente exortus. *Exiguus*, si materia sit copiosa; nec subito moveatur: *vehementior*, quo materia est tenuior & acrior, facultas expultrix validior, & partium sensus exquisitior. 2. quod *calor* sit multus, acer, & mordax, in vigore quoquo versum extensus. Et manu diutius detenta, propter facilem bilis diffusionem mitescat, quo tempore levi madore corpus perfunditur. 3. quod *pulsus* initio accessionis sit parvus, tardus, materiâ nondum à calore oppresso evictâ, sed tamen non retractus, in progressu, vehemens, velox, frequens, parùm durus, constrictionis propter fuliginem ex materia recenter instar humidorum lignorum accensâ, copiam, velocioris: in intermissione dilatationis velocioris propter caliditatem particulæ, in foco putredinis relicte, reliquis humoribus communicatæ, & ad cor delatæ. 4. quod *Paroxysmi* ultra duodecim horas non extendantur. 5. quod *Vrina* sit subrufa & subflava consistentiæ mediocri, nebulam quandoque albam vel enæreoma circuitu primo exhibens: & tum ultra quartû paroxysmum febris non protenditur. *Oritur* à bile, interdum illi simili, quæ in folliculo fellis est, in primas vias regurgitante, interdum æruginea aut viridi, in ventriculo & venis

& venis producta. *Curatio est facilior*: septem enim circuitibus ut plurimum judicatur. *Terminatur* vel *sudore*, si in venas per ambitum corporis humor rejicitur; vel *vomitum*, & *alvi dejectione*, si ad ventriculum & intestina: vel *nullo* horum, si magna pars in venis mesaraicis consistit; & tum fiunt, circa præcordia angustia, dolores & inflammationes. *Vena sectio* ante paroxysmum tertium administranda, ne in statum incidatur.

Notha est, quæ *cognoscitur* exinde, quod *Calor* fit mitior, nec per universum corpus diffusus. quod nec vomitu nec sudore solvatur, sed vapore in declinatione exeant. quod *pulsus* sit initio durus, durtie ad septimum augefcente, in progressu cum urinis coërioribus mollior. quod *paroxysmus* sæpe ad horas 18 extendatur, & febris sæpe ad decimum quartum, interdum & ad vigesimum pertingat. *Oritur à bile* cum melancholia vel pituita commixta; nec solum æstate, sed vere, autumno, & hyeme generatur. In *Curatione*, venæ sectio post tertium paroxysmum, ubi plus humoris morbifici sanguini in vena cava jam permixtum est, administrari debet. In *preparatione* ad diversos humores respiciendum.

III. *Perniciosa*, ex septem causis evadit. 1. Si ab ægro vel Medico *error* committatur. 2. Si *humor* extra vasa emittendus, ob occlusionem illorum in primarium membrum *incumbat*. 3. Si sit nimis *tenuis*, & putridus. Inde enim frequentia animi deliquia, sudor absque alleviamento nimius. 4. Si *pravitate peculiarem* vel ob unctionem, vel ob alimenta *habeat*. Inflammatis enim humoribus, oriuntur *lingua asperitas* & sitis inexhausta, *Oculorum* ob spirituum resolutionem excavatio. *Urina* ignea cum biliosis alvi dejectionibus. Totius corporis dolor ulcerosus. *Sudoris* propter materiæ crassitiem paucitas. 5. Si *crassus à calore fusus in aliquam partem*

decum-

decumbat. Hinc sequitur, propter difficultatem & facilitatem accensionis, inæqualis accensio. Humoris crassi, & qui paucus in vasis majoribus esse videbatur, ex rarefactione per accensionem facta, in extremis vasis, ad quæ à tenui deductus est, fusio & copia. Inde fit, ut calor rigore, & rigor calore interpoletur. Urina sit aquosa, multi sedimenti & crassi. Pulsus sit interdum interceptus. In declinatione ab umbilico ad caput fuderur. Nec augmentum, nec status, nec declinatio æqualia sint. 6. Si malignitatem contagiosam ac pestilentem contrahat. 7. Si calor vel uterum in consensum trahat, & humores in eo contentos moveat, vel periculosum catarrhum, asthma, vel arthritidem excitet.

ARTICULUS II.

De Quotidiana intermittente.

Quotidiana intermittens, est febris à pituita in venis mesaraicis putredine exorta, singulis diebus invadens.

Signa sunt. Causarum pituitam generantium progressus. *Invasio* quotidiana, & quidem sæpius nocturna, unde majus periculum ob incommodum medicationis tempus; & illa cum horrore & refrigeratione. *Calore* lento, halituoso, nec, ubi sæper corpus diffundit, valde urente. Cum præcordiorum distillatione & intumescencia. *Urinis* principio albis, tenuibus & crudis; cum materia concoquitur, crassius, turbidis & sæpe rubris. *Pulsus* est valde parvus, rarus, & tardus. *Paroxysmus* ad horas octodecim, interdum viginti quatuor extenditur. *Vomitum* & *sudor* si sunt ab initio, proficiunt à valida natura, non crasso humore.

Causa est *Pituita* in venis mesaraicis putrescens, quæ colligitur propter imminutum viscerum calorem, alimentorum humidam & frigidam naturam.

Eorum-

Eorundem copiam & abundantiam. *Putrescit*, propter causas enumeratas.

Curatio est sæpe *lubrica*, tum quod ad dies 40, imò menses tres & ultra duret: tum quòd ventriculo & epate validè læsis, ægros in cachexiam coniciat. *Peragitur*, I. *Materia peccantis preparatione*, per medicamenta convenientia, moderatè calida, quam & clyster & levis vomitus præcedere potest.

II. *Ejusdem jam concoctæ evacuatione*, Per vomitum, ubi extractum *Esula*, & Aqua ex radicibus *raphani* & nuc. *juglandi*. *viridibus* cum aceto destillata, laudantur. Per *Purgationem Phlegmagogam*. *Sudorem*. III. *Ventriculi* & *epatis roboratione*.

IV. *Diaeta*.

Differentias pro ratione causarum sortitur.

I. Alia est à *pituita crassa*. Tum *Vrina* est alba & tenuis, sed paulatim postea rubescere incipit, & hypostasis crassior efficitur, ac os continua madescit. Fortiora remedia ad sui concoctionem exposcit, eaque repetita; quibus *Tartarea* semper adjici debent. Vomitus, pillul. *Mercurial.* benè cietur. *Purgationi* infusum *Diacarthami* & sol. *sennæ* cum *Zingibere* in aqua *Centaurii minoris*, additis aliquot spiritus *Vitrioli* guttis, inservit. Singulis *septimanis* semel drach. i. *Theriaca Androm.* exhiberi potest.

II. Alia est à *pituita tenui acida*, & Tum frontis & sinistri hypochondrii dolor, alvi obstructio, acidæ eructationes adsunt. *Curanda* scitè, ne in quartanam abeat. *Vena epatica* sinistri lateris secari poterit. Ante paroxysmum specificum aliquod exhibebitur.

III. Alia à *pituita tenui salsa*. Tum salsedo & ariditas in lingua percipitur. *Urina* rubea & crassa cum caloris & acrimoniæ sensu prodit. *Vena epatica* dextri brachii incidi poterit.

A R-

ARTICULUS III.

De Quartana intermittente.

Quartana intermittens, est febris ab humore melancholico in venis mesaraicis exorta, quarto quoque die ingruens.

Signa illius sunt: *Pandiculatio* & oscitatio, sequente rigore, qui ab initio exiguus; progressu, iis qui hyberno tempore refrigerantur, similis, non tam pungens, quàm contundens. *Calor* propter materiae crassitiem paulatim succensus. *Paroxysmorum* quarto die reditus. *Pulsus* rarus ac tardus, sed in vigore paroxysmi velox & frequens. *Vrina* in principio tenues & aquosa, post coloratioris & crassiores. *Sudores* primò paucissimi, post maximi.

Causa, est Humor est melancholicus, in venis mesaraicis circa lienem & vicina viscera, ex causis similibus, inter quas & *Acetum* est, collectus & putrescens.

Curatio est in totum *Gravis*. Diuturna enim est, & ad annos interdum se extendit, si præsertim autumnò incipiat. *Gravior* tamen, si ab atra bile proficiatur. si in senes, quorum calor imbecillior materiam vincere non potest, incidat. si sit duplex. si cum graviore visceris alicujus affectu conjungatur. *Levior*, si sit legitima, & sine visceris alicujus affectu. Alias quartanà correpti, convulsionibus non admodum corripuntur; aut si corripuntur, materia ad hypochondria vergente, nec amplius in venis cum sanguine permixta, à quartana liberantur. *Absolvitur in genere* primò *lenioribus*, post *fortioribus*. In *specie*, I. *Vena* vel basilicæ vel medianæ *sectione*, statim in principio, primis viis evacuatis, si plethora adest; non statim, si abest; administrata. *Copiosiore*, si sanguis niger & crassus prodit; statim *supprimenda*,
Y si te-

fi tenuis. II. *Materia* peccantis *præparatione* & *coctione*, iterata, per humectantia, splenica; ut sunt *fumaria*, *capillus Veneris*, *ceterach*, Radices *Eryngii*, decoctum *Raporum*, Syrupus de *pomis redolentibus*, &c. III. Ejusdem *evacuatione*, seu per *Vomitum*, post quem ante sequentem paroxysmum exhiberi potest drach. i. *Theriac. Androm.* in vino resolutæ: seu per *Purgationem*, cui inserviunt, primò, pillulæ *Tartares* vel Quercetani, vel Sennerti; mox *Exter. hellebori nigri*; tandem pillulæ de *Sagapeno Camilli de Camillis* in Pharmac. Quercetani: seu per *Hæmorrhoides*, applicatis sanguifugis: Seu per *sudores*, quos *Theriacæ*, *Antimonium Diaphoreticum*, sal *armoniac. depuratum* gran. vi. vel x. in aqua Cichorii ante paroxysmum, &c. benè cient. Feliciter purgatio brevi ante paroxysmum, viribus stantibus & coctione apparente, datur. IV. *Viscerum*, & lienis in primis, *roboratione*, per sua appropriata, nec febrem augentia, tam externa, quàm interna. V. *Symptomatum mitigatione*. Rigoris per *Theriacæ*, vel Aquæ *vita* quatuor ante accessionem horis exhibitione. *Doloris* dorsi, per sacculi Hartmanni c. de febris quart. applicationem. VI. *Diaeta*, ubi observ. die paroxysmi ab omni cibo abstinendum esse. Vinum maturum & tenue concedi. *Appropriata* sunt, in hac febre, *Ammoniacum septics sublimatum*. Pulvis *serpentum* in convenienti vehiculo pondere scrup. j. vel iiss. ante paroxysmum datus. *Cor leporis*, ut pulmo vulpis præparatum. Oleum *Myrrhæ* à gutt. 4. ad 8. ante paroxysmum.

Distinguitur febris quartana *duplitter*.

I. Alia est à *Melancholia naturali*, in qua humectantibus & moderatè calefacientibus agendum.

Alia ab *Humoribus adustis*, quæ *Cognoscitur* ex appetentiæ prostratione, siti vehemente, capitis dolore, urinæ rubedine. *Oritur* ab illis, quæ humorem

rem

rem adurere possunt. In *Curatione* moderatè refrigerantibus agendum, quibus in progressu morbi incipientia & attenuantia succedere debent. Laudatur *balneum aqua dulcis*, vel potiùs pedum lotio.

II. Alia est *Ex se sine morbo præcedente*. Et tum, victus primò paulò tenuior convenit; hinc paulò crassior conceditur; tandem versus statum tenuior præbetur.

Alia *aliud morbum sequitur*. Tum, victus primum paulò crassior exhibendus. dein sensim versus statum aliquid de eo detrahendum. in paroxysmo nihil sumendum.

III. Alia est *Mitior*: de qua in superioribus est actum.

Alia *Periculosa*, quæ ex eo *Cognoscitur*, quòd quarto die paroxysmus cum maxima virium debilitate redeat, Urina sit valdè rubra & turbida. *Oritur* à morbis ardentibus, atrâ bile ex adustione vel Melancholici humoris, vel flavæ bilis & in cinerem conversione generata, &c. *Curatur* difficillimè.

ARTICULUS IV.

De Febris compositis, & Semitertiana.

Febres *compositæ* sunt, cum febris cum febre conjungitur.

Conjunguntur variè. Nam *interdum* non putrida cum putridâ conjungitur: *interdum* putrida cum putridâ; & quidem vel continua cum continuâ, vel intermittens cum intermittente; vel vice versa.

Signa sunt eadem cum signis simplicium, in primis frigoris, horroris, rigoris post quietem reditus. post plures rigores unius sudoris successio; vel post rigorem, nullus sudor. *Pulsus* frequentior contractio, ex qua novum materiæ motum, & novum paroxysmum insequi colligitur.

Curatio est Difficilior, cum plus affligunt quam simplices, & tempus agendi fere desit. *Pater* ex simplici curatione. *Dividuntur* variè.

I. Alia sunt *Confusa*, cum duæ febres eodem tempore incipiunt, ac desinunt, ut vix discerni possint; quod humores diversi inter se confusi, uno in loco putrescant. Alia *Implicita*, quando utriusque natura seorsim cognosci potest.

II. Alia sunt *Subintrantes*, cum alterius paroxysmus incipit, antequam prioris paroxysmus desinit. Alia *Coalterna*, cum uno paroxysmo finito, mox post breve intervallum alius incipit. Alia *Communicantes*, cum unus paroxysmus mox post alterius paroxysmum incipit.

III. Alia sunt *Intermittentes*, sub quibus continentur, 1. *Tertiana* tum *duplex*, qui vel singulis diebus semel, vel uno die bis affligit, & ex bile duobus in locis in venis melaëraicis putrescente oritur; tum *triplex*, quæ duorum dierum spacio ter affligit, uno scilicet semel, altero bis, & ex bile tribus in locis putrescente exsurgit. II. *Quotidiana duplex*, quæ agrum viginti quatuor horarum spacio bis affligit. III. *Quartana*, tum *Duplex*, quæ unum quidem diem vacuum relinquit, sed sequentibus duobus molesta est: tum *Triplex*, in qua singulis diebus ægri febricitant. Solet utraque plerumque ex intempestivo calidorum medicamentorum sudoriferorum præsertim usu excitari.

IV. Alia sunt *Continua*, qualis est *Semitertiana*. Hæc enim est febris ex quotidiana continua & tertiana intermittente composita, continuè, sed tertio quoque die cum rigore infestans. Cognoscitur ex utriusque febris signis. Oritur etiam ab iisdem causis, sæpissimè tamen ex inflammatione visceris alicujus. *Curatur* difficulter. Nec enim est simplex sed composita. Venter sæpissimè subvertit.

Partes

Partes nervosas, quod solet esse diurnitatis principium, lædit, & quæ in alto sunt, vehementer commoveret. Pro ratione febrium & causarum, inter purgantia *Agaricus* palmam obtinet. *Dividitur* dupliciter. Nam. 1. Alia est *Legitima*, quando par est bilis & pituitæ copia. Alia *Notha*, quando vel bilis excedit pituitam, vel pituita bilem. 2. Alia est *Maligna*, Contagiosa, & Epidemica, quæ signis malignitatis se prodit. Alia est *naturâ suâ intermittens*, sed cum inflammatione visceris alicujus, quæ ubi pars materiæ febrilis cum sanguine ad intestina, ventriculorum, epas & vicina loca protruditur, excitatur, conjuncta. Tum, continua symptomatice excitatur. Inflammationis signa adsunt. Rigor nunc ordinatè pro febris intermittens natura, nunc inordinatè, cum inflammatio novam partem occupat, aut cum pus fit, accidit. *Curatio* ex febris intermittens, & visceris inflammationis curatione dependet. Vide de illa *Spigelium*.

TITULUS IV.

De Febre Hæctica.

Hæctica esse febris à calore partes corporis ita occupante, ut etsi à nulla causa foveatur, nihilominus subsistat, exorta, continuo affligens.

Signa illa sunt, *Calor*, qui nullum dolorem infert propter alterationem solidarum partium jam factam; debilis est initio propter vaporum paucitatem; mordax post, propter partium soliditatem. in arteriis major propter communicationem à corde. hora una & altera post cibum, propter partium siccicarum & solidarum humectationem, augetur, liberè & incompressè, sine horrore & rigore, cum pulsu magno & veloci; distributo cibo cessat. Is etiam omne humidum radicale exsiccat. humores secundarios

Y 3

absumit,

absumit, & omnem in corpore pinguedinem colliquat.

Causa illius sunt, Aut *alia* Febres seu ardentes, seu diurnæ. Aut *viscerum internorum* ac potissimum cordis & partium thoracis, renum, ventriculi, diaphragmatis, morbi. Aut *causa externa evidentes*, vehementiores, quæ plurimum substantiæ in membris solidis absumunt. maximum & diurnum calorem excitant. nunquam tamen cum partibus solidis inducunt, quin primò spiritibus induxerint.

Curatio perficitur. I. *Humectatione & refrigeratione*, Interna per flores violarum borrag. buglossæ, semina quatuor frigida, lac perlarum, corallo- rum, & alia mitiora, ne debilis calor obruatur. *Externa*, ut balnea aquæ dulcis, lactis, olei olivarum. *Inunctiones* spinæ dorsæ, ut ol. violar. amygdalar. dulcium. II. *Diaeta conveniente*. Hic locum habent, Lac humanum, asininum, nisi febris putrida adsit, Cibi ex amygdalis, nucleis pini, pistaciis, &c. *Inscula* cochlearum. *Aquæ* caponum, Anguillarum, Cancrorum fluviatiliū: de quibus vide Ioëlem Tomo 5. 2. Mirabilis Ferdinandi, quæ constat ex sanguinis porcini juvenis & adulti, & nuper decollati, libris duabus, Terebinthina Veneta librâ unâ, Liquiritiæ rasæ lb. ss. passulæ. minorum manip. v. Ficubus pinguibus l. Radic. Ireos unc. iii. Pinear. mundatar. manip. iii. folior. Tabaci m. ii. Mica panis lib. f. in vase vitreo destillatis. Aquæ dosis Unc. ij. cum saccharo. Vide cum in *Observationibus* Hister. 21.

Dividitur Hectica dupliciter.

I. Alia est *sine tæbe*, quando rorida partium humiditas nondum absumta est. Ubi *incipit*; difficulter (nisi forte quis eam ex gracilitate corporis, bilio- sa ejusdem constitutione, & pectoris angustia colligere velit) cognoscitur. In *progressu*, Ephemerâ præ-

præsente, ultra diem calor extenditur & augefcit. Circa diem tertium calor post cibum augetur.

Alia *cum tæbe*, eaque duplex. Una *μωροσμοδης*, quando rorida humiditas absumitur, & substantia carnosâ arripitur. Tum corpus evadit macilentum. Tempora collabuntur, volæ manuum & plantæ pedum calidiores sunt, illa (de quibus in signis superius) accidunt. Alvi excrementa pinguedine perfunduntur. Eadem cum urina excernitur, non confertim, ut in benè constitutis; nec cum dolore renum, ut in pinguedinis renum solutione; sed lentè & parùm. Furfures in urina non affectâ vesicâ, crurum tumor, fluxus ventris, mortem minantur. *Altera* est, quando substantia fibrosa & membranosa violatur. Hinc subsequitur *μωροσμοδης*, qui interdum præternaturaliter juvenibus & senibus accidit: Interdum ex alimenti defectu, & Caloris extinctione, seu propter ætatem, seu propter scirrhum tumorem, oritur. Vide de eo Ioëlem, tomo dicto.

II. Alia est *Simplex*, cui supra in genere dicta, applicari possunt. Alia *Complicata*, & quidem, Aut cum putrida intermittente, & tum Caloris maxima pars in fieri manet, minima in factum abit. finito paroxysmo, artieriarum loca calent, reliquæ partes sunt temperatæ. pulsus frequentiam & celeritatem non amittit, æger cibo sumto non roboratur. Aut cum putrida continua, & tum difficulter cognoscitur. sicca caliditas post finem declinationis vel totius febris, remanet. corpus plus extenuatur. Urina est adiposa & oleaginosa, &c.

TITULUS V.

De Febribus Malignis.

CAPUT I.

De Febribus malignis in genere.

HActenus febres Benignas habuimus: sequuntur *Maligna*, quæ vel in genere, vel in specie considerari debent.

Maligna in genere considerata, sunt febres à causis occulta aliqua, & ad venenositatem accedente qualitate instructis exorta, symptomata solito graviora inferentes, nec tamen multos, nec subito è medio tollentes.

Signa illarum sunt, *Virium* à principio insignis sine causa manifesta debilitas, major quàm pro febris & caloris febrilis natura. *Pulsus* frequens, parvus, debilis: aut si is naturalis videtur, fallere, ex aliorum symptomatum præsentia agnoscitur. *Urina* aliquando primis diebus sanorum similes: aliquando rænes, crudæ, aut sine sedimento, aut cum eodem, sed crassæ & excremento potius simili: aliquando crassæ, coloratæ, turbidæ, crassum, rubrum & turbidum sedimentum deponentes. *Calor*, quàm pro natura morbi & symptomatum mitior. Symptomatum animalium, vitalium, & naturalium congeries. Tumorum vel macularum eruptiones, &c.

Causæ sunt vel humorum apparatus, vel contagium.

Curatio est difficilis, si majora & constantiora symptomata apparent. Stillicidium sanguinis ab initio magnam humorum ebullitionem, pravam qualitatem, & imbecillitatem significat. *Perficitur* Bezardicis, & aliis: de quibus in Differentiis.

Differentia febrium malignarum sumuntur à causis.

I. Aliæ

I. Aliæ sunt ab *Humorum vitioso apparatus*, seu is in ventriculo, seu circa præcordia, seu in primis viis hæreat. *Cognoscuntur* ex nausea, dolore, æstu, amaro ore, anxietate, & alijs indiciis. *Oriuntur* vel à cibis corruptis, vel aliunde. *Curantur* i. *Vena-sectione*, quæ post primarum viarum & corporis evacuationem per lenia, ne ebullitio major excetur, ante quartum diem institui debet. ii. *Sudoriferorum*, quæ nec febrim augeant, nec admodum sint fortia, exhibitione, ut vel corpus ad sudores disponatur, vel malignitas expellatur. iii. *Humorum alteratione* & præparatione per illa, quæ putredini, ebullitioni, & malignitati resistunt. Laudantur, succus *Citri*, *Granatorum*, *Scorzoneræ* radix, &c. *Quin* & *Spiritus vitrioli* cum alijs syrupis, nisi fortè patientes sint senes & macilenti: nisi pulmonis affectibus ob aliam causam quàm pituitam vasa infarcientem laborent. iv. *Purgatione*, quæ per lenia, & vix ante diem decimum quartum institui debet. v. *Diureticorum* refrigerantium exhibitione, si eò materia morbi vergit. vi. *Topicorum* ad pulsus & cor roto morbi tempore applicatione. vii. *Symptomatum* obvenientium vel mitigatione, vel sublatione. viii. *Diaeta*, in qua à vino nisi Syncope obveniat, abstinendum. Decoctum. CC. cum spiritus vitrioli ea quantitate, quæ gratam aciditatem inducat, cui Julepi Rosarum vel Violarum aliquid admisceri potest, exhibendum. *Dividuntur* bifariam. i. Interdum omne *Venenum* abest, sed ob causæ vehementiam vel aliquam malam qualitatem urget. Interdum occulta & *venenata qualitas* adest. 2. Aliquando *putredo* & *malignitas* æquales sunt. Aliquando major *putredo*, quàm *malignitas*. ubi primæ viæ non tantum per Clysteres, sed & per Syrupum rosar. solutivum, Cassiam, Tamarindos, &c. evacuari possunt. Aliquando *malignitas* putredine major.

Y 5

Aliæ

Aliæ sunt à *Contagio*, in quibus *Curatio* per Alexipharmaca & sudorifera institui, & natura, si quid expellit, juvari debet.

CAPUT I.

De Febribus malignis in specie.

ARTICULUS I.

De Variolis.

Febres malignæ in specie spectatæ, continent sub se febres cum *Variolis*, *Morbillis*, & hisce similibus exanthematis, febres *Petechiales*, *Sudorem Anglicum*, Morbum *Hungaricum*, Febrem cum *spasmo*, & Febrem cum *catarrho* & *tussi*.

Varioli sunt pustula, in summa cute partibusque cuti proportionem respondentibus, cum febre continua, propter peculiarem sanguinis effervescentiam & ebullitionem, à facultate expultrice excitata.

Signa præsentium non est quod inquiremus. Vifui enim obijciuntur. Imminentes indicant, Capitis cum gravedine oculorum, colli & dorsî dolor, narium pruritus, Respirationis imminutio, Tussis siccitas, pedum ægro sese convertente tremor, sternutatio frequens, cordis palpitatio. Urina interdum sanorum similis materiâ vitiosa ad ambitum corporis protrusâ, interdum ob magnam humorum ebullitionem turbida. Lacrymarum ex oculis spontanea eruptio. Febris ex humorum ebullitione accensio. Macularum proventus, &c.

Causa est Interna, materni sanguinis impuritas, quem infans in utero posterioribus mensibus, quia purior non sufficit, attrahit. Hic in totam substantiam carneam attractus, per aliquot annos insensibiliter occultatur: tandem, dum natura hanc impuritatem

tatem amplius ferre non potest, instar musti ebullientis fermentari incipit, per ebullitionem purum ab impuro separatur, impuritas per crisi quandam pellitur, & calor cordi communicatur, ac febris accenditur. *Externa. vel Contagium*, cum è corporibus ita morbidis, morbidum effluvium alteri communicatur: Vel *Aër* ob siderum influxum, aut alias causas, humores seu corrumpens, seu commovens.

Medicatio duo respicit: 1. Præservationem, quæ in adultis venæ-sectione, purgatione & fugâ contagii; in Infantibus ultimo isto duntaxat peragitur. 2. *Curationem*, quæ est *Bonæ spei*, si citò erumpunt, & eminentes, magnæ, disparatæ, albæ vel rubræ apparent. si calor, erumpentibus remittit. si largior narium hæmorrhagia præcessit. Si nullis gravibus symptomatibus afficiunt. *Dubia*, si vel difficulter apparent, vel iterum occultantur. si sunt violaceæ, virides, lividæ, duræ, contiguæ. si febris post eruptionem non minuitur. si difficilis respiratio, deliquia animi, & alia symptomata adsunt. *Absolvitur*, 1. *Ebullitionis mitigatione*, ne nimia ebullitio graviora symptomata adferat; quæ peragitur Venæ sectione & levi purgatione in adultis: Clysteris ex decocto hordei cum butyro recente & sacchari communi appositione, & syrupi citri cum syrupo violaceo, vel Morcell. citri exhibitione, in Infantibus. 2. *Nature pellentis adjumento*, ubi impedimenta per superiora remedia tolluntur; & malignitati simul resistitur. Ad *Expulsionem* facit, *pulvis iocelis* Tomo 4. l. 9. f. 5, ex femin. nasturtii, aquileg. ana dr. j. scobis unicornis scr. j. aut c. c. scobis dr. f. Corallor. rubr. Margarit. præp. ana. scr. j. factus & pondere dr. j. vel f. exhibitus. *Decoctum sicum* Mynsichti Armam. sect. 25. *Terra sigillata Silesiaca. Semen raporum alborum. Decoctum Lentium* decorticat. cum semin. fœniculi & gummi tragacanthi, &c. 3. *Partium defensione*. Ubi *Oculi* auro

auro puro confricandi; vel aquâ plantag. & Euphras. cum pauxillo Camphoræ & Croci illinendi. Si aperi-ri non possunt, vel calido lacte vel decocto hordei fo-vedi. *Naribus* nodulus ex sandalo & camphora a-ceto rosac. intinctus admovendus. Occlusæ ol. a-mygdal. dulcium illinendæ. *Guttur* vel diamoro illinendum, vel decocto plantaginis, hordei cum melle rosacæ eluendum. *Maturatio* variolorum in-unctione ol. Amygdal. dulc. promovenda. Maturi aciculis aureis vel argenteis aperiendi, ne nævos post se relinquant, aquâ *omnis generis florum* abluen-di, & pinguedine humanâ, vel Foresti unguento, inungendi. 4. *Symptomatum* intercurrentium vel sublequentium *ablatione*: sunt autem illa, *Epilepsia*, *Convulsio*, membranæ & nervi à pustulis ob-fessis; *Paralysis* iisdem obstructis. *Duri tumores*, qui absque suppuratione, emollientibus dissipandi. *Ulcera* externa, *Dysenteria*, ubi emollientia vitanda, exsiccantibus & absque acredine constipantibus a-gendum. *Læsis auditus*, ubi præmissa evacuatio-ne, vel vesicatoria vel vapores immissi locum ha-bent. *Oculorum inflammatio*, & cætera: de quibus suis locis vide.

ARTICULUS II.

De Morbillis, & similibus exan-thematibus.

Morbilli sunt tubercula parva, rubra, in cu-te erumpentia, cum febre continua, à facul-tate expultrice, & sanguinis peculiari ebullitione excitata.

Signa, Causa, Differentia, & Curatio non diffe-runt multum à variolis: de quibus superius egimus. Similia morbillis exanthemata sunt.

I. *Crystalli*, pustulæ lupini ferè magnitudine, in

in corpore erumpentes, & crystalli instar splenden-tes, è quibus aquositas quædam effluit, Germanis *Schafs-blattern* dicuntur.

II. *Tubercula*, Germanis *die Stein-pocken* dicta, quæ sine multâ sanie sparsim nec copiosè erum-punt, citra febrem invadunt, & citissimè sanantur.

III. *Rubeola* tubercula exigua & rubra, quæ quandoque sola cum calore & tussî invadunt, quan-doque variolis vel morbillis intersparguntur, quan-doque sanatis superveniunt.

IV. *Rossalia* seu *ερυσιπelas*, maculæ rubræ & quasi ignitæ, quæ cum vix effat digno tumore, per univèrsum corpus, quasi quædam erysipelata par-va, in principio morbi, seu die quarto, vel quinto erumpunt; progressu morbi totum corpus occu-pant, ut id quasi ignitum appareat. Is color in de-claratione iterum, ut in principio in maculas muta-tur; quæ tandem septimo vel nono die evanescent, epidermide squamarum instar decidente. *Curatio* horum nihil singulare habet.

ARTICULUS III.

De Febre Petechiali.

Febri petechialis est febris maligna, in qua macu-la quædam, pulicum morsibus similes, variorum colorum, rubra tamen imprimis, in cute apparent.

Maculæ illæ dicuntur, *puncticulæ*, *petechiæ*, *peti-culæ*. Unde febres etiam puncticulares, peticulares, petechiales, & lenticulares nominantur.

Signa sunt eadem, quæ in malignis. Maculæ sunt sine omni pruritu, extuberantia & exulceratio-ne. apparent in dorso, brachiis, cruribus, pectore, locis nimirum, per quas insigniores arteriæ & venæ transeunt. in facie rarò propter aëris appulsus, qui materiam facilè repellit. nullum puncturæ vestigium in

in earum medio conspicitur, sic à pulicum morfibz distinguuntur.

Causa est Humoris putridi pars tenuior, unde facile evanescunt. *Pellitur* à facultate expultrice, raro Criticè, cum in principio plerumque, absque notabili evacuatione, erumpant: semper ferè *Symptomaticè*, & quo copiosius erumpunt, eò majorem pravae materiae copiam indicant.

Curatio ejus *dubii eventus*, si sint maculae copiosae, quia multum materiae adesse significant. si paucæ, & signa naturæ debilis sunt præstò. si delitescant, quia intrò vergere indicium est. si tardè erumpant; quia vel humorum crassitiem, vel cutis densitatem, significant. *Peragitur* I. *Materia subductione*, quæ fit per venæ sectionem instituendam, præmissis alvum lenientibus, quibus aliquid camphoræ addi potest, ante quartum diem; ne, si seriùs, vires debilitentur. II. *Ejusdem* per sudorifera malignitati simul resistentia, *expulsione*, præmissis (si ita videretur) inunctionibus, quæ poros aperiunt. Ex illis sunt Lapis *Bezoar*, Emulsiones ex *seminibus napi*, *citri* cum aqua cardui benedicti & Syrupo citri. *Ossa*, *sanguis*, *cornu* & *cutis* Rhinocerotis, &c. III. *Virium roboratione*, per emulsiones *Corallor. margaritar.* Confectionem *Alkermes*, &c. IV. *Interdum* & ad exteriora per vesicatoria *revulsione*, si externa frigent, dolores capitis, deliria, convulsionnes, &c. urgent. si alvi fluxus accessit, naturæ committendus, nisi nimis excedat.

Differentia à quantitate & colore sumuntur. I. *Aliae sunt copiosæ*, *aliae paucæ*. II. *Aliae minores*, *aliae majores*. III. *Aliae sunt rubrae*, à sanguinis temperationis putredine; *aliae flavae* vel *virides*, à bile; *aliae puniceæ* & *nigrae*, ab humore atro, &c.

AR

ARTICULUS IV.

De Morbo Hungarico.

Morbus Hungaricus est febris continua, maligna & contagiosa, cum magno humorum circa ventriculum & primas vias apparatu, & insigni capitis dolore conjuncta.

Vocari potest *Castrensis* & *Militaris*, quòd in castris exortus sit. *Signa* ejus sunt cum malignarum febrium eadem. accedunt eis, dolor capitis ingens, ut & circa ventriculum ad locum sub mucronata cartilagine, durities & renitentia; deliria, quæ, materia ad aures secedente & surditatem excitante, solvuntur: sepius petechiæ & maculae apparent, &c.

Causa est vel Humorum in vena cava putredo & corruptio: vel *Contagium*.

Curatio est *Bona spei*, si materia ad aures tendit. si per alvum evacuetur. *Peragitur* pro ratione Causarum, quas in differentiis vide: & maximam tum febris, tum malignitatis rationem habet.

Dividitur ratione Causarum.

Alia est ab Humorum in venâ cava corruptione, qui diætæ erroribus cumulantur. Aër namque Hungaricus noctu crassus, interdiu tenuis & fervidus. Milites vapores è terra exhalantes excipiunt. Victus eorum plerumque est pravus, & spontè ad putredinem tendens, &c. *Cognoscitur*, ex victu antecedente, dolore ventriculi. *Curatur* I. *Humorum educatione*, tum per alvum, ubi *agaricus* laudatur; tum per vomitum: tum per venæ in cubito vel talo sectionem, quæ primo vel secundo die instituenda: si aliquot dies præterlapso, & vel alvus solvitur, vel vomitus supervenit, omittenda. II. *Malignitatis* per sudorifera moderata, aliquoties repetita, *dispulsione*, ubi & *antimonium Diaphoreticum*, & *Theriaca* in

352 SUDOR. ANGLIC. FEB. CUM SPASM.
in frigidis aquis dissoluta locum habet. 111. *Dieta*
malignis febribus conveniente. A vino qui non abs-
tinent, intereunt.

Alia est à *Contagio*, in qua purgationibus & vo-
mitibus omisiss, soli malignitati resistendum.

ARTICULUS V.

De Sudore Anglico, Febre maligna cum
spasmo, & febre maligna cum tussi & catarrho.

Sudor Anglicus seu febris sudativa, in Anglia tem-
pore Henrici VII. cepit, & ægros cum summo ca-
pitis dolore, inquietudine, cordis pulsatione, per-
petuis & copiosis sudoribus afficiebat. Causa con-
jicitur in aëris constitutionem, humidam & venena-
tam, ac spiritibus & subtiliori humorum parti ac
cordi inimicam; accedente peculiari aliquo siderum
ad hanc corruptionem influxu. Curabatur meris
sudoriferis, aquâ nempe acetosâ, scabiosâ, terrâ si-
gillatâ, &c. Sudor per xxiv horas continuabatur.
Somnus ante finitam sudationem non permitteba-
tur: nec ægri detegebantur, sed interim succo citri,
granatorum, & aliis confortabantur.

Febris maligna cum spasmo anno MDXCVI in Ger-
mania exorta, variis symptomatibus cum spasmo æ-
gros infestabat. Multi subito invadebantur, quidam
epilepsiâ, nonnulli Apoplexiâ corripiebantur, in
quibusdam mentis delirium per aliquot dies dura-
bat per contagium, quod se intra duos post annos
exferebat, serpebat, &c. Orta putatur à pestilenti-
bus ichoribus & malignis vaporibus nervis infestis-
hi ex victu pravo ob annonæ caritatem contracti
fuisse putantur. In Curatione vitiosa & venenata
materia tollebatur, & nervi debilitati confirmaban-
tur. Vide de illa facultatis Medica in Academia Mar-
purgens

LIBER SEPTIMUS. 353

purgens scriptum; & *Sennertum* l.4. cap. 16. de Fe-
bribus.

Febris maligna cum catarrho & tussi epidemiâ,
anno M.D.LXXX. exorta, sub Sirii ortum universam
penè pervagata est Europam. Invebat cum calo-
re febrili, dolore capitis, quem excipiebat tussis sic-
ca, dolor pectoris & septi transversî, faucium asperi-
tas, gravis anhelitus, &c. Orta creditur ab humida
annorum præcedentium constitutione, & diutino
austri flatu. Febris causa potuit esse materia catar-
rhalis per venas diffusa, nisi fortè, febre morbo pri-
mario existente, natura partem humoris, à quo mo-
lestabatur, per hanc viam ejicere tentarit. In Cura-
tione respiciebatur ad humorem malignitatis fomi-
tem, qui extrudebatur ad malignitatem ipsam, cui
Alexipharmacis resistebatur, & humoris reliquæ al-
terabantur. Ad membrum affectum, cui appropria-
tis subveniebatur.

TITULUS VI.

De Febribus pestilentibus.

Febris pestilens est, febris putrida continua, qua ex
aëre potius & contagio oritur, maximam illorum
quos invasit partem trucidat, putredinem & calo-
rem ex deleteria & venenata seminario contagiosi vi
fortitur, & majoribus quàm in maligna symptomati-
bis, bubonibus & carbunculis affligit.

Signa illius, symptomata in pestilentia, pauciora
& mitiora paulo, occurrentia, suppeditant: de qua se-
quenti agemus capite plura in differentiis videantur.

Causa eadem sunt, quæ pestis gradu duntaxat ra-
tione contagionis, vehementiæ, & magnitudinis dif-
ferunt.

Curatio est Difficilior, vel faciliior, pro multitudi-
ne, paucitate, benignitate vel vehementia sympto-
matum,

matum. Ratio in illa habenda tum *pestilentis veneni*, tum *putredinis* & *febris*, quæ inter se conferenda sunt. *Peragitur* 1. *Sudoriferis* non admodum calidis, præsertim si plus malignitas quàm putredo urgeat. Aquæ *destillatæ* sunt efficacissimæ, & sal volatile *cornu cervi*. II. *Vena-sectione*, antequam malignitas in totam massam sanguineam sit disseminata, cæteris quæ in generalibus præceptis continentur paribus. III. *Purgatione primarum viarum*, præsertim per clysteres, si præsertim sit ab apparatu morbofo, ita ut iterum Alexipharmaca subsequantur. IV. *Vesicatoriorum applicatione* ad crura, brachia, supra cubiti flexuram extra, pro-ut locus (ad quem materia, quam revellere & derivare cupimus, ruit, aut circa quem præcipuè hæret) monstrat.

Dividitur hæc febris trifariam.

I. Alia est *sine peste*, alia *cum peste*.

II. Alia, in qua & *putredo* & *malignitas summa*. Tum vires vehementer deiciuntur; & ratione putredinis varia Symptomata, aut vigilæ, dolores capitis, sitis inexhausta, &c. insequuntur. Alia, in qua *putredo est summa*, & *malignitas remissior*. Tum vires minus deiciuntur, calor in exterioribus ad statum est putredini *ἀνάλογος*; circa eum, si æger non evader, exteriora tepescere, mox frigescere incipiunt. Alia in qua *putredo remissa*, *malignitas vehemens*. Tum febris est mitis, & cor valdè læditur. Cum nec ægris nec medicis periculosus videatur, jugulat.

III. Alia creditur esse *Ephmera*, alia *Humoralis*, alia *Hectica*. Sed quia spiritus non tantum incallescunt, sed etiam corrumpuntur; quia cor non tantum in temperie afficitur, sed & in substantia vitatur; nullæ pestilentes vel Ephemeræ, vel hecticae esse possunt. Attamen quia inter eas aliqua differentia apparet, & nunc ipsum cor, nunc spiritus,

nunc

nunc humores magis afficiuntur, propter similitudinem, quam cum aliis propriè dictis habet, ita appellari potest.

CAPUT UNICUM.

De Pestilentia.

Pestilentia est morbus cordis venenosus, à materia venenata & contagiosa generatus, omnes cordis actiones subito & lethaliter, cum omnis generis Symptomatum congerie ladens.

Morbus est, & quidem 1. *Epidemicus*, propter causam communem, & propter contagium. 2. *Cum putredine conjunctus*, ita ut nec ex ea sola judicetur, quia phthisis esset magis pestilens; in febribus putridis non daretur major calor, quàm venenatis; Alexipharmaca non essent necessaria; nec semper febrim inferat, ut ex multis exemplis patet. 3. *Venenosus*, quia omnes vitales facultates opprimat, & subito occidit.

Signa sunt vel *imminentis*, grassatio ejusdem in vicinis locis. prægressus eorum, quæ aërem inficere possunt, ut sunt tetri è terrâ vapores, frugum infectio. Effecta aëris ad corruptionem tendentis, ut sunt, fungorum nimia copia, plantarum marcor, insectorum multitudo, animalium exanimatio, panis aëri nocturno expositi mucor, carnis facilis putredo, variolorum & morbillorum frequentia, &c. Vel *Præsentis*, cujus suspicio est, si plurimi illorum qui corripiuntur, pereunt, si ab uno ægro in alium serpit, si vires subito prosternuntur, si bubones & carbunculi infecto alicubi aëre apparent, si in mortuis maculæ conspiciuntur.

Causa pestilentiae est *materia venenata, & contagiosa*. Hæc prodit 1. Ab *Aëre*, qui interdum ad pestilentiam mutatione primarum qualitatum præparatur; interdum sine ulla mutatione corrumpitur; seu

permissio exhalationum variarum ex terra & aquis erumpentium, præsertim quando Saturnus triplicitatis igneæ signa Arietis, Capricorni & Sagittarii transit, occultè & tota naturâ cordi adversarum; seu occulto siderum aspectu & influxu. *II. A pravo visu*, ubi se facilius humorum vitium exserit, si ex aëre occasio aliqua accedit. *III. A Venescis* ne cromanticorum vivorum insipientium, sagarum mortuorum in sepulcro non avulso à cervice capite recumbentium. *IV. Ab imaginatione & terrore*, quæ humores in corpore agitant, seminarium pestilentiale excitant, & illud altè cordi inducunt. De *Contagio* libro primo diximus.

Medicatio tria respicit; *Præservationem*, *Curationem*, & *Symptomatum sublationem*.

Quantum ad *Præservationem*, *I. Causa*, quæ pestem inducunt, removeantur. *II. Corpora* ad suscipiendam pestem minus apta reddantur. Itaque corpus pillulis *Rusi* ter septimana scrup. j. pondere purgetur. *Vena sectione* corpus non debilitetur. *Cibus* optimi succi pharmacis alexiteriis conditus sumatur. *Fontanella* interdum, ut humores suos transitus habeant, fiat. *Aër* igne & suffumigiis purus teneatur. *Nares* aceto, oleo scorpionis, &c. inungantur. *Amuleta* ex hydrargyro nuci incluso, arsenico, &c. de collo suspendantur, ita, ne arsenico propter virium imminutionem alia immisceantur. ne motu, propter per poros penetrationem incalificent. Inter *Antidota* commendantur *Theriaca*, *Electuarium de Ovo*, *Elixir proprietatis*, *Lapis Bezoar*, *Sal vitium* & *Millesfolii*, *Extract. Iuniperinum*, &c. *Medicamenta calida* temperentur, & in aceto primò maceantur.

Curatio absolvitur *I. Vena sectione*, quæ administranda post sumtum Alexipharmacum, si tanta sit sanguinis copia, ut putrida febris metuatur.

in

in quocunque latere, si non adest dolor; si adest, in quo est, nisi carbunculus ingentem dolorem & inflammationem causetur, intra xii vel xxiv horas. *II. Purgatione*, post sumtum Alexipharmacum, si Cacochymia metum febris injicit. si pestilentia ab internâ humorum corruptione orta est. *III. Sudoriferorum & Alexipharmacorum* exhibitione. Laudantur ex simplicibus *Unicornu* Hercynium. *Sanguis* Rhinocerotis gutt. v. in aqua acetosâ. Ejusdem corii frustulum, aquæ incoctum, in qua aurum candens extingui debet. *Succus* medullæ fructus Brasiliensis *Muracujao Hasi* dicti, *Coccus* Moluccensis in scobem redactus gran. v. pondere ex aqua rosacea aut acetosâ. *Galega* seu rutæ capraræ succus unc. iij. pondere, &c. Ex compositis Syrupus, *Melissophylli* Fernelii, ex succo *Galega* Septalii. Rob *Sambuci* cum aceto Theriacali. *Elixir pestilential* Crollii. *Diascordium* Fracastorii dr. ij. in gravidis & pueris præsertim. Pulvis ex *snaragdi* præpar. *Lapis Bezoar* ana gr. viij. *Hyacinthæ* præpar. gr. iij. Vide Sennertum de Febribus, circa finem. In horum usu observandum. Theriaca frigidiorebus paulò temperanda. Theriaca, Mithridatium & alia fortiora gravidis & pueris non danda. *A Camphoratis* ventriculo & capite infirmis abstinendum. Intra xxiv horas ter medicamentum præbendum. In principio *medicamenta*, ne natura assuescat, sæpissimè mutanda. Aquæ, Spiritus, & quæ facile penetrant, maximè offerenda. A somno, donec bis sudaverit, abstinendum. Inter *sudandum* æger succo citri, aquis Carduibenedicti, &c. reficiendus. Finito sudore, frigidus aër vitandus, cibo æger refocillandus.

Pestilentia Symptomata sunt *Bubo*, *Carbunculus*, *Febris ardens*. *Bubo* securior est, si major & eminentior. si statim in initio, & in inguinibus erupit.

pit. *Periculofior*, fi lividus & niger. fi sub cute delitefcit. fi circa collum, vel sub alis tertio vel quarto die erupit. *Periculofiffimus*, fi virium debilitate manente evanuit. *Delitefcens* foras eliciendus eft, aut cucurbitulæ affixione, aut catapl. ex rad. Raphani & fcorpulariæ major. cum pauco falis & aceto. *Eminens* ad ignobiliores partes detrahendus eft, à collo ad volam manus, ab inguinibus ad plantam pedis. Infervit hic *Cataplasma*, ex radice. *fcrophul. glandul. major.* unc. ij. Radice. *Raphani* unc. i. Conrufis, & admifta fermenti acerrimi unc. ifs. cum aceto vini coctis, formatum, & aut volæ aut plantæ pedis ejufdem lateris impofitum, & ter aut quater per noctem renovatum. *Fixus* i. Cucurbitula cum magna flamma, abique ulla cutis incifione, fæpius attrahatur. 2. Avulfæ cucurbitula *cataplasmate* maturante, & attrahente ex radicibus *fcrophul. fale, fapone nigro*, fermento acris, in aceto coctis, tegatur. 3. Poft horas fex, cucurbitula iterum affigatur, & cutis fcapello convulneretur. 4. *Cataplasma* maturans & attrahens, vel ex *capa magna* excavata, Theriaca repleta, & in cineribus ad mollitiem decocta, vel ex *corticibus med. fambuci* cum flore lactis coctis & cum fermento miftis, iterum per noctem imponatur, & fæpè renouetur. 5. Tumor altero die in inferiori parte vel incidatur, vel rumpatur, fanies exprimatur; & mundificativum emplaftrum ex *Terebinth.* aqua *fcordii* elota, cum melle rofaceo, proponatur.

De *Carbunculo* & *Febri*, quam etiam quædam fymptomata excipiunt, vide fuis in locis. vide de Pefte *Petrum Salium Diverfum*, *toelem.* Tom. 5. f. 3. *Septalium* peculiari tractatu, & *Valerium Martini.* Et tantum de febribus.

I D E Æ

I D E Æ

MEDICINÆ PRACTICÆ

LIBER VIII.

De Morbis capitis.

TITULUS I.

De Morbis Cerebri.

CAPUT I.

De Intemperie Cerebri fine materia.

HActenus erant Morbi Universales: fequantur *Particulares*; & hi vel Non *venenati*, vel *Venenati*. Ad illos, *capitis*, *medii* & *infimi ventris* morbi pertinent. Morbi capitis sunt vel *Cerebri*, vel *Oculorum*, vel *Aurium*, vel *Narium*, vel *Lingua*, vel *Labiorum*, vel *Facies*, vel *Oris*, vel *Dentium*, vel *Gingivarum*, vel *Maxillarum*, vel *Gurgulionis*, vel *Tonsillarum*. Ad morbos cerebri referuntur, *Intemperies*, *Meatum angustia*, *Commotio*, *Inflammatio*, *Hydrocephalus*, *Contusio*, *vulnera* & *fractura*. *Intemperies* vel est *sine materia*, vel *cum materia*.

Intemperies cerebri sine materia, est ejufdem à sua temperie per causas externas, *declinatio*.

Signa & *causas* in Differentiis vide.

Curatio absolvitur *Alteratione* & *Purgatione*, ne, fi corpus fit vel plethoricum vel cacochymicum, plus attrahat vaporis.

Dividitur in quatuor species.

I. Alia est *Calida*, quando ad nimum calorem cerebrum deflectit. *Cognoscitur* ex pulsu temporum,

Z 4

rum, agitatione intra cranium, somna vel nullo vel brevi, imaginationis mutabilitate. *Oritur* à causis externis calidis, aëre, cibo, potu, affectibus nimis, &c. *Curatur* I. *Alteratione*, per medicamenta refrigerantia tam interna, quam externa; Illaque non valida, in pueris præsertim & mulieribus; vim adstringendi mediocrem habentia, ne humores vel attrahantur vel fundantur, non frequenter adhibita, ne stuporem inducant, cum dissolventibus in declinatione mixta. Præcipua sunt, Folia *Lactuce*, *portulacæ*, Flores *Rosarum Nymphaeæ*, *Papaveris albi* & *Erratici*. *Lign. santalin.* & quæ ex iis parantur, ut fomenta, quæ penetrantibus ob tenuitatem substantiæ, ut aceto, corriguntur. Fronti, temporibus, futuris, applicantur. Ubi incaluerint, mutantur; nec crassius, nec multiplicibus linteis involvuntur, Embrochæ, lotiones pedum. Laudantur Fol. *sempervivori*, *vitis*, *salicis*. Flor. suprâ dicti, *sambuci*. Radix *Rhodiæ*. Cataplasma ex fol. *salicis* & *capreolis vitis*. II. *Evacuatione* propter superius adductam causam. III. *Diatâ* ad frigidiorum declinante.

II. Alia est *Frigida*, quando ad nimiam frigiditatem cerebrum defleſcit. *Cognoscitur* ex oculorum tumore, faciei pallore, capitis gravitate, ad somnum propensione, torpore & pigrâ. *Oritur* ab externis vel frigidis, vel frigis inducentibus. *Curatur* I. *Evacuatione*, si corpus est Cacoehymicum. II. *Alteratione*, per externa & interna calefacientia, illaque post cibum sumta. Præcipua sunt, Radix *peonia* lunâ decreſcente collecta, *Aristolochia rotunda*, *Castoreum*. Flores *stæchadis*, *primulæ veris*, *Tilia*, *Tunicis*, *Liliorum convallium*, *Rorismarini*, *Betonica*, *Majorana*. Aquæ *Ceraſorum nigror. hirundinum*, *Theriaca*. Essentia *Rutæ*, *Rorismarini*, *Succini*. Condit. *Nucis Indicæ*, *Moschate*. *Theriaca*, *Mithridatium*, *Conſectio Anacardina*, *Alkermes*.

Olea

Olea destillata, ut *Guajaci ligni*, *sassafras*, in aquis vel morsellis. Extra proſunt Folia *Rutæ*, *serpilli*, *verbena recta*. Balsama, *Lavendula*, *Rorismarini*, *Succini*, *Caryophyllorum*, *Nucis moschate*, &c. III. *Diatâ* ad calidam vergente, ubi fuffumigia locum habent.

III. Alia est *Humida*, quando cerebrum ad nimiam humiditatem defleſcit. *Cognoscitur* ex narium & oculorum humiditate, Catarrhis qui inſequentur, propensione ad somnum. *Oritur* ab externis causis non naturalibus, humiditatem inferentibus; ut sunt, pluvia, lunæ radii, &c. *Curatur* I. *Alteratione* per moderatè siccantia frigidis mixta, non multum odorata. Internè per decoctum inprimis *China Guajaci*, cui aliquid carnis vitulinæ ad temperandam siccitatem, injiciendum. Externè Embrochæ, sacculos, ex milio, *sale toſto*, *melanthio*, &c. II. *Diatâ* conformi illi, quæ decocto Guajaci utentibus præſcribitur.

IV. Alia est *Sicca*, quando cerebrum ad nimiam siccitatem recedit. *Cognoscitur* ex oculorum cavitatè, somni carentia, faciei squallore, sensuum acridine, causarum antecessu. *Oritur* ab externis, præcipuè nimis corporis evacuationibus, vigiliis, inedia, tristitiâ, nimis studiis. *Curatur* I. *Humectantibus* internis, ut emulsione *seminum frigid. major. flor. violarum*. Externis, *spuma feri lactis*. II. *Diatâ* humidiorè, ut sunt: juscula carnum pingua, ova sorbilla, balneum aquæ dulcis. *Salviterur*.

V. Alia est *Composita*, cujus ratio ex simplicibus connexis cognosci potest, ita ut non necesse sit plura de illa dicere.

CAPUT II.

De Intemperie cerebri cum materia.

Intemperies cerebri cum materia est ejusdem à sua temperie per causas externas & internas, humores nempe & flatus inducta declinatio.

Signa sunt, causarum internarum progressus, morbi ad phases Lunæ mutatio.

Causæ sunt Internæ, Humores nempe & flatus, qui vel ab imbecillitate cerebri, vel à partium inferiorum repletionem veniunt.

Curatio peragitur, 1. Evacuazione tum generali, ubi habenda ratio *pilularum*, quæ ratione ingredientium efficacissimæ, & manè offerri debent. totius corporis, quod purgandum. absentia & præsentia febris, ne incocta attingantur. Clysterum revellentium, qui non omittendi: tum *Speciali*, ubi locum habent 1. *Errhina*, maximè exsiccantia, modò oculi & nares non laborent. 2. *Sternutatoria*, si præsertim caput vaporibus repletum est, & crassos mucus fover. 3. *Apophlegmatizantia*, si pulmo est ab ulcere liber, nec succi adeò tenues. 4. *Cauteria, setacea, Topica, &c.* 11. *Intemperiei* correctione.

Dividitur trifariam.

I. Alia est *per essentiam*, quando materia in cerebro generatur.

Cognoscitur ex eo, quod symptomata affectum excipientia adsint. quod continuò, nisi fortè materia per intervalla in capite generetur, affligant. quod causæ caput afficientes præcesserint. *Oritur* tum à cerebri malè concoquentis vitio: tum ab excrementorum propter expultricis vel meatuum læsionem, retentione. *Curatio* non variat ab illa, de qua superius dictum, & de qua inferius dicitur.

Alia est *per consensum*, quando materia aliunde ad caput

caput transmittitur. *Cognoscitur* ex generalibus signis, de quibus l. 1. Tit. 1. *Oritur* etiam ab iisdem causis, de quibus ibidem. In *Curatione* 1. à parte mittente *incipiendum*, sed si sit crisis, nihil adhibendum, nisi vehementer materia moveatur. 11. *Revellendum* Venæ sectione in brachiis vel cruribus, cucurbitulis, clysteribus frictione, cauteriis. 111. *Repellendum* per oxyrrhodyna, nisi vel febris vel Catarrhus, vel nimia vigilia, vel cranii, cerebri membranarum, propter vulnus detecto adsit. 1v. *Intercipiendum*. *Differentia* hujus pro varietate partium à quibus materia mittitur, sunt variae. 1. *A toto*, ut in febris: & tum magis revulsioni & evacuationi, quàm repulsioni studendum. 11. *A Ventriculo, Liene, Epate, Renibus, Vtero, Diaphragmate, Externis partibus*. Tum ex partium mittentium affectibus cognoscitur, & Curatio ex illis sumenda est.

II. Alia est à *Flatu* vel vapore, quæ *Cognoscitur* ex sensu tensionis, sive gravitate, sibilo aurium, pulsatione articularum, vertigine. *Oritur* ab iisdem, de quibus in generalibus dictum est; quibus accedunt ex specialibus, odora menta, res foetida, vapores metallici, fumus carbonum, &c. *Curatur* diversimodè pro ratione specierum. *Dividitur* bifariam. 1. Alia est à *Causis externis*, ut vaporibus metallicis, quæ *Zedoaria* pellitur. Carbonum fumo, cui aër liber, aqua cum theriaca, sternutatoria debentur. Vento vel frigido vel calidior, cui opposita inserviunt. Alia ab *Internis*, seu calidioribus, seu frigidioribus. 2. Alia est *per essentiam*, & tum præcessit capitis gravitas, partium inferiorum affectus absunt. Discutientibus internis & odore cephalicor. curandum. Alia *per consensum*. & Tum venæ in collo tenduntur, Urinæ in superficie bullis repletæ sunt. flatus aut per partem anteriorem, cum thoracis tensione & articularum in profundo pulsatione; vel per posteriorem, cum vena-
rum

rum & arteriarum ejusdem partis tensione, adscendunt. *Oriuntur* ab aliis partibus quæ submittunt. In *Curatione* ratio habenda Revulsionis per clysteres paulo fortiores. Repulsionis per Oxyrrhodina externæ, per conservam rosarum &c. internæ. Evacuationis per purgantia carminativis castigata.

III. Alta est ab *Humoribus* : & hæc est vel *Sanguinea*, *Biliofa*, *Pituitosa*. vel *Serosa*, *Melancholica*, & *Atrabilaria*.

I. *Sanguinea cerebri intemperies à sanguine seu tenui seu crassiore procedit. Cognoscitur*, nisi à causa externa proveniat, extensione & gravitate, flante præsertim austro, oculorum rubedine, calore mitiore, partis anterioris ab horâ nonâ noctis ad tertiam diei dolore. *Oritur* à plethora & ejus causis. Deducitur in actum ab affectibus nimis, vini potu & aliis, quæ calorem vel dolorem capiti inferunt. *Curatio* instituenda citò, ne inflammatio vel alius affectus oboriatur. *Peragitur* I. Sanguinis (qui influxit) diversione, per venæ cephalicæ, vel pedum, si menses vel hæmorrhoides, suppressi (Arteriotomia propter *insuccessum* non tentanda) sectionem, quæ evacuat & revellit. Cucurbitular. lumbis, scapulis & cervici impositionem, Lenem evacuationem. Repulsionem per repellentia potestate frigidâ hyeme, actu æstate, si æger juvenis, nisi catarrhus adsit, & per frictions, institutam. II. *Sanguinis qui influxit educatione sensibili*, per nares millefolio attritas, per venæ in frontem excurrentis, si posterior pars afficitur, sectionem. *Discussione. Diata* conveniente.

II. *Biliofa cerebri intemperies à bile exsuperante procedit. Cognoscitur*, ex dolore dextræ inprimis partis acri & pungente, calore fervido, actionum cerebri depravatione, aurium excrementis flavioribus & multis, oris amaritudine. *Oritur* à causis bilêm generantibus. *Dividitur* in illam, quæ est per

essentiam, in qua Curatio administratur I. *Vena sectione* dexteri brachii, post levem clysterem, nullâ præmissâ præparatione, si febris abest. II. *Præparatione* si opus, per refrigerantia & humectantia cephalica, eò fortiora, quo bilis validior. III. *Purgatione* per aloëtica & alia cerebro specialia. IV. *Reliquiarum absorptione*: ubi Camphora propter vigilias vitetur. V. *Digestione*, per digerentia medicamenta. VI. *Diata* opposita. Et illam, quæ per consensum; in qua procedendum, ut in superioribus expositum est.

III. *Pituitosa cerebri intemperies Cognoscitur* ex signis in intemperie cerebri frigida allatis. Somnus est profundus vel multus, nisi solutâ pituitâ Catarrhus excitetur & tussis. Dolor magis in occipite, à tertia hora noctis ad nonam affligens. Faciei pallor, nisi diurnitate à sanguinis parte eò delata, rubedine suffundatur. *Oritur* à causis pituitam generantibus, cerebro præsertim frigido, epate calido & humido, qui sanguinem vaporosum eò mittit. *Curatio* non est facilis, hyberno præsertim tempore, & facile morbus ipse in apoplexiam & paralyfin abit. *Perficitur* I. *Alteratione* post primarum viarum evacuationem, per Cephalica calida & sicca, primò benigniora, mox fortiora, illaque sæpius repetita. ubi decocto *China*, *Guajaci*, *Sassafras* agi potest. II. *Purgatione* alterationi interposita; ubi pillulæ *Asajereth*, *aurea*, & *Cochia*, vel illarum *Extractum*, locum habent. III. *Evacuatione* particulari per Erhina, masticatoria, gargarifinos, collutiones oris, &c. IV. *Topicorum applicatione*, inter quæ fomenta, embrochæ, sacculi, quibus insensibiliter materia evacuat, locum habent. V. *Cauterii* ad suturam coronalem, vel setacei in cervice, si morbus cedere non vult, *appositione*. VI. *Corroboratione* per appropriata cephalica. VII. *Diata* causæ & morbo opposita. *Dividitur*

videtur in eam, quæ est à Pituita crassa, ubi præparationes locum habent; nec venæ sectio benè adhibetur: & eam, quæ à pituità tenui & fluida oritur, quæ Catarrhum excitat, & in qua ptarmica & Errhina fortiora vitanda sunt.

IV. *Serosa* cerebri intemperies. *Cognoscitur* ex illis signis, quæ superius expressa sunt. Derivatur ad caput, seu sensum cum ipso sanguine arterioso præsertim & spiritibus; seu confertim, ob causas externas validiores, potum vini nimium, iram, exercitationes, &c. *Curatur* 1. *Humoris serosi à cerebro evacuatione*, nullis præparantibus præmissis. Ea peragitur 1. *Purgatione* humoris per hydragoga. 2. *Vena sectione*, si febricula & fervor adest, quæ serum in caput movet, & si evacuatio consueta suppressa est. 3. *Sudoriferorum* non calidorum, ut *Antimonii Diaphoretici*, bezoardici *Lunaris fumaria*, &c. exhibitione. 4. *Diureticorum*, quæ lieni quoque profunt, *propinatione*. II. *Intemperiei correctione*, per pulverem ossium humanorum, lotiones exsiccentes, &c. III. *Diatâ*, de qua vide Practicos.

V. *Melancholica* cerebri intemperies, *Cognoscitur* ex deliriis cum timore & mœstitia, dolore sinistræ præcipuè partis, somniis & visis turbulentis, repentina interdum motus amissione. *Oritur* à causis melancholiam procreantibus. *Curatio* est facilis ab initio. *Peragitur* 1. *Humoris melancholici purgatis* primis vis, repetita *preparatione*, per calefacientia & humectantia, inter quæ Syrupus de pomis præstat. II. *Eiusdem*, per potiones purgantes primò lenes, post fortiores, (*lapis lazuli* laudatur) additis humectantibus evacuatione; quam evacuatio per Errhina & alia insequi debet. III. *Cerebri per Confect. Alkermes* & alias roboratione. IV. *Diatâ*, in qua acetum, quod melancholiam fermentat, vitandum. *Dividitur* in illam, quæ est *per essentiam*, in qua

qua & cephalicæ sinistri brachii sectio copiosa, si niger sit sanguis, paucissima, si purus, habet locum: & illam quæ vel à *mensum* vel *hamorrhoidum* suppressione oritur; in qua revulsio, & venæ in talo sectio, locum habet.

VI. *Atrabilis* cerebri intemperies, *Cognoscitur* ex vigiliis & delirio, &c. *Oritur* à causis melancholicum succum suppeditantibus, eundemque exurentibus viscerum fervor hic plurimum potest. *Curatio* est difficilis, quia nimium à cerebri temperie recedit. *Perficitur*, 1. *Repetita* per refrigerantia & humectantia, evacuatione primarum viarum præmissa, *preparatione*. Compositum *Cachunde*, de qua in Melancholia, hic locum habet. II. *Repetita* atræ bilis per medicamenta melanagoga humidis permixta, item particulariter cerebrum purgantia, *Evacuazione*. III. Per *Topica* & balnea aquæ dulcis *digestione*. Si non cedit, serum lactis cum Antimelancholicis humectantibus propinetur. *Dividitur*, I. In illam quæ est *per Essentiam*: ubi cephalicæ vel basilicæ communis, sectio locum habet. Et illam, quæ à *mensum* vel *hamorrhoidum* suppressione; de qua superius. II. In illam, quæ est à *Sanguine* adusto, in qua ægri ad risum sunt proclives. Venæ sectione curatur. quæ à *Bile flava*, in qua delirium ferinum & iracundiâ viget. & eam quæ ab *humore melancholico*, in qua mœstitia & taciturnitas, vel hac ruptâ, loquacitas dominatur, &c.

CAPUT III.

De Meatuum cerebri angustia.

Meatuum Cerebri angustia est, quando illi à causis suis vel obstruuntur, vel comprimuntur. Meatus isti sunt pori cerebri, quod fungosum est, ventriculi, venæ, arteriæ, nervi & crânii suturæ.

Signa

Signa ex actionum cerebri imminutione vel abolitione sumuntur. *Causæ* sunt, vel *Obstructio* ab humoribus pituitosis, sanguine extra vasa effuso, vaporibus, crassis: vel *Compressio*, vel à cranio propter vim illatam, vel sanguine vasa distendente, unde illa *φλεγμώδεις Διςήσεις* afficiuntur, vel in substantiam propter copiam, tenuitatem, vel acedinem illapsopituitosum humore basin Cerebri occludente. Tumore duro.

Curatio secundum differentias variatur.

Differentia desumuntur à causis.

I. Alia est à *Causis externis*, nempe, Aut fumis carbonum, cerevisiæ, musti, &c. suffocantibus. Tum ægri libero aëri exponendi. Vapores aqua vitæ cum theriaca discutiendi. vomitio vel sternuatio excitanda. Aut *Cranii compressione*, ab ictu. Tum præsentis & æger consulendi. Cerebrum ut de fractura dicetur, elevandum. Aut *suturarum seu defectu*, qui corrigi non potest; seu ab humoribus & vaporibus *obstructione*, qui fomentis discutiendi.

II. Alia ab *internis*, nempe I. *Sanguine* aut extra vasa sua effuso, & anfractus ejus obstruente, aut vasa ita distendente, ut meatus comprimantur. Tum plethora plerumque adest, sanguis per os & nares interdum erumpit. nisi hoc fiat, putredine sua inflammationem &c. accersit. Per venæ sectionem & cucurbitulas evacuandum & revellendum. secta vel frontis vel linguæ venâ derivandum. II. *Pituita crassa* vel basin cerebri comprimente, vel exortum nervorum obstruente, & sic Spiritus animales intercludente. Tum Causæ pituitam generantes, capitis gravitas, oculorum obtenebratio, pituitæ per nares vel fauces suppressa evacuatio, præcessere. Nisi tempestivè evacuetur, paralytin &c. infert. *Curatio*, prout in intemperie pituitosa dictum, institi-tuenda. III. *Vaporibus*, qui vel à victu plenior

vel

vel vaporoso procedunt, à quo abstinendum: vel ab humoribus in inferioribus hærentibus, qui evacuan-di: *vel* in principio febrium, ubi earundem ratio habenda, revellendum, deprimendum. IV. *Tumore*, qui vix vivente homine cognoscitur, nec est curabilis.

CAPUT IV.

De commotione Cerebri.

Commotio cerebri est ejusdem de loco naturali propter externas & violentas causas dimotio.

Subiectum est cerebrum, præsertim secundum superiores partes. *Signa* sunt, ægrorum consternatio, ut quasi muti & apertis duntaxat oculis immoti evadant.

Causa est ictus vel casus validior, bombardarum vel fulgurum fragor, quæ vel spiritus tantum conturbant, vel etiam cranii fracturam causantur.

Curatio absolvitur, I. *Sanguinis & revulsione*, per venæ sectionem, ne affluat. & *repulsione*, vitatis sic-cis & adstringentibus, ne pori obstruantur, & transpiratio intercipiatur. II. *Sanguinis*, si quis effusus, *evacuatione*, per sectionem venæ, tum puppis, quæ supra lambdoidem est; tum illius, quæ sub lingua. III. *Discussionem*, primò cum repulsione conjuncta, post sola per calefacientia & humectantia.

Dividitur in Leviolem, & Graviorem.

Levior est, in qua duntaxat virtutis animalis in cerebrum retrahitur, & nulla sit vasorum ruptio. Tum sopor duntaxat incidit, nec tamen ita profundus.

Gravior, in qua etiam cerebri partes à naturali situ dimoventur, meatus concutiuntur, & vasa rum-puntur. Tum à *quævis* accidit. sanguis per os & nares effunditur. Vomitus ventriculo consentiente infertur.

A a

stant.

stant. Materiâ putrescente, oritur febris, delirium, cerebri Sphacelus, &c. & detrusâ ad nervos materiâ, alia Symptomata.

CAPUT V.

De Inflammatione Cerebri.

Inflammatiō Cerebri est ejusdem tumor, à sanguine è vasis in spatia partis effuso & putrescente exortus.

Signa sunt, febris acuta & continua, quæ de tertio in tertium exacerbatur. Delirium perpetuum, quod sensum & paulatim inchoatur. faciei & oculorum rubor & squalor, membranâ calore adurente exsiccatis, lacrymæ acres, excrementis quasi spontè defluentibus ob partis imbecillitatem, pulsus frequens & velox, &c.

Causa est sanguis è vasis elapsus, & ibidem intercepta transpiratione, putrescens. Effunditur, vel propter copiam suam: vel propter tenuitatem & incredinam, adjuvantibus illis quæ aut sanguinem ad caput deferunt, aut eundem violenter commovent, ut sunt, aëris fervor, dolor, percussio, vulnus, ira, &c.

Curationis spes ferè Nulla, si convulsio supervenit. si urina alba & pullucida est, quia bilis ad caput rapitur. si præsentè jam delirio, stridor dentium, ob muscutorum in temporibus & maxillis convulsionem advenit: si ad suppurationem tendit, quia pus intra cranium & membranâ evacuari non potest. *Aliqua*, si die critico copiosus sanguis ex naribus fluit. si sudor multus & calidus à capite. si per alvum magna bilis copia post morbi vigorem evacuat. *Parva*, si plures functiones læduntur. si lingua contremiscit. si rigor, albis per alvum excretis infestat. si nigra stilla, eaque sincera, ex naribus accidit, quia ab exustione valida est. si festucas colligunt.

colligunt. *Perscitur* 1. *Humoris*, qui influit 1. *Revulsione*, seu per sectionem Cephalicæ, aut si magna adsit copia, medianæ primum, sed non ad animi deliquium: seu per cucurbitulas cum scarificatione profunda, ad partes inferiores & superiores; seu per alia revulsionum genera. 2. *Repulsione*, nisi materia ad capitis cutem vergat, per repellentia; vel repida, aceto levi temperata, capiti rasô apposita, si calor vel internus vel externus non adest; vel frigida, si hoc est. 3. *Interceptione* per fascias collo circumjectas. 4. *Leni purgatione*. II. *Humoris* qui influit *Evacuatione*, per apertionem venarum capitis, narium, sub lingua, & applicationem hirudinum, cucurbitulæ ad synciput. Discussionem per medicamenta ex discutientibus confecta, Unguentum Alabastrinum, &c. III. *Dista*, in qua jejunium vitetur, &c.

Dividitur trifariam.

I. *Alia febrim antecedit*, in qua febre absente purgare licet; majore præsertim Cacochymia præsentè. Cucurbitulæ summo vertici sunt apponendæ, scarificatione subsequente. *Alia febrim sequitur*, in qua etiam lenioribus purgari potest, si materia turgat.

II. *Alia magis à sanguine quàm bile*, in qua plus sanguinis mittendum. *Alia à bile magis quàm sanguine*, in qua potius purgandum est.

III. *Alia est Membranarum cerebri*, cui signa superius apposita conveniunt. *Alia Cerebri*, in qua primò dolor caput occupat, & per occiput ad colulum, & universam nucham penetrat. ægri non delirant, sed sensus externos & internos amittunt. parum aut nihil loquuntur, &c.

CAPUT VI.

De Hydrocephalo.

Hydrocephalus est tumor capitis, à serosi humoris, in aliqua membrorum caput constituentium parte, collectione exortus.

Signis opus non est. Nam ipso visu malum cognoscitur. Corripit magis infantes, quam adultos.

Causa est humor aqueus, serosus, interdum faculentus, imò & cruentus.

Curatio est dubia, tum quia pars nobilis: tum quia subjecta tenera: tum quia apoplexia vel lethargus facile ingruere possunt. Perficitur 1. Aqua educatione per hydragoga, sudores, urinam, insensibiliter discutientia & exsiccantia, sectionem. II. Cerebri ad suam temperiem per calida cephalica reductione.

Differentia ab humoris situ sumitur. Nam *Alius* est ab aqua, inter cutem & pericranium hærente. Tum humor est mollis, ad candelam pellucidus, doloris expers. facilius medicamenti cedit, & sectione unica tolli potest. *Alius* ab eadem inter pericranium & cranium consistente. Tum dolor affligit, sectio bina est adhibenda. *Alius* ab eadem inter cranium & membranas collecta. Tum tumor non est ita mollis, dolor major, frons extra ferè projecta est. Malum etiam ferè incurabile.

CAPUT VII.

De Contusione Capitis.

Contusio capitis est ejusdem, extrinseco plerumque integro apparente, à re gravi, dura & obruta, colliso.

Signa quæ præcessere, dabunt. Sanguis ex venis effundi-

effunditur, & tumor mollis, lividus, absque magno dolore excitatur.

Causa est in definitione expressa. Cute plerumque integra, exiguae venæ sub cute aperiuntur.

Curatio ita instituenda, ut 1. *Humorum affluxus prohibeatur*. idque per venæ sectionem, si contusio major est. per repellentium & adstringentium admotionem, quæ sæpius ne incalescant removenda. Capillis abrasis, ol. rosac. locus inungendus. per doloris mitigationem. II. *Sanguis, qui sub cutem effusus est, evacuetur*, insensibiliter applicato Emplastro de betonica, Ceroto Vigonis, de Minio, de matris ilva, de gratia Dei. III. *Suppuratio*, si impediri non potest, juvetur Triapharmaco, quod componitur ex olei dulcis parte una, aquæ communis partibus duabus, farinæ tritice. q. s. quibus ovi vitellum addatur. IV. *Materia in pus conversa, sectione in loco decliviore facta, extrahenda.*

Dividitur tripliciter.

I. Alia est cum cutis vulnere, de qua sequenti capite agetur. Alia sine eo, de qua hoc loco dictum est.

II. Alia, in qua muscoli temporales contunduntur. Tum Delirium, paralysis, convulsio & mors inde sequitur. sectio in loco propinquo instituenda est, ut muscoli caput moventes vitentur. Alia, in qua contusi non sunt.

III. Alia est Adulorum, de qua præcedentia accipi debent. Alia Puerorum, in qua 1. Abraso vel forcipe detonso capite, linteam ovi albumine, aceto, & rosaceo madidum, imponendum, & deligatione factâ, integro die naturali, linteam extrinsecum iisdem madefaciendum. 2. Sequenti die Cataplasma benedictum apponendum, & usque ad diem nonum continuandum. 3. Post undecimum, Emplastrum diapalma Galeni, quod tercio quoque die immutandum. 4. Post vigesimum Emplastrum barbarum.

5. Si ex partu fit, *Diaphenycinum* ex rosaceo confectum discutit.

CAPUT VIII.

De Vulneribus Capitis.

ARTICULUS I.

De Vulnere cutis & pericranii.

Vulnera capitis in triplici sunt differentia. Vel enim *solum cutem*, & pericranium, *cranio intacto*, attingunt. Vel *cranium intactis membranis*, vel etiam *membranas*.

Vulnus cutis illaeso cranio est, quando scilicet solum cutis, panniculus carnosus, muscoli, vel etiam pericranium vulneratur.

Signa quod attinet, vulnus vel obtutu patet, vel specillo indagari potest.

Causa quia evidens est, non est quod de ea multa dicamus.

Curatio pro ratione Differentiarum variat.

Dividitur in Vulnus cum contusione, & sine contusione.

In *Vulnere cum contusione*. 1. Humectandum & emolliendum ita, ut partis calor naturalis à contusione, aëre externo, medicamentis debilitatus simul foveatur. 2. In principio *oleo rosarum maturo* cum vitello ovi in mollioribus corporibus, in durioribus resina laricea agendum. 3. *Terebinthina* omnibus vulneribus partium nervolarum praesertim, commoda est. 4. Circa diem septimum pus semelius ostendit. 5. Si fiat à morsu feræ, labia vulneris scarificanda, sanies sanguisugis extrahenda. Ulcus medicamentis abluendum.

In *Vulnere sine contusione*. 1. Interna causa seu *dispositio* partis calida & dolorifica removenda, per

per inunctionem Unguenti *de Alabaastro*, Rosæ. 2. Si sola deligatione hiantia vulneris labia conjungi non possunt, futura cruenta vel sicca ad contactum adducenda; Vulneri verò medicamentum aliquod digestivum imponendum. Nec tamen id facile faciendum, idque propter pericranium, quod intime cranio adheret, & per futuras membranis internis connectitur. 3. Cranio denudato & raso, quod fit ut materia idonea carni generandæ suppeditetur, nec tamen facile faciendum, non unguenta imponenda, sed medicamenta actu & potentia sicca, cum linimentis siccis, & temperamento ossis simillimis applicanda. Plura vide apud Practicos.

ARTICULUS II.

De Vulnere Cranii seu fractura.

Vulnus seu fractura cranii, est continua in cranio solutio à vi exteriori facta, membranas cerebri non attingens.

Signa sumuntur, tum ex Symptomatum insequentium Syndrome, ut bilis vomitu, sanguinis per nares & aures fluxu, casu, stridore fracti ossis &c: tum ex conditione ictus, ubi percutiens, capitis ictum recipientis conditio, Instrumenti dispositio spectanda sunt. tum Ex specillo, nec nimis acuto, nec nimis crasso, atramento, rasione, &c.

Causæ sunt evidentes, continuum in cranio solventes.

Curatio est Nulla, si post septimum febris obvenit, quia putredinis in cerebro est indicium. si vulnus aridum, siccum, purulentum, nigrum evadit. *Dubia*, si ægri vires statim deficiunt, ipse senex, quia calor illius debilior, & sanguis serosus. si caput distillationibus & Erysipelatibus obnoxium. si Symptomata, quæ statim obvenere quarto vel septimo

die, permanent & augmentur. *Operosa*, si obvenit æstate, propter inflammationis imminuentis metum. si humidâ regione, quod ab humidis facile offendatur cerebrum. si plenilunio propter humorum abundantiam. si cerebro vulnus vicinum. si in syncipite & bregmate, quia cerebrum hic vicinius magis arcuatur, sanici commodus effluxus non datur. si in temporibus, quia muscoli temporales arteriis, venis, & nervis abundant. & maxillæ inferioris motus læditur. si in suturis, tum quia cranium ibi imbecille, tum quia dura mater fibris ibi annectitur. si accidit cum confusione, quia ista multa illaque occulta mala infert. De illius institutione hæc observanda. 1. Quia in corporibus plethoricis, quæ levia etiam sunt vulnera, ob humiditatem Symptomata attrahunt, evacuandum; ita ut mitioribus fortiora addantur, & illa, quæ bilem & serum purgant; *evacuentur*: Venæ sectio etiam instituitur, & Clysteres applicentur. 2. Bilem & serofos humores alterantia, morumque calidorum humorum ad caput impediencia summè profunt. 3. Si cutis sit vulnerata, & non satis pateat, latius aperienda, donec fissura tota in conspectum veniat. Tum verò pericranii sectio tentanda, cum suspicio est læsi cranii. Commodissima est illa, quæ transversis lineis figurâ cruris fit. 4. Musculi temporales propter nervositatem vitandi; futuræ propter fibrarum transitum. 5. In Vulnere frontis cavendum, ne sectio fiat per transversum. Nam si musculus qui palpebram attollit, ita secetur, palpebra decidit. Sectio itaque à parte inferiore sursum versus facienda, &c.

Differentia fracturæ cerebri sunt quinque.

I. *Fissura*, à gravi & contundente telo in osse duriore, eaque conspicua, inconspicua, capillaris, brevis, longa, recta, curva, laminæ externæ, internæ, utriusque, &c.

II. *Con-*

II. *Contusio* seu collisio, cuius duæ species. *Vna*, cum cranium solum in seipsum cedit ac subsidet. *Alteræ*, cum cranium solum deprimatur, & foveam in osse molli acquirit.

III. *Depressio*, cum os finditur, & retrocedit.

IV. *Sedes*, cum à telo acuto cranium læditur, ita ut aciei teli impressi vestigium conspicuum sit. Huc pertinet *Dedolatio*.

V. *Contra fissura*, seu *εμφραχία*, quæ tres habet modos. 1. *Cum* locus fissus & percussus, sunt in uno eodemque osse. 2. *Cum* ejusdem ossis percussâ tabula externa, eaque integra manente, interior dehiscit. 3. *Cum* os percussum ab osse fissio futura determinatum est. De quibus vide Practicos, inprimis *Jacobi Berengarii Carpentis* aureum de *fractura cranii* libellum, Lugduni nuper editum.

ARTICULUS III.

De Cranii fractura cum meningum læsione.

Cranii fractura cum meningum læsione est duplex. Nam,

Vel *Dura meninx* saltem simul læditur: Tum sanguis copiosè effluit, cum plurima vasa per eam diffeminantur, & dolor in parte membranosâ valde urgeat. In *Curatione*, non neglectis quæ vulnus cranii spectant, sanguis est sistendus. Dolor oleo rosarum tepido leniendus. si purulenta evadere incipit, melle rosato detergenda. si huic non cedit ad fortiora, ut Unguentum *Ægyptiacum* accedendum, &c.

Vel *Pia mater*, seu tenuis membrana, simul afficitur. Tum sanguinis profluvium & inflammatio metuenda est. Curationem vide apud *Aquapendentem* chirurg. l. 2. c. 20.

Aa 5

TITU

TITULUS II.

De Symptomatibus Cerebri.

CAPUT I.

De Symptomatibus sensuum externorum.

Symptomata Cerebri infestant *vel* sensum tactus, *vel* sensum communem, *vel* Imaginationem, *vel* Imaginationem & Ratiocinationem simul, *vel* plures sensus internos, *vel* motum animale, *vel* sensus internos, externos, motum & Ratiocinationem, seu plures animalis facultatis actiones simul, *vel* excretionem & Retentionem. Ad primum pertinet *Dolor Capitis*.

ARTICULUS UNIDUS.

De Cephalagia seu Doloze Capitis.

Cephalagia est tactus in partibus capitis membranosis à solutione continui facta, molestia & corruptio.

Subjectum est caput secundum partes membranas, cute, pericranio, nervis membranarum vestitis, ipsa substantia cerebri non exclusis.

Signis opus non est: ex relatione patientis cognoscitur.

Causa est, quicquid quoquo modo violentam unitatis solutionem infert, sive id faciat occultè, sive manifestè: sive sit *externum* quid, ut erium, lactis porus, glandes palmarum & quercuum, semen viticis, olivæ nigræ, odor rei gravis, &c. sive *internum*, de quo differentiæ consulantur.

Curatio est *Bona spei*, si quarto die bona signa apparent. si pus, vel aqua per nares, aures, vel oculos effluit.

effluit. *Ambigua*, si febris acuta adest, & urina alba, quia bilis sursum fertur, & inflammatio metuenda est. si æruginosa vomuntur, & cum surditate vigiletur, quia ob collectam bilem vehementer & citò infaniunt. si Catoche, cum intercepta alvo, ferociente intuitu, facieque impensè rubente detinentur, quia opisthotono corripuntur. si simul sonitus aurium sine febre, vertigo, vocis surditas, & manuum torpor accedit, quia apoplectici vel Epileptici evadunt. *Nullius* ferè. si vehemens cum fuerit, subito delitescat, non sequente alleviatione per crisin. si extrema frigescent, quia calore retracto phlegmone excitari potest. si cum febre acuta sit, & quarto die signum aliquod perniciosum apparuerit. si sanus eo repente corripatur, statim obmutescat & stertat, nec febris valida corripatur. *Peragitur* I. *Doloris mitigatione*, vel per Anodyna, ex *canceris fluxionalibus* cum aceto rosaceo contusis, aqua *Verbena*, radice ipsius contusa & imposita, unguento alabastrino, quæ futuris & temporibus applicari debent: vel per *Narcotica*, quæ fronti duntaxat apponi possunt. II. *Causarum remotione*, & *partis roboratione*: de quibus in Differentiis videbitur.

Differentiæ Cephalagiæ sunt variæ.

I. Alia est *Symptomatica*, de qua hic agimus. Alia *Critica*, quæ non ab initio, sed circa tempus criseos affligere incipit. Tum spiratio repente fit difficilior, retractis hypochondriis. Venæ tument, & arteriæ in temporibus pulsant: genæ rubescunt. spontaneæ lachrymæ fluunt: ager manibus nares scalpit, & hæmorrhagia plerumque insequitur.

II. Alia est *Externa*, quæ pericranium obsidet, in superficie percipitur, ad radices palpebrarum pertingit, capillorum manusque pressu exacerbarur. Alia *Interna*, quæ ad tactum misceat, præsertim si sit sine distentione; & ad radices usque oculorum pertingit.

III. Alia

III. Alia est à *Causis Externis*, nempe 1. *Ebriitate*, quam cerevisia, cui chamæpeuce incocta est, facile causari potest. Tum vomitu, materia in ventriculo fluctuans ejienda. Folia vel brassica in aqua calida madefacta, vel Rute cum aceto rosaceo contrita, applicanda. Spiritu vini caput irrorandum, pedes sale & aceto fricandi. 2. *Contusione*, percussione, vulnere, ubi curatio ex suis locis petenda est. 3. *Calore solis*, balnei, ventorum australium. Tum caput refrigerantibus agendum. 4. *Aliorum usu*, ut sunt dactyli, avellanae, castaneae, nuces juglandes, tubera, semen cannabis, coriandri non præparati, Thus, styrax, myrrha nimium sumta, &c.

Alia ab *Internis* nempe, 1. *Intemperie* absque materia, quæ si *Calida*, dolor est vehemens, & caput calet. si *Frigida*, dolor est diuturnior, caput friget. conveniunt Rotulae ex Diamoscho dulci, & sacculus ex calefacientibus Cephalicis. si *Sicca*, dolor est moderatus, lentus. præcessere causæ exsiccentes. 2. *Intemperie cum materia*, quæ vel est *A sanguine*; Tum dolor mitior est, synciput potissimum occupat, & ante cibum increbescit. *Curatio* ex suis locis petatur. vel *A Bile*; Tum dolor est pungens, erodens, dexteram Syncipitis partem plerumque occupat. In *Curatione* profunt Epithemata ex *laudano Opiato* cum aqua rosarum, Vesicatoria ad collum locata, Aquæ rosarum cum Camphora olfactio, Capitis ex *Agarici decocto* cum floribus chamæmeli lotio, Auricularum scarificatio, &c. Vel à *Pituita*; Tum dolor in dextra potius occipitis parte affligit. Valent, *Oxymel squillit.* aqua flor. sambui, epuleg. rosmar. cum crystallis nitri. Nucis perscorum, cum aqua verbenæ confusi. Oleum Nucis moschar. expressum, Balsamus Apoplecticus, succini, sacculus Hartmanni. Vel à *Melancholia*;

Tum

Tum vigiliae urgent. dolor est in sinistra occipitis parte. Curatio ex suo loco petatur. 3. *A Flatu*. Tum dolor est vagabundus, tensivus, statis sæpe diei horis recurrens. *Discutitur*, si tempora & futura coronalis, cum allio confuso & aceto vini aut urina infantis commixto, inungantur & confricentur.

III. Alia per *essentiam* seu primaria, quæ interdum etiam à *vermibus* cum rosione quadam & pruritu narium oritur, & quæ omnes superiores differentias sub se complectitur. Alia per *consensum* cordis, ut in febribus, hypochondriorum, Ventriculi, uteri, &c. & hæc ut plurimum est *Hemicrania*. Vide Tit. 1. hujus libri cap. 2.

IV Alia est *Cephalalgia speciatim dicta*, quæ nihil aliud est quam dolor recens, levis, & sine magnâ imbecillitate facillimèque solubilis, ab externis plerumque causis obortus, sæpissimè cum febre.

V. Alia *Cephalæa*, seu dolor contumax diuturnus, paroxysmis maximis, sed levibus de causis suscitatis, totum cerebrum, caput, vel certè maximam ejus partem, potissimum membranas infestans. Alia *Hemicrania* dimidiæ partis capitis, quæ à partibus subditis exoritur. In ea quæ est à *ventriculo*, profunt ad evacuationem *pillula Fernellii*, ex aloës opt. unc. f. pulv. elect. de gemmis, diatrionfantal. rosar. rubrarum ana gr. vj. Cum Syrupo de absinth. & violar. num. xxx. formatae, & x. hora ante cœnam deglutitæ. Capiti apponi potest Epithema ex *radic. cucumer. agrest.* viridi cum verbenâ & absinthio Pontico, in hydrelæo decocta.

CA-

CAPUT II.

De Symptomatibus sensus communis.

ARTICULUS I.

De Vigilis nimiis.

Symptomata sensum communem infestantia sunt, *Vigilia, & Coma somnolentum.*

Vigilia præter naturam sunt sensus communis & externorum præter modum exercitium, propter continuum spirituum in organa influxum, exortum.

Signus opus non est. Relatio ægri sufficit.

Causa in definitione expressa est. Spiritus autem influunt, quia sopiri non possunt, seu propter externa, objecta nempe, lucem nimiam, curas, cogitationes; seu interna, intemperiem cerebri calidam, dolorem, &c. Curatio est difficilis. si inciderint in juvenes & minus assuetos. si delirium, vel convulsionem vel rissum inferant. si diu durent. si à causis internis oriantur. Consistit I. In Causarum vigilias inferentium remotione. II. In somni seu per cephalica refrigerantia extra applicata vel intus data, seu per Narcotica conciliatione. Excellunt, pinguedo lucii piscis temporibus illita, Vinum Hypnoticum Mynsichti, Soporiferum Saxonis, Liqueur ex vermiculis spongiarum cynosbati, postquam maturuerint expressus, Opium croco, magisterio corallorum & Spiritu vitrioli correctum. pulmentum ex semine papaver. cum ol. Hyoscyami, & lacte muliebri, pulvisbus applicatum. Pediluvium Hartmanni, &c.

Differentia à Causis sumitur.

Aliæ sunt à Causis externis, nempe I. Affectibus animi, timore, mœrore, curis, consuetudine. Tum ista removenda, & quia intemperiem capitis causari solent,

solent, humorum proventui occurrendum. 2. Objectis sensuum externorum, quæ rejicienda. Laudatur inunctio narium per Oleum nenupharinum, & eius lactuca.

Aliæ sunt ab Internis, nempe I. *Intemperie calida & sicca*, seu cum febre, seu sine febre, quæ spiritus agitat, & vapores dissipat. Curari ex suo loco debet. 2. *Vaporibus calidis*, acribus, falsis, qui membranas cerebri vellicando spiritus turbant. Hi, vel ab apostemate capitis aliquo elevantur, vel ex toto, vel ex partibus; vel sine febre, vel cum febre. Signa & Curatio ex suis capitibus peti debent. quæ vapores demulcent, post coenam exhibenda sunt. 3. *Vaporum spiritus sopientium defectu* seu quod non generentur, ut in inedia, cruditate. Tum in curatione ratio diætæ habenda est: seu quod dissipentur, ut in intemperie calida. Tum ejusdem ratio est habenda. 4. *Dolore*, in quo cum sensus communis simul afficiatur, eo commoto, omnes reliqui commoventur. Curatio ad ipsius mitigationem convertenda. Huo pertinet *Tussis, Alvi fluxus*, &c. quæ somnum homini eripiunt.

ARTICULUS II.

De Comate somnolento, seu Cataphora.

Coma somnolentum est sopor gravis, quod sensus communis torpens, nec spiritus animales ad sensus diffundi sinat, nec ab iis accepta objecta agnoscat & judicet, exortus.

Signa ex eo sumuntur, quod æger demissa ferè inferiore maxilla & hiant ore dormit, excitatus oculos aperit, respondet, sed mox iterum, in somnum delabitur. Sic à caro, apoplexia & uteri suffocatione distinguitur.

Causa

Causa est, quicquid spirituum animalium ad sensus organa influxum prohibet, eosque ad actiones animales ineptiores reddit.

Curatio est *dubia*, si virium imbecillitatem magnam, seu ex morbo aliquo acutissimo, seu ex gravi cerebri affectione sequitur. si in continuis febribus accidit. si à causa maligna proficiscitur. *Nulla ferè*, si à morbis calidis & siccis oriatur: quia ita insignem in cerebro refrigerationem esse necesse est. si malum ita ingravescat, ut sensus, motus, & respiratio ipsa tollatur. In quibus consistat, in Differentiis videndum est.

Dividitur pro ratione causarum.

I. Aliud est ab *Humiditate* vel *Frigiditate cerebri*. Tum materia in capite evacuanda & discutienda. In illa, irrigatione capitis *acerrimo aceto* cum rosif & *floribus chamemeli* permixto. in hac, cum oleo anethino calidè inuncto. In utraque Apophlegmatismis, Errhinis, sternutatoriis agendum. Aliud à *Vaporibus narcoticis*, Spiritibus animalibus torporem inducentibus, qui *vel* sunt à nimio potu. Tum, eo adhuc in ventriculo hærente, vomitus excitandus. *Vel* cum febribus plerumque conjunguntur. Tum 1. Vapores seu per venæ in cruribus sectionem, seu per clysteres, frictions, cucurbitulas, &c. revellendi. 2. Tidem per Oxyrrhodina actu calida, futuræ coronali applicata, quibus liberalius acetum admisceatur, repellenda; vel quod melius, ruta, castoreo, aceto, &c. discutienda. 3. Ne ea quæ somno depellendo exhibentur, febrem augeant, cavendum. *Vel* sine ipsis affligunt. Tum à ventriculo, utero, vel aliqua parte inferiore elewantur. Iisdem, quibus antecedentes, remediis tolluntur. Narcoticorum vim infringunt, *Ruta* cum *aceto*, balsamum *ruta*, *Castoreum*, *nigella*, suffitus *sulphuris*, &c. Dietam, vide apud Practicos,

CAPUT III.

De Symptomatibus Imaginationis.

ARTICULUS UNICUS.

De Vertigine.

Symptoma imaginationis, quod & sensum communem interdum lædit, est *Vertigo*, quæ nihil aliud est *quàm falsa conversionis & circumgyrationis imaginatio*, ab inordinato, & circulari spiritus animalis in cerebri parte anteriore, motu exorta.

Subiectum est cerebrum secundum anteriorem partem, quatenus est pars organica, spiritus animales continet, & quibusdam meatibus, in quibus illi moventur, præditum est.

Signis opus non est. Aliis omnia in gyrum circumagi videntur; aliis & visus obscuratur, nonnullis sibilus in auribus percipitur, &c.

Causa est, quicquid vel vapores ex se suppeditat, ut *radicula*, *allium*, *sinapi*, *vinum*, &c. vel humores fundere & agitare solet, quo & purgatio spectat.

Curatio est *dubie spei*, si senibus accidit: quia cerebrum debile habent. si diu durat, quia Epilepsia vel apoplexia est prænuncia. si in ea caput vel corpus circumagi videtur. *Peragitur* I. *Discussione*, Tum foramina narium oleo *majorana*, *nucis moschate* inunguntur; vel iisdem aqua rosarum cum acetato admoveatur. Tempora & carpi manuum, aqua aceto rosaceo cum gutta *ol. cinnamomi* mixta, inunguntur. vel succo betæ nigrae illinantur. Palatum theriaca inungatur. II. *Vena-sectione*, si nimis est fortis. III. *Revulsione*, si ab inferioribus partibus procedit. IV. *Diaeta*, in qua cibi vaporosi, cerevisia multo lupulo condita, & alia vitanda. Ad præ-

servationem *semen carni* in vino maceratum, siccatum, & quotidie sub horam decubitus sumtum laudatur.

Differentia sumuntur à causis.

I. Alia est à *Causis evidentibus* spiritus agitantibus, ut sunt, diuturna totius corporis circumgyratio, adspæctus rerum circulariter motarum, prospectus ex loco altissimo in profundum. Sic enim spiritus ex adspæctu rei insuetæ & meticulosæ diffunduntur, & retrahuntur. *Cognoscitur* ex relatione ægri. *Curatur* quiete & somno. si planè non cessat, frictionibus. Si à *fame* est, Mica panis in succo *granatorum*, vel vinò austero intincta exhiberi debet.

II. Alia est à *meatuum cerebri angustia*, per quos quidem spiritus animales moventur, sed quia impediti sunt, retrocedunt. *Oritur* ea vel ab obstructione partiali, quam si vapores crassi inferunt, citò solvitur: si humores serosi & pituitosi, diu durat, fluctuationis sensus adest. In Curatione ratio causæ haberi debet. Vel ex cerebri compressione, & cranii fractura, quæ suis locis videantur. Vel ex arteriarum ab exortu & ingressu in calvariam universo per cerebrum ductu coalescentia, de qua vivente homine vix aliquid certi statui potest.

III. Alia est à *vapore spirituofo* in Cerebro genito, qui inordinatò motu in venas & arterias effusus, spiritus animales ita agitat, ut circulariter in se convertantur, & phantasie falsam hanc rerum speciem exhibeant. *Cognoscitur* ex vehementi capitis dolore & gravitate, aurium diuturno tinnitu, sensuum externorum quadam læsione. Malum est frequens, ex levi occasione corripit, & diu durat. *Oritur* à causis status generantibus, consuetâ præsertim evacuatione suppressâ. *Curatur* vel in paroxysmo, de quo superius: vel extra paroxysmum
1. *Materia* vapores suppeditantis *evacuazione*, tam uni-

universali, quam particulari. ab Errhinis quidam metuunt. 2. Eiusdem *Revulsione*, *Derivatione*, & *Discussione*, per vesicatoria, cauteria, frictiones, lotiones capitis. 3. *Cerebri roboratione*, per externa & interna. Ex *appropriatis* laudantur *stercus pavonis* drach. j. pondere in vino maceratum, colatum, & ebibitum. *Extrahit. Scorzoneræ*, Radices *Doronicæ* comestæ, *Auricula ursi*, pinguedo *damarum* & *colubrorum* temporibus illita, Pulvis *bombycum exsiccatum* vertici inspersus. Valent quoque spiritus *rorismarini*, oleum *succinî*, *Theriaca Hippocratis*, Pulvis ex *cinnabar. miner. vera unc. f. Margarit. præpar. corallor. rubr. præp. ana ser. ij. Croci ser. j. Folis auri n. x.* factus, & in aqua *Liliorum convall.* dosi ser. j. exhibitus. Electuarium *Saxonie. Dividitur* in eam, quæ est à *sanguine feruido*. Tum rubedo faciei, & pulsatio arteriarum adest. In *Curatione* habenda ratio venæ sectionis, basilicæ primò, si plethora adest. Cephalicæ statim, si in capite duntaxat abundat. non est educendum confertim, sed pluribus per intervalla detractionibus. Arteriotomia non facile tentanda. & in eam, quæ est ab humore pituitoso. Tum locus de intemperie pituitosa consulendus. Evacuatio præmissò clystere optimè per extract. *pillular. cochiar.* à scr. f. ad ii. expediri poterit. Lixivium & Balsamum vide apud *Agricol. p. i. p. 38.*

IV. Alia est à *vapore spirituofo*, ex aliis partibus elevato. *Cognoscitur*, quod nulla sensuum læsio præcessit, malum per vices affligit, partis affectæ signa adsunt. *Oritur*, Aut à *ventriculo* seu *picrocholo*, seu pituitoso, seu ob imbecillitatem cibos corrumpente. Tum *Curatio* ad ventriculum obvertenda. Locum hic habent *granum thuris* unum atque alterum post cibum sumtum, confectio *feniculi, coriandri*, saccharum *prunelle, rosarum*. Electuar. ex

conserva rosar. rubr. antiq. Diacydon. simpl. spirit. vitrioli, & Syrupo Menthae. Reliqua vide de morbis ventriculi. Aut *ab Epate, Liene, Vtero, toto*; ut in febribus fieri solet. Tum affectarum partium & Symptomatis ratio habeatur.

CAPUT IV.

De Symptomatibus imaginationis & ratiocinationis læsæ.

Symptomata imaginationem & ratiocinationem lædentes sunt, *Memoria læsio, Delirium, Phrenitis, Melancholia, Mania, & Rabies, seu Hydrophobia.*

ARTICULUS I.

De Memoriae læsione.

Memoria læsio est ejusdem à causis siccitatem cerebri cum moderato calore conjunctam ad memoriam necessariam lædentibus, & sic Spiritus animales vel nimis torpidos, vel nimis mobiles reddentibus, imminutio vel abolitio.

Signis opus non est. Actiones ægri Symptomata detegunt.

Causa cerebri temperiem ad memoriam necessariam lædentes, vel calorem nativum obtundunt, seu *externè*, ut Venenata, Narcotica, cervici vel collo applicata; seu *internè*, ut Intemperies frigida, humida, quæ aut ob ætatem pueros & senes afficit; aut ob cibum & potum frigidiorum & humidiorum, aërem crassiores, morbos, & alias (de quibus in intemperie frigida actum) causas, alios. Vel *eundem dissolvunt*, ut sunt *Externè*, philtrea, vigiliae, nimiae cogitationes, medicamenta calida. *Internè*, morbi calidi, cerebri abscessus, bilis abundantia, &c. Vel *eundem exaltant*, ut sunt Intemperies calida & sicca,

quæ

quæ inordinatum spirituum animalium motum caplatur. Vel *spirituum animalium motum impediunt*, ut sunt Conformatio capitis & cerebri minor. Crassities ejusdem, &c.

Curatio causas suas respicit, & ex supra dictis sumi potest. *Appropriata* memoriae seu conservandæ seu restaurandæ putantur. *Tinctura luna* in aqua Lillorum convall. sumta. *Pulvis Trithemii*, de quo in miraculis Mulleri, dictus, *Confectio Anacardina* dr. s. pondere caurè exhibita, nisi intemperies calida & sicca impediatur. Intemperiei frigida, humidæ resistunt, Aqua *Magnanimitatis* Cunradi. *Lilium convall.* *Melissa*, *Thus* scrup. s. pondere cum vino sumtum, nux moschata, &c. de quibus consulantur Practici.

ARTICULUS II.

De Delirio.

Delirium est phantasia & ratiocinationis depravatio, à phantasmatibus absurdis & inconvenientibus oblatione exorta.

Signa, incipientis, in taciturno garrulitas, & vice versa, in mite, ferocia, sermo obscenus, oculorum mobilitas, quod cum cerebro, arteriis, venis & nervis focientur, pulsus in hypochondriis cum perturbatione. *presentis*, sermones & actiones inconluetæ & inconcinnae.

Causa est phantasma absurdum, vitium spiritus animalis tam fixi quàm mobilis, qui purus, lucidus, temperatus & ordinatè mobilis esse debet, exortum. si enim ab istis requisitis deficiat, phantasmatibus, circa quæ ratio occupatur, vitium communicatur, & ea intellectui non ita ut debent, offeruntur.

Curatio pro ratione Differentiarum variat.

Dividitur delirium in *primarium* & *Sympatheticum*.

Bb 3

I. Pri-

I. *Primarium est*, quando cerebrum per se afficitur. & est vel *cum febre*, de quo sequenti capite: vel *sine febre*, continens sub se, tum *ἡδύπορον* & *λῆγον* ab imbecillitate facultatis principis, ob immoderatum sanguinis profluvium, vel diurnas vigilias exortum: tum Stultitiam, in qua facultates principes, non solum imminutæ, sed & depravatæ sunt.

II. *Sympatheticum*, quando causa ab aliis partibus communicatur. *Dispersitur* in illud, quod est *sine Febre*, quæ sub se complectitur *temulentiam*, seu à vino, cerevisia, Spiritibus inducta; seu à cannabi, lolio, hyoscyamo, coculis de Levanthe, corticibus mandragoræ, opio, &c. *Præservant* comæ absinthii & rutæ stomacho jejuno comestæ, brassica, buccella panis haustui supercomestæ. *Curant* Vomitus, Acidorum usus, &c. Et in illud, quod est *cum Febre*, quod vel in febribus acutis accidit. Tum febris præstō est. si in principio absque signis coctionis adveniat, phrenitidem inducit. somno demulcetur. si cum coctione & aliis signis accedat, decretorium est. *Curatur*, 1. *Revulsione* per venarum in pedibus apertionem, & alia. 2. *Fervoris sanguinei* in capite temperatione per Topica. 3. *Hypnoticorum* applicatione. 4. *Materia* quæ caput occupavit, tum *Evacuatione*, venâ vel frontis vel linguæ sectâ; tum *Discussione*, per applicationem columbar. dissectar. decocti chamæmel. ad caput, &c. Vel in *inflammatione* partium, Diaphragmatis inprimis. Tum respiratio est inæqualis. hypochondria sursum & intrò revelluntur. delirium cum rufsi & dolore lateris junctum est. *Curatio* ad partem affectam obverti debet.

ARTI-

ARTICULUS III.

De Phrenitide.

Phrenitis est delirium perpetuum & continuum, ab inflammatione membranarum cerebri exortum, cum febre continua affligens.

Signa sunt, delirium perpetuum, febris continua, vigiliæ perpetuæ, respiratio parva & frequens.

Causa est inflammatio membranarum cerebri: de qua hoc libro superius egimus.

Curatio ad morbum, vigilias, & urinæ suppressionem obvertenda est. In illo *Vena-sectio* est unicū remedium: sed & pennâ ad radicem instar stellæ effigiata, intra nares immisâ, ac fortiter circumducta, copiosum aliquando eduxit sanguinem. plura de Inflammatione cerebri videri possunt. Propter istas hypnotica repellentibus admisceri, vel seorsim adhiberi debent. *Laudani opiat* gr. iij. in liquore convenienti, cautè adhibita, ne phrenitis in veternum abeat, laudantur. *Hæc* vel spontè, vel quod ægri reddere negligunt, accidere solet, & fomentis emollientibus tollitur. Habent in isto morbo usum, *Luna portabilis* Hartmanni gutt. vii. pondere. pharmacum *phantasticum* Bartoleti, cujus dosis à drach. j. ad ij. & Spiritus terræ sigillatæ.

ARTICULUS IV.

De Melancholia.

Melancholia est delirium, à phantasmate melancholico exortum, quâ detentus, uni cogitationi, absque furore & febre, cum tristitia & metu, inheret. *Signa* sunt, Tristitia & metus absque causa evidenti. Taciturnitas vel sermo incongruus, de unâ re præsertim.

B b 4

Causa

Causa est phantasma melancholicum, quod procedit à spirituum animalium vitio, qui cum lucidi, renues, subtiles & mobiles esse debeant, obscuri, opaci, tenebricosi & fixi redduntur. Unde omnia objecta ad modum vitiosæ dispositionis spirituum, speciebus imprimuntur. Hanc dispositionem acquirunt, vel *vitio cerebri*, à nitore suo descedentis, & tales spiritus generantis: vel *materia ex qua sunt*, sanguinis nempe & spiritus vitalis: vel *materia impura* & melancholica, quæ sanguini & Spiritibus permiscetur, sive ea sit humor, sive vapor.

Curatio est facilis, si recens: sic enim solo victu & humectatione corporis ac capitis interdum curatur. si corpus augmentum sumit, si imaginatio saltem læditur. si cum risu aliquo est. *Nulla*, si hæreditaria. *Processum* vide de intemperie cerebri melancholica, & infra in differentiis. Nota tamen, 1. Diætæ hic magnam rationem habendam. somnum, ne in maniam abeat, urgendum. *Acetum* non nisi ut vapores sicci à cerebro ayocentur, adhibendum. Aquæ dulcis balneum non negligendum. 2. *Agrum* ad contrariam imaginationem ducendum. 3. Medicamentis interdum ad certum tempus abstinendum. Laudantur hic, *Confectio Alkermes*, *Tinctura* & *Extractum Lazuli*, *Elixir proprietatis*, *Lapis Bezoar*, *Cachunde* medicamentum Indicum; cujus descriptionem vide apud Zacutum Historiæ Medic. l. i. p. 310.

Dividitur in aliquot species.

I. Alia est *Cerebri*, quando Cerebrum in modo substantiæ à naturali luciditate, & puritate discedit. *Cognoscitur* ex eo, quod delirium est perpetuum & vehemens, melancholiæ in capite abundantis signa adsunt. sanguis si emittatur, non est is crassus nec ater. *Oritur Externe*, à forti imaginatione, metu, & gravibus aliis animi affectibus. *Internè*, ab humore

humore melancholico in capite cumulado; seu quod intemperiem cerebri frigidam acquisitam; seu ob melancholicam constitutionem, quæ ex affectibus agnoscitur; seu ob materiam frigidam & siccam, post morbos calidos, calore remittente & partibus tenuioribus resolutis, in cerebro relictam. *Curatur*, 1. *Materiæ peccantis alteratione* & *preparatione*, per fumariam, aquam vel Syrupum pomor. redolent. & Tartar. vitrioli. 2. *Eiusdem evacuatione*, per *extract. hellebori*, viis inferioribus apertis. Erhina, Sternutatoria. 3. Somni inductione per hypnotica. 4. Capitis roboratione, per *Tincturam Chrysolithi*, & alia appropriata.

II. Alia est *Totius*, quando sanguinis melancholicus in toto redundat, & inde ad cerebrum mittitur. *Cognoscitur* ex eo, quod delirium quidem est continuum, sed cum certis exacerbationibus & remissionibus; quod melancholiæ in corpore abundantis signa adsint, & causæ præcessere. *Oritur* à suis causis, de quibus in differentiis agitur. *Curatur* 1. *Vena sectione* sæpius instituta: sed quia paucissimi sunt in melancholicis spiritus, non copiosa; vel in sinistro brachio, vel in talo, crurum venæ si amplæ hirudinibus aperiri possunt. 2. *Humoris preparatione*, per Syrupum pomorum redolent. fumaria, cum cremore Tartari, & Tartaro vitriolato; Confectionem *Alkermes*, serum lactis cum succo cichorii & fumariæ. 3. *Eiusdem Evacuatione* leni, sæpius repetita, spiritus ac principes partes roborantibus, nec non humectantibus castigata. sed & fortiore, si sanguis est nimis crassus, nisi jam corpus nimis contabuerit. hanc balnea humectantia additis emollientibus excipere debent. 4. Potu acidularum & Thermarum usu. 5. *Capitis* per interna & externa roboratione, inter quæ *embroche*, inprimis laudantur. 6. *Diæta*, in qua à leguminibus abstinere debet. *Dividitur* pro ratione

tione caufarum. I. Alia est à *caufis externis*, ut timore, vigiliis, curis, quæ humidum radicale exsiccant, sanguinem in toto corpore mutare possunt, & humorem melancholicum detinent. Tum, venæfectio minimè locum habere creditur. Alia ab *internis*, nempe vel hæreditaria constitutione, quam ne temerè tangas: vel Epatis & lienis seu frigida & sicca, seu calida & sicca dispositione; in qua, causa exurrente cessante, calor desinit, & crassiores partes, quæ frigida & sicca sunt, relinquuntur. Tum aut est *cum sanguine*, unde delirium cum risu: aut *cum pituita*, unde pigrities, obliuio; aut *cum bile flava*, unde ira, &c. In *Curatione* caufarum quoque ratio est habenda.

III. Alia est *Cordis*, quando Spiritus vitales ob intemperiem frigidam & siccam, frigidi, sicci & impuriore gignuntur. *Curatio* non differt à superiore.

IV. Alia est *Hypochondriaca*, quando humor melancholicus, interdum frigidus & serosus, interdum in venæ portæ ramis adustus, in hypochondriis colligitur, & per vapores atros emissos, spiritus animales inquinat. *Cognoscitur* ex eo, quod per intervalla accedat; & in accessu interdum subito & ex improvise incurrat, interdum & sæpissimè, primò ructus & ventriculi tensionum dolorem; mox anxietatem, difficilem respirationem, cordis palpitationem, linguæ immobilitatem; tandem oculorum caliginem, aurium tinnitum, brachii alterutrum vel utriusque stuporem inducat. *Oritur* à vapore sæculento, qui ex humore melancholico ex lienis, epatis & ventriculi ἀντιρροή in hypochondriis collectus, versus superiora tendens, & in membra irruens, symptomata illa infert, & in cerebrum, seu per orificium ventriculi, seu per venæ cavæ ramos emissus, Spiritus obfuscat. *Curationem* in affectione hypochondriaca vide.

V. Alia

V. Alia est *Vterina*, quæ *Cognoscitur* ex eo, quòd de sinistri lateris dolore, & manifesto in dorso circa diaphragma pulsu, ægri conquerantur. *Oritur* etiam à vapore, seu ex mensium obstructione, seu ex seminis putredine exorto. *Curationem* vide suo loco.

VI. Alia est *Erotica*, ab *Amore profecta*, quæ vel ex *philtis* contrahitur; & tum danda 1. *Vomitiva* ex radice *Asari* cum bezoardicis, aqua benedicta Rulandi. 2. *Sudorifera*, ut aqua Theriacalis, *Diaphoreticum* in acutis. Appropriatum est *pulvis secundina*, de quo vide Hartmann. Vel ex *Veneris appetitu*, & *seminis abundantia*. Tum Venerem sopientibus & semen extinguentibus agendum. Vide de ea *Ferrandum* in peculiari tractatu.

VI. Alia est *Errabunda*, quæ Februario mense plerumque infestare solet. Ægri ulceribus in cruribus scatent, & ne per horam quidem uno loco quiescere possunt.

ARTICULUS V.

De Mania.

Mania est mentis diuturna, cum audacia & ferocia, sine febre, ab igneo spirituum fervore exorta, emotio.

Pars affecta est & Cerebrum, memoriâ maximâ ex parte servatâ; & Cor, quod ex affectibus nimis, & diuturna frigoris hybernæ patientiæ, corde calorem copiosè diffundente colligitur.

Signa sunt ferocia, sic à Melancholia; febris Symptomatica, quia putredo abest, carentia; sic à phrenitide distinguitur. Accedunt Vigiliæ nimix, & alia communia delirii indicia.

Causa est spirituum fervor; cui occultam & potentiorē causam necessariò conjungi, ex Symptomatum

matum enormitate & diuturnitate pater. Unde verò iste fit, in differentiis exponetur.

Curatio est difficilis, quia affectus est diuturnus, tum ratione causæ, quæ pertinacissima, & fermenti se instar habet; tum ratione ægrorum, qui non obediunt. *Bona spei*, si menses & hæmorrhoides fluunt. si alvus laxa. si mitiora Symptomata. si copiosa ex naribus, varicibus, utero, hæmorrhagia. si sudores adsunt. si in taciturnam desipientiam mutatur. *Peragitur* 1. *Dia* opposita, in qua vinum cavendum, somnus provocandus, ægri Musicâ demulcendi. 2. *Causarum fervorem inducentium remotione*, de qua in Differentiis. 3. *Symptomatum*, vigiliarum præsertim, mitigatione.

Differentia à Causis fervorem Spiritibus inferentibus sumuntur.

I. Alia est à *Causis externis*, ut æstu caniculari, excandescentiâ nimia, vini potentis haustu, *solano, cerebro fellis, muskela, vino fulmine congelato*, philtro, canum vel luporum morsu, varicum, fistularum & ulcerum antiquorum curatione, quæ ex relatione ægri & adstantium cognoscuntur.

Alia ab *internis*, de quibus in secunda Differentia.

II. Alia est à *sanguine adusto*, quæ *Cognoscitur* ex plethoræ indicitiis, oculorum rubedine & velut lusu, cantu, inmodico saltu, &c. *Oritur* interdum ab hepatis intemperie calida, mensium vel hæmorrhoidum suppressione. *Curatio* venæ sectione peragitur, non neglectis morbis, à quibus causatur.

Alia à *Bile atra*, occulta proprietate stipata, quæ *Cognoscitur* ex eo, quod perpetua sit, si in venis vel omnibus vel membris principalibus proximis stabulatur, delirium sit cum insaniam; ægrorum vires continuis vigiliis dissolvantur, rabida mordendi & dilacerandi libido adsit. &c. *Oritur* interdum à liene fervido *μυδαίνω γάλην* præbente. *Curatur* Sanguinis

nis missione, tum per venæ brachii sinistri & salvatellæ sectionem, copiosa, si sanguis nigrior; parcâ, si rubicundior; tum per hæmorrhoidum & varicum, si apparent; venæ frontis, si malum pertinacius, apertionem. II. *Humoris peccantis* per refrigerantia & humectantia Cephalica *preparatione*. Laudatur *oleum Camphoræ unc. j. ol. Musci dr. j. pondere commixta*, & dr. f. valore exhibitâ. *Decoctum Anagallidis flore purpureo*. III. *Ejusdem* per melanogoga, *lapidem inprimis lazuli*, & *mel helleboratum*, de quo *Petræus* in Nosologia, *eductione*. IV. *Cordis & Cerebri* per *Confecti. Alkermes* & de *hyacintho* roboratione. V. *Topicorum usu*, in quibus locum habent, cauteria futuræ coronali applicata. Cranii cum Trepano apertio, *lixivium ex baccis lauri & radicibus hellebori nigri veri factum*, quo caput tepidè lavari debet, &c. Specifica sunt, *Liquor sanguinis humani* cum extracto lapidis lazuli. *CrySTALLI saturni* cautissimè exhibendi. *Sanguis asini* ex venis post aures captus, de quo *Hartman.* &c. Vide *Rulandum* in Curationibus.

III. Alia est per *essentiam*, cui ista omnia attribui possunt.

Alia per *Consensum*, *Vteri* inprimis; unde furor uterinus dicitur: de qua suo loco.

ARTICULUS VI.

De Rabie.

Rabies est delirium, à veneno quodam peculiari in animali genito & homini communicato productum, cum vehementi liquidorum omnium & aqua potissimum abominatione.

Animalia illa sunt lupus, felis, canis; & hic præcipue,

Signa sunt, *Incipientis*, iracundia, querela de aëre quasi austro, parvum bibendi desiderium, lumen

num etiam de die accendendorum cupiditas, capitis vertigo. *Confirmata*, membrorum distentio, sed non continua, spuma, oculorum torvitas, in proximos expulsiō, morę canum latratus, ab aqua propter singularem quandam diffensum exhorrescentia, unde hydrophobia dicitur.

Causa est *venenum*, quod ex peculiari quadam inclinatione in animali gignitur. homini per halitum, osculum, salivam, morsum communicatur. in quibusdam ex terrore, si Donato credendum, generatur. in nonnullis ad corni, vel sanguinarię, vel forbi contactum excitatur. *Producitur* verò *delirium* in quibusdam citius. die ad summum vigesimo; in quibusdam tardius etiam anno duodecimo. Idque vel ob partis demorsę varietatem; alię namque sunt nobiliores, alię ignobiliores: vel ob victus, qui venenum retundere potest usum: vel ob patientium diversitatem: vel ob regionum & temporum difformitatem.

Curatio est *Alicujus spei*, si vulnus nervum, venam, vel arteriam non attingit. si profundum non est. *Nullius*, si timor aquę adest si singultus accessit. *Consistit* 1. In *Preservatione*, ne venenum in corpus penetret. ubi occurrunt 1. *Ligatura* supra partem affectam; si eam pars non patitur, interceptientium seu adstringentium impositio. 2. *Cucurbitula* cum magna flamma, cum scarificatione si vulnus exiguum; sine, vulnus magnum. 3. *Partis*, si vulnus nimis angustum, *amplificatio*, ut venenum eò melius effluere possit. 4. *Attractio* per medicamenta vehementer attrahentia, vel cauteria actualia. 11. In *Curatione proprię ita dicta*, ubi locum habent. 1. *Purgatio* per helleborum. 2. *Sudorifera* appropriata, maxime *mixtura simplex*. 3. *Vescantia* validissima. 4. *Antidota* duplici quantitate exhibita, &c.

CAPUT V.

De Symptomatibus plurium sensuum internorum.

ARTICULUS I.

De Comate Vigili.

Symptomata plures sensus internos simul instantia, sunt *Coma Vigil*, & *Lethargus*.

Coma vigil est ad somnum propensio, & ad eundem impotentia, à vaporibus Narcoticis somnum inducentibus & mentum turbantibus, exorta.

Signa sunt Oculorum conniventia, eorundem frequens apertio, delirus sermo, manuum & crurum inordinatus motus.

Causa in vapores narcoticos conjicitur, quibus aliquid quod vigilandi necessitatem infert, ut sunt, phrenitis, febris maligna, &c. adjungitur. Procedit interdum & à nimia virium debilitate, ex vehementi morbo, immanissimis doloribus, & immodica evacuatione contracta, & tum ferè lethalis est.

Curatio est *Difficilis*, quia facile in lethargum vel phrenitidem mutatur. *Dubia spei*, si sermo sit impeditus. si spirantibus in gutture murmur audiat. si ægri potulenta difficulter deglutiant. si humor tenuis è naribus destillet. *Peragitur* Revulsione. Materię à qua mittitur Evacuatione, &c.

ARTICULUS II.

De Lethargo.

Lethargus est inexplibilis in somnum propensio, cum febre lenta, oblivione & torpore, ex pituitoso sanguine in posterioribus cerebri sinibus putrescente, exorta.

Pars affecta sunt sinus cerebri posteriores, quia memoria præcipuè læditur.

Signa sunt, *somnus inexplibilis*, quia cerebrum ob madorem expandi nequit, & spiritus animales propter obstructionem ligantur. *Febris lenta*, quia humor putrescens non admodum mordax, calor à contrario refringitur; *continua*, cum focus sit perpetuus; & sub noctem quotidie recurrens. *Oblivio*, quia posterior cerebri pars læditur. *Respirationis tarditas*, quia nervi thoracis afficiuntur. *Tussis*, ob pituitæ in laryngem defluxum. *Vrina turbida*, quia crudi humores à calore agitantur, nec separantur. *Pulsus magni* ob febrem, *tardi* ob virium imbecillitatem. *Differt à Catalepsi* oculorum conniventia. *A Caro* febris præsentia. Ab *Apoplexia*, quod non subito invadat, nec omni motu privet. Ab *Hysterica passione*, quod lethargici respondeant & febricitent. *A Comate*, somno inexplibili, in quem excitati relabuntur.

Causa est Pituita, in posterioribus cerebri sinibus putrescens. *Vbi nota.* 1. Interdum illam circa cerebrum & meninges diffundi, & tumorem non ita magnum nec durum inferre: interdum iisdem impingi, & ut instar spongiæ tumesciat facere. 2. Pituitosum sanguinem à Narcoticis ut plurimum in fœceturæ cruditatibus *invehi*: ut putrescat, à vaporum distensionum retentione fieri.

Curatio est *Nulla*, si legitimus est: si indies vires prosternuntur. si sudor frigidus in capite augetur. si in sphacelum desinit. *Dubia spei*, si juveni æstivo tempore accidat. si urinae claræ & tenues reddantur. si multa & liquida per alvum egerantur, quia à natura resoluta sit. si tremor accedat, quia vel materiæ copiam vel resolutionem significat. si phrenitis subsequatur. *Alicujus*, si septimus dies superatus. si animales actiones non valide læduntur. si expulsa

expulsa ad nervos materia melius habent. si materia putrefacta per aures vel nares evacuetur. si abscessus post aures fiat. *Instituitur* 1. *Revulsione*, quæ peragitur, 1. *Vena sectione*, illaque maturâ, præmissis clystere; cui, si vires non ferunt, ligaturæ, hirudines, cucurbitulæ dorso & humeris affixæ, substitui possunt. 2. *Purgatione*, instituta per *Mitiora* propter febrem, cholagoga in principio, phlegmagoga in progressu. *Fortiora*, si febris remissior, & materia urgens. *Castoreo*, quod huic morbo proprium, *castigato*. Non omittis *Clysteribus acrioribus*, si febris est major. II. *Repulsione*, quæ administratur post venæ sectionem, per medicamenta mitiora, futuræ coronali applicata, revulsione non neglectâ. *Oxymel Scilliticum* bonum est. III. *Præparatione* materiæ, si morbus dat inducias, *stoechade Arabica* mixta, si febris nimia. IV. *Evacuatione cerebri particulari*. Ubi nota, Castoreum semper admisceri debere. *Sternuatoria* ab initio usurpari non debere: nec continuè, quia caput replent, in ipsis persistendum esse. *Vescatoria* post aures, vertici aut futuræ coronali imponi debere. V. *Capitis roboratione* per appropriata sua. IV. *Diaeta*, in qua in principio debet esse victus tenuis, in primis boni fucci. somnus paucus, &c.

Dividitur dupliciter.

I. Alius est *Legitimus*, de quo hæcenus diximus. Alius *Nothus*, qui est citra febrem, & nihil aliud quam somnus profundus, mediæ quasi inter caronæ & coma vigil naturæ.

II. Alius est *per essentiam*, de quo hæc accipientia sunt. Alius *per consensum*, materia cerebro ob mensium vel hæmorrhoidum suppressionem, vel alium aliquem morbum communicatâ.

CAPUT VI.

De Symptomatibus motus animalis.

ARTICULUS I.

De Lassitudine.

Symptomata morum animalem lædencia sunt, *Lassitudo*, *Inquietudo*, *Rigor*, *Tremor*, *Paralysis* & *convulsio*.

Lassitudo est ad motum animale, qui per naturam fieri debebat, cum dolore ineptitudo.

Signa relatio ipsius ægri suppeditat.

Causa est, quicquid musculos motus animalis instrumenta onerat & lassat, sive illud externum, sive internum.

Curatio per Remotionem causarum, & Musculorum demulsiōem peragitur.

Dividitur in sex Species.

I. Alia est *Non Spontanea*, ad quam *Exsiccativa* pertinet. Alia *Spontanea*, quæ, quia redundare in corporibus humores ostendit, morbos præfagit; & si post febrem perseverat, recidivam significat. Ad eam *Gracilitatis Vlcerosa*, *Tensiva*, *Phlegmonodes* & *Ostendens* pertinet.

II. Alia est *Exsiccativa*, quæ à nimio corporis motu progreditur. Nihil periculi in se habet, nisi in corpus cacochymicum inciderit. Curatur I. Quiete somni præsertim, quia tum membra mediâ formâ, musculis relaxatis, locantur. II. Exercitio, si prior levius, quia discutit humores in ambitum corporis motos.

III. Alia est *Gracilitatis*, quæ nullum molestum sensum habet. A carnis & adipis musculorum consumptione oritur. Vel chronicos vel acutos morbos insequitur. *Curatur* Diæta conveniente.

IV. Alia

IV. Alia est *Vlcerosa*, quæ *Cognoscitur* ex indicibus cacochymicæ biliosæ, sensu punctionis per totum corpus, unde nomen sortita est, & rigore subsequente. *Oritur* ab acri & mordaci vel humore vel vapore, seu à calore fuso, seu ab exercitio liquato. *Curatur Purgatione*, si materia profundius hæret. *Friktionibus* & motu, si in superficie.

V. Alia *Tensiva*, quæ *Cognoscitur* ex sensu tensionis in musculorum tendinibus, fibris, & nervis, *Oritur* à plethora. *Curatur* *Friktione* cum oleo dulci, Balneo aquæ dulcis.

VI. Alia *Phlegmonodes*, quæ *Cognoscitur* sensu contusionis & contractionis, & quasi inflammationis musculorum illorum, præsertim qui sub cute locum habent. *Oritur* vel à sanguinis copiâ ad musculos delapsâ, aut per exercitationem attractâ, & tum venæ sectione cura perficitur: Vel ab *Humoribus*, pari ratione eò deductis; & tum *Purgatione* opus erit.

VI. Alia est *Ostendens*, quæ *Cognoscitur* ex nervorum interiorum tendinum ossibus adhærescentium, & membranarum ossa obvolventium tensione. *Oritur* à Melancholiâ membranas illas occupante. Concurrit cum scorbuto, febribus quartanis, morbo Gallico. *Cura* ad morbos dirigitur primariis.

ARTICULUS II.

De Inquietudine.

Inquietudo est corporis & membrorum varia iactatio, à materia partes sentientes molestante exorta.

Signis opus non est. Affectus oculis est expositus.

Causa est materia acris, vel humor, vel vapor calidus.

Curatio ad eandem, ut ex differentiis patet, obverti debet.

Dividitur in Criticam & Symptomaticam.

Critica est in perturbatione illa subitanea humorum. Unde nihil periculi. *Symptomatica* accidit in genere, & continet sub se I. *Stomachicam*, quæ *Cognoscitur* ex nausea, interdum sine vomitu, interdum cum illo, dolore ventriculi, &c. *Oritur* vel ab *Humoribus* os ventriculi vellicantibus, & in tunicis imbibitis; ubi purgantia acrimoniam retundentia locum habent: vel à *cibo* intempestivè sumto, ubi vomitu subveniendum est. II. *Inflammatoriam*, quæ à visceris inflammatione procedit. III. *Febrilem*, quæ in febribus malignis apparet, & cum virium imbecillitate periculosa est. In *Curatione* ad morbos respiciendum.

ARTICULUS III.

De Rigore.

Rigor est musculorum totius corporis vibratio, cum refrigeratione & dolore quodam conjuncta, à re molesta, partes sentientes in ambitu corporis subito vellicante, & expultricem irritante exorta.

Pars affecta est totum corpus, vel musculi ejusdem, sive compatiantur interius, sive non.

Signis opus non est. Refrigeratio quæ in eo accidit, vel est duntaxat cutanea ob dolorem ab acrimonia humoris excitatum: vel musculorum, seu illa ab humoris fit diffusione, seu viscerum inflammatione.

Causa est res molesta, sive in ipsis musculis colligatur & contineatur; sive aliunde transmittatur. Illa verò est acris & mordax, multa, quæque velociter movetur. Accidit inprimis in febribus.

Curatio subtilis causis peragitur. Malus est, si evacuatione subsecuta morbus non cessat: & si cum tabe jungatur.

Dividitur præcipuè trifariam.

I Alius

I. Alius est *ab Externis*, ut aëre frigido, calore externo excrementa quæ quiescebant fundente. adspersione aquæ frigidæ, scintillæ in cutem illapsu, &c. *Curatio* hic nihil observatu dignum habet.

Alius *ab Internis*, humore nempe *bilioso*, falsa pituita, melancholiâ, atra bile, vapore acri. Cura morbos spectat. *Mitigandi* interdum sunt ol. *Rutaceo*, *laurino*, de *castoreo*, de *piperibus* cum *Theriaca* & *Mithridatio*.

II. Alius est *Vehemens cum febre continua*. Tum, si in principio fit, inflammationem visceris indicat; si in fine, vel materiam febrilem è venis moveri, vel inflammationem ad suppurationem tendere ostendit. Alius *Parvus*, qui februm index, in propriis de illis capitibus videndus est.

III. Alius est *Periodicus*, qui secundum typos affligit. Et hic optimus, si die Critico accedit. si corpus ad ipsum exalescit; aut aliqua defectione sequitur. Alius *Symptomaticus*, quando materia sine crisi in ambitum corporis protruditur. Et de hoc agimus.

ARTICULUS IV.

De Tremore.

Tremor est motus voluntarii depravatio, propter quem membrum elevatum in suo situ servari non potest, à debilitate facultatis motricis exorta.

Signis opus non est. Differt à *Convulsione*, quia in hac pars contrahitur & servatur. à *Paralyfi*, quia in hac non attollitur, vel nimis tardè. à *Palpitatione*, quia in hac non totum membrum, sed caro & inprimis cutis movetur; & membrum immotum nunc subsidet, nunc distenditur. à *Rigore*, quia sine dolore est.

Causa est facultatis motricis debilitas, quæ vel vitio spirituum animalium, vel nervorum accidit.

C c 3

Curatio

Curatio est Nulla, si senes adoritur, ob spirituum & cerebri magnam imbecillitatem. si in vehementi phrenitide vel melancholia accidit; sit enim vel ob nervorum per febrem exsiccationem, vel ob pravam qualitatem. si est hæreditarius, vel vitio diætæ in illis qui organa facultatis animalis debilia habent, exoritur. si æger ad manum resilit, in febribus acutis, quia nervi aut exsiccantur, aut à prava materia vellicantur, unde convulsio sequitur. *Facilior*, si à causis evidentibus procedit. *Dubia & difficilis*, si in parte sinistra accidit, quia calidum innatum ejus partis facilius cadit. si in convulsionem mutatur, quia materia peccans deteriorem qualitatem induit. si in febre ardente sit, & delirium subsequitur. gravis enim morbus succedit, & vires absumuntur. si æger ad manum resilit, nam nervi humore madescunt. *Instituitur* pro ratione causarum & Differentiarum: de quibus agemus.

Differentia sumuntur à causis inducentibus.

I. Alius est à *Causis externis*, præsertim malignis & narcoticis, ut *argento vivo*, venenis, opiatis, *hyoscymo*, retentione secundinarum, sanguinis post partum suppressione; quæ omnia removenda sunt. *Alius ab Internis*, de quibus in secunda differentia.

II. Alius est à *Spiritu inopia*, qui vel non generantur in debita sufficientia, ob intemperiem cerebri frigidam; Tum morbi ipsius in curatione ratio habenda est: vel dissipantur & absumuntur, per calorem nimium, evacuationem nimiam, morbos longos. Hic Diætâ agendum.

Alius à *Nervorum vitiis*, quæ esse possunt, i. *Intemperies Cerebri frigida & humida*. Tum affecti cerebri signa adsunt. Curatio ad intemperiem observanda. Laudantur *Intus*, Essentia Melissæ, stochas Arabica, *Extra*, Oleum ex floribus Trifolii, vul-

pinum;

pinum, piperinum, de Castoreo, &c. 2. *Plethora*, quando aliqua evacuatio suppressa est. Tum, Vena aperiatur. 3. *Obstructio* eorundem partialis, seu à crassis humoribus, seu à Crapula & aliis. Vide Curationem Paralyseos.

ARTICULUS V.

De Paralyfi.

Paralysis est motus in partibus voluntaria abolitio, sine rationis lesione, ob defectum Spirituum animalium, vitio nervorum exorta.

Signus opus non est. Motus plerumque perit, manente sensu. in parte affecta est mollities, frigus, pulsus debilis, &c.

Causa est Spirituum animalium defectus, qui vitio nervorum accidit.

Curatio est Nulla, si ex luxatione vertebrarum soluta & valida accidit, quia nervi insigniter contunduntur, ac sequitur inflammatio. si ex nervi grandioris aut spinalis medullæ incisione, quia incisio non coalescit. *Difficilis*, si in senibus, quia caloris imbecillitatem innuit. si membrum extenuatur, & ejus calor vegetus mutatur; præsertim si oculus lateris imminuitur, quia calorem ferè extinctum arguit. si plures nervi & muscoli affecti sunt. si Apoplexiam insequitur, quia causa est nimis vehemens. *Facilior*, si crura aut pedes resolvuntur, quia siccorum ibidem nervorum natura. si membrum resolutum actu est calidum. si tremor aut febris supervenit. *Instituitur* pro ratione Causarum & Differentiarum.

Differentia Paralyseos sunt variae.

I. Alia est *Universalis*, in qua vel totum corpus excepto capite occupatur, vel medietas sive alterutrum latus. Tum, si *facies* afficitur, cerebrum quoque cum spinali medulla affectum est: sin omnes sub

Cc 4

facies

facie partes, initium spinalis medullæ malè habet secundum transversum. *sin medietas*, alterutrum spinalis medullæ latus peccat.

Alia *Particularis* cum certa pars laborat. Tum, *Si brachia* & manus motu destituuntur, nervi, qui ex vertebra cervicis prodeunt, peccant. *Si pedes*, qui in vertebra lumborum & ossis sacri. *si oculi* secundum par nervorum afficitur. *si lingua* septimum, *si vox* deficiat, nervi recurrentes affecti sunt.

II. Alia est ab *intemperie nervorum*, propter humores pituitosos & frigidos, *tonum ipsorum laxantes*, à capite plerumque descendentes. *Cognoscuntur* isti ex capite de Intemperie. Curatio fit 1. *Evacuatione* primarum viarum, ne præparantia humores crudos in ventriculum trahant, (Et vomitus vomitorio Cratonis ex *succo raphani*, in quo *belleborus niger* defossus erat, excitatus, locum habet, si ventriculus pituita repletus est) *leni*; si verò materia in motu est, *fortiore*. 2. *Præparatione* materiæ repetita, per medicamenta Cephalica, inter quæ *Ira arthetica*, *flores primula veris*, *lilior. convall.* optima. 3. *Purgatione*, per Mechoacanum, vel *pilulas Solenandro & Mathiolo* usuales. 4. *Sudorum concitatione*, per *hydroticum* Quercetani, *sudoriferum* s. Ambrosii, quibus adjungi debent *Gnajakum*, *China*, *Theriaca*, *Bezoardicum Lunare*, cum aliis appropriatis, quos frictiones colli, vel spinæ *capa lilii*, *radice iridis recenti*, excipere debent. 5. *Evacuatione* cerebri *particulari* per Errhina, Apophlegmatizantia, &c. 6. *Topicorum applicatione*, ubi locum habent Frictiones cum *aqua formicarum*, & salviæ cum *foliis Tabaci* in vino Malvatico infusis, balnea cum *formicetis*. Rubificationes per *Vitricas virides*, & alia. Inunctiones unguento *vipertino*, de piperibus, de castoreo, *axungia Catii Sylvestris*, *humana*, &c. *Therma naturales* vel *artific.*

artificiales, de quibus vide *Heurnium* in Methodo. 7. *Distà calidà & sicca*, de qua consule Practicos.

Alia à *Nervorum angustia*, quam insert 1. *Obstructio*, facta ab humore pituitoso, & aliis huc infervientibus. Tum Curatio causæ rationem habet: de qua superius. 2. *Constipatio* à tumore in substantia spinalis medullæ vel nervi exorto. 3. *Compressio* seu ab aliqua externa causâ, seu à tumore, &c.

III. Alia à *Causis unitatem nervorum solventibus*, inter quas 1. *Contusio*, casus, vel ictus. Tum vena secanda, ne affluxus fiat. Adstringentia cum discutientibus apponenda, nisi inflammatio adsit. 2. *Dissectio*, ubi nullum remedium. 3. *Luxatio vertebrarum* dorsi subito facta, de qua l. 2.

Alia à *rebus Narcoticis*, ut contactu marinæ torpedinis, argento vivo, vino Spiritus torpidos redente. ubi ratio causæ in curatione est habenda.

IV. Alia est *Colica*, cum humor ab intestinis non tam ad nervorum principium, quàm musculos & tendines movetur. In *Causa* est humor tenuis biliosus & serosus. In *Curatione* clysteribus est maxime agendum, ut perversus naturæ motus invertatur. Vena secanda, si plethora adest. Purgandum per *Epicrasin* mitioribus. Sudorifera subsequantur, in aquis *primula veris*, *Liliorum convallium*. Valet & *Spiritus nitri*.

Alia *Scorbutica*: de qua vide in Scorbuto.

Alia *Hysterica*, quam suo quoque loco videbimus.

ARTICULUS VI.

De Spasmo, seu Convulsione.

Spasmus est musculorum involuntaria, perpetua, & dolorifica, versus suum initium retractio, ob nervosarum partium abbreviationem, quam rigor & figura depravatio sequitur, exorta.

Pars affecta est Musculus, & præcipuè Tendo.

Signa per se parent, ita musculi retrahuntur, ut immobiles sint in contrarium.

Causa est vel materia expultricem partium velligans: vel morbus violenter nervosas partes tendens. Et hæret in genere nervoso, vel in principio nervorum, cerebro nempe, vel spinali medulla, vel in peculiari nervo.

Curatio est Nulla ferè, si est ab helleboro. si post phrenitidem exorta. si à vulnere, cerebri præsertim, ob saniem nervos vellicantem. *Difficilior*, si cerebri vicinæ partes laborant. si primario sit nervi consensu, quia ob vehementiam Symptomatum æger durare nequit. si à copioso sanguinis fluxu oritur. si à muliebri profluvio. si febres insequitur. si acutis cum doloribus circa viscera accidit. *Facilior*, si partes à cerebro remotæ & minus nobiles occupantur. si consensu cerebri fiat, nisi affectus, quod cerebrum laborat, pertinax sit. *Instituitur* pro ratione Causarum: de quibus in Differentiis.

Differentia spasmi sunt varæ.

I. Alius est *Universalis*, qui totum corpus afficit. Hujus *Causa*, vel est in Cerebro, & cum corpore musculi etiam faciei convelluntur; vel in exorta spinalis medulla, unde musculi caput & spinam moventes retrahuntur. Tum, vel trahitur corpus cum cervice & capite ad partem anteriorem, unde *Spasmus* oritur: vel musculis duodecim caput extendentibus affectis, ad partem posteriorem, unde *Spasmus*: vel musculis & nervis tam anterioribus quam posterioribus affectis, totum corpus inflexile permanet. Unde *Tetanus*, quo affecti vel intra quatuor dies moriuntur; vel si hos effugerint, evadunt.

Alius est *Particularis* Oculi, oris, &c. quos suo loco videbimus.

II. Alius est à *Repletionem*, quæ nervorum latitudinem

dinem dilatat, longitudinem minuit. *Cognoscitur* ex causarum prægressu, invasione subita citra evidentem causam & exhaustum, habitudine phlegmatica. *Oritur* I. Ab humoris pituitosi, in nervos secundum tunicas, & ut sunt partes musculorum componentes, & instrumenta operationis motivæ, affluxu. Tum Diæta antecessit talis. Menses, hæmorrhoides vel aliar evacuationes consuetæ suppressæ sunt. In *Curatione*, I. Clystere præmissio attenuandum & incidendum. Laudatur *Theriaca Andromachi*, *Aqua vel Spiritus Juniperi*, *Balsamus Quercetani*. 2. Evacuandum sæpius clementioribus. fortiora materiam fundunt. 3. Revellendum frictionibus, gargarismis, cucurbitis, &c. 4. Discutiendum Oleis *Castorei*, *Euphorbii*, *Terebinthina* destillatâ, *Nucis moschata*, *Thermis sulfureis*. 5. In Diæta nulum vinum bibendum. II. Ab *Inflammatione partium nervosarum*. Tum Plethora adest. Casus vel ictus, vel aliquid violentum, dolores longi & acuti in partibus nervosis, iræ vehementes, &c. antecessere. In Causa est affluxus sanguinis fervidioris. Curatio ad inflammationem obvertenda. III. A *Flatibus*. Tum causæ præcessere, citò transit. Ad *discutiendum*, valent *verbena* & *matricaria* collo impositæ. IV. A *Vulnere* vel *punctura nervi* simplici vel venenata, de qua lib. 2. egimus.

Alius ab *Inanitione*, in quo nervi breviores ob exsiccationem nativæ humiditatis redduntur. *Cognoscitur* exinde, quia sensim cum membri diminutione accedit. *Oritur* à causis, vel immodicè evacuantibus, ut sunt, hæmorrhagia narium, sudores, purgationes helleboratæ; vel vehementer calefacientibus & exsiccantibus, ut sunt inflammationes, vigilæ, labores, vini potus, venus nimia, dolor diurnus, hæctica, cauteria aut vesicatoria nervosis partibus adhibita. Curatur I. *Diæta* humescante. 2. *Medicamentis*

camentis *analeptics* & humectantibus, ut sunt unguenta de *ansere* & *cato assatis*, balnea oleacea. Aqua pinguescens ex sanguine suillo *Ferdinandi*, 1. 3. c. de *Hecticâ*. *Morselli ex carnibus testudinum*. Magisterium *hyacynthi* specificum est.

III. Alius est *quorôdus*, qui à Spiritu seu halitu crasso, à cruditate excitato, spacia musculorum replete, & cum dolore distendente oritur. Durat eo usque, dum musculus relaxatur. Frictione tollitur, vel inunctione cum *Theriaca*, aut aqua *Iuniperi*.

Alius *Illegitimus*, qui ob stimulationem partium nervosarum ab affectu dolorifico, sed sine perpetua tensione oritur, & plerumque per consensum orificii ventriculi, vel uteri accidit. Affectus dolorificus vel est ab intemperie, vel à solutione continui.

CAPUT VII.

De Symptomatibus sensus internos, ratiocinationem & motum, cum sensibus externis simul, lædentibus.

ARTICULUS I.

De Incubo & Catalepsi.

Symptomata sensus internos, ratiocinationem & motum, cum sensibus externis simul lædencia sunt, *Incubus*, *Catalepsis*, *Epilepsia*, *Carus*, & *Apoplexia*.

Incubus est motus, potissimum respirationis & vocis interceptio, cum falso rei gravis thoraci incumbens & suffocantis in somnio, ob impeditam liberam spirituum, vis obstructis, ad nervos penetrationem.

Pars affecta est Cerebrum, maxime parte posteriore, qua meatus ad principium spinalis medullæ pertingit. Comprimitur & *Diaphragma*.

Signa

Signa sunt gravitas & immobilitas corporis, præsertim pectoris, sensus torpidus, suffocationis, initio præsertim somni, homine supino decumbente, imaginatio, & quasi ab aliquo incumbente oppressio, ut æger exclamare nequeat, sed confusam vocem edat. Sola respirationis & vocis interceptio imaginationi offertur; quia solus thoracis motus, in somno summè est necessarius.

Causa est Spirituum animalium interceptio, ab Obstructione levi, ventriculorum cerebri, ac potissimum principii spinalis medullæ, exorta. Hanc causatur Vapor crassus, sæpe frigidus, imò Narcoticus; hinc æger difficulter expergitur. Qui à crassa pituita aut humore melancholico, in hypochondriis & circa præcordia hærente oritur, is hilce per crapulam, cruditatem, vel aliis de causis turgescitibus & motis exhalat, diaphragma & pulmones premit, in principium nervorum irruit, & in imaginationis sedem irrepens, spiritibus sese immiscet.

Curatio est Minoris spei, si à causa interna, proveciores ætate adoritur. si diuturnus est & frequens, & à quo æger stupidus permanet. si partim dormienti, partim vigili accidit, quia Epilepsia propinquior est. si post excitationem, sudor frigidus, tremor cordis, spasmus aut syncope sequuntur. Respicit I. Paroxysmum, in quo ægri excitandi, vapor frictione dissipandus. II. Tempus extra paroxysmum, in quo I. Diata servanda, quæ exigit Aëris tenuitatem, Cœnam frugalem, vini & cerevisiæ tenuioris usum, decubitus supini fugam. 2. Materia vaporum fomes, si altius insedit, per incidentia & abstergentia preparanda; mox debito modo evacuanda. Venæ Cephalicæ vel Epaticæ, in mulieribus menstrui suppressione laborantibus, saphenæ sectio, si plethora adest, probatur. 3. Capite privatim mox purgato, illud roborandum. Internè per semen ni-

grum

grum pœonia maris, Theriacam in qua pœoniæ exhibitam. Externè, per lotiones ex cephalicis compositas. 4. Vapores post cibum prohibendi, *Diacydonio*, *Coriandro* preparato, &c.

Catalepsis seu *Catochus* est subita sensuum omnium, motus, & mentis præhensio, qua qui corripuntur, rigidi in eo statu, in quo prehensi fuerunt, aperti ac immotis oculis, permanent. Signis opus non est. De *Causa* dissentiant eruditi. Verisimile est ita figi à *vapore fixativo* spiritus & immobiles reddi, quemadmodum à fulmine & spiritibus è terræ cavernis prorumpentibus, homines & bruta rigida reddita legimus. Dantur tamen & in hoc morbo *gradus*. Nam quidam nihil vel vident, vel audiunt. Alii audiunt & vident, sed nihil loquuntur. Nonnulli manus movere visi sunt. Quidam impulsu ambulantes. Curationem rarissimi affectus vide apud Practicos. In Topicis abstinendum ab aceto, ne vis conglrandi intendatur.

ARTICULUS II.

De Epilepsia.

Epilepsia est actionum animalium & principum cessatio, cum motu totius corporis convulsivo, à materia acri, peculiari vi, cerebro infesta, principium nervorum vellicante, constringente, & ad expulsionem irritante.

Dicitur & morbus puerilis, *Herculeus*, *Comitialis*, *Lunaticus*, *Divinus*, *Sonicus*, & *Caducus*.

Signa sunt, vel *Imminentis*, nervorum trepidatio, splendoris instar iridis oculis obversantes, odoris foedi sensus, vertigo, venarum sub lingua flavedo: vel *Præsentis*, subitus lapsus, membrorum non proportionata ad materiam (ut vocant) faciei contorsio, mugitus, stridor vel arcta collisio dentium, digito-

rum

rum stricta constrictio, urinae vel sæcum involuntaria emissio, Spuma ovi candido similis, &c.

Causa est Aut *Humor tenuis & spumofus*, aut *vapor*, qui dum peculiari vi cerebrum principumque nervorum vellicant, & constrictiorem meatuum inducunt, & sensibiles partes ad expulsionem noxii stimulant. Inde spirituum sensificorum oclusio & retractio, ac, defectu eorundem, abolitio vel immutatio sequitur. Hinc omnes partes motum convulsivum pariuntur. Ad *dispositionem* facit hæreditas, & in Eclipsi Lunari nativitas. *Materiam* suppe- ditat, hepatis & carnis hircinæ, coturnicum veratrum devorantium, columbarum adularum, anguillarum, passerum, lentium, &c frequens usus. *Movent* eandem Lunæ radii, Olfactus rerum foetidarum, bituminis, gagatis, cornuum caprarum, cervorum, corii caprilli, myrrhæ, sulfuris; allii, api, &c. Timor validus, Titillatio, Daemon, &c.

Curatio est *Difficilior*, si omnes functiones abolentur, convulsio vehementior & diuturnior est, ac excrementa spontè fluunt. si ante pubertatem accidit, si senes ac decrepitos infestat. si mulierem utero gerentem invadit. *Facilior*, si est recens. si breviores habet paroxysmos, convulsionem non vehementem, & si æger liberius respirat. *Nulla* ferè, si est hæreditaria. si infantes parvos exagitat. si ad usum sternutatoriorum æger non sternutat. *Respicit* 1. *Paroxysmum* ipsum Vel *Instantem*. Tum aut Essentiæ Castorei aut spiritus succini albi gutta una vel altera, in aqua antepileptica Langii, aut pillula Ladani opiatæ, cui partibus quatuor una olei Camphoræ admixta sit, sumatur. Vel *Præsentem*, in quo inter cætera, Os diducendum, & sacculus ruræ, castoreo, &c. impletus, dentibus interponendus. Rêvulsio per frictiones & ligaturas instituenda. Alvus glande vel Clystere acri, cui & scorias reguli Antimoni quidam

dam incoquunt, sollicitanda. Nares balsamo succini, rutæ, inungendæ. Lingua & palatum *Theriaca* in aceto rutaceo dissoluta illinenda. sternutatoria, si æger his non excitatur, adhibenda. vel turtur depلمات umbilico imponendus. *Innus*, Aqua Cerasorum nigrorum dulcium, hirundin. cum ol. succini, Cranii humani, exhibenda. II. *Tempus extra Paroxysmum*, in quo 1. *Materia* radix mali, imminuto prius sanguine, nisi malum sit inveteratum, præparatur. *Per inferiora*, repetitis vicibus, agarico vel alio conveniente, habitâ humorum qui abundare possunt ratione, *purgetur*. Eadem sudoriferis, exoticis illis inprimis China, Guajaco, cum visco querno tollatur. 2. *Materia in Cerebro residua*, per Errhina, Apophlegmatizantia, quin setacea & fonticulos educatur. 3. *Cerebrum* Cephalicis & Antepilepticis *roboretur*. 4. *Diata* servetur, in qua cibi vaporosi, specialiter morbo faventes, vinum, Venus, &c. vitanda. 5. Omnibus capiti appropriata, & *Epilepsia specificè resistentia* admiscenda, ut sunt *Radix pæoniæ maris* in Julio luna decrescente collecta, *Vngula alcis* posterior dextra, *viscus quernus*, Magisterium Cranii humani, *solis immaturum*. Aqua hirund. Cerasorum nigrorum & dulcium, tilia. Oleum succini albi, Cranii humani. placenta ex rore in S. Iohannis Baptista nocte collecto facta. Pulvis ex CrySTALLORUM præpar. dr. j. Corallor. rubr. scr. ij. Margarit. Orient. scr. j. Smaragd. Orient. præpar. dr. f. factus, & in aqua conveniente sua dosi exhibitus. *Extra*, Corium lupi ea parte desumptum, quâ spinæ adhæret, duorum digitorum in cinguli formâ, & Amuletum ex frutice sambuci in salice inventi Hartmanni. Signum perfectæ curationis est, si æger suffitu rerum foetidarum naribus admoto, non concidat.

Differentia Epilepsiae sunt variae.

I. Alia est *Recent*, quæ si in initio neglecta fuerit,

rit, frequenter iis, qui eâ detinentur, commoritur. Alia *Inveterata*, quæ dubiæ plerumque est Curationis.

II. Alia est *Mitior*, in qua aliquæ duntaxat partes convelluntur: æger ad se reversus, omnium quæ egit ignarus est. Alia *Gravior*, in qua totum corpus concutitur.

III. Alia est *Periodica*, quæ vel singulis annis semel aut bis, vel singulis mensibus in Novilunio & plenilunio, vel brevioribus intervallis, sed illis statim invadit. Alia, *quæ periodos non servat*, sed nunc rarius, nunc sæpius infestat.

IV. Alia est *per Essentiam*, quando dispositio Epileptica est in ipso Cerebro. *Cognoscitur* ex eo, quod homo sine ulla paroxysmi præfensione concidat, sibi redditus nihil eorum quæ acta sunt recorderetur. frequenter circa novilunia & plenilunia afficiatur. *Oritur* ab iisdem (de quibus supra) causis. *Curatur* quoque eodem modo. Si venæ-sectione opus, Cephalica in cubito secetur, setaceum magnum usum habet. Cauterium in hac sola futura coronali applicari potest. *Fit* interdum ob *abscessum in cerebro*: interdum ob *corruptam meningem*: aliquid quando ob *cranium cariosum, vulnus*, &c. de quibus suo loco dictum est.

Alia est *per consensum*, quando causa in partibus inferioribus prognata, in caput sublata, Epilepsiam excitat. *Cognoscitur* ex eo, quod paroxysmus ingruens præsciri potest, & aurâ veluti à parte inferiore ascendit, dolor in aliqua parte percipitur; & æger sibi redditus, paroxysmi recordatur. *Curatio* ad partem mandantem obvertenda, & materia sursum tendens revellenda. *Dividitur* variè: de quibus sequenter Differentia agetur.

V. Alia est à *ventriculo*; in qua, ægri in Epilepsiam incidunt: si tardius cibum sumant, indicia ventriculi

triculi affecti adsunt. In Curatione vomitu agi potest, &c.

Alia à *Vermibus*, qui suis signis deteguntur. Medicamentis scolobroticis Antepileptica admisceri debent.

Alia ab *Utero*, quæ *Cognoscitur* ex eo, quod affectus uteri aliquis adest, nempe mensium suppressio, seminis vel secundinarum retentio, foetus in utero mortuus, &c. *Curatio* ad affectus est obvertenda, in qua Radix Aristolochiæ rotundæ laudatur. *Nota*, Aquam hirundinum cum castoreo, galbano & aceto destillatam convenientissimam esse. Fœminæ gravidæ utero suaveolentia admoveri non debere. imò suaveolentia medicamenta, cum caput gravent, bene removeri.

Alia à *partibus Externis*, seu vulneratis, seu ulcere affectis, seu morfu læsis, quæ diligenter est examinanda, ne cum ea, quæ ab utero proficiscitur, confundatur. Curatur pro ratione Causarum.

V I. Alia est *Adulorum*, cui hæcenus dicta conveniunt.

Alia *Infantum*, in cujus *Curatione*, si *Lactentes* sunt, in *Paroxysmo* ita procedendum ut supra, ætatis duntaxat ratione habita; Extra *Paroxysmum*, partim nutrice medicamenta propinanda, partim infans *Syrupo de tribus* evacuanus, cerebrum ipsius roborandum, & abscessus, si qui erumpunt, non impediendi. Laudatur à nonnullis inunctio totius corporis cum butyro illoto, infuso, cum ruta in mortario contusa misto. Præservationis gratia, valet pulvis præservativus Hartmanni, Aqua vitæ mulierum prægnanti exhibita. Oleum amygdal. dulc. cum saccharo recens natis datum. In ea quæ est per consensum, laudatur Emplastrum ex succini albi, Thuris, mastiches ana dr. j. f. Galbani Opoponacis ana sc. j. vitæ quercini dr. ij. Ambra gr. vj. Moschi gr. iij. seminis paon.

paon. maris dr. f. Ladani dr. j. f. ol. Nigis moschata paux. adspersis pulvere cubearum, in aluta extensum, & abdomini impositum: quod si ex *Lactis concretione* accidat, valet Cataplasma ex fol. ulmi part. iij. in urina pueri coctis, cum butyri recentis unc. ij. formatum, & regioni ventriculi applicatum. *Ablattorum* cura non multum à supra dictis variat.

ARTICULUS III.

De Caro.

Carus est somnus profundus, cum sensus & motus, respiratione excepta, imaginationisque læsione, ab impedito spirituum animalium motu, exortus.

Signa sunt somnus, oculis clausis, tam profundus, ut æger interrogatus non respondeat, sic à Catalepsi & lethargo distinguitur: membri si pungatur retrahit, quod in Apoplexia non fit. libera respiratio, nisi causæ vehementia sit maxima.

Causa est Spirituum animalium in sensus & motum prohibitum exercitium, cujus diversæ causæ in Differentiis exponuntur.

Curatio est Nulla, si in declinatione febrium continuarum, viribus debilibus, accidat. *Difficilior*, si respiratio læditur. si, cum capitis gravitate conjungitur, quia, humore non nimis crasso in nervorum substantiam penetrante & eos extendente, convulsio sequitur. si post aliquam magnam evacuationem advenit. Peragitur pro ratione Causarum.

Dividitur quinquefariam.

I. Alius est, quando spiritus animales non generantur, quod fit, quando vel arteriæ carotides spiritum vitalem ad cerebrum vehentes læduntur: Vel Musculi temporales, insignem consensum cum cerebro per insignes nervos habentes, comprimuntur vel contunduntur.

II. Alius est, quando Spiritus animales dissipantur, quod fit, vel ab evacuatione nimia, Vel à dolore exquisito, ab externa aut interna causa profecto: Vel à cerebri, propter nimiam agitationem, defatigatione; quod in somno gravi, qui in fine paroxysmi Epileptici accidit, evenit.

III. Alius est, quando Spiritus animales sopiuntur. Fit id vel Externè, idque 1. à Fumo carbonum, in conclavi accensorum: de quo etiam supra egimus. 2. A Medicamentis Narcoticis, Opio; hyoscyamo, &c. ubi Castoreum cum Oxymelite vel Cassia lignea locum habent. 3. A Venenis, seu assumptis seu extra applicatis. ubi Theriaca adhiberi debet. Vel Internè, 1. à vaporibus in febribus emissis. 2. Ab iisdem ex vermibus elevatis: de quibus sui loci sunt consulendi. Cura ex sequenti Differentiæ membro petatur.

IV. Alius est, quando spiritus ad membra penetrare nequeunt. Fit id 1. A Compressione cranii & Cerebri; de qua supra. II. A meatuum obstructione. Tum pituitæ signa aderunt. In Curatione, habita torius ratione, Revulsiones, caput purgia, &c. adhibenda, & quid in Apoplexiæ cura fiat, videndum.

V. Alius est, quando Spiritus perturbantur; ut in istu, percussione, casu capitis alio, &c. quæ suis locis vide.

ARTICULUS IV.

De Apoplexia.

Apoplexia est repentina omnium functionum animalium abolitio, solâ restante aliquandiu licet afflictâ respiratione, ob angustiam & occlusionem meatuum, potissimum circa basin cerebri, per quos spiritus animales ad membra derivantur, exorta.

pars

Pars affecta est Cerebrum, non solum secundum ventriculos; sed etiam secundum poros, & potissimum circa partem inferiorem & posteriorem, ubi nervorum principium.

Signa sunt *Imminentis*, aliquando nulla, nonnunquam vertigo, scotomia, incubus, tremor totius corporis, stridor dentium in somno, extremorum perfrigeratio, muci abundantia, capitis gravedo, &c. *Præsentis*, sensus & motus ablatio, illaque subita & cum stertore, sic à Caro; sine febre & excitatione, sic à Lethargo; cum membrorum laxitate, pulsus plenitudine, & facie colorem retinente, sic à Syncope, & *Vetri suffocatione*, distinguitur.

Causa est angustia sinuum & pororum cerebri, præcipuè basios & retis admirabilis, quatenus spirituum interclusionem efficit. Unde autem ista oriatur, in Differentiis dicemus.

Curatio est *Nulla*, si à difficili respiratione sudor superveniat. si statim obmutescentes & stertentes, febris acuta, quæ materiam pituitosam & spiritum flatulentum attenuet & dissolvat, non apprehendat. Terminatur in paralyfin. *Respicit* 1. *Præservacionem*, quæ antecedentem causam præcaverit & tollit, ac pro ratione Differentiarum variat. II. *Curationem in specie dictam*, quæ Incipienda, cum prognostico, Explorata vitâ, vel per candelam accensam, fenestris clausis, naribus admotam; vel per speculum tersum ori appositum. *Peragenda* 1. *Ægri* commoda ut facilius aërem attrahat locatione; levi, ne materia in corpore fundatur, concussione; & partium extremarum sale & aceto frictione. 2. *Materiæ*, per cucurbitulas capiti impostas, quod unicum est remedium, per fortes clysters & glandes; per venæ cephalicæ vel communis, sine omni mora, per vices, intra tamen paucas horas, sectionem; per venarum jugularium secundum longitudinem

Dd 3

rudinem apertionem, Revulsione. 3. Aquarum Antapoplecticarum, quibus cerebrum recreatur, materia dissipatur usu.

Differentiæ Apoplexiæ sunt variæ.

I. Alia est *Legitima*: de qua in sequentibus Differentiis.

Alia *Nôtha*, quæ Aut ab *Obstructione arteriarum carotidum & venarum jugularium* oritur: de qua vide in Caro. Aut à *Narcoticis vaporibus*, Spiritus sopientibus; ubi locum habet Revulsio, Materiæ foventis Evacuatio, Narcoseos per castoreum cum acetone infrastructio.

II. Alia est ab *Obstructione* basios cerebri, quæ fit 1. Aut à *materia pituitosa, & crassa*, vel calore liquata, vel frigore in meatu cerebri expressa. *Cognoscitur* ex indiciiis intemperiei frigida; *Oritur* ab iisdem causis. *Curatur* 1. *Materia peccantis evacuatione*, per *Vena-sectionem*, vel illius succedanea. per *Purgationem* validiorem. per *Errhina*, & sternutatoria, forma pulveris indita, ex quibus Bartoleti Nasipurgium laudatur. per linguæ & palati, Theriacâ vel sinapi semine in vino forti cocto, frictiones. per *Cauteria* & fontanellarum excitationem. Vomitoria hic locum non habent. 2. *Cerebri corroboratione*, per Aquas Cephalicas, Spiritus Cerasorum nigrorum. Essentias Rorismarini, salviæ, Balsamos majoranæ, succini, Rutæ, &c. II. Aut à *Vaporibus crassis*, cum quibus eodem modo procedendi debet.

Alia à *Compressione*, quæ fit, 1. Aut à *causis violentis*, ut concussione, ictu, vulnere: de quibus supra. II. Aut ab *Humoribus frigidis & humidis*, in cerebro accumulatis, continua irrigatione Cerebri molem molliorem laxioremque reddentibus: de quibus in hujus differentia superiore membro. III. Aut à *plegmonode diathesi*, seu sanguine copioso affatim in princi-

principium animalis incumbente. *Cognoscitur* ex indiciiis plethoræ, aliqua consueta evacuatio supprimitur. *Oritur* ab iisdem causis. *Curatur*, pro-ut illa quæ à pituitæ fit obstructione. Sanguis ramen copiosius mitti potest.

III. Alia est Apoplexia *Levis*, quæ in paralyfin alterius lateris ferè definit, & in qua respiratio aliquem ordinem servat.

Alia est *Vehemens*, in qua respiratio est violenta, inæqualis, inordinata ac intermittens.

Alia est *Fortis*, in qua respiratio est violenta, stertor auditur, & spuma apparet, quæ pauca est, si ab ipsa pulmonum humiditate ob vehementissimam cordis compressionem excitatur; multa, si ex pituitoso humore flatu repleto, oritur.

Alia est *Fortissima*, in qua respiratio ad sensum aboletur.

CAPUT VIII.

De Symptomatibus Excretorum.

ARTICULUS UNICUS.

De Catarrho.

*S*YMPtoma Excretorum est *Catarrhus*, qui nihil aliud est, quàm humoris excrementitii, ob lesam cerebri coctionem geniti, de capite in subjectas partes defluxus, ab intemperie, vel nimia repletionem expultricem irritante, procedens.

Signa sunt, *Imminentis*, Capitis gravedo, Oculorum hebetudo, sensuum torpor, sternutatio, &c. *Præsentis*, sensus destillantis humoris, tussis, sternutatio crebra, &c.

Causa est humor *pituitosus*, aliquando *inspidus*; aliquando *acris, salsus, acidus*, malè coloratus; aliquando *corruptus* & substantiâ peccans: qui 1. *Generatur*, Aut *in cerebro*, ob concoctio-

nem læsam, seu vitio ipsius cerebri, seu vitio alimentum; Aut *alibi*, & eo mittitur præsertim in iis, qui vel cerebrum habent frigidum, ventriculum & epas calida; vel hæc frigida, cerebrum verò calidum. II. *Moverur*, vel ab *expultrice* irritata: Vel à Causis *calefacientibus*, quæ humores attenuant, & vias rarefaciunt: Vel à Causis *frigescentibus*, quæ aut humores in cerebro exprimunt; aut fuliginibus retentis & aucto calore liquant. Vel à Causis *concutientibus*, quæ cerebrum validè movent. III. *Defluit*, ratione *Termini à quo*. Aut è *partibus sub calvariâ* positis, cerebri potissimum ventriculis; Aut à *partibus capitis extra calvariâ*, potissimum sub Cute verticis, quo venarum per faciem & tempora in caput irrepentium extrema desinunt: ratione *Termini ad quem*. Aut ad *partes internas*, pulmones, nares, ventriculum, &c. Aut ad *externas*, non tantum inter cutem & carnem; sed etiam per venas & arterias, ac musculorum, venarum, & nervorum continuitatem.

Curatio est Difficilior, si catarrhi sunt frequentiores & graviores. si cum impetu ruunt. si senes invadunt. si cum dolore capitis junguntur. *Respicit* I. *Materiam genitam*, quæ evacuanda. Ne amplius generetur, præcavendum, & partis suppeditantis dispositio corrigenda. II. *Materiam fluentem*, quæ revellenda, intercipienda, & pars recipiens roboranda. Plura in Differentiis.

Dividitur Catarrhus tripliciter præcipuè.

I. Alius est ab *Humore frigido & humido*, coque I. Vel *Copioso*, & cum majore impetu ruente: Tum venæ *externæ cubiti* sectio adhibenda, ne à reliquo corpore affluat. Vel *paucos*, nec cum impetu ruente: Tum in senili præsertim ætate, venæ sectione superfedendum. 2. Vel *Tenui*, & aquoso. Tum præparandum moderatè incrassantibus, ut decocto

Thuris,

Thuris, mastiches, Betonica, Nucis moschata: purgandum, ne materia agiteretur, lenioribus, *Manna, Mechocanna*: particulariter evacuandum per Errhina, si materia *ad pectus & ventriculum fuit*; per Garisimos & Apophlegmatismos, si *ad oculos & nares*; omnia ita disposita, ut impetum catarrhi fiant: Catarrhus exsiccandus, & caput roborandum, Rotulis ex *floribus sulfuris, succino pulverizato*, sacculo implicato, in Spiritu vini malvatici calefacto, olei succini guttis aliquot asperso, & naribus ac temporibus eodem illitis, vertici applicato. radic. chinæ, sassafras &c. decocto. Vel *Crasso*, Tum præparandum Calefacientibus & attenuantibus, decocto *hyssopi, Ruta, Oxymelle simplici, scillitico*. purgandum *Agarico*, Extr. pillularum *Cochiarum*. Evacuandum particulariter, ubi inter Errhina, *semen nigella Romana* pulverizatum, & cum aqua majoranæ evola manus in nares attractum. Caput roborandum, ubi optima, *Aqua serpilli* cum vino destillata. *Hartman. Vinum medicatum* ejusdem.

Alius est ab *Humore Calido*, qui I. Tollendus venæ sectione, aut cucurbitulis, ne capite calente plus attrahatur. 2. *Præparandus* refrigerantibus Cephalicis, & modicè adstringentibus. 3. *Evacuandas* Rhabbaro, &c. 4. *Procedendum*, ut superius.

II. Alius est *cum impetu ruens*, qui præter diversiones & alia jam exposita, *interceptionem* per medicamenta sistentia & incrassantia, post cenam, sub ingressu lecti exhibenda, non expectata concoctione, reposcit. Talia sunt, *Theriaca recens*, Bolus *Armenus* ruber & levis, *Ossa cranii humani* combusta. Laudanum *Opiatum*. Pillulæ de *Cynoglossa, Asajereth, Arabica, Wieri*, ex Styrcis calam. succi Liquirit. *Thuris, Myrrhæ, Opii ana dr. f. Croci scr. j.* cum f. q. papav. rhæad. compositæ. Trochisci de

De 5

papav.

papav. Mynsichti. Si humor salus, *spica* est addenda, & in *Asthmaticis* suffitus vitandi. Per *Vigiliis*, quod in pectus influxit, *evacuandum* est.

Alius est *Suffocativus*, qui magno impetu ad pulmones & cor fluit. Huic subito succurrendum, *Revulsionibus* per clysteres, frictiones, Emplastror. Catarrhum suspendentium rasis capillis applicationes, Narium balsamo succini inunctiones, suffumigia, &c. Vomitu nihil putatur esse praesentius, quia etiam illa quae pulmonum bronchiis infarcta sunt, extundit.

III. Alius est à materia in cerebro vitio ejusdem collecta.

Alius est materia, quae cerebro, seu à ventriculo frigidior, & Epate calidior, seu ab aliis visceribus communicatur. In hujus curatione, respiciendae sunt partes mandantes, & illis providendum est. Qui verò Catarrhis frequentioribus sunt obnoxii, singulis mensibus paulò ante novilunium corpus leniter purgare debent, praesertim si iis alvus sicciore est. Virum Adriani Papae, quod contra Catarrhos vehementer laudatur, ex *Cort. myrob. omn. cum nucl. prius exsiccat. ana dr. iij. Cinnam. dr. j. caryophyll. galang. cubebar. cardam. gran. parad. muscat. ana ser. f. rosat. rubr. siccat. dr. ij. flor. anthos. lavend. ana dr. f. contus. & ad septem vini mensuras mistis, componitur.*

TITULUS III.

De Oculorum morbis.

CAPUT I.

De Palpebrarum affectibus.

Si affectus cerebri absolvimus; Oculorum morbis, vel partes eum ambientes, vel partes constituentes, vel

vel totum oculi globum tangunt. Ambiant Oculum Palpebra, Cilia, Caro angularis.

Palpebrarum vitia sunt.

I. *Tegxwv*, seu internae palpebrarum partis asperitudo. *Cognoscitur* ex rubore, pruritu, & milii granorum veluti eminentia. *Oritur* ab humore adusto, mordace & salso: saepe à collyriis acrioribus. *Curatur* Corporis evacuatione. Materiae per repercutientia aversione. Topicorum emollientium primo & acrimoniam temperantium, mox abstergentium, ut *aloës in aqua rosarum, myrrha in lacte muliebri*, dissolutarum applicatione; quae interdum intermitteri debent, ne vim suam fortius oculis imprimant. Palpebrae inversae ad sanguinis prorruptionem, saccharo Cando frictione. *Dividitur* dupliciter. I. In *Δασύτητι*, in qua palpebrae duntaxat rubent, asperae sunt & pruriunt. *Σύκωσις*, in qua quasi grana ficus eminent. *Τύλωσις*, in qua pars exulcerata scissuram & callositatem contrahit. & *Ψευδοφθάλμιον*, scabiem, quae totam palpebram, praesertim versus oculorum angulos afficit, & universalibus praemissis, linimento rosato, adjecto pauxillo tutiae praeparatae, curatur. II. In illam quae *A sanguine*, in qua minor pruritus. *A Bile*, in qua pustulae parvae. *A Pituita salsa*, ex qua plus serosi humoris exit. *A Bile atra*, in qua quod effluit lividum est.

II. *Εμψύχησις*, seu tumor palpebrarum; qui fit Aut à causis externis, nempe Aranei, vespa, apis vel urticae ictu. Tum apis contrita imponenda. Theriaca, & succus plantaginis illinenda. Aut Internis, nempe, *Humore calido*, ubi Ophthalmicum Rhasis locum habet. *Aguoso & seroso*, in febribus diuturnis, vigiliis, cachexia; ubi fomenta ex decocto emolliente & dissipante recte adhibentur.

III. *Coalitus*, cum palpebrae vel inter se, vel cum alba aut cornea aut utraque oculi tunica coalescunt.

lescunt. *Curatur Difficulter*, si tota coaluit. *Nunquam* ferè, si cum cornea simul concrevit. *Facilius*, si extremitate solum oculo hærescit. si annatæ saltem agglutinatur. *Oritur* vel ab *Ulcere* negligenter curato, in quo, sanescendo, quod diduci potuit, agglutinatur. Ubi sectio locum habet. Vel à *Pituitosa & viscida materia* ad palpebras affluente; ubi *Revulsio* per vesicatoria, & *Repulsio*.

I V. *Cancer* sive exulceratus, sive non: de quo libro secundo.

V. *Inversio*, quæ, Vel *ἐκτροπή* inferioris nimirum palpebræ, *Ortum* 1. A *Resolutione*, seu paralyfi: de qua alibi vide. 2. A *carnis* in parte interna *incremento*: quod vel medicamentis absumendum, vel sectione tollendum. 3. A *vulneris* aut *ulceris mala curatione*: ubi etiam incisio locum habet. Vel *λαγρόθυρον*, palpebræ nempe superioris. *Ortum*, A *mala conformatione*, quæ curæ non subjacet. 2. A *consuetudine* puerorum in cunis sursum versus respicientium; quæ pannis nigris cunis circa caput obvolutis præcavetur. 3. A *convulsione* & contractione, quæ emollientia ophthalmica exigit. 4. A *vulnere* vel *ulcere malè curato*, ubi vel cicatrix emollienda, vel manuum opera adhibenda.

VI. *Υδαρίς* seu *Aquila*, seu substantiæ unctuosæ in palpebra superiore incrementum, humorem antelucanis præsertim horis perpetuò fundens. *Oritur* præcipuè in pueris, ex seroso humore, intra palpebrarum membranas, in quarum medio unctuosæ substantia, illapso. Vel est *Recens*, & jejuna salivâ interdum tollitur. Vel *Diuturna* ac peculiari membrana inclusa, & manus operam requirit.

C A

CAPUT II.

De Ciliorum vitis.

Ciliorum vitia sunt:

I. *Hordeolum*, seu tuberculum, quod suppurascens simile est grano hordei. *Oritur* ab humore pituitoso, crasso, cum sanguine misto. *Tollitur* hordeo jejuno ventriculo masticato, applicato, vel corpore muscæ capite abjecto, si eo fricetur. si suppurari non potest, *secetur*.

II. *Grando* seu tuberculum rotundum, translucentum, huc atque illuc mobile. *Oritur* à materia dura & lapidescente. *Emolliendum* est ammoniacò in aceto dissoluta, cum adipe gallinæ, vel terebinthina & cera mixto.

III. *Μαδάρισις*, seu pilorum defluvium, quod plerumque post febres malignas infestat. Vide l. 2. Si simul adest crassities, callositas, & rubor, palpebræque turgent, & lucidæ fiunt, vocatur *πιδάρισις*.

IV. *Τερχίσις*, cum pili præternaturales sub pilis naturalibus exorti, & intrò nuentes, tunicas oculorum pungunt. *Oritur* ab humoribus ad palpebrarum extremitates fluentibus, seu ob tumorem diuturnum, seu ob deligationem. *Curatur* 1. *Evulsione* totali, quam inunctio sanguinis viridium ranarum excipiat. 2. *Corrosione*, per medicamenta corrosiva cautè inuncta. 3. *Sectione*: de qua Practici.

V. *Φαλαγγισις*, cum palpebris intrò vergentibus, pili non apparent, nisi attollantur. *Oritur* vel ab humoribus pituitosis palpebram degravantibus: vel à *Cartilaginis exsiccatione*, & hanc sequente cutis versus cilia depressione. *Curatio* apud Authores.

VI. *Phthiriasis*, seu pediculorum proventus, in iis qui lotionibus non utuntur, & victu pravo gaudent, à sordibus exortus; interdum per contagium existens.

stens. *Curanda* tempestivè, ne acres fluxiones concitet. Ablutio palpebrarum decocto betæ & staphisagriæ laudatur.

CAPUT III.

De Carnis angularis vitiis.

Carnis angularis affectus sunt.

I. *Rhyas*, seu carunculae secundum majorem oculi angulum, tumminutio, ex quo lacrymæ involuntariæ effluunt. *Oritur*, vel ab *alimenti defectu*: Vel à *Corrosione*, seu à medicamentis corrosivis, seu ab humoris acris affluxu, ut fit post epiphoram, variolos, ulcera profunda: vel ab *Incisione*, quæ non potest curari.

II. *Encanthis*, seu carunculae secundum majorem oculi angulum incrementum. *Oritur*, vel ex mala *pterygiorum* curatione, vel ex nimio *alimenti* affluxu. si magnum & antiquum malum est, nonnisi chirurgià curatur.

III. *Ægilops* est tuberculum, inter majorem oculi canthum, & nasi radicem ortum. *Oritur* à materia certa ad oculi angulum depulsa. *Dividitur* variè. 1. In *Acnilopa*, qui est tumor nondum ruptus, & siue inflammatione. provenit ab humore lento, melleo pultaceo, folliculo suo plerumque concluso, & sine soluta unitate afficiente, sectione tollitur. Et *Ægilopa* propriè sic dictum, qui est tumor ruptus, cum inflammatione. *Cognoscitur* ex dolore, colore mutato, & tumoris immobilitate. *Oritur* à sanguine è temporum, frontis vel faciei venis effuso, externa inprimis causa accedente. *Curatur* 1. *Difficiliter*, inprimis, si partes profundas occupet. si ruptus sit ad interna, quia subiecta ossa facile corrumpit. si ad canceri naturam accedat. 2. *Ad modum aliarum inflammationum*. Excipit eum plerumque

rumque *Fistula lacrymalis*, quæ tum propter continuum affluxum, tum propter motum oculi perpetuum, chronicon est plerumque malum. In ejus *curatione*, antequam consolidetur, videndum, utrùm callum contraxerit, & utrùm os corruptum sit; quod asperitas ossis aut sonitus detegit.

CAPUT IV.

De Tunica annatæ morbis.

ARTICULUS I.

De Ophthalmia.

Partes Oculum constituentes, vel sunt Tunicae, *Adnata*, *Cornea*, *Vvea*, & *Aranea*, vel Humores. *Adnatæ* morbi sunt *Ophthalmia*, *Pterygium*, *Panniculus*, & *Hypophagma*: quorum hoc cum cornea commune, illa cum palpebris.

Ophthalmia est annatæ tunica inflammatio, à sanguine acri venulas ipsius distendente, exorta.

Signa sunt Oculorum rubedo, lacrymarum effluxus, dolor, &c.

Causa est Sanguis, qui seu solus, seu ab humoribus aliis castigatus, vel per affluxum, vel per congestionem, allapsus, per venas dispergitur, & eas distendit.

Curatio est Difficilis, si in regionibus & temporibus frigidis oboritur, quia membra stringuntur. si pueros infestat, quia ab imbecilli capite continuè affluit. si dolor diu perseverat, quia materiam, aut erodentem, aut vehementer distendentem, aut suppurantem arguit. si fit per consensum à membranis cerebri, & partibus intra cranium contentis. si grana sordium parva in oculo apparent, quia maturationis tarditatem significant. *Facilius*, si est per consensum ab externis. si lacrymæ sunt copiosiores & mordaciores, quia citius ad finem pervenit. si alvus est cita, quia

quia alvi profluvium ab eâ liberat. *Pervagitur*, secundum methodum aliarum inflammationum. *Notandum in ea*. 1. Venæsectione interdum intra horæ spacium maximas ophthalmias sublatas. 2. Vescicatoria post aures applicata benè revellere. Laudatur *farina Erucæ* in sacculo interpassato, apud Hartman. 3. Errhina, si æger per nares excrementa Capitis evacuare consuevit, & quidem mediocria, exhibenda. 4. Topica, non nisi exactis tribus diebus, & quidem actu tepida, mordacitatis expertia, benè mundata, à proprietate juvantibus castigata, repellentibus; quæ, nec nimis frigida, nec nimis adstringentia, nec nimis siccæ, fronti & collo statim apponi possunt, & Anodynis, quæ si affluxus major metuitur, oculo benè ab initio applicantur, exceptis, applicanda. 2. Lac muliebri singulis horis mutandum, ne diutina mora à calore oculi, acrimoniam contrahat. 3. Opium & Opiata non nisi necessitate urgente adhibenda. 4. Ne suppuratio intus fiat, diligenter cavendum. 5. In Diæta vinum & balneæ in declinatione permittantur. Cataplasma ex *medulla panis triticeï*, & pomi assati, cum lacte muliebri, pauxillo croci & sacchari Saturni, vehementer laudatur. Sic & Aqua ex succi *Canceror. destill.* lb. ii. *Aque Rosarum* lb. i. & Croci metallor. unc. ss. simul infusis: Nec non *Aquar. Euphras. Fœniculi ana unc. v. cum croci metallor. dr. j.* quibus aliquid aquæ Rosarum addi potest. Inter Discutientia etiam locum obtinent *Sarcocolla* lota, & *Tubia vera Arabum*, quæ sine morfu siccant.

Differentia Ophthalmiæ est triplex.

I. Alia est *Todesis*, seu perturbatio, quæ ex eo *Cognoscitur*, quod oculi duntaxat calidiores cum rubore, absque lacrymis copiosis apparent. Oritur à Causis externis, nempe 1. Calore solis, vel igne. Tum Cataplasma superius opponi potest. 2. Dolore

capitis

capitis ex solis æstu contracto. Tum idem locum habet, nisi universalia omnino præcedere debeant. 3. Vento, fumo, pulvere. Tum lacte tepido oculi abluendi, & somnus capiendus. 4. Ictu vel Casu. Tum, sanguis statim mittendus. 5. *Apis, vespe, Crabronum* icu. Tum, repellentia ex albumine ovi, lacte muliebri, &c. imponantur.

Alia est *Ophthalmia vera*, quæ vel à calidis, vel à frigidis causis provenit; cui superius dicta præcipue conveniunt.

Alia est *Χήμωνας*, quando palpebræ quasi invertuntur, nec claudi possunt, albumque supra oculi nigrum intumescit. Hæc validiora remedia exigat.

II. Alia est *Periodica*, quæ intervalla servat, capitis calidis & humidis familiaris est, & oculos tandem in tabem conjicit. Alia est, quæ *Periodos non servat*. Alia *Contagiosa*.

III. Alia est *Humida*: de qua nunc maximè egimus.

Alia *sicca*, in qua exiguus est lacrymarum fluxus, & noctu palpebræ indurantur. Oritur ab humore paucio, salso, & nitroso. Vel est cum pruritu, quæ, si leviter fluunt lacrymæ, vocatur *Ψωροφθαλμία*; si omnino non, & oculi duntaxat sunt rubri, sine tumore, dicitur *ξηροφθαλμία*. Vel *sine pruritu*, & cum duritie palpebræ, nuncupatur *σκληροφθαλμία*. Curatio Methodum superioris sequitur.

ARTICULUS II.

De Ungue oculi, Panno, & Hypophagmate.

I. *Unguis*, seu *πτερυγιον*, & Sagitta, est membranula nervosa, fibrosa & albicans, quæ ab angulis ocularum, majore inprimis, prodit, adnata valide adhærescit: interdum usque ad corneam producitur; sæpe si nimium increseat, pupillam tegit.

E e

Signis

Signis affectus non eget, cum oculis sit expositus. Albedine à carne lacrymali discernitur.

Causa est sanguis, humoribus crassus & lentis permixtus, ex partibus inter cranium & cutem contentis defluens, & scabritiem quandam inferens, quam dum vis nutriendi æqualem reddere nititur, incrementum membranæ præter naturam producit.

Curatio reposcit I. *Universalium præmissionem*. II. *Unguis*, post decocti vel aquæ distillatæ temperatæ solum, *extersionem*. Inter Medicamenta valent, pulvis ex *ovorum* testis paratus, & oculis inspersus Lapis *medicamentosus Crollii* in aqua rosacea, & Euphrasie. Specificum *Lucii piscis* Hartmanni. Aqua *albuminis ovorum* ejusdem, & alia: quæ si acria sunt, *tragacanthâ* & hujuscemodi castigari debent, & ne cornea tangatur, caveri. III. *Chirurgiam*: de qua apud Auctores. IV. *Diatam*, in qua à vino & cibis vaporosis abstinendum.

Dividitur multifariam.

I. Alius est *Albicans*, Alius ad *nigredinem vergens*, qui remediis tolli non potest. II. Alius *Recens*, qui facile discuti potest. Alius *Invetatus*, cui si crassitudo accesserit, excidi debet: interdum tamen tam pertinaciter annatæ adhæret, ut neque per Chirurgiam absque oculi jactura auferri possit. III. Alius est, qui ad *Corneam duntaxat* producit. Alius, qui ad *pupillam usque* protenditur, & si tollatur, oculum quidem à fluxionibus liberat: sed cicatrice relicta, visum impedit. IV. Alius est *Cancerosus* & *putridus*, qui curationem non admittit. Alius *Non*.

II. *Pannus* est quiddam instar panniculi rubrum, à sanguinis exuberantia, in venis oculi exterioribus, exortum.

Signis opus non est. Apparet tanquam tela carnosæ in superficie præcipue annatæ, cum pruritu, 10,

re, oculorum à lumine offensione, visione obscura vel ablata.

Causa est sanguis ad oculos derivatus, vel solus vel mixtus, vel per viam fluxionis vel congestionis: vel per vasa externa, & tum frons nonnihil tumet; vel per interna, tum dolor ad radices oculorum tendit.

Curatio perficitur I. *Universalium usu*. II. *Absterfione* per supradicta. III. *Chirurgia*: de qua vide Auctores.

III. *Hypophagma*, seu *Sugillatio*, est macula rubra seu livida, à sanguine ex venis apertis effuso, exorta, cornea communis.

Signis opus non est, quia malum visu deprehenditur.

Causa est, quicquid venas aperire potest, sive id externum, sive internum: ut in Differentiis videbitur.

Curatio est Facilis in principio. Peragitur, præmissis Universalibus, si major est affluxus, per *Discutientia*, leniora primum, & adstringentibus castigata; post validiora, & acrimonie, ne plus sanguinis alliciat, expertia.

Dividitur trifariam.

I. Aliud est à *Causis externis*, ictu, clamore, tubarum inflatione: in qua ad *Topica* statim confugiendum, nempe Decoctum *flor. meliloti, rosar. cum sem. fanigraci*, Collyrium ex *sanguinis columbar. ex alis detracti* dr. ii. *Lactis mulieris temper.* unc. f. *Thuris* scrup. j. compositum. Aliud à *Causis internis*, nempe, vel *Sanguinis copia*, ubi venæ sectio non omitterenda: vel *eiusdem fervore*, Tum macula ad Citrinum vergit. Inflammationi occurrendum per *albumen ovor. concussum*, Si pus adest, idem collyrio ex *mucag. fanigr. cum aqua feniculi & melle rosaceo*, extenuandum.

II. Aliud est *Recens*, in quo macula est rubri coloris. Præter superiora topica, *summitates hyssopi* in aqua simplici coctæ, & in nodulo applicatæ, ad discutendum valent. Aliud *Invetratum*, in quo macula est livida. Convenit collyrium ex succ. *Chalidonia major.* & *Cardui bened. ana. unc. f. pingued. quastula avis liquef. dr. ii. myrrha scr. f. confectum*; nec non *Radix sigilli Salomonis* conquassata, &c.

III. Aliud est, quando sanguis vel in annatam, vel in corneam ejicitur. Aliud, quando in utramque. Tum objecta omnia colorem ad rubrum vergentem præ se ferunt.

CAPUT V.

De Morbis Corneæ.

ARTICULUS I.

De Crassitie, Nebula, & Albugine.

Morbi Corneæ sunt, *Crassities, Nebula, Albugo, Pustula, Ulcera, Vulnere, & Dolor.*

I. *Crassities* est substantia ejus exsiccatio & corrugatio. Cognoscitur exinde, quod nebula quasi in superficie appareat, & ægri quasi per fumum videant. Oritur vel à frigidorum incauta applicatione, post Ophthalmiam præsertim. Vel ab humoribus crassis sese insinuantibus. In Curatione laudatur, *Chelidonia succus* expressus, & oculis guttatim instillatus.

II. *Nebula* est color corneæ, ab humore subtili illo lapsus mutatus. Valet in ea pulvis *Margaritarum* præparat. in aqua rosar. & fœniculi. *Cataplasma* Plateri apud. l. 2. Obs. 19.

III. *Albugo*, seu *Leucoma*, est macula alba, corneam ita densam reddens, ut speciebus visibilibus transire denegetur. Oritur Vel à Cicatrice, post vulnus

vulnus vel ulcus, Tum Curatione est Difficilis in senibus, facilius in pueris. Peragitur 1. Emollientium applicatione. 2. Absterfione, ubi locum habet Aqua flor. *Roris marini* oculis instillata. *Pinguedo mustela piscis.* Vel à *pituita* inter ejus lamina collecta. Tum facilius curatur. Valet Collyrium, quod ex *lapid. calam. ter usti ac bis in vini aceto extincti scr. j. Myrrha, plumbi usti ac loti ana scr. f. Croci Oriental. gr. v. Opii gr. vvi. Aeris usti scr. iv. Decocti sano. gr. Vnc. j.* supra porphyritem contritis, paratur.

ARTICULUS II.

De Pustulis & Ulceribus Corneæ.

I. **P**ustulae sunt tubercula, annata & corneæ tunica communia. Cognoscuntur ipso visu, magnitudine granum milii æquant. nigredine, exacta rotunditate, & quod in fundo circulum album non exhibeant, à proclidentia uveæ distinguuntur. Oriuntur ab humore acri & seroso, tunicas attollente. Curantur facilius, si sunt in annata: difficilior, si sunt juxta pupillam: nulla ratione, si cornea in partem internam rumpitur. Ad modum Ophthalmiæ Dividuntur dupliciter. I. Aliæ sunt cum inflammatione, quæ prout aliæ inflammationes curantur. *saccharum saturni* cum aqua *Euphras* optimum est. Aliæ ab Humore aquoso, quæ exsiccantia, ut *Tuthiam, Lapidem calaminarem*, &c. exposcunt. II. Aliæ sunt superficiales, & *ἐπιφωρμα* dictæ, quæ nigriores apparent. Aliæ profundiores sub secunda vel tertia lamina, & *ἐνὶ ὕφωτι* vocatæ, quæ propter corneæ albedinem, albæ magis videntur, & cum totam corneam erodere possint, periculosa sunt.

II. *Ulcera* corneæ interdum ab externis, interdum ab internis seu assluentibus, seu congestis oriuntur.

tur; & variis nominibus pro varietate circumstantiarum insigniuntur. *βόπιος* dicitur, quod cavum angustum & durum est. *μεγίστος*, quod latius, sed minus profundum. *ἄγρεον*, quod in iridis externo circulo exortum, circa externam iridis partem rubicundum, circa internam candidum, ambientia etiam comprehendit. Circa *curationem* observandum, medicamenta fronti etiam & temporibus, ut influxus impediatur, imponi, & lenia ac temperata esse debere. Laudatur *Aqua Ophthalmica Mynsichti*.

ARTICULUS III.

De Vulneribus Corneæ, & Dolore Oculorum.

I. **V**ulnera corneæ in genere, exigunt 1. *Evacuationem*, per venæsectionem præsertim. 2. *Repulsionem*, ut inflammatio prohibeatur, & dolor leniatur, per Cataplasmata super palpebram duntaxat imposita, ut oculus & palpebræ aperiri possint. 3. *Consolidationem*. Laudatur vehementer pars albuminis ovi, Germanis *das Eichen* / Italis *Galatura* dicta, conquassata; nec non Oleum rubrum Saturni. *Differentias* si spectes, 1. *Aliquando* sola cornea vulneratur. *Aliquando* cum ea & palpebræ: ubi cavendum, ne cum oculo agglutinentur. 2. *Aliquando* vulnera non tam altè penetrant. *Aliquando* cornea rumpitur, & humor aqueus effluit, quod & in ulceribus accidit. Tum, si vulnus sit angustum, minus periculi habet; si uvea procedit, incurabile est. *Curatio* eadem, quæ vulnerris & ulceris oculorum.

II. *Dolor oculorum*, oculis præcipuè ob tunicas externas convenit. *Cognoscitur* ex relatione ægri. *Oritur* à causis continui solutionem excitantibus. *Curatur* causis sublatis. *Mitigatur* albumine ovorum.

rum. pulpa pomi assi cum saccharo, Camphora, Croco, aqua rosarum, & lacte muliebri. Ab *Opiatis* cavendum.

CAPUT VI.

De Uveæ morbis.

ARTICULUS I.

De Uveæ procidentia, Pupillæ dilatatione, & angustia.

Uveæ in oculo tunicæ morbi sunt, *Uvea procidentia*, *Pupilla dilatatio*, *Ejusdem angustia*, & *suffusio*.

I. *Uvea procidit*, quando cornea unitas solvitur sive per vulnera, sive per ulcera. *Cognoscitur* & à pustulis. *Discernitur* exinde, quod pars, quæ procidit, aut nigra aut cærulea est, & in fundo circulum album, qui à labiis corneæ erosis est, exhibeat, & pupilla parte sui quadam divulsa appareat. *Curatur* medicamentis sine asperitate adstringentibus; & si his non cedit, ferro. *Differentias* vide apud *Eginetam*.

II. *Pupilla dilatatio*, *μυδιασις*, & *πλυνγεζα* dicta, est quando pupilla præter naturam versus iridis circulum ampliatur. *Cognoscitur* ex eo, quod ægri seu ob nimie externi luminis copie in oculos incursum, seu obliquoium radiorum, qui perpendicularibus debiliores casum minus acutè videant. cum aliquid intueri volunt, oculos nonnihil comprimant. & oculo uno clauso, alterius pupilla dilatarì non possit. *Oritur* à tensione Uveæ, cujus illa foramen est, seu ob externas seu ob internas causas. *Curatio* in *Differentiis* videnda. *Dividitur* trifariam. 1. *Alia* est *Nativa*, & à primo ortu contracta. *Alia* *Adventitia*. 2. *Alia* à Causis externis, ut percussione, casu ab alto, &c. quæ si sit absque inflammatione,

facile curatur; si cum ruptura Uveæ, non item. *Alia* à Causis internis, quæ insequente differentia exprimuntur. III. *Alia* à siccitate uveam tendente, ut in coriis perforatis fit, quæ difficulter curatur. Optimum est lac caprinum, si ei oculus immergatur. *Alia* ab Humiditate, cujus curatio faciliior, nisi si post capitis dolorem vehementem acciderit. Perficitur præmissis Universalibus, missione sanguinis ex venis temporum & venis in angulis oculorum, cucurbitularum in occipitio, & hirudinem post aures applicatione. Resolventium, (aqua salita laudatur) & leviter adstringentium usu. *Alia* à Flatibus, quod tubicinibus accidit, qui discutiendi sunt.

III. *Pupilla angustia seu uva serena est, quando illa angustior, quàm naturaliter fieri debebat, redditur. Cognoscitur* ex eo, quod omnia majora intuenti ægro videantur. quod species visibiles per foramen angustius illapsæ, in ampliore spacio versus crystallinum dilatentur. *Oritur* à Contractione Uveæ. *Curatur* pro ratione Differentiarum. *Dividitur* pro diversitate causarum. *Alia* est à nimia humiditate, uveam ab ambitu versus centrum contrahente, cui siccantia, ut Ruta, Chelidonia, remedio. *Alia* ab humoris aquei defectu. Tum æger melius videbit in obscuro, quod species visibiles promptius crystallino occurrant. lacte & aqua dulci, Capiti admotis, alimentum attrahendum. *Alia* à pauciore Spiritus visivi ad pupillam affluxu.

ARTICULUS II.

De Suffusione.

Suffusio seu uva serena est pupilla ab humore ea parte in oculo consistente, visionem impediens, obstructio.

Signa pro ratione principii, augmenti & perfectioris,

nis, diversa sunt, & separatim in differentis exponuntur.

Causa, humor, seu sincerus, seu mistus; seu ibidem collectus, seu per venas tunicarum, uveam tunicam, vel nervos transmissus. *Colligitur* inprimis, in magnis & prominentibus oculis: quia in magno spacio virtus diffusa infirmior est, & viarum laxitas facilem aditum præbet.

Curatio est Difficilis, si præsertim ex febre, aut vehementi capitis dolore accidit. si in pueros vel senes incidit. *Nulla*, si suffusio est nigra. si æger ingenium non cernit. *Perficitur* I. *Materie obstructis educatione* per purgantia phlegmagoga, hiecam præsertim & electuarium diacarthamum, quibus præmitti præparantia possunt. II. *Ejusdem per cucurbitas, vesicatoria, &c. revulsione.* III. *Ejusdem per Topica emollientibus permista Discussione, & Oculorum extersione.* Laudatur *Aqua Ioëlis*, Remedium Bovii ex fellis galli unc. ss. sanguinis muris dr. iij. s. cum lacte muliebri, collyrii instar, compositum. Vel *Aqua stercoris humani elambicata, cum felle mustelæ & leporis, saccharo candi rosato, & margaritis præparatis.* IV. *Chirurgia*: de qua authores videri debent.

Differentie suffusionis sunt variae.

I. *Ratione situs.* 1. *Alia* est in centro pupillæ, quæ fenestris quasi pertusas res objectas exhibet, & acu, ne rota pupilla impleatur, tentanda non est. 2. *Alia* residet inter Uveam & Corneam, & tum pupilla intensius obtenebrata conspicitur, & pupilla ob humorem distendentem necessario dilatatur. 3. *Alia* inter Uveam & Crystallinum, & tum opposita apparent. 4. *Alia* in profundiore loco sita est; & tum pupilla angusta est. *Alia* minus profundo; & tum amplior est.

II. *Ratione graduum*, *Alia* est Incipiens, & tum

Ec;

tum culices aut caliginosa quædam obversantur. *Alia* Aucta; & tum pupillæ color marinus apparet, vel est similis aëri nebulis repleto. *Alia* Perfecta; in qua æger non cernit, pupillæque albus color apparet.

III. *Ratione cause.* 1. *Alia* est à materia tenui, & fluxa, qualis in principio esse solet, & tum, plethora præsentē, venæ-sectio institui potest. *Alia* crassa lenta & tenax; & tum à Venæ-sectione abstinendum. 2. *Alia* est specie aëris puri, argenti, gypsum, margaritarum, quæ spem aliquam curationis relinquit. *Alia* Nigra, quæ ne acu quidem curari potest. *Alia* Viridis, quæ etiam insanabilis est.

IV. *Alia* est *Vera*, de qua hæc tenus dicta sumi debent, quæ alterum duntaxat oculorum occupat; aut si utrumque, non simul, nec similiter, & cuius Symptomata sunt continua. *Alia* *Notha*, quæ se contrario modo habet, à vapore ex inferioribus adscendente oritur. Remoto affectu tollitur.

CAPUT VII.

De Humorum in oculis vitiis.

Humores Oculos cum tunicis constituentes sunt tres, *Aqueus* nempe, *CrySTALLINUS*, & *Vitreus*.

I. *Aquei vitia* sunt præcipue quatuor. I. *Imminutio*, ob calorem, siccitatem, nimiam évacuationem, quæ quia cum totius corporis siccitate conjungitur, difficulter curatur. II. *Effusio*, quod in ruptura Corneæ fit, & tum vulnus vel ulcus præcessit. Cornea tunica subsidet. Regignitur interdum hic humor sponte. III. *Crassities* ab humorum vel vaporum crassorum admittance exorta; & tum humor non tam clarus, ut solet, apparet, imagines oculis obversantur, &c. IV. *Obscuratio*, & *alienus*

alienus color, ob humores admistos. visu ipso hæc cognoscuntur.

II. *Humoris CrySTALLINI* vitia sunt præcipue ista. I. *Glaucoma*, quando iste in glaucum colorem mutatur. *Cognoscitur* ex eo, quod circa pupillam insignis & profunda apparet albedo, & omnia tanquam per fumum & nebulam videntur. *Oritur* ab Exsiccatione, quæ fit vel ob ætatem, vel ob aliam causam. II. *Soliditas* & *obscuritas*, quæ majore illuminatione indiget, Unde *νυκταλωπία*, nocturna cæcitas, quæ laborantes interdum satis vident, occidente sole obscurius, noctu nihil. III. *Situs mutatus*, qui multipliciter accidere solet: 1. *Sursum aut deorsum*, unde dissolvitur incrucciatio opticorum, vel axes pyramidum in duplici plano figuntur, & omnia duplicia apparent. 2. *Ad latera*, & tum res videntur magis dextræ aut sinistræ, quàm sunt. 3. *Versus medium & Centrum*. Unde propinqua rectè, remotiora non satis distinctè videntur. 4. *Vltra medium & centrum* versus opticum; & tum, quæ cernere cupiunt, oculis necessariò adhibent. 5. *Versus pupillam*; & tum, res ab oculis remotas rectius discernunt.

III. *Humoris vitrei* vitia sunt, I. *Augmentum*, quo non solum pupilla dilaturatur magis, sed etiam CrySTALLINUS obumbratur, & spiritus obtunduntur. II. *Diminutio*, unde tunica corrugantur, pupilla contrahitur, & supra crySTALLINUM decidens, spaciūque inter ipsum & tunicas, in qua splendores externi occurrunt, brevius reddens, persimilem gignit affectum eorum, qui nickando solem intuentur. III. *Crassities*, quæ vel ab humoris, vel ab aliene substantiæ permistione venit.

CAPUT VIII.

De morbis oculi globum infestantibus.

Oculi globum infestantes morbi sunt, *Atrophia*, *Procidentia*, *Strabismus*; quibus addi potest ex Symptomatibus, *Visus debilitas*, & *Cacitas*.

I. *Atrophia* est, quando oculi partes contabescunt. *Oritur* præcipuè ab evacuatione & exsiccatione nimia. *Curatur* medicamentis humectantibus, lacte inprimis muliebri imposito.

II. *Procidentia*, quando oculus vel ex sua orbita præter modum eminet; vel etiam ita, ut à palpebris regi nequeat, excidit. *Oritur* à Causis tam externis, ictu, tubarum inflatione, strangulatione, partu laborioso, &c. quàm internis, Musculorum aut nervorum resolutione, Tumore oculum extrudente, &c. *Curatio* respicit 1. Oculi in suam sedem *repositionem*: si fieri non potest, totalem ablationem. 2. *Ejusdem* in sua sede *detentionem*, per fomenta exadstringentibus, rosis nempe, balaustis, & acacia, composita. Nec tamen Venæ-sectionis obliviscendum, & inflammatio repellenda. Si resolutio est in causa, Apoplegmatisimi profunt.

III. *Strabismus* est, quando pupilla à medio declinat, ita ut in una oculi parte plus appareat, quàm in alia. *Oritur*, vel à mala in primo ortu *conformatione*; & tum curari nequit. Vel à *consuetudine*, quod in infantibus viderè est: & tum, larva faciei applicanda, foraminibus ad locum oculorum perforata, ut per ea radii visivi emittantur. Vel à *musculorum convulsione*, aut *resolutione*; & tum morbus præcessit.

IV. *Visus debilitas*, & *Cacitas*, causarum magnitudine saltem differunt. *Oritur* vitio Aut Cerebri, spiritus animales non suppeditantis, unde reliqui sensus plerum-

plerumque afficiuntur: Aut *Spirituum animalium*, qui lucidi, tenues, multi, esse debent: & *Oxydorcicis*, inter quæ sunt, Aqua *Roris marini* cum sale gemmæ, destillationis *Iuniperorum*, *Nux moschata*, *Myrobalani*, *chebula*, &c. roborantur: Aut *nervorum opti-
corum*, qui aut sunt *angusti*, unde *gutta serena*, Germanis *der schwarze stahr*, in qua nullum planè oculorum vitium animadvertitur, nisi quodd pupilla nigrior & amplior appareat; aut *rumpuntur*, aut *contorquentur*. Aut *humorum* & *tunicarum*: de quibus in superioribus sufficienter actum est.

TITULUS IV.

De Aurium morbis.

HAstenus Oculorum morbi fuere: Aurium morbi sunt, *Inflammatio*, *Ulcus*, *Vermes*.

I. *Inflammatio*, seu rumor, *Cognoscitur* ex dolore pulsatili vehementissimo, rubore ad malas & tempora sese extendente: accedunt febris, deliria, motus interdum convulsivi. *Oritur* à sanguine tenui & bilioso, è venulis cerebri in membranas aures elapso. *Curatio* est *Dubia*, propter Symptomatum magnitudinem, inprimis in juvenibus, qui tamen, si septimum diem superarunt, evadere solent: sed & pueris, qui ob sensus acrimoniam minùs dolorem sustinere possunt. *Peragitur*, ut in aliis inflammationibus. hæc modò observentur: 1. *Venam Cephalicam* ad revulsionem secari debere. 2. *Repellentibus* non faciliè utendum; si adhibentur, dolorem lenientibus (ut lacti muliebri & aliis) immiscenda. 3. In suppuratione promovenda, *εὐπρόστατον*, ex *ficibus* in lacte coctis, & cum *axungia* porci tritis, componi. 4. *Adruptionem*, succum *ranunculi* cum quadruplo lactis muliebris facere. *Hirudines* retro aures felicissimè

simè apponi. *Dividitur* in *Profundam*, in qua propter majorum arteriarum compressionem, major est pulsatio; & dolor, ob vicinitatem cerebri vehementior, quæque quod nervus auditorius affectus sit, periculosissima est; & *Minus profundam*, quæ opposito modo se habet.

II. *Ulcus*, quod *Cognoscitur* ex sanie & sanguine egrediente. *Oritur* à rebus vel pus fundentibus, vel acrimoniâ suâ erodentibus. *Curatur*, quemadmodum alia ulcera. *Eluitur* vino calente, in quo rosæ & folia hederæ decocta. *Detergitur* vel vino, in quo betonica effervuit; vel aqua mellis in qua radix hellebori albi prius ebullit. *Dividitur* multifariam; I. *Aliud* est abscessu rupto post inflammationem. *Aliud* à mordacibus humoribus acrimoniâ suâ aurem exulcerantibus. *Aliud* à sordibus aurium diutius coercitis. *Aliud* ab acri liquore forinsecus in aurem illapso, & mordendo ulcus efficiente, in quorum curatione ad suas causas respiciendum est. II. *Aliud* est Recens, in quo, cessantibus ad saniei effluxum capitis dolore, & sensuum perturbatione, spes curationis affulget. *Aliud* inveteratum, quod & in fistulam faciliè degenerat, & crustam contrahit. III. *Aliud* est Fistulosum, quod ex ulceris antiquitate, saniei virulentia, & carnis callositate cognoscitur, cui vinum in quo thus vel helleborus albus decocta prodest. *Aliud* non item. IV. *Aliquando* sanies ex auribus, ab apostemate in cerebro rupto, effluit, & tum, magna primò copia exit, dein paulatim emittitur; donec omnis absumatur; signa inflammationis Cerebri præcesserunt, & cura ad hanc obvertenda. *Aliquando* absque apostemate, in ejus venis genita sanies emittitur; & tum, semel exhausta iterum coarceatur, profunt purgationes capitis. *Vrina asini vel pueri*, in qua rasura ligni Guajacini maduit, bene immittitur. V. *Aliquando* sanie cessante dolor omnis evanescit.

evanescit. *Aliquando*, dolor sanie aut grumo sanguinis in profundo auris relicto, permanet, & tum *mundificandum* mulso cum felle tauri, oleo amygdalarum amararum, aceto tepefacto cum melle optimo, in sanguinis inprimis grumo, &c.

III. *Vermes*, qui se dolore corrosivo, inquietudine, & aliis conjecturis produnt. Quomodo *extra* hi debeant, vide Practicos. *Necantur*, Unguento ex *axungia capii*, & oleo coryli cum gr. ij. Mercurii dulcis misto, & in orificio aurium cum bombace imposito. Decocto *Cannabis* instillato.

IV. *Aqua auri* illapsa oleo infuso educitur.

TITULUS V.

De Aurium symptomatibus.

CAPUT I.

De Dolore, & Surditate.

Symptomata Aurium sunt, *Dolor*, *Surditas*, *Tinnitus*, & *Obauditio*.

Dolor signis non indiget: in infantibus, si pars tangatur, ploratu exploratur. *Oritur* à causis membranas, auris cavitatem vestientes, & sensu exquisito præditas, distendentibus. *Curatio* ejus est *Dubia Spei*, si juvenes infestat. si in senibus recidivas patitur. si in profundo hæreat. *Perficitur* Anodynis, & si ingens est, stupefacientibus. Inter hæc sunt *folia Tabaci* viridia, aut saltem aqua propria vel rutæ humectata & applicata, *Laudani opii* gr. iij. Quæ extra applicantur, lenia esse debent, ne dolor exacerbetur.

Differentia à causis præcipuè sumuntur.

I. *Alius* est ab Externis, ut re illapsa, vulnere, &c. quæ ex ægri relatione colliguntur. *Alius* ab Internis,

nis, nempe. *Intemperie* vel sine, vel cum materia, vel frigida, in qua *succus caparum* cum liquore aliquo valet; vel calida, in qua *lac muliebre* cum succis herbarum refrigerantium prodest. *Flatu*, ad quem ea sequuntur, quæ de sonitu dicemus. *Inflammatione*, de qua in superioribus. *Vlcere & sanie*, de quibus ibidem.

Surditas est auditus abolitio, magnitudine duntaxat causæ à *βασανγία* seu *ῥαρυμφώσις*, qua homo sonos ex justa distantia difficulter percipit, differens. *Oritur*, illorum, quæ ad auditum perficiendum concurrunt, vitio. I. *Cerebri*, quod Spiritus animales vel non gignit, vel non transmittit, ob peculiarem aliquem morbum. II. *Nervi auditorii*, qui eos non defert, seu ob vitium conformationis; hinc plerumque surdi muti sunt, & talis surditates non curatur: seu propter obstructionem, densitatem, &c. III. *Spiritus animalis*, qui vel non generatur, propter ingentem cerebri intemperiem; vel aboletur, propter omnimodam angustiam: vel non permeat, ob nervi vitium: vel paucus crassius, & impurus est, propter ambientem aërem, seu aliquam aliam causam. IV. *Aëris congeniti*, qui vel deficit, ob vulnus nempe, ulcus, &c. egressus; ex sono, capitis contusione, vehementi cerebri affectu dissipatus; propter alimenti defectum, non restitutus: vel impurus est, ab aliqua materia, seu à cerebro seu aliunde missa. V. *Motus auditorii*, qui vel malè conformatus est. Vel obturatus, seu ex parte hinc auditus duntaxat imminuitur; seu ex toto, hinc externus sonus non percipitur, ab aëre verò relicto alius excitatur: seu à rebus externis illapsis, immixtis; seu internis humoribus, sordibus, ulceribus, &c. Vel constipatus, ex inflammatione, tuberculo: vel compressus, ex fractura ossium. VI. *Tympani*, qui rumpi, laxari, crassius vel siccus reddi, tendi, inflammatione circa eum abortâ,

abortâ, infestari potest. VII. *Ossiculorum trium*, quæ aut non rectè formata sunt, aut loco suo moventur. *Frequentissimè* tamen ab humore *pituitoso* vel *bilioso*, quod in febribus acutis accidit, & interdum materiam ad exteriora ferri indicat. In ejus *Curatione* videndum, ut medicamenta *calide* applicentur. Ne nova, nisi *sordibus deterfis*, apponantur, ne plus *tribus guttis* immittatur. Ut à *viscosis* & nimis *unctuosis* caveatur. ut æger super *aure sana* jaceat. ut *capitis* ratio habeatur. Laudantur, *Aqua Cardui benedicti* bis infusis foliis in vitro destillata. succus *Carpæ* spiritu vini imbutæ, & sub cineribus coctæ, succus ex *ovis formicarum* expressus, vel aqua ex *iisdem* destillata. *fel leporinum* cum pari portione mellis virginei, & cætera: quæ vide in *Petræo* & *Hartmanno*.

CAPUT II.

De Aurium tinnitu, & Obauditione.

Tinnitus est sonitus in auribus præternaturalis, in instrumento auditus, seu cavitate ossis petrosi factus & perceptus, à vaporibus interclusis & motis exortus.

Signis in isto affectu opus non est.

Causa in *ῥαρυμφώσις* quovis conjicitur, quatenus aërem innatum præter naturam commover. *Exsurgit* verò hoc, 1. *Vel per se*, vel per aliarum partium nempe, lienis, Epatis, uteri, ventriculi, &c. consensum, & tum affectarum partium signa adsunt. 2. *Vel à causis externis*, vapores excitantibus, aëris nempe nimio frigore vel calefactione, nimia cibi repletionem, crapula à vino, unde cruditas in capite cumulat; vento boreali post austrinum flante, qui facile removetur: frequenti in caput vel tempora percussione; qui, quod, humoribus præ dolore ad organa auditus confluentibus, in surditatem verti soleat,

F f

leat, difficulter curatur. *Vel ab internis*, idem emittentibus, & quidem 1. *Spiritu fervidiore*, arteriolam quæ aurem subit, implente; & tum morbus diurnus est. Refrigerantibus & humectantibus decoctis & succis agendum, *Opium*, sed cautè, etiam adhiberi potest. 2. *Humore pituitoso* & frigido; & tum malum paulatim cœpit. per intervalla recurrit. sonitus est clarior. causæ præcessere ejusdem. In *Curatione*, Universalibus præmissis, attenuantibus & discutientibus, quæ manè & ante cœnam apponi debent, Ut vapore *aceti* cum *felle bubulo*; secreto, quod ex *vermiculis intra lignum quercinum* & corticem stabulantibus, & ol. rutæ. costin. (vide *Petraum*) componitur, *felle* lucii piscis præparato, *fumo Mercurialis*, agendum. 3. *Humore bilioso*; & tum in febribus accidit. vel symptomaticè vel criticè urget. spontè interdum, interdum bilioso alvi fluxu solvitur. 4. *Sordibus*, quæ *Urina asini vel pueri*, in qua maduit, lignum Guajacum, portio castorei, mentastri fasciculus destillata, elui debent. 5. *Apostemate*, qui se suis signis prodit.

Obouditio seu *naççus* est, quando auditus confusus percipit. Fit id vel ab ulcere non probè terfo & consolidato, quando spiritus per arterias impulsus auditum impetu suo offendit. *Vel* in febribus, vaporibus ad caput elatis, & in aures effusis. *Vel* sine febris, calidâ evaporatione è visceribus impuris continenter in caput elata.

TITULUS VI.

De Narium morbis & symptomatibus.

CAPUT PRIMUM.

De Ulcerebus narium, *Ozana*, & Polypo.

Narium affectus sunt, *Ulcera*, *Ozana*, *Polypus*, *Hæmorrhagia*, *Olfactus læsio*, *gravædo*, & *sternutatio*.

I. *Ulcera*

I. *Ulcera narium* interdum abiectu, contusione, casu, vulnere, & aliis evidentibus accidunt; interdum ab eorum, quæ præterlabuntur, ut pituitæ salis acrimonia. *Cognoscuntur*, dividuntur, & curantur perinde ac alia: pro ut in primo libro dictum est, Præcipua differentia est illa, quâ in *Recentia* & *Vetusta* dividuntur. *Recentia* hinc noscuntur, quod sanguinis nonnihil frequenter eructent, maximè cum attinguntur aut irritantur: quodque nares hoc sæpè madeant; atque si sinuntur, crustulâ siccâ eaque nigrâ obducuntur, quæ emunctionis impetu nonnunquam procidit.

II. *Vetustum* ac jam putridum ulcus *Ozana* dicitur. *Cognoscitur* exinde, quod ex eo crustula sordidior, atque etiam graveolens mucus excidat. laborans ipse tum sibi graveolet, tum vicinis tetri Spiritus contagione molestus est. si malum diuturnum est, narium alæ, vel earum interstitium, vel alia ejus loci tenella ossâ exeduntur & putrescunt, exesumque palatum sæpè perforatur; idque maximè, si carcinomatis speciem habet, vel è lue venerea contractum est. *Oritur* aut *ab externis*, suffumigiis nempe è mercurio & Cinabrio incautè adhibitis: aut *ab internis*, humoribus nimirum acris, & quod in lue venerea accidit, malignis. *Curatur* 1. *Universalium administratione*, ut à capite novi affluxus avertantur. II. *Capitis* per gargarismos masticatoria, &c. *evacuatione*: & per Cephalica externa & interna *roboratione*. III. *Ulceris* 1. *Deterfione*, & mundificatione, seu per succos, *millesfolii marubii*, *veronica* cum melle rosato; seu per *aquam aluminis*: seu per *aquam viridem* Hartmanni, cui crustæ per vapores herbarum emollientium, emollitio præmitti debet. 2. *Exsiccatione*, per vaporem *scoria ferri*, candentis, vino rubeo conspersæ; per suffumigium *aurepigmenti*, *cinnabaris*, *benzoi*, *styracis*

styracis, calamita, caryophylli inter se permistorum; obstructis ad radices naribus, ne cerebrum feriat.

3. *Consolidatione*, per trochiscos Rondeletii, &c.

III. *Polypus est carnosus in naribus excrecentia, ex radicibus quibusdam tenuibus pendens, & nunc è naribus propendens, nunc etiam in palatum descendens.* Cognoscitur ex eo, quod caro illa sit laxa, rara, mollis, colore varia; quod in plenilunio vehementer excrecat, circa novilunium flaccescat, &c.

Oritur ab humoribus viscidis, pituita in primis sanguini permixta, quæ è cerebro ad nares exulceratas defluens, ulceribus inhaeret. *Curatio* festinanda, ne in Cancrum abeat. Peragitur, vel *Chirurgia* seu præcisione; de qua vide Practicos: vel *Pharmacia*, ubi præmissis universalibus adhibenda circa novilunium, vel *Oleum vitrioli* non correctum, lana, postquam caro scarificata fuerit, exceptum & applicatum; Vel *turundæ radicis gentianæ*, ex præscripto Hartmanni; vel *linimenta* Ioëlis. *Dividitur* dupliciter.

I. Alius est *Mollis & albus*, qui doloris expers, facilius curatur. Alius *Subrubeus*, qui difficilior. Alius *Lividus*, qui curationem respuit, & in cancrum degenerat. Laudantur in eo *vitella* ovorum, in mortario plumbeo ad nigredinem usque agitata, & in unguenti formam cum scrup. j. *Camphoræ* redacta. Alius *Durus*, in quo emollientia totus forma præmitti debent. II. Alius est *Profundus*, qui quia cerebro est propinquior, periculosior simul est. Alius, qui *oculis* cernitur, & foris nonnihil existit.

CAPUT II.

De Hemorrhagia narium.

Hemorrhagia est immodica, totoque genere præter naturam, sanguinis per venas nasi, divisum, rarefactas, vel apertas, excretio.

De

De Hemorrhagia Symptomatica, non Critica res est, quæ fit à natura robusta in febribus, cum prægressis signis coctionis & criseos in die judicatorio; quæque morbum solvit.

Signa affectus per se sunt manifesta. *Præcognoscitur* ex humorum ad superiora *evaporatione*, quam capitis & colli dolor, temporum gravitas, oculorum caligo, hypochondrii tensio, lacrymæ involuntariæ, difficilis respiratio, &c. significant.

Causæ sunt, quæcunque venas nasi aperire, dividere, vel rarefacere possunt, quorum in differentiis mentionem faciemus.

Curatio est Difficilis, si est ita immodica, ut in corporibus biliosis, bile sanguinem adurente, facies citrina; in pituitosis, pituita multiplicata, plumbea; in melancholicis, fusca, evadat, & ad iv. libras extendatur. si in pituitosos & melancholicos, quia isti magis refrigerantur, incidit. si prærubro colore præditos, cum capitis dolore afficit. si morbum cui supervenit non sedat, & rigor illum excipit; quia corpus exhaustum spiritibus, inrigidatur, & hoc modo morbos diuturnos parit. *Non tentanda* in iis, quibus in febre ardenti capitis dolores, cum cervicis labore, & totius corporis, cum tremore imbecillitas, adsunt, quia morbum solvit. in iis quibus menses deficiunt. in iis quos vel furditas, vel spinæ distorsio & spirandi difficultas, vel dolor in infernis partibus fortis, parib. cæteris, affligunt. *Dubia spei*, si in affectibus epatis è nare sinistra, in lienis, è nare dextra, cum thoracis præsertim aut capitis sudore, fluit. si febricitantibus accidit, & inde alvus convalescentibus humectatur, quia calore nativo debilitato, hydrops oboritur. si cum sudoribus exiguis & perfrigeratione contingit, quia nimia virium exsolutio indicatur. si in morbo acuto, oculorum motum velocem, somnum turbulentum, & vigiliis conjunctas habet. si in acutis & ardentibus,

Ff 3

tibus,

tibus, quarto die, crassius & niger cum aliis Symptomatibus guttatim prodit, quia imbecillitatem naturæ indicat. si in morbis longis, talis accidit. *Peragitur I. Revulsione*, per venæ medianæ sectionem moderatam & iteratam ejus partis, ex cujus nare fluit; cucurbitulas hypochondriis applicatas, si sanguis malus non est, frictions, &c. II. *Medicamentis fluxum sistentibus*, seu refrigerantibus, seu adstringentibus, seu glutinantibus, seu qualitate occulta agentibus; extra adhibitis, vel intra propinatis. Præcipua esse creduntur, ex Internis, *sperniola compositum* Crollii 3. vel 4 granis in aqua bursæ pastoris exhibitum. *Crocus Martis* cum succo Cydoniorum & aliquot laudani opiat granis, *Syrupus de Corallis Quercetani* in aqua chalybeata. *Extract. Croci Martis* gr. iij. cum aqua plantaginis. *Sperma ranarum* vere collectum, siccatum, & cum vino propinatum. Ex externis, Unguentum *Quercetani* ex Croci Martis subtiliss. reverberati, croci veneris ana unc. ij, oleo visci pomor. simplic. excepti compositum. Aqua *Spermatitis ranarum* cum pauxillo camphoræ & sacchari saturni collo circumposita. *Argilla furnacea* cum aceto forti instar pulvis commista, & eodem modo applicata. *Stercus asininum* aut *suillum*, aceto rosaceo dissolutum, & in nares immissum. *Fungi betulinii* ramenta, *Radix Cichorii albi*, circa festum Jacobi in meridie collecta, & dentibus attrita. *Magneticam curationem* per vitriolum vide apud *Beckerum* in *Medico Microcosmo*, cap. de sanguine, &c.

Dividitur hæmorrhagia tripliciter, à Causis, sanguine, & locis.

I. *Alia* est ab ἀναστροφῇ, quæ vel fit à sanguinis copia, & tum rubet facies, venæ tenduntur, vitæ liberalior præcessit. Venæ-sectio locum habet. Caput aqua frigida non perfundendum, ne sanguine detento aliquid deterius sequatur. Nec linteam frigidâ

frigidâ madidum inter initia collo injiciendum, ne viæ inter cerebrum & cor præcludantur. Vel ab *acrimonia*, & *tenuitate*; tum signa cacochymiae adsunt. Incrassantibus, ut bolo armeno, sanguine draconis & aliis, agendum. Vel à *facultatis irritatione*, & tum eadem præstò sunt. Vel ab *eiusdem imbecillitate*; & tum sanguis per intervalla exit, nec multus; morbus hepar debilitans præcessit. Curatio ad illum etiam obvertenda.

Alia à διαστροφῇ: ab humore acri & aliis, & tum sanguis majore copiâ fluit, vel causa aliqua violenta præcessit, vel signa biliosæ Cacochymiae adsunt.

Alia à Ἀγανθρόσ: & tum sanguis paucus est, &c, vide l. i.

II. *Alia* est sanguinis arteriosi, qui calidus, rubens, subtilis, cum spuma & impetu exsiliens. *Alia venosi*, crassior & nigrior.

III. *Alia* est sanguinis ex venis cerebri prodeuntis; & tum capitis dolor præcessit. Fluxus non facile sistitur. *Alia* ejusdem ex venis narium profiliensis; & tum contrarium accidit.

CAPUT III.

De Olfactus læsione, Gravedine, & Sternutatione.

I. *Olfactus* præcipua læsio est ejus Abolitio aut Diminutio, quæ gradibus & magnitudine causarum duntaxat differunt. Fit hæc i. Aut ab intemperie cerebri, quæ vel ipsius partem anteriorem obsidet; & tum, gustatus quoque, ob tertii nervorum cerebri paris propagines, linguam efformantes, aboletur. vox est sonora & inculcata. Curatio intemperiei rationem habebit: vel processum illor. nervorum, qui olfactus organum statuuntur; & tum nulla in cerebro vel cæteris sensibus læsio conspicitur.

tur. Aut ab *Angustia*, & quidem vel *Cerebri*: & tum gravitas adest. Errhinis nec tamen nimis agendum: Sed & sternutatoria vehementer juvant: vel *processuum cerebri*, aut *nasi interni*, & *ossis id est* *maxillæ*; & tum, vox & respiratio vitiantur, excrementa solita cohibentur. Olfactus interdum *totaliter aboletur*, si pituita ad foramina illius ossis calore induratur, quod iis qui coryza laborantes balneum in cautè ingrediuntur, accidit. Laudantur in hisce, Radix *geriana* naribus convenienter inserta. *Castoreum* aceto immersum & odoratum. *Oleum nigellæ*, Errhinum *Zacuti* l. 7. c. 15. p. 517. &c. de quibus in capite de Catarrhis.

II. *Gravedo* seu *ῥογῆ* est cerebri excrementorum instar aqua crudorum ac tenuium ad nares defluxio, quam frequens sternutatio comitatur. Cognoscitur ipsa per se. Oritur, ab intemperie cerebri seu calida seu frigida: de quibus superius.

III. *Sternutatio* est flatuosorum spirituum, aeriumque vaporum, cerebrum offendentium, violenta & involuntaria per nares expulsio. Fit cum strepitu, tum quia spiritus confertim, tum quia per angusta narium foramina erumpit. Oritur vel à *Causis externis*, & tum oleo rosaceo vel lacte nares demulcendæ. Vel ab *internis* humoribus & vaporibus eò delatis, de quibus suis capitibus: solet autem ut plurimum à Medicis negligi, nisi in corpore plethorico, in principio morbi, cum destillatione accidat. *Venula* in majori oculorum angulo naribus proximo, fortius compressa, crebram statim sedant.

TITULUS VII.

De Linguae morbis & symptomatibus.

Linguarum affectus sunt, *Tumor*, *Ranula*, *Nigrities*, *Paralysis*, *Balbuties*, *Aphonia*, *Gustus lesio*.
I. *Tumor*

I. *Tumor* oritur, vel à *causis externis*, ut inunctione hydragryi, esu fungorum venenatorum, &c. Tum, vitanda sunt purgantia. Lingua decocto Scabiosæ, Plantaginis, cum pauxillo Theriacæ & mellis rosacei abluenda. Vel à *Causis internis*, nempe affluxu, *Materia calidioris*, sanguinis nempe aut bilis; & tum, Inflammatio plerumque excitatur. *Frigidioris*; & tum lingua albicat, multum pituitæ effluit. *Venenata*, ut in luc venera, cujus signa aderunt. *Corrupta & canerosa*, & tum malum ferè est incurabile, & putredine ad radicem linguæ vel sanguinis fluxu in linguis erosio accedente, tandem ægri moriuntur. Ad quoscunque conducit *oleum vitrioli* cum melle rosaceo inunctum, & venarum sub lingua sectio.

II. *Ranula* est tumor rana formam referens, quæ sub lingua ex molli carne, cui lingua incumbit, cuique quasi vinculo alligata est, nonnunquam exoritur. Cognoscitur ipso visu. Oritur à sanguine viscido & pituitoso eodem confluyente, & mollem ac laxum tumorem, qui apertus, mucum ovi candido, permilem de se dat, excitante. Curatur aut Topicis remediis, inter quæ *oleum vitrioli* cum melle rosaceo prævalet: aut *Chirurgica operatione*, quam linimenta ex tragacantho torrefacto cum radice hermodactyli & albumine ovi, vel gargarismata, excipere debent.

III. *Nigrities cum scabritie* & scissura aliquando oritur ab igneis vaporibus & exhalationibus, in febribus, præsertim ardentibus. Ablui debet lacte caprino aut canino. foveri mucilag. semin. psyllii & cydoniorum collui aquis refrigerantibus, cum lapide prunella.

IV. *Paralysis* contingit linguæ, vel Toti, & tum ii nervi prorsus impediuntur, qui à septima cerebri conjugatione propè spinalem medullæ initium derivantur,

vantur, gravis etiam Apoplexiæ metus impendit. Vel ejus parti sive dextræ sive sinistræ, seu vitio nervorum seu spirituum. In ejus Curatione præmissis Univerſalibus, laudantur *ſalis margarit.* gr. x. in vino malvatico. *ol. Rorismarini* cum rotulis diambæ vel diacastorei. *Aqua vel ſpiritus caras. nigrorum* frictio linguæ cum *ſol. Tabaci, ſemine Erucæ, & Theriacæ.* Vide & *Electuarum Solenandri* in conſiliis.

V. Balbuties, & blaſitas infeſtant, Aut ex ebrietate; aut linguæ mala conformatione, brevitate, nimia craſſitie: aut ejusdem immodica ſiccitate; aut nimia humiditate. Difficulter tollitur.

VI. Aphonia oritur, vel à naturæ conformationis vitio: vel à *Conſummata paralyſi.* Curatur ut paralyſis. Valet Aqua Lilior. *Convall. Lavendulæ, Cum ſanguine Turtur. oleo Aniſi, & ſpiritu vitrioli.*

VII. *Gustus leſo* fit, I. *Eo imminuto vel abolito*, ſeu nervis mollioribus, à tertia cerebri conjugatione exeuntibus perfrigeratis; ſeu eâ cerebri parte, unde exeunt, affectâ. Prodeſt ſectio venæ ſub lingua; nec non ea, quorum in Aphonia & Paralyſi facta eſt mentio. II. *Eo depravato*, ut alienus ſapor percipiat, quod fit, cum vel linguæ corpus, vel quæ ipſum veſtit membrana, tetro humore imbuitur, qui vel ſolus, vel liquore eorum quæ eduntur vel bibuntur dilutus, in linguæ corpus mollesque nervos penetrat; tumque vel ſaluſ, vel amarus, vel acidus, pro ratione exhalationis & humoris ſapor, guſtu percipitur. Laudatur *Raſura linguæ* cum *radice Zedoariæ* vel *gentians*, *Raphanus ſale conditus* ante Cœnam maſticatus, eluto poſtea ore vino, &c.

TITU

TITULUS VIII.

De Morbis & Symptomatibus labiorum.

Labiorum affectus ſunt, *Fiſſura, Ulcera, Tremor, & Perverſio.*

I. *Fiſſura eſt continuitatis labiorum à nimia ſiccitate & tensione ſolutio.* Cognoscitur ipſo aſpectu. Oritur à ſiccitate nimia & tensione; ut in definitione dictum. Curatur, ſiccitatis per humectantia correptione, & ſolutæ unitatis unione. Valet *pinguedo*, qua ex *Cochlearibus* ligneis in culina ad coquendum uſitatis, ſi igni admoveantur, editillat. *Dividuntur* variè. I. Alia ſunt à *Nativitate*, quæ difficulter curantur. Alia *Adventitia*, quæ facilius, niſi ad cancroſam materiam degenerent. II. Alia ſunt à *Cauſis externis*, frigore, calore, vento boreali, &c. & tum relatio ægri ſufficiet. In Curatione ut omnia removeri debent, ſic uniuscujuſque ratio haberi. A frigore *pomatum album* valet. Alia *ab internis*; nempe I. *Humoribus calidis*, qui ex capite ſæpe devolvuntur, pruritus & profunditatem inferunt. In Curatione, evacuata materiâ, lintea tenera *ſucco ſemper vivi* madida imponi; & ſi profundiores fiſſuræ ſunt, *adipe anſerino* & *caponis* illiniri debent. II. *Vaporibus*, qui calidi, ſicci, ſalſi & acres ſunt. Ex inferioribus partibus per œſophagum vel aſperam arteriam aſcendunt. Mulieres ſalaciores, ex uteri ſiccitate, propter communem tunicam infeſtant, & fiſſuras ſine ardore, pruritu, multâ duritie, nec profundas, nec frequenter inducunt. In Curatione partium mittentium ratio habenda eſt. In omnibus labium introvertendum, & præmiſſa maſticis maſticatione, linguâ humectandum eſt.

II. Circa *Ulcera labiorum* hæc notanda ſunt.
I. Omnia

1. Omnia ab humoribus acribus, biliosis & serosis, sive ex adustione & putredine, sive ex admisione, *oriri*. 11. Interdum crustola, interdum manantia esse, 111. Interdum *Criticè* in febribus malignis & aliis protrudi, quæ per se facile curantur, febris finem designant. si cum viribus diminutis sint, mortem minantur: Interdum *Symptomaticè*, idque vel propter contusionem labii; vel propter venenâ; vel propter humores, ut in morbo Gallico. In *curatione*, Medicamenta somni tempore optimè adhibentur. Acres cibi vitari debent.

III. *Tremor labiorum* provenit, vel ab *externa causa*, nimirum. 1. Frigore, cum dentium stridore. 2. Ira, vel metu, dissipatis aut ad interiora remissis spiritibus. Vel ab *interna*, ut in cerebri magno affectu, ex nervorum debilitatione: in nausea, ex humore acri vellicante, vel ventriculi per consensum membranarum agitatione: In vermibus. Curatio ad causas obvertenda erit.

IV. *Perversio labiorum*, fit ab affectu *nervorum tertii paris*, convulsis musculis; idque vel *per se*, à siccitate: vel *ex eventu*, seu cum cognati & congenere, qui simul membrorum aliquid attollunt vel deprimunt, vel convelluntur; vel antagonistæ musculi resolvuntur. *Lethalis* est, viribus debilibus, in febribus continuis, peculiari organorum defectu. *Periculo vacans*, si vires sunt validæ, actiones sibi constant & criticæ materiæ ad caput metastasis peragitur.

TITULUS IX.

De Faciei morbis & symptomatibus.

CAPUT I.

De Oris apertione, hiatu, & oscitatione.

AD Faciei affectus pertinent *Oris apertio*, *Hiatus*, *Oscitatio*, *Tortura*, & *Ptyalismus*.

I. Oris

I. *Oris apertio est*, quando os, quod per naturam claudi debebat, non clauditur. Fit id, 1. Quando *maxillo inferior* capiti adnascitur, quod rarius contingit. 11. Quando tumores *circa juncturam* maxillarum, in inflammationibus maxillæ & tonsillarum exoriuntur. 111. Quando *oris cardo*, in quo gena vertitur, *obrigescit*, & os strictius, quo minus in rictu queat expandi, squallido humore in juncturam illam & vincula altius imbibito, connivet. 111. Quando *cervix ex vulnere nervorum*, quia maxillæ veluti ossa rigescunt, distenditur.

II. *Oris hiatus est*, quando os, quod per naturam uno labio alteri superinsedente claudi debebat, *hiat*. Oritur 1. A *mala consuetudine*. 2. *Maxilla inferioris luxatione*. 3. *Narium*, ut copiosior aër attrahatur, *obstructione*. 4. *Vaporum calidissimorum* in febribus *ascensu*; & tum, si sint faucium sine tumore dolores & pusilli & strangulantes, emotio mentis portenditur. 5. *Lasa* in lethargo memoriâ.

III. *Oscitatio est*, *vehemens oris ab halituosis & in spaciis muscutorum maxilla inferioris, & buccarum collectis, & excretricem ad excernendum stimulantibus vaporibus, distentio*. De *Signis* laborandum non est. quia verò auris meatus aërem tum satis non admittit, & nervus comprimitur, obauditionem conjunctam habet. *Causa* in definitione exposita est. *Curatio* est *Nulla* serè, si in nixu accidat. *Dubia*, si maxillam inferiorem luxet. Aliàs citra occasionem frequentiore, morbos, si diducto ore assatim aër hauritur, mox cum sono excluditur, præflagit; & febrium propter vaporum ex materia in inferioribus jam collecta & putrescente ascensum, præludium est. *Peragitur*, 1. Materiæ, quæ vapores suppeditat, exclusione. 11. Vaporum discussione vel revulsione.

CAPUT II.

De Oris tortura.

Oris tortura est ejusdem ex affectis vel faciei musculis, vel tertia & quinta conjugationis nervis, seu iis qui à primis cervicis vertebra descendent, procedens dissentio.

Signa sunt, quòd oculus alter ritè claudi non possit, æger exspuere jussus, alterâ tantum parte id faciat; quod si nulla signa appareant, ridere aut literam O pronunciare jussus, alteram oris partem movere nequeat.

Causa in definitione exposita est.

Curatio est *Facilior*, si nulli corporis parti turpitudo illa consentit. *Difficilior*, si ultra sex menses producit. Quomodo peragatur, in Differentiis videbitur.

Dividitur autem dupliciter, pro ratione causarum.

I. Alia est à *Resolutione*, quæ *Cognoscitur* ex eo, quod pars affecta sit laxa, mollis ad sanam trahatur, sensus in parte sit obtusus, palpebræ oculi ex parte decident, facies sine rugis extendatur, & continuò ad inferiora inclinet. *Oritur* ab iisdem causis, à quibus Paralyfin aut Apoplexiam portendit. *Curatur* ad modum Paralyseos. 1. *Per universalia*, ubi nota. 1. Ad fortiora ante quartum vel septimum diem, nisi metus sit à morbis memoratis, non accedendum. 2. Venam secandam prius cubiti; pòst sub lingua. 3. Cucurbitulas cum scarificatione potius scapulis quàm primis vertebra imponendas, ne, si cervici sæpius imponantur, tremorem inferant. II. *Per Particularia*, & tum Errhina & Apophlegmatizantia sint in usu. Gargarismi ante Errhina, ne materia ad faciem ducatur, non adhibeantur. Extra, inunctiones ex *Castoreo* fiant. Per ligaturam os ad natu-

naturalem statum redigatur. *Æger* in loco obscuro, ne lucis præsentia humores fusi, ad nervos concurrant, ponatur. Speculum ipsi opponatur.

Alia à *Convulsione*. quæ *Cognoscitur* ex eo, quod pars affecta sit dura, & plerumque doleat. sana ad tensam trahatur. Cutis in una parte sit rugosa, in altera tensa. salivæ & sputi paucitas adsit. *Oritur* ab iisdem causis, à quibus Convulsio. *Curatur* quoque *Difficulter*, vel *Nulla modo*, si utrumque latus occupat (spasmus Cynicus dicitur) & fortis est. nam interdum intra quatuor dies, interdum intra duodecim, materia ad Cerebrum translata, interficit, si in febribus ardentibus, perniciose phrenitide, &c. accidit.

II. Alia est, quando musculi afficiuntur; & tum vitiosa figura solam partem faciei, quam ille musculus regit, occupat. Alia, quando nervi; & tum, *Principio* ipsorum affecto, cerebrum etiam dimidiâ parte afficitur, & dimidium faciei cum toto corpore patitur: *Progressu laborante*, distortio dimidium faciei secundum omnes partes occupat. *Tertio pari*, quia aliqua sui parte cum motorii oculorum nervis, per eadem foramina prominet, magis oculus laborat. *Quinto*, levis sit noxa buccarum. *Primis cervicis vertebra*, insignis sit iisdem noxa; Oculus verò, nisi simul musculus temporalis afficiatur, in quem quinta conjugatio ramulum mittit, est liberior.

CAPUT III.

De Ptyalismo.

Ptyalismus est crebra & involuntaria sine tussi & sreatu exspuitio, à nimia salivæ copia proveniens.

Res est de *Symptomatico*, non *Critico*, qui à morbo liberat.

Signis opus non est. *Involuntaria* dicitur, ut ab illa quæ consuetudine sive inter perorandum, sive non,

non, accersitur, distinguatur. *Sine tussi* est & *screatu*, quia spurum id est, quod exscreatione ex thorace plerumque ejicitur; saliva, quæ sine illa.

Causa est nimia salivæ copia. Nam si naturaliter in sua mediocritate consideretur, cibum in ore ad primam coctionem misturâ suâ dum masticatur præparat, locutionem promovet, & saporum est vehiculum.

Curatio generalis, quia in glandulis linguæ utrinque assistentibus, quas Tonsillas vocant, concurrente linguæ & partium in ore calore gignitur, ad tonsillarum roborationem convertenda est. Id fit decocto ex fol. *Myrti*, *Plantaginis*, *Alumine*, &c. quæ detinenda sunt tantum in ore, non gargarizanda, ne plus pituitæ attrahatur.

Dividitur secundum causas.

Alia est à *Causis externis* salivam augmentibus, ut hydrargyri inunctione molesta. Cibis copiosis & humidis, potu nimio: & hæc post cibum exsurgit.

Alia à *Causis internis*, humore nimirum aquoso & pituitoso, qui 1. Interdum à *Cerebro* ad fauces defluens, se ipsi commiscet; & tum in Columellæ laxatione, inflammatione, & ulceribus oris idem fit. *Curatio* ad Catarrhum dirigenda est. 2. Interdum *in toto corpore* cumalatus, quod infantibus accidere solet, eò mittitur. 3. Interdum ex *Ventriculo* humidior & jejuno, post morbos præsertim Chronicos exsudat; & tum, ratio ventriculi per aloëtica purgantia, *Thus* & *Mastichen* cum vino sumta, cibos sinapi admixtos, & *Diagalangam* habenda. 4. Interdum ex *intestinis*, ut in vermibus. ex *Liene*, ut in scorbuticis, ex *pectore* & *pulmonibus*, &c. provenit.

T I T U S

TITULUS X.

De Oris affectibus.

CAPUT I.

De Aphthis.

Oris ita propriè dicti affectus sunt *Aphthæ* & *Factor*.

Aphthæ sunt quædam in summa oris superficie exulcerationes igneæ quidpiam caliditatis habentes.

Signis opus non est, visu ipso dignoscuntur.

Causa tam externæ, quàm internæ, in Differentiis exponuntur.

Curatio Repulsione, in principio cum adstrictione, in progressu cum discussione. *Discussione* sola, & *Maturatione*, si ad suppurationem tendant, ubi *lactis* vel *passularum* decoctum prodest, perficitur.

Dividuntur multifariam.

I. Alia sunt à *Causa externa*, hydrargyri nempe inunctione, cibis acribus in ventriculo corruptis, esu fungorum, mensium retentione, &c.

Alia ab *Internis*, nempe 1. *Humoribus pravis* vel ibidem genitis, vel aliunde missis; Tum, Colores humorum imitantur. A pituita minùs ferventes sentiuntur. A bile plerumque inflammata sunt. In pueris nigra, & veluti crusta, lethales evadunt. Universalia postulant. 2. *Vaporibus*, qui vel à toto vel à parte, calido præsertim jecore emittuntur. summas oris partes faciliè ob mollitiem & teneritudinem acrimoniâ suâ lædunt. in febribus frequenter talem morbum inducunt.

II. Alia sunt *Recentes*, quæ faciliùs sanantur. Alia *Inveterata*, quæ difficilius: idque tum propter partis sensibilitatem, quæ ab acribus medicamentis irritatur; tum propter medicamentorum à saliva elutionem;

G g

nem;

nem; tum denique propter mali in loco calido & humido ad putredinem properationem.

III. Aliæ sunt *sordide*, quæ aqua saccharata, cum Oleo vitrioli permista, ablui possunt. Aliæ *Ulcera sordida* post se relinquentes, & tum *Aqua viridis* Plateri rectè adhibetur, quam ablutio oris per aquam plantaginis sequi debet.

IV. Aliæ *summam duntaxat Cutem stringunt*, & in gingivas, palatum, linguæ latera & radicem serpunt. Aliæ *profundius penetrant*, & palatum carnemque linguæ exedunt: in infantibus præcipue, quia molliora corpora habent. Laudantur decocta *Satureiæ* & *Veronice* in vino, si in his os colluatur. Aqua *nucum* cum aceto exstillata, si Spongia adhibeatur.

V. Aliæ sunt *Puerorum*, quæ plerumque à lacte acri & falso proveniunt, *diamoro* cum melle rosato aut *Oxymelite* curantur. Aliæ *Adultorum*, quæ Universalia expescunt.

CAPUT II.

De Factore Oris.

FOEtor oris est anhelitus gravitas à vapore fetido ex ore egresso producta.

Signis opus non est.

Causa proxima est Vapor, qui progreditur 1. A Cibis vel ex seipsis foetidis, ut allio, cæpa; & tum foetor brevi spontè evanescit: vel in ventriculo, aut interstitiis dentium corruptis. II. Ab intestinorum excrementis, cum orificium ventriculi inferius, quo in intestina se aperit, non arcè clauditur, quod ebriosus accidit. & tum *Caryophylli*, *Nux moschata*, *Zedoaria*, *Radices Imperatorie*, *Ireos*, *Cortices citri*, &c. in ore detinenda. III. Ab humoribus fetidis, seu in ventriculo; & tum aloëticis optimè evacuantur: seu in ossè colatorii, si quando corrumpitur; seu

seu in ulcere, & vulnere, pulmonis, gingivar. intestinorum. IV. A *vermibus* in intestinis stabulantibus, &c.

TITULUS XI.

De morbis & symptomatibus Dentium.

CAPUT I.

De Morbis Dentium.

ARTICULUS I.

De Dentium corrosione.

MOrbi Dentium sunt Corrosio & Mobilitas.

Dentium corrosio est magnitudinis eorumdem à causis erodentibus, ut frangantur & frustillatim excident, diminutio, fistulas interdum inducens.

Signa & tactu & visu facile deprehenduntur, & ut plurimum, qui tales dentes habent, jejuni tetrum halitum expirant.

Causa erosionis sunt, vel *Externa*, fuci mulierum ex hydrargyro, dulcia, præsertim saccharum, ut experientia ostendit, calida assumpta, nimium frigida post calida levi intervallo injecta. vel *Interna*, nempe 1. *Humores acres*, qui ex capite plerumque decurrunt; & tum, In *Curatione* ita procedendum, ut primò fluxus sistatur. 2. Humiditas putrida, decocto radic. *Cappar*. *Mentha*, *baccarum lauri*, *gallia moschata* cum mastiche denti indita tollatur. 3. Corruptio mundatione præcaveatur, per scalpellum à cibis, & oris collutione per vinum. Laudantur, *Odontalgici Crollii* gr. j. denti impolitum cum gossypio, *Tralliani globuli* ex opii *Thebaici* scr. j. *Myrrha*. *Styrac. calam. ana dr. s.* *Piperis albi*, *Croci*, *Galbani ana scr. j.* cum melle scillitico conformati, & denti inserti. II. *Vermes*, qui globulis ex semine *hyoscyami*, *cæpa* & porro cum s. q. sebi caprim

ni, conformatis, & dentium cavitati impositis, eliciuntur.

De *Fistulis* dentium hæc duo sunt notanda.

I. Eos humorem *corruptum* & *saniem* sensum stilare, qui *interdum* in os cum foetore influit; *interdum* per dentium radices & maxillæ foramina, per quæ vasa in eas subeunt, sensum extra derivatur, & tubercula in mala vel mento excitat; *interdum* apertum semper ulcus manet.

II. Vix nisi dens *evellatur*, quod tubercula illorum etsi rumpantur, noviter succrescant, & ulcera claudi nequeant, *curari posse*. Ut autem dens bene extrahi possit, vel *ranarum viridium* in arboribus degentium *pinguedine* affricetur; vel ex *tithymalli succo* & *ammoniaco* formati globuli ipsi indantur; vel unguento ex *gummi ammoniaco* dissoluto, & *semine hyoscyami* inungatur. Sed observa, I. Vicinos dentes bene muniri debere, ne à medicamento tangantur. 2. Os apertum servari, ut saliva effluat. 3. Nihil deglutendum esse.

ARTICULUS II.

De Dentium mobilitate.

Dentium mobilitas, est eorundem à causis suis profecta vacillatio, quam casus interdum insequitur.

Dentes *subjectum* sunt, sed præsertim *Incisorii*, qui unâ saltem radice nituntur.

Signum attactus ipse suppedirabit.

Causæ sunt, vel *Externa*, vel *Interna*.

Externa, ictus nempe vel *Casus*, & tum medicamentis adstringentibus agendum; inprimis remedio ex gland. dr. j. *alumin. usti*, *gallarum. succi acaciae* ana dr. s. *folior. rosar. rubr. m. s.* cum vini rubri lib. i. ad casum unius pollicis decoctis & colatis, composito, quo quotidie dentes elui debent.

Interna

Interna sunt, I. *succus prævus*, gingivas vel dentium radices *erodens*; & tum, destillationes acres præcessere, & dentes dolent. pulvis ex corallo rubro præparato & mastiche prodest. si in lue venerea id fiat, morbus ille videatur. II. *Nimia humiditas* radices dentium *laxans*; & tum, Os saliva abundat, & gingivæ sunt molles. In *Curatione* adstringentibus ex decocto *filicis maris*, *Capparum*, *foliorum myrti*, cum oleo *sulfuris* utendum. Cortices *granatorum*, *balauſtia*, *vitriolum*, quia dentes denigrant, vitanda. si sit à scorbutico, ad ipsum respiciendum. III. *Defectus alimenti*, quod fit in senibus & convalescentibus, Unde alveoli fiunt ampliores. Non potest curari: modicè tamen adstringentibus agendum est.

Casus interdum sequi dixi, circa quem observa. I. In *infantibus* modò radices remaneant, in quibus regenerandi spes residet, spontè iterum *renasci*. II. *Molarium appendicem*, quia ita cum dentibus committitur, ut ipsorum pars ossea videatur, raro *decidere*. III. *Geminos*, si exciderunt, nunquam ferè redire. IV. Dentibus ex ebore arte factis & insertis adimpleri posse, modò caveatur, ne ex compressione, gingivarum vel nervorum inflammatio sequatur.

CAPUT II.

De Dentium symptomatibus.

ARTICULUS I.

De Odontalgia.

Symptomata Dentium sunt, *Odontalgia*, *Stupor*, *Stridor* & *Nigredo*.

Odontalgia est tristis dentium sensus, ab ipsorum continui per humores solutione procedens.

Tristem sensum dico. Dentes enim & mollium

Gg 3

cerebri

cerebri nervorum, ex quinta & sexta propagine participes sunt: & nervulum ad radicem dentis implantatum habent, membranulæ cavitatem intus succin-
gentes.

Subiectum sunt dentes maximè molares. Iste tamen dolor, à dolore *puerorum dentientium*, qui, cum canini erumpunt, maximus est, quique à durtie & densitate gingivarum oritur, & si pinguedine gallinæ vel lacte canino inungatur, evanescit, alius est.

Signis opus non est: diligenter tamen à *gingivarum* dolore, quæ interdum inflammantur, tumescunt, putrescunt, quique exemto dente non sedatur, discernendus est.

Causa est humor continuitatem solvens: de quo in Differentiis.

Curatio est *Bona spei*, si se pus in aure colligat. si tumore in gingivis vel malis exorto, prius non apparen-
te, materia ab interioribus ad exteriora transpor-
natur. *Exigua*, si febris ardens & insuetus dentium
stridor accidat; quia is, cum ob convulsos tempo-
rum musculos invadat, & cerebrum tactum esse in-
dicio sit, delirium primò; mox, quia mali confirma-
ti signum est, mortem minatur. *Peragitur* I. *Dolo-
ris*, si nimis urgat per *Narcotica mitigatione*. Pro-
sunt *Opii grana duo cum croci æquali parte* in bom-
bace indita. Oris cum *aceto* & *Opio* collutio; pillu-
læ ex *Opio* & *Theriaca* Andromachi formatæ. *Trans-
plantatio* in nucem avellanam: de qua vide Becke-
rum, in Medico Microcosmo. Dolor sopito, os il-
lico decocto *Salviæ* & *Rorismarini* eluatur. II. *Hu-
moris* peccantis *evacuatione*, per sanguinis missio-
nem, quæ fit propter *Revulsionem*, ex majore venâ;
propter derivationem, ex auriculis, vel sub lingua,
ubi nec vesicatorium post aures negligendum. III. *E-
jusdem Repulsione* & *Interceptione*, ubi locum habet
Emplastrum de *masliche*, *gummi Elemi*, & *Taca-*
mahaca

mahaca benè calefactum temporibus appositum.
IV. *Discussione* per Emplastrum de *Meliloro*, & alia.
V. *Proprietate agentium applicatione*, ex quibus præ-
cipua, Canis mortui *dens* in fornace ustus, cum
posca mistus & impositus. Radix *lapathi acuti* ante
germinationem vere collecta, exsiccata, & denti
dolenti applicata. *Senecta Serpentis* in vino vel ace-
to cocta. gummi *hederæ* dentibus insertum. VI. *Ex-
tractione*, quæ si dens aquâ ex sale armoniaco destil-
lata tangatur, facilitabitur. Nota istud in quacun-
que causa R. Radic. *Filicis*, *Pentaphylli ana dr. iii.*
Bistorta dr. ii. *Foliorum Ruta*, *Salvia*, *Beton. Flor. ro-
sar. ana m. f.* Coque in vini rubri adstringentis, &
aquæ commun. q. f. ad consumptionem tertiæ par-
tis pro collutione oris.

Differentiæ sumuntur ab *Ortu*, *Loco* & *Qualitati-
bus humorum*.

I. *Ortu*. Interdum à *Capitis vertice* confluent; & tum, per venam *Cephalicam* revellendum est. ea quæ de repellentibus supra innui, observanda. Interdum ab *inferioribus* oriuntur, & tum per *basilicam* revellendum.

II. *Loco*. Interdum in *dente* hærent; & tum, Dolor non est ita profundus. secundum latitudinem dentis extenditur. plerumque vermem intus continet. ad cuius motum dolor exasperatur. Interdum in *nervulo*, in radices dentis, & membranam hujus nerveam, tendente, & tum Dolor vehementior est. Secundum gingivas in latitudine se extendit, & ad aurem pertingit. dente exemto, quòd ob viam patefactam dolor melius diffusetur, levatur. Interdum in *maxillas ipsas* decumbit, & tum, In superiorem per oculum anguli majorem, in inferiorem per venas temporum confluit. Repellentibus, quia materia ad fauces delata suffocat, periculosè tentatur.

III. *Qualitatibus*. Alii sunt *Calidi*, serosi, *falsi*
G g 4

falsi & acres, qui acerrimum, sed ob subitas mutationes citò desinentem dolorem excitant: rarò male tumorem conjunctum habent. Repellentibus, inter quæ Radices *Oxylapathi* in vino austero decoctæ, & cum vino in ore detentæ: radices *prunorum Sylvestrium* ablato cortice exteriori, quod præcipuum, cæteris paribus, tolluntur. Alii *Frigidi & pituitosi*, à quibus remissior & diuturnior est dolor. male tumorem plerumque inferunt. Præmissis Universalibus. *Camphora scr. f. Spirit. vini* unc. ij. vel *Gummi Juniperini* unc. f. cum vini Rhenani unc. viij. decoctis, & in ore retentis; vel denique *Ol. de still. Caryophyllor.* gutt. ii. cum Camphoræ pauxillo, denti cum gossypio impositis, tollitur.

ARTICULUS II.

De Stupore, Stridore, & Nigredine dentium.

I. *Stupor dentium* fit, i. Interdum ab *acore* sive ciborum, sive humorum, sive vaporum, quod hypochondriacis accidit. ii. Interdum ab *imaginatione* ad limarum strepitum, vel acerborum ab alio masticationem. Si acutus valde fit sonus & stridulus, applicatio vim patitur quasi in angusto facta: tum & membrana auditus quasi icta offenditur, unde contrahitur repente, ac cum ea simul & nervuli quidam usque ad radicem dentium, in quem locum subito incidens novus aer, horrorem quandam circa dentes facit. Tollitur masticatione *Cerae, panis calidi, panni, &c.*

II. *Stridor* procedit i. Ab imbecillitate *musculorum* maxillæ à frigore inducæ. ii. A *vermibus* cerebro per consensum affecto. ii. A *vaporum* multitudine, ut in paroxysmorum principis. Solet Apoplexiam, &c.

& in febribus apud insuetos delirium, si hoc non præcessit, minari.

III. *Nigredo* à variis causis procedit, tam *Externis*, quàm *Internis*. Illæ sunt, Detergendi incuria. Dulcium & calidorum usus. Hydrargyri illitus. Istæ i. Exspiratio *cruditatis* & crapulæ. 2. *Humorum* vitium, propter viscerum maximèque lienis impuritatem à quartana relictam. Tollitur dentifricio ex *radic. alibes, iridis Illyricæ*, in aqua, cum salis gemmæ & aluminis ana q. f. coctis, post in fornace exsiccatis, in minutissimum pulverem contritis, accum aliquot moschi granis mixtis, compositum. Dentifricia componuntur, ex *maxillis lucii piscis* ustis, *corall. alb. ossib. dactylorum* ustis, *sepia piscis, testia ovorum* ustis, *cornu cervi* adusto, &c.

TITULUS XII.

De Gingivarum affectibus.

Gingivarum præcipui affectus sunt *Excrecentia*, & *Parulis*.

I. *Excrecentia* interdum tanta est, ob spongiosam gingivarum raritatem, & uberiolem sanguinis affluxum, ut dentes, præsertim molares obtegantur. Caro excrecens interdum est laxa, sordida & flaccescens; crüorem etiam, si paulatim attingatur, de se fundit: Nonnunquam putredine corripitur; aliquando ejus est expers. In *Curatione* adstringentibus, *alumine usto, sale ammoniaco, mastiche, thure* in pollinem redactis, si nulla putredo adest, utendum: si adest, *Aqua viridis* Plateri, Hartmanni, nec non *Unguentum de Aquilegia* commendantur. Hoc multo usu comprobatum est. R. *Pulv. folior. Aquileg. salvia, mentha crispa, Nucis moschata*, ana unc. f. *Aluminis usti* unc. j. *Mellis purissimi* unc. iv. Mel bene igne despumetur, calenti & despumato pulveres inspergan-

spargantur. F. Linimentum, pro inungendis dentibus.

III. *Parulis est inflammatio gingivarum, ad dentium radicem intus & foras ad eam prominens, ut etiam vicina partes distendantur, calcant, & ru-beant.* Procumbit in maxillam superiorem, ex oculorum cantho majore; in inferiorem, per tempora & venis eò definentibus. *Abscessus* hinc sequitur, cuius pus non ad faciei cutem, sed ad dentium radices exili velamento testas irumpit. *Ulcus* si malè curatum est, caruncula exstat, & prominet, *Epulis* nuncupata. Curandi ratio eadem, quæ in inflammationibus cæteris. Potest vena sub lingua aperiri. Juvant & cucurbitulæ collo admotæ. Observa in *Topicis*, Medicamentis asperis & mordacibus supersedendum esse. Ab aceto abstinendum, cum gingivas sua natura molles & raras erodat. In *Epulide*, *virriolum* adpersum valet.

TITULUS XIII.

De Maxillarum affectibus.

Maxillarum præcipui affectus sunt, *Immobilitas & Luxatio.*

I. *Immobilitas* inferiori maxillæ accidit, vel propter luxationem, fracturam, maxillæ cum capite coalitum: vel propter destillationem è vertice capitis derivatam, quæ in ejus articulum ad radicem auriculæ insluit, insequente dolore & tumore duro ac conspicuo. Huc & *Scorbutica* maxillarum rigiditas pertinet.

II. *Maxilla luxatio est ejusdem vel altera tantum parte, vel utraque ad priorem partem, rara sed periculosa depulsio. Cognoscitur* exinde, quod os in ea claudis nequeat, locutio depravetur, masticatio tollatur; & si luxatur processus rostri similis, qui sub

sub jugali osse inferitur, ipso osse jugali humilior fit, & extra ipsum fertur. De *Curatione* notandum.

1. Citò sumendam, ne musculi affecti propter ramos nervorum, qui à secundo & quinto cerebri pari orti, in musculos maxillam moventes inferuntur, cerebrum in consensum trahant. 2. Si non restituitur, periculum mortis circa diem decimum, cum febre continua, & dormiendi inexpugnabili necessitate, minari. *Dividitur* in eam, in qua alterâ tantum parte maxilla depellitur; & tum, à parte illa in anteriorem magis prominet. in adversum ipsâ & mentum inclinatur. os distorquetur, & ordo dentium inferior & superior ita sibi non responder, ut sub incisoriis sint canini. *Curatio* videatur apud Practicos. Et in eam, in qua utraque depellitur; & tum, Ordo dentium sibi responder. Os magis hiat, & balbuties insequitur. Maxilla inferior cum superiore non potest committi, sed illa magis prominet. Propter quatuor musculorum maxillam sursum trahentium, & nervorum ipsis inferorum affectum, unde dolor, inflammatio, febris acuta, ventriculi dolores, periculo non caret. *Curationem* vide ibidem.

TITULUS XIV.

De Gurgulionis affectibus.

Gurgulionis affectus præcipui sunt *Laxatio & Inflammatio.*

I. *Laxatio est, quando is præter naturam citra inflammationem intumescens, ab humore plerumque pituitoso, à cerebro transmissio, in longum extenditur.* Tum dicitur *κλινισ γαλασ ροη. γαφύλη* autem, sive nava, quando ima parte in rotunditatem crassescens, supra qua dependet, gracilior efficitur, ut uvæ à pediculo suo pendentis speciem præ se ferat. Tum verò radici linguæ & faucibus incumbit, titillatione molestâ;

lesta; quâ qui afficitur, hanc perpetuò vorare frustra contendit, metuitque ne ejus impetu stranguletur. Columella ipsa mollis est, albicans, concolor palato, sine dolore & calore. Humor è Cerebro demittitur, quod præcipuè fit in Catarrhis. *Curatur* iste affectus, ut inflammatio. Si columella est erosa, contemperandus est acris humor. hinc extergendum. Profunt *Orum recens* ad duritiem coctum, per medium scissum, & vertici per aliquot horas impositum. In infantibus, *Charta munda* quadruplicata, lactis materni & aquæ rosacæ æ. p. imbuta, vertici imposita. Pulvis ex *piperis longi ser. j. succi acacia, rad. tormentilla ana ser. ij. compositus*, & post adstringentis gargarismi usum insufflatus.

II. *Gurgulionis inflammatio*, est ejusdem à sanguine bilioso in eum delapso, cum rubore, ardore, dolore, suffocationis periculo, interdum febre, intumescencia. Res se in ea habet, ut in aliis Inflammationibus.

TITULUS XV.

De Tonsillarum affectibus.

Tonsillarum præcipui affectus sunt *Inflammatio* & *Ulcus*.

I. *Tonsillarum inflammatio* est earum ex affluxu humorum genita intumescencia. Cognoscitur intus sub maxilla tactu visuque, ubi ceu frustulum quoddam faucibus inhærescens, mole sua premit, obstatque ne cibus, potus, aut saliva faciliè transeant. Adest quoque dolor, ardor, rubor, & sitis; & facilius in tonsillas quàm gurgulionem ob mollitiem & laxitatem, substantiæ, ac temperamenti proprii & loci caliditatem & humiditatem cadit. *Oritur* Externè in pueris, ob *adduſſationem*, cui tenera corporis textura accedit,

accedit: in *lactentibus*, ob lactis vitium & pravitatem: in *puellis*, ob menstruum insufficientem purgationem: *adultis*, ob nimiam meri potationem, multam & avidiorem ciborum maximè acrium & asperorum devorationem. Internè ab humorum calidorum & acrium affluxum. *Curatur* ad modum aliarum inflammationum: hoc tamèn attendendum, interdum tonsillas nimio refrigerantium & repellentium usu indurari.

II. De *Ulceribus* hæc veniunt notanda. I. Sine febre securiora esse. II. *Æstate* suborta, quia citò feryunt, pejora quàm quæ aliis oriuntur temporibus. III. Interdum citra inflammationem vel ex destillatione salia partes illas exedente, vel ex halitu adscendente, quod in lue venerea accidit; interdum ex aliis causis, tempore verno & aëre pestilenti, oriri. IV. Alia *familiaria* esse & mitia, quæ sunt exigua, munda, non altrè descendunt, nec inflammata, nec dolorem excitantia. Alia *maligna*, & *pestilencia*, quæ lata, cava, concreto humore albo aut livido, aut nigro sordentia; quod si concretæ illæ sordes altius descenderint, Eschara gignitur. V. Circa fauces cum magna molestia serpentina, difficultatem spirandi adferre; quod si in pectus per trachæam penetrant, eodem illo die strangulare. In *Curatione*, Omnia oris ulcera, tum ne amplius serpent, tum quia semper à saliva fiunt humidiora, validiora adstringentia reposcere. Et tantum de Capitis morbis.

MEDICINÆ PRACTICÆ

LIBER IX.

De Morbis medii ventris.

TITULUS I.

De morbis Faucium, seu Angina.

ET tantum de morbis & affectibus Cerebri: sequuntur morbi medii ventris, qui sub se affectus Faucium, Gutturis, Aspera arteria, Pulmonum, Thoracis, Mamillarum & Cordis continent.

Faucium morbus est Angina, seu faucium, id est summarum gula gutturisque partium, per quas tum cibi potusque, tum spiritus introitus est, spirationis & deglutitionis difficultatem inferens, præclusio.

Signa communia sunt, spirationis difficultas, quia guttur præcluditur. Deglutitionis impedimentum, tum quia gula obsidetur, tum quia muscoli duo à larynge exorti, œsophagici & Circulatores quod suis fibris transversis, semicirculum imitantibus œsophagum complectantur dicti, cibi & potus ad inferiora detrusione, dum laryngem deglutitionis tempore sursum trahunt, ut locum cibo cedat, adjuvantes, occupantur: tum quia muscoli faucium, cibum ad œsophagum, dum ad suum principium contrahuntur, detrudentes, patiuntur. Dolor circa fauces, qui pro ratione Causarum & subjectorum vel augetur, vel minuitur.

Causæ sunt omnia præcludere spiritum apra: ut in Differentiis dicitur.

Curatio

Curatio in Differentiis videatur.

Dividitur ratione Causarum in tres species, quarum prima quatuor habet.

I. Alia est ab Inflammatione, quæ Cognoscitur ex febre continua, si simul cætera adsint. Oritur à sanguine, qui è venarum jugularium ramis, in eas partes, præcurrente plerumque difficili colli sine Causa evidente, motu, dolore, ac calore circa fauces insueto, influit. Curatur Difficulter, si febris magna est, & sputum subaridum, glutinosum & crassum. Dubio eventu, si materiâ in pulmones transmissâ, Empyema exoritur: si ad caput, deliria excitat; si ad pleuram, dolorem pectoris cum tussi & difficili respiratione causatur: si ad cor, tremorem & pulsuum obscuritatem infert. Nullo, si febris invalescat, facies ægri viridescat, sinus oculorum denigrentur, extrema frigeant, lingua nigra & crassa cernatur. Si spuma circa os appareat, quia extremam cordis angustiam significat. Curatio ad normam aliarum Inflammationum instituitur, ubi tamen quædam peculiariter observanda veniunt. De Venæ-sectione nota, 1. Si dubitatur, utra pars magis affligatur, cum hepar sit mittens, ex dextro brachio mitti sanguis debet. 2. Ubi minor est spirandi difficultas, largius sanguis mitti potest; ubi major, mitius, interjectis vicibus, quatuor vel quinque horarum intervallo. 3. Cucurbitulæ si statim parti loco affecto propinquæ impostæ fuerint, major ad illam confluxus excitatur. supra renes ergo non in brachio nec in collo apponi debent. Purgatio statim in principio instituenda. Repellentia intus in faucibus adhiberi debent, & quidem in forma gargarismorum, colutionum oris, & linctuum. Laudantur, lapis prunella, compositum ex moris, musto, & nucum corticibus, quod insuavitatem & adstringendi vim nimiam habet. medicamenta ex sempervivo, plantagine

gino, portulaca, &c. Digerentia die tertio vel quarto repellentibus admiscenda. Declinante morbo cancerorum combustorum cinis cum melle illinendus, vel cribratum canis album, vel gallina, vel aliquid de nido hirundinis. Inter maturantia est, Cassia medulla in ore retenta, gargarismi ex lacte tepido cum saccharo. Emplastrum ex altheae. malv. ana p. j. flor. Meliloti, chamæmeli totid. semin. Lini, foenigr. ana dr. f. ficuum pinguium n. x. farinae tritic. p. ij. formatum. Ad Ruptionem valet Cataplasma ex cremore radic. iridis recentium, cum butyro & ol. violaceo. Inter Specifica sunt, Fungus sambucinus coctus & bibitus. Hirundinum pulvis, si sale adpersi unâ cum pennis in fictili comburantur, & cinis melle mixtus illinatur. Rasure dentis apri scr. j. si cum olei Amygdalar. dulcium unc. f. misceatur, & cum saccharo cando albo dulcoretur. Secretum Guntzmanni apud Hartmannum. In Dieta ad Clysteres nutrientes deveniendum. Dividitur dupliciter: 1. In quatuor Species Cynanchen, &c. de quibus inferius, quarto numero. 2. In illam, quæ à puro est sanguine, in qua major est colli distentio, faciei color est rubicundus: & illam, quæ à pituitoso, in quo omnia sunt mitiora.

II. Alia est à vertebrae colli luxatione; & tum, Casus aut ictus antecessit, aut humor præter naturam vertebrae vincula laxavit; vel illa de propria sede disiecit; nullum ex signis, quæ in aliis prodita sunt, apparet. Cervix ponè excavatur, ægræque & cum dolore circa cæphagum inflectitur. Dolor, extra si tangatur, sentitur. Lingua ex propriis locis excedit. Curatio ex suo fonte peti debet.

III. Alia est à pituitosa defluxione, in fauces & cervicis musculos decumbente. & tum, Dolor est paucus, gravativus. tumor ferè citra ruborem, aut cum exiguo, latior. febris adest nulla, aut fortè lenta.

Vox

Vox raucescit. saliva est copiosa. aperto semper ore hiant, & aërem attrahunt. difficultas est deglutendi circa suffocationis periculum. Curatio ad Catarrhum est obvertenda.

IV. Ab inflammatione quæ oritur, alia est πυρρῆς, quæ in internis laryngis, seu gutturis musculis delitescit; & tum, neque in faucibus intra, neque in cervice extra, quicquam ruboris vel tumoris apparet. fauces ita vehementer cum metu strangulationis dolent, ut erecta cervice & aperto ore, ægri spirare cogantur. lingua livescit, nigrescit, & ob summam venarum circa ipsam repletionem intorquetur. febris est acutissima, & morbus intra quartum diem, imò octodecim horas jugulat. Prostant hircines venis sub lingua appositæ: de quibus apud Zacutus Lusit. l. 8. c. 2.

Alia πυρρῆς, quæ in externis musculis hæret: & tum, Tumor & rubor intus ore diducto & linguâ depressâprehenditur. si die non critico evanescat, tuberculum verò sine dolore, quod nec naturæ, nec artis beneficio suppuratur, remaneat, mortem; quia relictâ foris crassâ materiâ, tenuior & ferventior ad guttur conversa est, & ruboris recidivam; quia materia calidior ex accidente aliquo intro pulsâ est, minatur.

Alia πυρρῆς, quæ in interiore faucium ambitu continetur. & tum, Cervicem quoque ad linguæ radicem comprehendit. tumor atque rubor foris cum dolore & calore est conspicuus, qui si ad interiora sine causa decurrat, subito translatâ materiâ evanescit. symptomata nihilo sunt, quam cæteris leviora: sed tamen spes salutis, quod inflammatio foris proficiens, evocari digerique possit, melior.

Alia πυρρῆς, quæ solam cervicem ejusque musculos, linguam & os hyoides contingentes, prehendit. Hæc omnium est levissima, propter distantiam

Hh

ipsius

ipsius à gutture, & partium constitutionem, quæ glandulosæ, molles & laxæ, affluentem humorem sine difficultate recipere possunt. quia laryngis musculi non inflammantur, respirationis via non intercipitur.

V. Alia est, quæ solvitur *diaphoresi*, causâ ejus distracta, revulsa, evacuata, vel discussa. Alia, quæ *maturatione*, & puris ex illo aperto evacuatione. Alia, quæ *per materia ad aliam partem translationem* finitur, quod ex tumoris & doloris subita cessatione, pulsusque mutatione cognoscitur. Transfertur 1. *Ad Cerebrum*, & tum dolor capitis gravis, phrenitis & delirium excipit. 2. *Ad Musculos colli*, & tum dolor, tumor, interdum convulsio excitatur. 3. *Ad pulmones & pleuram*, & tum dolor pectoris, tussis, difficilis respiratio oritur. 4. *Ad Cor*, unde tremor, syncope. & pulsus obscuritas afficiunt.

TITULUS II.

De morbis Gutturis.

CAPUT UNICUM.

De Strumis & Bronchocele.

MOrbi gutturis sunt *Struma in gutture*, & *Bronchocele*.

I. *Struma seu Scrofula in gutture sunt tumores in glandulis, è pituitâ lenta geniti, & propria membrana inclusi.*

Signis multis opus non est: tumores sunt rotundi, penduli, ad tactum mobiles; & à cute separabiles.

Causa est Pituita, quæ aliquando sola est, alitquando cum melancholia jungitur, è cibis crudis & crassis, unde ætati puerili est familiaris, oritur, ab aquis etiam mercurium in se continentibus, quales sunt in Carinthia, Styria, & circa Alpes, eodem

maximè

ximè protruditur. Interdum cum succo nutriente, si is quantitate peccans totus non absumitur, à natura, ad glandulas tanquam partes ignobiliores mittitur. Membrana, cui includuntur, à facultate formatrice nunquam oriosa profertur. Dum enim ab affluente humore superfluo membrana distenditur, & forsitan etiam rumpitur, natura novæ quasi membranae texturam aggreditur.

Curatio his nititur. I. Evacuanda materia, quæ causa est. II. Absumenda eadem, *scrophulariâ*, radice *urtica mortua*, *filipendula*, *gladioli*; maximè *radice rusci*, cujus in pulverem redactæ dr. j. singulis diebus cum vino absumenda. III. Per topica emollienda, incidenda, discutienda. Laudantur *folia cupressi*, quorum pulvis vino conspergatur, & in massam unam redigatur, & hoc medicamento strumæ illinantur, nec nisi tertio die solvatur. IV. Suppuranda, mutata in pus aperiendus tumor. pus evacuandum. sinus expurgandus, carne denique implendus.

II. *Bronchocele est tumor in gutture, amplo spacio extuberans, à flatu exortus, & cum tensione conjunctus.*

Flatus iste sub cutem membranamque generalem, cuti substratam adnexamque in colli interioribus, irrumpit. Fit ab aëre, qui, dum cutis cui membrana illa, quæ eo loci crassior est & rubicundior, quam alibi, à subjectis asperæ arteriæ musculorumque colli anteriorum sedibus, per conatum vehementem, (id fit, dum spiritum retento excrementa, vel foetus in partu, excluditur; aut buccæ vehementer inflantur) avellitur, & spaciū ibi efficit, ob fugam vacui irrumpit, & cutim ac membranam in tumorem elevat.

TITULUS III.

De Asperæ arteriæ morbis.

ASperæ arteriæ morbi sunt; *Asperitas, Angustia, Vulnura, Vlcera.*

I. *Asperitas, quæ lævitatæ naturalis defectus est, Cognoscitur ex raucedine vocis. Oritur, vel ab externis, ut oleo si vetustate vel frizione rancidum est, nucibus, pulvere, fumo, &c. Vel ab Internis, aut humoribus à capite delapsis; aut vapore parietes ipsius feriente. Curatur lenientibus & lævigantibus, quæ Arteriaca dicuntur; & hæc, vel omnis mordicationis sunt expertia, ut butyrum, lac, mustum dulce, decoctum passulatum, glycyrrhiza, jusuva, tragacantha: vel simul abstergentia, ut, saccharum, mel carica, saccharum penidium, Syrupus violatus, jusubinus: vel cum acrimonia, ut Hyssopus, radix ireos, semen Urticæ, spica, thus, myrrha. Maxime profunt, pillulæ bechica, Trochisci bechichi. Oleum amygdalarum dulcium cum saccharo cando.*

II. *Angustia arteriæ asperæ, Cognoscitur ex respirationis difficultate, & imminente suffocationis metu, modò majore, modò minore. Oritur, Aut à causis comprimantibus, ut luxatione vertebrarum, inflammationibus, tumoribus, laqueo, &c. Aut à causis obstruentibus, ut Rebus externis illapsis, quæ removendæ. Internis, humoribus crassis, glutinosiss, qui incidendi, attenuandi, extergendi, Syrupo capillorum veneris, prassii, glycyrrhizæ. Pure, grandine, calculis in pulmone genitis, carne post vulnera & ulcera adnata.*

III. *Vulnera vel superficiem tangunt, & tum curari possunt: vel Cavitatem, & tum aer ita egreditur, ut admota candela extinguatur. si substantia cartilaginea est vulnerata, per transversum præfer-*
tim,

tim, vix coalescunt: si inter duos annulos, interdum sanantur.

IV. *De Vlceribus hoc monendum. Ab humoribus acrib. falsis, venenis & medicamentis oriri. Cum dolore, sanguinis sputo, in principio puro, post purulento, ita ut & crustulæ ejiciantur, affligere. Si internam cavitatem occupent, difficilia, ob partium situm & naturam curatu esse. Si Cartilagineas excendantur, & putrilago accedat, non curari.*

TITULUS IV.

De Pulmonis morbis.

CAPUT I.

De Pulmonis intemperie.

Pulmonis morbi sunt, *Intemperies, Peripneumonia, Angustia, Vulnus, Phthisis seu Vlcus.*

Pulmonis intemperies est ejusdem à temperie naturali ad præternaturalem, propter causas tam externas quam internas, deflexio.

Signa in Differentiis experimentur.

Causæ sunt vel Externæ, & hæc variæ, potiones nempe frigida vel calida, medicamenta applicata; aer qui parum alteratus ad pulmonem deferitur, in illis qui columellâ destituuntur. Vel Internæ, Humores, qui eò sive ex Capite, sive ex aliis partibus, ex hepate frequentissimè deducuntur.

Curatio ad causas obvertenda, Ubi ratione humorum nota, 1. Difficulus ob situm partis avelli: evacuari tamen debere. 2. Si copiosior est pituita, commodius expectorantibus & emollientibus, ut est radix Eryngii, Altheæ, Malva, Passulæ, quam incidentibus tolli. 3. Multa calida hic non convenire, ne tenuioribus partibus absumtis crassiores mancant.

Optimum est *semen lini*. 4. Si cum materia febris acuta addit, *Eclegmatibus* abstinendum esse. siccitate quippe sua & lentore expectorationem supprimunt. Unde frequentior sit respiratio, ac materia fervore contumaciam induit.

Dividitur intemperies pulmonis dupliciter.

I. Alia est *sine materia*, quæ nullum suffocationis periculum habet, & facilius curatur. Alia *cum materia*, quæ evacuanda, & revellenda: ut supra diximus.

II. Alia est *Calida*, quæ *Cognoscitur* ex eo, quod genæ propter fumos adscendentes rubeant. siccitas linguæ cum siti, quæ non nisi frigida aëris inspiratione sedatur, infestet. & quod anhelitus sit frequens & celer. In *Curatione* medicamenta refrigerantia, quæ per asperam arteriam eò devchi debent, adhibenda sunt. *Vbi nota*, 1. Valida refrigerantia & repellentia pectori esse inimica, sanguinis & spiritus vias interceptando, ipsamque thoracis naturam, cum sit cartilaginea & ossia, labefactando, 2. Inter præcipua interna numerare *Papaver album*, nigrum, & rheas, *violas*, *Endiviam*, *Hordeum*, *Nimphaam*, & ipsorum syrupos. 3. Dietam conformem esse debere, & in potu *Aqua hordei cum syrupo violato* valet.

III. Alia est *Frigida*, quæ *Cognoscitur* ex eo, quod Causæ refrigerantes præcesserunt. respiratio sit parva, tarda, rara, & pulsus ipsi similis. Exspiratio sit frigidior. In *Curatione* medicamentis calefacientibus utendum est; inter quæ præstant, *Crocus* qui anima pulmonis, Extr. *calami aromatici*. *Theriaca* verus, *Tussilago*, *Nicotiana*, *Scabiosa*, *radix Ireos*, & *Aronia* præparata, *Elixir proprietatis*, *Mixtura simplex*, *Oxymel scilliticum*, &c.

IV. Alia est *Humida*, quæ *Cognoscitur* ex eo, quod vox sit rauca, anhelitus frequens, cum sibilo, Stereopte, & multo sputo. In *Curatione* cavenda mul-

tum siccantia & adstringentia. Pro sunt *Oleum sulfuris*, *flores sulfuris* in ovo sorbili, vinum in quo *oculi Cancrorum* macerati fuere, *sassafras*, *radix China*, &c.

V. Alia est *Sicca*, quæ *Cognoscitur* ex eo, quod homines contabescant sine ullo ulcere. respiratio sit parva & frequens. sitis sit continua, sputum paucum. In *Curatione* profunt *Passula*, *lac muliebre* & *asininum*, *aqua testudinum destillata*, *aqua vitulina*, *Conserva violarum*. Extra, balneum aquæ dulcis.

CAPUT II.

De Peripneumonia.

Peripneumonia est pulmonis à sanguine in substantiam ejus effuso, cum pectoris angustia, spirandi difficultate, febre acuta, & tussi, inflammatio.

Signa sunt. Pectoris angustia cum dolore gravativo & spinam attingente. ubi membrana pleuram attingentes sustentantur, isque dolor remissior est, nisi membrana simul inflammata fuerit; quod si est, simul punctorius evadit. *Difficultas spirandi*, & quidem major quam in pleuritide, utpote cum periculo suffocationis. æger erectus spiritum ducere cogitur, thorace eo situ facilius dilatato, quippe qui decumbentibus in se concidit, eo quod pectoris partes in spinam declinant, quæ erecta thorax etiam simul fertur, non amplius seipsum gravans. *Respiratio* illa est sublimis, ita ut in ea summus moveatur thorax ad opera scoptula usque. est etiam principio frequens, & magna, quæ brevi ob virium imbecillitatem & instrumenta spirandi in parvitatem mutatur, & frequentia augetur. *Exspiratio* est calida, & quia cor expulsiōne fuliginum levatur, levantur & illi quo plura expirant. *Acuties* in febre major est quam in pleuritide, ob cordis vicinitatem; hinc, calidi vapores ad caput exhalant, qui sanguinem simul rapien-

tes, malis imprimunt, ubi cutis tenuior est, & rubere faciem faciunt. Oculi & temporum venæ tument. *Tussis* molesta est ob pulmonum affectum. Coniungitur cum *Sputo*, quod tenuiore primum sanie, mox cruore, aliàs alio colore tinctum, interdum spumofum redditur.

Causa est sanguis, qui ex dextro cordis sinu in venam arteriosam effunditur, & non modò venas & arterias pulmonis, sed etiam totum corpus implet. Concitatur à causis externis, ut, aëre frigido, aquilonari australem sequente, exprimente; potu vini generosioris, motu vehementiori post quietem longam & corpore repleto, ira, &c.

Curatio est *Alicujus spei*, si sputum ex rubro & flavo mixtum aliquod coctionis signum exhibet; & si abscessus aut ad aures aut ad sedes thoracis inferiores sunt, & vel in fistulam ut evacuari possint abeunt, vel ad crura derivantur. *Dubia*, si sputum propter materiæ contumaciam & virium imbecillitatem deest. si sudores circa cervicem & caput oborti, cum urinis multis & crassis prodeunt; quia illi ex impetu, suffocatione, & violentia esse putantur. De cætero sequitur methodum aliarum inflammationum. Si *alteri morbo* successit, & jam sanguis evacuatus est, brachiis & thoraci cucurbitulæ scarificatæ applicari debent. Expectorantia sint validiora, & Topica fortiora.

Differentia sumitur à Subiecto & Causis.

I. Alia est *totius pulmonis*, qui si una cum corde inflammatur, ut procedat in latus, resolutionem seu paralyfin ægro infert. Nam sanguine in arteriam magnam copiosè influente, ut arteriæ intercostales impleantur, & ramuli etiam illi qui per foramina vertebrarum thoracis in spinam penetrant, tumeant, nervi ex spinali medulla ibi progredientes, comprimuntur & resolutionem excitant.

Alia

Alia est *alterutrius partis*; & tum dolor ac gravado in alterutra parte sentitur. si superior ala laboret, ad claviculas se extendit: si inferior, ad diaphragma. Vena in illo latere, in quo inflammatio, secanda est.

II. Alia est à *Sanguine puro*, unde fit phlegmone. *Cognoscitur* ex eo, quod sputum cruentum citetur, nisi admodum sit crudus morbus. præcordiorum rotisque pectoris angustia premat. gravitas summa sternum dorsumque contrahat. febris acuta non admodum urat. Sanguis autem ille, *interdum* in angina è faucibus irruit, & tum intra septem dies moriuntur; si hos effugerint, purulenti evadunt: & quia in illis qui sunt medii inter senes & ætate juveniles, expultrix facultas languidior est quàm in minoribus, difficulter curantur. *Interdum* ex pleuritide eodem derivatur, non quidem per vasa, quia nullus est ipsorum ductus; sed per membranam, quæ omnes thoracis partes investit: & tum etiam, quia fit translatio ab exterioribus ad interiora, à minis nobilibus ad nobiliora & cordi viciniora, malum est.

Alia à *Bilio*, unde angina in peripneumoniam vertitur, & pulmo spongiosus tenuiorem materiam facilius admittit, & penitus imbibit. *Cognoscitur* ex eo, quod tussis flavum nec multo cruore permixtum sputum trahit. pectoris angustia, gravitatisque sensus minor est. febris flagrantior incendio torret.

CAPUT III.

De Pulmonis angustia.

Pulmonis angustia est vasorum ejus propter obstructionem, compressionem, vel exsiccationem interceptio, tussim, oppressionem & respirandi difficultatem inducens.

Hh 5

Signa

Signa, causa, & Curatio ex Differentiis petantur.
Differentia à Causis & partibus affectis sumuntur.

I. Alia est *Arteriarum asperarum*, de qua sequentes Differentiæ consulantur, quæque ab obstructione &c. proveniunt.

Alia *arteriarum levium*, quæ *Cognoscitur* ex respiratione, non quidem in principio, sed & incremento difficili; pulsû omninò vario, inæquali, intermittente, interciso, magno, celere, tardo, raro, frequente, vehemente, propter luctum inter naturam fuliginis ob angustiam arteriarum expellere non valentem, & causam morificam; Oppressio jam cordis, palpitatione ejusdem & animi defectione. *Oritur*, vel à *Crassis viscidis* & pituitosis humoribus; & tum, pulsus est durus per tensionem, magis variat, sed & magis est æqualis. Non ita difficulter curatur, præsertim si sit recens. *Curatio* infra dicenda exigit. Vel à *Tuberculo*; & tum, pulsus est durus per tensionem & siccitatem. inæqualitas ejus propter causam magis fixam est uniformis. De *Curatione* inferius agetur.

II. Alia (*asperarum arteriarum* intellige) est ab *Obstructione* per sanguinem, humorem, &c. de quibus infra. Alia à *Compressione* ex iisdem ferè causis, quod & in hydropse fit. Alia ab *Exsiccatione*, metallurgis frequens, quæ lac amygdalatum exposcit.

III. Alia est *A sanguine* obstruente vel comprimente arterias asperas, eodem seu ex pulmone seu aliunde excussio, qui revellendus, evacuandus, si in grumum abiit, per *Oxymel scilliticum, poscam*, id est, mixturam ex aqua & Aceto unc. vi. pondere, ita ut sit potu jucunda, nullam ob acetum tussim excitet, tepida ter vel quater de die detur; dissolvendus.

Alia ab *Humore*, qui Vel est *copiosus*, & tum, si in solam membranam guttur succingentem destillatione

tione profluit, vocem obscurat, & raucedinem infert. si in gutturis cavum ductumque incidit, tussiculam cum quodam acrimoniæ irritantis sensu, inducit. Vel est *Crassus & viscidus*, qui, Rarò in pulmonibus, quia tenui & puro sanguine aluntur, gignitur: semper ferè à catarrhis de capite delapsis oritur. Vi caloris successu temporis, in vitream aut gypseam abit pituitam, quæ multis circuitu destillationibus redeuntibus, magna ejus copia cumulata, asthma infert. Idem arida tussii vehementissimè exercet, quæ vix quicquam extunditur: Spiritum difficilem reddit: inter spirandum stertorem aut sibilum elidit, quod pulmonum bronchiis sit pertinaciter impactus. Destillationis notas, vel à cerebro, vel à vicinis partibus antecedentes habet. In *Curatione*, dum materia præparatur, *Tussilagini, prassio*, & aliis incidentibus, *Borrage, Glycyrrhiza, passula* admisceantur. *Purgatio Agarico* bene perficitur.

Alia est à *Pure*, quod ex aliquo apostemate effunditur, & tum Expectorantia locum habent.

IV. Alia ex *Causis toto genere præter naturam*, ex quibus sunt, I. *Calculi*, alii præduri ac solidi; alii veteris casei consistentiæ, omnes propria cysti inclusi, & asthma producentes. II. *Tubercula*, quæ *Oriuntur* ex materia in una parte collecta, & inde extuberante, nulla destillationis nota præcedente; & asperæ arteriæ adnascuntur. *Dividuntur* in *Cruda*, quæ difficulter cognosci possunt. nunquam suppurantur, & nullam febrim conjunctam habent: & *Suppurata*, in quibus pus membranula propriaque cysti tam arctè concluditur, vix ut quicquam de se tetrum in corpus exspirent. Tum; *Ægri* sublivido sunt colore, lingua ipsis lentore quodam maximè cum longè à cibo absunt, oppleta est. Corporis agitatione, aut potu cibove calidiore urina tingitur. post concitatiores motum, pillulæ parvæ & globuli in-

star

star pisi exigui, membranulâ inclusi, è pulmone red-
duntur. Tussis etiam tum molestâ & spirandi diffi-
cultas excitatur. Dolor ægrotos continuò affligit,
inprimis ubi vehementius & concitato motu moven-
tur. Ex his æger *non convalescit*, nisi 1. Ut suppura-
tio citò fiat. 2. facta suppuratio citò erumpat. 3. ad
superiora vergat, & per tussim ejiciatur. 4. Torum
pus evacuetur. 5. Ut venter, id est, Cavitas illa, in qua
pus continebatur, perfecte agglutinetur.

CAPUT IV.

De Pulmonis vulneribus.

Pulmonis vulnera benè Cognoscuntur, ex respira-
tionis ob lationem organorum difficultate. spu-
mantis ex ore sanguinis cum tussi rejectione. ruben-
tis spumantisque ex pectore sanguinis sine dolore
expuitione, Cervicis venarum turgentia. faciei mo-
dò rubente, modò pallido colore.

Fiunt autem bifariam. Nam interdum accidit, ut
Caro pulmonum ladata; & tum, quia sanguis in ca-
vum thoracis destillat, nec cruenta expuitio, nec
tussis ulla urget. respiratio est difficilis. caloris & fri-
goris propter halitus è corde vicissitudo apparet. In-
terdum venæ pulmonis afficiuntur, & tum sanguis
rubicundus, niger, spumofus affluit. tussis est perpe-
tua, nisi virum imbecillitas, aut pulmonum oppres-
sio à sanguine adsit.

Curantur, 1. Si sanguinis profusio sistatur, &
inflammatio pulmo obnoxius, per venæ sectionem
cohibeatur. II. Si sanguis, in qui in cavitatem effu-
sus est, subsistat. III. Si, ubi idem propter vulne-
ris angustiam effluere non potest, vulnus scalpello
amplietur. Inter sanguinem sistentia medicamenta
sunt, *Fragaria, Veronica, Scabiosa, Alchymilla, Sani-*
cula.

cula, Consolidata, &c. Extra, mordicationis sunt ex-
pertia, Bolus Armenus, Thus, &c.

CAPUT V.

De Pulmonis Ulcere, seu Phthisi.

Phthisis est pulmonum à materia acri erodente,
cum febre lenta, tussi, sputoque cruento & puru-
lento, exulceratio, quâ sensim totum corpus consumi-
tur & extenuatur.

Subjectum hujus exulcerationis est Pulmo cum
partibus suis; substantia nempe carnosa, bronchiis,
vasis & membranis. In iis præsertim, quibus caput
facile impletur, & ad Spiritus organa multas de-
stillationes mittit: quibus à prima nativitate vitiosa,
id est, tenera, mollis, ac corruptioni parata pulmo-
num est substantia. Unde tabida stirpe nati, quasi
hæreditario jure, tandem omnes necessariò tabe mar-
cescunt: quibus naturalis est pectoris angustia & de-
pressio, collum angustum, corpus macilentum, pro-
minentes à tergo in morem alarum scoptulæ.

Signa sunt, 1. Febris lenta, à vaporibus ex ulce-
re elatis, & in cor irrudentibus exorta, cum qua con-
junguntur aliæ aliàs Erraticæ, aliàs tertianæ modo
invadentes, dum humores intra venas ab illo calo-
re accensi putrescunt: ipsa verò sine intermissione
hæctica, facta, mox à cibo & noctu aliarum more in-
valescit. 2. Tussis frequens, vulpina, absque dolore
magno, quæ noctu potissimum affligit, & propter
irritationem pulmonum à materia acri existit. 3. Spu-
tum cruentum & purulentum. Illud non in omnibus
est. Nonnulli post exfcreationem liquidi & flavi hu-
moris, levi febricula correpti tabescere coeperunt,
ac multo post tempore, cruoris exiguum quid-
dam cum pure ejecerunt: non pauci sensim sublati
sunt, in quibus toto temporis decursu, nihil o-
mninò

minùd cruoris comparuit. Quin iuniores magis quàm seniores afficit; quia illi sanguinis copia, caliditate, acrimoniâ, valorum laxitate, & duritie laborant, violentiore motu se exercent, & diætâ negligunt. Hoc id singulare habet, quod, si ex substantia exeat, spumofum fit. igni appositum foeteat. in aqua primum spargatur, dein collectum subsideat. 4. *Corporis extenuatio*, quæ à febre lenta est, quæ calore igneo in totum corpus disperso, sanguinem arteriosum, cujus cum venoso necessaria est ad nutritionem mixtura, dissolvendo, concoctionem alimenti in toto corpore impedit, & calore præternaturali quod concoctum & appositum est, absumit.

Causa est materia acris erodens, eodem illapsa: de qua in Differentiis agetur.

Curatio non est desperanda, etiam jam exorto ulcere. Nam Galenus tales ad Tabias mittit, & lac eis præscribit. *Difficilis* est tamen, *tum* quod sanies & pus in molli & spongiosa illa carne hærens, citra tussim expurgari nequeat, quâ pulmones magis indies læduntur: *tum* quod in assiduo respirationis motu, cui tussis insuper violenta accedit, consolidatio nulla fieri potest: *tum* quod medicamenta integris viribus tanto intervallo non perveniant; *tum* denique, quod febres humectantia requirant, quæ ulceri nocent. *Respicit* sex. I. *Catarrhi sublationem*, de qua in Differentia. II. *Ulceris curationem*, ubi laudantur flores *sulfuris* cum ovo sorbili, Syrupus de *Erysimo* Lobelii, de succo *hedera terrestris* cum floribus *sulfuris*; de *althæa* Fernelii, de succo *piloselle*, millefolii. C. C. *prepar.* decoctum *Pimpinelle*, *Symphyti*, *saccharum rosatum* vetus, cum sero lactis caprini. *Secretum Freytagii*, quod apud eundem de Opio vide. Radix *Chinæ*, *Guajacum*, &c. Singulis horis *Looch de Symphyto* cum *Conserva rosarum* rubrarum lambatur. III. *Sanguinis correctionem*, ut

bonus

bonus affluat. In Diætâ itaque prodest *Lac*, quod serositatē suā ulcus abstergit, caseositatē consolidat, & tabidum corpus aërea butyroscque pinguedine humectat. *Lac* certè caprinum in prandio sumi deberet, si febris magna abest, aut capitis dolor, unde non acefcat, nec nidorescat in ventriculo: in Cœna, *Emulsio* ex semine papav. albi. frigid. majorib. ana. dr. j. lactis Amygdal. dulcium lib. j. item lac cum *Oryza* coctum. si lac non convenit, *hordeum deglutatum* cum jusculo galli in cremorem redactum. Destillata non probantur, quia vis nutritiva alembicum non transcendit. IV. *Febris sublationem* per refrigerantia & humectantia. IV. *Extenuationis* per restaurantia *depulsionem*; ubi locum habent, *Pultes* ex lacte, vitellis ovorum butyro insulso, saccharo, farina hordei & oryza. *Balneum* lactis repidi, post quod pullus assus lacte saginatus succedat. *Limacum* stillatitius liquor, Aqua *mirabilis*, quæ l. 8. apud Zacuthum videantur. V. I. *Nocturna totius per sudores colligationis aversionem*, Tum exhibenda vesperi, *Conserva rosarum* rubrarum cum Syrupopapaveris, jujubino, *Diacodio*. Pectus & Spina inungenda, linimento resumptivo cum oleo *rosarum* & violarum, &c.

Dividitur phthisis ratione causarum & durationis bifariam.

I. Alia est à *Sanguine*, qui in pulmones effusus grumescit & putrescit. Et in hac in principio, paribus cæteris, phlebotomia locum habet.

Alia ab *Humore acri* sive seroso sive bilioso, qui vel à capite demittitur, nec ejicitur per tussim; & tum curatio ad Catarrhum obvertenda est. vel à corde in pulmones effunditur. Vel ex suppressis mensibus aut hæmorrhoidibus regurgitat; & tum Curatio ex suis locis peti debet.

Alia, sed rara, à *pituita dulci*, si majore copia ad

ad pulmonem confluat, bronchia obstruat, substantiam humidiorē reddat, & ob diutīnam ibidem moram, ac ventilationis carentiam, putrescat.

Alia à *Pure*, ex rupto angina, uvulæ, pleuritidis, Empyematis, &c. abscessu. Hinc *Hippocrates*: Qui ex pleuritide Empyi fiunt, si in quadraginta diebus non liberantur, phthifici fiunt.

Alia à *Contagio* ex phthificorum anhelitu; quo pertinet *lepus marinus* specifica venenositate pulmones erodens, & felium ac canum in secundo præsertim emissus spiritus.

II. Alia est *Recens* & incipiens, in qua non sunt tam valida Symptomata.

Alia *Confirmata* & diuturna, in qua *gena* cum pallore faciei livefcunt, etsi interdum ob vapores è pulmone ascendentes rubeant. *respiratio* ob facultatis imbecillitatem, bronchiorum obstructionem, seu à puris copia eo demissa, seu ob multa excrementa, quæ in pulmone debilitato colliguntur, difficilis evadit. *pulsus* modò sunt languidi, modò celeres, nunc ob siccitatem corporis duri, nunc ob materiam humidam arterias humectantem molles. *sudores* ob facultatis naturalis debilitatem, per somnum, copiosissimi erumpunt. tandem malo jam vincente, portiones putridi pulmonis intolerabili cum foetore ejiciuntur. *Capilli* ob alimenti corruptionem & penuriam, defluunt. *Ungues* absorta carne, quæ in summis digitis existebat, incurvantur. *pediculi* ob alimenti corruptionem generantur. *extrema*, maxime pedes, propter extinctionem caloris nativi tumescunt. *diarrhœa* tandem, ex retentricis ventriculi & intestinorum imbecillitate cum sputi suppressione supervenit. Vide *Freytagium* de *Phthisi*.

TITULUS V.

De morbis Thoracis.

CAPUT I.

De Mediastini inflammatione, & Diaphragmatis tumoribus.

Thoracis morbi sunt, *Mediastini inflammatio*, *Diaphragmatis tumor*, *Pleuritis*, *Empyema*, *Tubercula dorsi*, & *vermes dorsi*.

I. *Mediastini* seu septi, quod pulmonis lobos disjungit, inflammatio *Cognoscitur*, ex febris continua, respiratione frequente & celere, & maximo thoracis incendio, dolore ad sternum, cui mediastinum alligatur, exiguo, rejectione rubra primò, post flava; sed, quia inter duplicem quasi membranam materia colligitur, & non faciliè nisi eà erosa evacuetur, non copiosa. *Oritur* à sanguine, eoque præcipuè bilioso. *Curatur* ad modum aliarum inflammationum. Ubi nora, Medicamenta reprimantia, frigida quidem, sed non adstringentia esse debere. *Oleum violaceum* maxime laudari, quod tepidum, nisi tempus æstivum sit, pectori inungi debet.

II. *Diaphragmatis tumores* sunt duplices.

Alii sunt *Frigidi*, qui *Cognoscuntur* ex spirandi difficultate, hypochondriorum, nullo apparente in iis ad tactum tumore, tensione, delirii absentia. *Oriuntur* à materia cruda & tenui, in Diaphragmatis densitatem, ex ejusdem vel compressione vel percussione, penetrans. *Curantur difficulter*, si sint diuturni, quia agrum ad tabem deducunt. *Facilius*, si sint recentes. *Nullo modo*, si delirium accedat. *Primò* materiam præparatam evacuantibus, inter quæ *Hydragoga* maxime laudantur. *Post* emol-

lientibus & digerentibus , *Sassaparilla* inprimis , nisi humor indurari cœperit.

Alii sunt Calidi , qui *Cognoscuntur* in principio ex febre continua & acuta , dolore , respiratione parva & frequente , præcordiorum tensione , ad locum diaphragmatis palpitatione , vel saltu : in *progressu* , ex delirio , respiratione inæquali , parva , magna , frequente , rara . *Oriuntur* , à sanguine calido & bilioso . *Curatio* est *Difficilis* , propter ingens periculum . Imitatur etiam inflammationem pulmonis.

CAPUT II.

De Pleuritide.

Pleuritis est pleura & adjacentium musculorum , ab influxu humoris fervidi exorta , cum dolore lateris punctorio , tussi , respiratione difficili , febre continua acuta , pulsu duro inæquali & frequente , inflammatione .

Signa pathognomonica sunt dolor *pungitivus* , quia membrana exquisitissimi sensus à materia acri distenditur . *Pulsus durus* inæqualis & ferratus , quia pars nervosa inflammata est . *Tussis* , ob irritationem & transudationem , quæ initio sicca , in progressu cum sputo cruento & purulento conjungitur . *Respiratio* frequens & parva , quia ob dolorem , musculi satis dilatari nequeunt . *Febris acuta* , ob inflammationem cordi vicinam . Et hæc omnia non sparsim adeste , sed conspirare debent .

Causa est materia fervida , seu sanguis vel purus vel impurus , qui potissimum ex vena cava cordi affidente , per ramum qui *ζωγος* dicitur , in tenues ejusdem propagines influit . quibus apertis , ruptis , vel poris dilatatis , impetu pleuram incurrit : quandoque per intercostalem superiorem , rarius per thoracicam & mammariam irrumpit . Suppeditat eam

plethora,

plethora , cacochymia , & viscerum sanguificantium æstuositas . Movetur à variis causis externis , subita præsertim refrigeratione , flatu boreæ post austrum , exercitatione nimia , &c.

Curatio est *Bona spei* , si sputum maturè coctionem recipiat , & facile ac promptè excernatur ; & si quarto die exspuat æger album , leve , æquale , idque ter vel quater tussiendo , in septimo terminabitur ; si seprimo , ultra undecimum vel decimum quartum non extendetur . si sanguinis è naribus , hæmorrhoidibus , utero , fluxus , in die Critico , cum signis coctionis accadat . si , quod rarissimum est , *πυρρὸς* materia ad articulos & minus nobilia membra fiat . *Dubia* , si ichores tenues saltem exspuantur . si flava bilis sputo admodum permixta , multò post initia appareat , quia naturam nihil adversus morbum tentare significatur . si Sputum sit flavum , sincerum , & aquositate multæ promixtum . si idem glutinosum , quia ex calore adurente lentor contrahitur . si æruginosum & spumosum . si nigrum , quia humoris pravitatem , & caloris nativi extinctionem significat , si excretio tussim ac spirandi difficultatem non sedat , quia vel malignitas materiæ , vel expultricis debilitas significatur . si in Empyema post quatuordecim dies abeat . si in peripneumoniam facescat . si senibus accadat , quia ob caloris inopiam materia non concoquitur . si in corpora densa & exercitationi dedita , cæteris paribus , incidat . *Nullius spei* , si in ea nihil exspuat . si pulsus sit durus , parvus , & ob calorem frequentissimus . si sanguinis aliquis fluxus in initio absque alleviatione contingat , quia æger plerumque in quarto moritur . si pleuritis sit tanta , ut epas & ventriculus in consensum trahantur , & diarrhæa superveniat . si pleuritis post alium diuturnum morbum , corpus cachecticum adoriatur . si plurimus ex sputo strepitus in pectore sonet , vultus demissus sit .

& oculi aurugine & caligine obducantur. *Respicit*
 I. *Humores affluentes* & affluxuros, qui revellendi.
 II. *Fluentes*, qui non intercipiendi, nec repellendi,
 sed derivandi. III. *Impactos*, qui discutiendi, vel
 quoquo modo tollendi. IV. *Dolorem*, qui mitigan-
 dus. V. *Febrem*, quæ compescenda. VI. *Vires*, quæ
 roborandæ. De his omnibus ista notentur. I. *Vene-*
sectionem quam primum esse administrandam, in op-
 posito latere, ad revulsionem, si corpus est pletho-
 ricum; in non plethorico, è directo affecti lateris, &
 si ad claviculam vergat. 2. Si *mensēs* vel *hamorrhoi-*
des repenti supprimuntur, è vena tali vel poplitis
 primò evacuandum: si suppressio est antiqua; è vena
 brachii. 3. In *Derivatione*, tam diu mittendus san-
 guis, donec color in eo mutetur. 4. *Dolori* fomen-
 ta adhiberi possunt in non plethorico, etiam ante
 venæsectionem; in plethorico non item. Præstat
 hic unguentum ex *Diatheæ* unc. j. *Ol. Amygdal. dul-*
cium unc. f. compositum, quo partes dolentes illi-
 niri debent, desuper tenuis *flor. chamæm.* pulvis in-
 spergi, tandemque folium brassicæ calidum, butyro
 aut pinguedine porcina inunctum supponi, idque
 per totum tempus curationis, addito *Ol. stillati a-*
nethi & camphoræ pauxillo, fieri. 5. Commodè
 statim in principio, & sudor excitatur, exhibitis vel
Papav. rhæados aqua unc. iii. cum dr. j. pulv. de
Corallo, avellanis rubris, mandibula lucii piscis: vel
mistura simpl. dr. 1. cum aqua *Cardui Maria*; vel
Spiritus nitri cum Spiritu vini ana scr. i. Spir. Tar-
tari scr. f. in aqua *papav. rhæados*, vel simplice, &c.
 6. *Decocta* pectoralia, cum appropriatis continuè
 post præmissa universalia sunt administranda, ut
 sputum facilitetur. 7. *Specificâ* proprietate agunt,
flos papav. errat. lappa sicca, *Cynosbati candidi*, se-
 men *Cardui Maria*, *priapus taurinus* vel *cervinus*,
ramenta dentis aprini, &c. vide *Petræum*, quæ pul-
 verizata,

verizata, pani in aqua scabiosæ intincto benè im-
 ponuntur. 8. *Abscessum* feliciter rumpunt, Cata-
 plasma ex *herba Kaly*, radicibus *lilii albi recentis*,
 &c. lateri dolenti applicatum. 9. Post illa *Lac cha-*
lybeatum, nisi febris impediât, optimum est.

Quantum ad Differentias.

I. Alia est *Legitima* & exquisita, cui superiora
 debentur, quæque I. *Oritur* vel à sanguine puro,
 in qua est sputum sanguineum, tensio venarum cir-
 ca tempora & frontem, cum sensu gravitatis circa
 oculorum cavitates & capitis anteriora. Vel à san-
 guine biliōso, in qua sputum est flavum; quod si
 absque ratione evanuerit, ægri in delirium conji-
 ciuntur. Venæ salvatellæ sectione feliciter cura-
 tur. Vel à *pituitoso*, in qua sputum spumofum,
 tardius dulce. *syrupus Zacuti* libro 8 C. 3. *Histor.*
 in ea valet. Vel à *melancholico*, quæ per modum
 affluxus rara; II. Afficit, vel *interiorem tunicam*,
 & tum æger facilius in latus patiens decumbit,
 quodd tumor nec suspendatur, nec distendat. Vel
exteriorem circa ossa, & tum res contrariō mo-
 do se habet. Vel *utramque*, & tum supinus decu-
 bitus dolore liberior est. III. Afficit vel *partem*
dexteram, vel *partem sinistram*: vel *superiorem* ad
 jugulum, vel *inferiorem* ad hypochondria pertin-
 gentem.

II. Alia est *Notha*, seu spuria, quæ pro ratione
 materiæ & situs distinguitur. Alia est à *Flatibus*, in
 qua dolor est vagus, fomentis mitescit & sæpe dif-
 curtitur. causæ status generantes præcessere. mirifi-
 cè pulvis cymini in folia brassicæ butyro illita asper-
 sus, & foris loco dolenti applicatus, valet. Alia à
Destillatione, quæ sensum delapsus præcedentem ha-
 bet, contactu exacerbatur, fomentis non cedit.
 Curatio catarrhum tenuem respicit. Alia *Exter-*
na, cum sanguis per ramos ab axillari in externos

thoracis musculos effunditur; & tum dolor pressu excandescit, molestus est in latūs ægrum decubitus, nihil excernitur, facilis est in veram transitus.

CAPUT III.

De Empyemate.

Empyema est cavitatis thoracis à materiâ purulenta copiosa constipatio, & difficultate & respirationis cum tussi sputoque purulento inducens.

Subiectum est thoracis capacitas, sive spaciū inter thoracem & pulmones, licet pulmo & ejus vala prorsus excludi non possint. Quoniam verò pulmo in duas per mediastinum partes dividitur, vel in utraque vel in alterutra parte pus colligitur.

Signa sunt respiratio difficilis cum sputo tussique purulenta perpetua. doloris gravantis in imo thorace ad diaphragma potissimum sensus. genarum, tertia præcipue vel quarta post cibum horâ, rubor, &c.

Causa est ipsa purulenta sordities thoracem implens, cujus copia sœtor & acrimonia graves noxas infligit.

Curatio est *Alicujus spei*, si ad sectionem vel usionem pus album effluat. si dextri potius sit lateris quàm sinistri, & æger sit robustus. *Nullius*, si totus thorax in respiratione attollatur. si tota cavitas occupetur. si sinistrum latius. si ad sectionem vel usionem subcruenta & foetida exeant. si ad eandem pus aut aqua universim effluxit. si iis specillum à pure velut ab igne coloratur. *Respicit* I. Suppurationis concoctionem. II. Abscessus ruptionem, quæ salforum esu, crebris sputationibus &c. perficitur. III. Puris evacuationem, ubi quo natura vergat, nempe an sursum versus, an ad intestina vel vesicam videndum. Sputum

Sputum procuratur egregiè *Ol. sulfur.* & *Spiritu terbinth.* decoctis pectoralibus permistis. Laudatur succus *hedera terrestris*, *prassii*, cum *thure*, *myrrha*, *diapenid.* in Looch compositus. De *Ebeni decocto* & *Testudinum Syrup.* vide *Zacutum* l. 8. c. 11. His nil proficientibus, ad sectionem & usionem pervenientum: de quibus vide Authores.

Quantum ad *Differentias*. Aliud est à *ruptura* præcedentis alicujus *apostematis*, ut anginae, pleuritidis, peripneumoniae, quando per suppurationem terminantur.

Aliud quando ex *vena aperta*, *rupta*, vel *erosa* portio sanguinis in particulam pulmonum secedens in pus abit, & per summa cystim sibi efformat: de qua superius actum est.

Aliud à *destillatione à capite* ad pectus delapsa, & intra dies quatuordecim per sputum non repurgata.

CAPUT IV.

De Tabæ & Vermibus dorsi.

Tabes Dorsi est, quando illud contabescit. Species ejus sunt quatuor. I. *A nimia Venere*, & tum videntur ægris ex superioribus partibus à capite velut fornicæ in spinam demitti, semen ipsis interdiu & noctu effluit. in principio nulla adest febris, sed temporis successu accedit. II. Cum calor *Spinalis medulla* insitus à *copiosiore sanguine* obruitur, & ferè extinguitur. III. Cum oclusis *meatibus*, per quos nutrimentum ad eam deferretur, *exsiccat*. IV. Cum *prava destillatio* in eam decumbit. Vide *Salium Diversum*, & alios.

II. *Vermes Dorsi*, seu Crinones, infantes infestant. *Cognoscuntur* ex eo, quod infantes quidem comedant, sed non nutriantur: imò contabescant, quod

propter pruritum molestissimum & lancinationem inquieti sint; & quod in balneum illatis & fortiter fricatis, capilli quidam cineritii aut nigricantes è curre prorepant. *Oriuntur* à materia viscosa, in venis capillaribus sub cute conclusa. *Tolluntur*, si infantes linimento ex farina triticea & melle confecto illinantur, & Capitella, quæ vermiculi mox exserunt, novacula absceindantur, &c.

TITULUS VI.

De symptomatibus Pulmonum & Thoracis.

CAPUT I.

De vitis Respirationis.

Symptomata pulmonum & thoracis sunt, *Respirationis vitia*, *Asthma*, *Tussis* & *Hæmoptysis*.
Ad vitia Respirationis pertinent,

I. *Μακρόπνοια*, seu respiratio magna, thoracem admodum distendens, & copiosum aërem adducens, quod *vis februm*, in quibus cordis calor accenditur, ideòque refrigerii plurimi & fuliginum educationis magna est indigentia, accidit.

II. *Ταχύπνοια*, seu respiratio major & frequentior, quàm pro naturæ modo, usu ejus à calore & fuliginibus adaucto. *Oritur* vel ab intemperie cordis, pulmonum, pectoris; vel abundantia halituum calidorum; præsertim ubi facultas imbecillior, quàm ut justæ thoracis diductioni sufficiat.

III. *Δυσπνοια*, seu Difficultas respirationis, vitio ipsorum organorum exorta, quæ *Cognoscitur* facile, & ultro sese in sensus ingerit. *Oritur* I. Vel ab *Externis*, fumo nempe argenti vivi, Carbonum, Calcanthi, calcis, inunctione Mercurii, & aliis. Vel ab *Internis*, angustiam vasorum, seu Obstructione, seu

Com-

Compressione (de quibus superius actum est) inferentibus. *Subsidere* etiam ob arefactionem, quamvis rarò ista accidere solet, quando pulmonum substantia ulcere ita consumpta aut exsiccata est, ut dilatari amplius nequeat, quod phthisicis ante mortem accidit, consuevit. II. Alia est *Per Essentiam*, cui hactenus dicta comperunt. Alia per *Consensum* I. *Thoracis*, cujus motus seu spirituum seu musculorum vitio impeditur. 2. *Diaphragmatis*, cujus motus impeditur, vel quod nervi ipsi inserti lædantur: vel quod vapores ab inferioribus exhalantes, circa idem subsistant: vel quod humor aquosus id comprimat, &c. 3. *Epatis*, *Lienis*, & *Ventriculi*, quæ interdum distenduntur & tument. III. Alia est *Levior*, in qua densior crebriorque citra sonum & anhelationem spiritus, & de quo jam dicta sumi debent. Alia *Gravior*, seu *Asthma*: de quo inferius.

IV. *Άνωια*, seu senilis respirationis ablatio, summo cum suffocationis periculo conjuncta. *Oritur* partim ab iisdem causis in summo peccantibus; partim contrariis, necessitate nempe diminuta, vel usu sublato. Contigit aliquando post esum *fungorum*, aliquando in gravissima uteri suffocatione & syncope. *Curatio* ad causas & morbos (de quibus alibi) obvertenda.

CAPUT II.

De Asthmate.

Asthma est frequens densa & anhelosa respiratio, à pertinaci bronchiarum pulmonis seu obstructione, seu compressione, proveniens.

Signa Incipientis sunt, gravitas pectoris, in cursu & acclivi itinere difficilis respiratio, raucedo, tussis, flatus in præcordiis, &c. *Præsentis*, in definitione sunt exposita. Adest aliquando febris, sed & sonitus

I i §

& ster-

& stertor, quia quandoque materia in bronchiis asperæ arteriæ hæret, quæ, dum spiritu exploditur, sonitus excitatur : quandoque extra eas in lævibus arteriis. Inspiratio expiratione est difficilior. Cum enim in inspiratione nec pulmones ob materiæ copiam, nec thorax ob motus imbecillitatem facile moveri possit; natura interpositâ, quasi quiete vires dejectas refocillare conatur; in expiratione Operis instrumenta suapte sponte concidunt.

Causa est asperarum arteriarum, sed & lævium, obstructio & compressio: de qua superius dictum; & à quibus causis fiat, inferius dicitur.

Curatio Causas respicit, & est *Difficilis*, si ægri sint senes. *Parva spei*, si gibbi ex eo ægri fiant, quia in his pulmonibus crescentibus & Spina non crescente, in angustia pectoris, calor suffocatur. si sit cum febris acuta, quia causa asthmatis à calore febrili exsiccata ineptior ad ejiendum redditur. si Tussi cessante, difficultas respirationis manet. si vires sunt imbecillæ, quia citò in syncopen incidunt.

Differentia partim à Causis obstruentibus & comprimantibus, partim ab accessionibus, & aliis sumuntur.

I. Aliud est ab *Humore viscido* bronchias infarcente, quod exinde *Cognoscitur*, quod difficilis sit cum sonitu & tussi respiratio. *Curatur* 1. venæ basilicæ sectio, si nihil obstat. 2. Materiæ per incipientia benigniora, cum humiditate conjuncta. sæpius mutata, ne natura assuescat, incisione. Laudatur *Oleum Angelicæ*, syrupus *Nicotiana*, *Augeniorum* patris & filii, *Theodati* in Pantheo Hygiastico, *Decoratum Ioselis ex Zedoaria*, *gummi Ammoniaco*, *floribus sulphuris & Croco*, *Oleum saccharinum Grulingii & Petri* in Nosologia. secretum *Freytagii* in Aurora Medicor. *Oxymel scilliticum* cum Syrupo violar. &c.

3. Evacuatione, per *pulverem asthmaticum Rulandi*.

4. Exsic-

4. Exsiccatione per *Guajacum*, *Sassafras*, &c. Dividitur humor in eum qui in *pulmone colligitur*; & tum sensim difficulter respirare æger incipit: difficultas est continua. Et eum qui *aliunde allabitur*, & tum Continua totaliter non est. Exacerbationes sunt manifestæ. Purgantia propter periculum vitanda.

II. Aliud est ab *Humore seroso*, in ramis venæ cavæ majoribus fervente, & *spissus* per dextrum ventriculorum cordis in pulmones irruente, ac arterias comprimente. Et hoc est frequentissimum. Venit inprimis ab *Epate*. Hinc pedes asthmaticis intumescunt ob ejusdem imbecillitatem. humores ad pulmones primo ruentes, lapsi ad renes suo, urinæ difficultatem excitant. Eructationes & flatu in præcordiis inter ejusdem signa censentur.

III. Aliud est à *Crudo tuberculo*, *grandine & calculis*: de quibus superius in angustia pulmonum actum est.

IV. Aliud est *Levis*, cum stertore, strepitu, & tussi violenta, diaphragmate & intercostalibus, imò & abdominis musculis opitulantibus. Aliud *Gravius*, *Orthopnoea* dictum, in quo respiratio est parva, densa & velox admodum, quæ non nisi pectore & cervice rectis peragitur, musculis etiam superioribus pectoris & scapularum, operam conferentibus.

V. Aliud est *Non periodicum*, quod paroxysmos suos non observat. Aliud *Periodicum*, quando humor vel propria natura ad majus se spacium extendit, vel à Causis externis exagitur, si ibi collectus est: vel statò tempore aliunde affluit. Exacerbationes istæ fiunt hyeme vel autumnò præsertim, quia materia est pituitosa. *Noctu*, quia tum temporis movetur, secundum lunæ motum, & quarto fere die. Succurri ei potest, cæteris non neglectis, vel scrupulo *Croci in vino malvatico* calidè exhibito: vel *Brunneri* potiuncula ex *Ammoniaco dr. j. A-*

qua

qua hyssopi unc. iv. Vini Rhenani unc. ij. composita.

CAPUT III.

De Tussi.

Tussis est vehemens, crebra & sonora spiritus copiosi prius à pulmonibus attracti efflatio, à veloci pulmonis & thoracis contractione edita, ut id, quod spirandi organis molestum est, excutiat.

Signis in tam evidenti Symptomate opus non est.

Causa est, quicquid pulmones & asperam arteriam, membranamque quā intus vestitur, afficere potest, sive sit aliquid externum, sive humor sive vapor, &c.

Curatio vel respicit Causam, à qua exoritur; vel tussim ipsam, si vehemens est, quæ aut lenitur paregoricis seu Anodynis, aut tollitur sensum obtundentibus, ut syrupus de papavere, Diacodio, Theriaca recente, &c.

Differentia tussis sunt variae.

I. Alia est à Causis externis, ut aëre frigido, pulvere ex lino, vaporibus calcis, rancidis, pinguibus, scalpturnā vehementer aurium, unde affectus dolorificus partium nervosarum oritur. quæ minus vehemens est, nisi à re aliqua in trachæam incidente oriatur; sed & minus periculosa. Curatur causa ablata. A frigidityte, sola Spiritus cohibitione.

Alia est à Causis internis, nempe, I. Humore, qui I. vel est viscosus; & tum nihil, aut admodum parum exspuitur. Intemperiem frigidam conjunctam habet. validior est. Curatur præmissis universalibus, incidentibus & expectorantibus. Inter purgantia dilutum agarici cum pauxillo Oxymellis scillitici præstat. Inter incidentia & expectorantia, Aqua vis. bechica Ioëlis, Liqueur sacchari

Hart-

Hartmanni. Elixir proprietatis à gutt. vj. ad xij. 2. Vel Tenuis; & tum nihil exspuitur, quia inter ejciendum à Spiritu ita disploditur, ut in pulmones relabatur. Intemperiem calidam & catarrhum plerumque conjunctum habet. Materia intus putrescens, aut febrem putridam, aut hecticam, aut ulcus excitat. Curatur præmissis universalibus incrassantibus & lenientibus; qualia sunt, syrupus jujubinus, papaver rhæad. diatragacanthum frigidum, &c. 3. Vel in pulmonibus continetur, & tum, Intemperiei habenda est ratio: vel ab aliis partibus appellit, ut Cerebro in catarrho, ubi signa Catarrhi adsunt. tussis est vehementior & perseverans. in senibus, quia non maturatur, periculosa. si frequens ac diuturna, ad sanguinis sputum deducit. Inferioribus partibus, ut in hydrope, lienis, epatis, & ventriculi inflammatione, &c. II. Vapore, qui vel pulmones obstruit, vel membranam ferit; & tum, Ab aliis plerumque partibus & morbis vapor submittitur. tussis est arida, & interdum parum irritans. quando patiens loquitur aut hiat, potius accidit. In Curatione agendum per Causæ vapores mittentis remotionem, Vaporis repulsionem, revulsionem, &c. Accidit, aut in Febris, quæ instare paroxysmum indicat. futuros abscessus prænunciat. si febre soluta remaneat, recidivæ periculum minatur: aut in Vermina, quæ vel per vaporum putridorum ad pulmones appulsum, vel per membranæ cesophagi, quæ membranam asperam arteriam investientem in consensum trahit, vellicationem exoritur, & signis vermium se exferit. III. Pure, quod in phthisi, peripneumonia, pleuritide, vulnere & inflammatione diaphragmatis, &c. accidit. iv. Tuberculo crudo, grandine, &c.

II. Alia est Sicca, in qua nihil tussiendo excernitur,

tur, seu facultatis seu materiæ vitio. Alia *Humida*, in qua materia rejicitur.

Utraque vel est *Recens*, *ἰσχυρὸς* dicta, in qua levis duntaxat ad tussendum propensio fatigat, non secus ac nausea vomitum præcedens, & quæ sola spiritus cohibitione interdum comprimitur: vel *Invetrata*, graviora symptomata proferens.

III. Alia est *Periodica*, quæ ex certis intervallis bis terve anno affligit, & ex irruente destillatione plerumque proficiscitur.

Alia, quæ vel *Continenter*, vel *minima intermissione* fatigat, quæ aut vitiosam pulmonum affectionem, aut obstructionem veterem, aut aliam stabilem causam intus habet.

CAPUT IV.

De Hæmoptysi.

Hæmoptysis est Sanguinis cum tussi ex partibus respirationi dicatis, reiectio, citra illarum inflammationem accedens.

Signis opus non est, cum affectum visus patefaciat.

Causa est, quicquid venarum unitatem solvit, sive id fiat per modum anastomoseos, sive diæreseos. sive diapedeseos.

Curatio sanguinem sistere jubet, & causas respicit. Nota in ea, Revulsionem fieri debere per Venæ-sectionem in brachio; vel si mensium suppressio adest, in talo. Malam sanguinis qualitatem temperandam esse. Purgantia non debere esse calida, nec fortia. Inflammationem, in parte unde sanguis exit, avertendam. Grumos sanguinis, sed non solo aceto dissolvendos. Adstringentibus vel sistentibus avertentium usum supersedendum. Topica frigida fugienda. Laudantur inter sistentia, *Centinodum* in

in iusculo coctum, & partibus adhibitum. *Scaligeri pulvis*, quem apud *Petræum* in Nosologia vide.

Differentia à Causis & partibus sumuntur.

I. Alia est ab *Anastomosi* venarum: Alia à *Diaresi*, Alia à *Diapedesi*. de quibus videatur caput de hæmorrhagiâ narium.

II. Alia est à *Cerebro mittente*, quæ *Cognoscitur* ex sanguine minimè spumoso, cum sreatu nonnunquam & tussi reiecto, Capitis dolore gravativo, venis frontis elatis, exscreatione frequenti, sensu caloris & saporis sanguinei, Gargarismata hic valent.

Alia à *Faucibus*, quæ *Cognoscitur* ex sreatu, solutione continui depressa lingua conspicua, quæ gingivas & oris partes etiam prodit cum simplici exspuitione. Gargarismate ex *corticibus radic. prunor. sylvestr. sumach. &c.* tollitur.

Alia à *Guttur*e, in qua sanguis frequenti tussicula cum dolore laryngis rejicitur.

Alia ab *Aspera arteria*, in qua prodit sanguis paucus, ruber, & calens; aliquando cum ramento parva tussi reiecto, & partis nonnullo dolore.

Alia à *Thorace*, in qua sanguis est minimè spumosus, sed nigricans & grumosus, interdum foetidus & puri mistus, cum tussi & dolore reiectus. *Curatur*, 1. Venæ epaticæ dextri lateris sectione, & detrahi per vices ac paulatim sanguis debet. 2. Evacuatione per cholagoga. 3. Incrassatione, ubi valent *Trochisci de Carabe, de spodio, de terra sigillata, &c.*

Alia à *Pulmonibus*: in qua sanguis est spumosus perseveranter, floridus, fervens, confertus, cum tussi, absque dolore: quandoque ipsius putrefacta particula una rejicitur.

Alia ab *Inferioribus partibus*: in qua sanguis exiguus, vomitu cum dolore & cruenta deiectione ejicitur, &c.

TITULUS VII.

De Cordis affectibus.

CAPUT I.

De palpitatione Cordis.

Cordis præcipui affectus sunt, *Intemperies, Palpitatio, & Animi deliquium.*

De *Intemperie*, calida præsertim, libro secundo actum est. De humida frigida & sicca, nihil singulare occurrit, cujus in reliquis non possit fieri mentio. Itaque de istis duobus duntaxat agemus.

Palpitatio cordis, est ejusdem vel quod molestum est expellentis, vel quod utile est attrahentis & deficiens restaurantis, inordinata & ex dilatatione & subsidientia composita motio.

Differt à *Tremore*, quòd hic locum mutet; illa majorem & minorem saltem occupet. hic sit facultatis moventis; illa instrumentorum, & partibus aliquin immotis accidere potest.

Signa ipsis sensibus satis sunt manifesta, visui nempe tactui, & auditui. Arteriæ præcipuè jugulares subfultant, pulsus est inæqualis & inordinatus.

Causa est vel res facultatem motricem irritans, vel refrigerationis propter intemperiem calidam necessitas, vel Spirituum defectus: de quibus specialiter in Differentiis.

Curatio est difficilis. Est enim morbus periculosus; peracutus in singulis paroxyfimis; at diuturnus, quia intermittens & sæpius repetens. Ex frigiditate cordis si eveniat, si diu perenner, pluresque recidivas faciat, plerumque per Syncopen in mortem terminatur. *Respicit* 1. *Paroxysmum*, in quo locum habet, fomentum ex *melissa* & *borragine*, *Aqua ex cordi-*

cordibus animalium apud Heurnium, succus *Cardiacæ*, &c. 11. *Causas*, de quibus in Differentiis dicitur.

Differentia à Causis sumuntur.

I. Alia est à *Vapore seu flatu* expultricem cordis stimulante, qui eo *Cognoscitur*, quòd repentina fiat accessio, à levi corporis motu excitetur, sæpe tremor in genubus, oculorum tenebræ, &c. obrepant.

1. Vel ibi *colligitur*, resolutus ex materia frigida & crassa eo loci hærente, cum intemperie sæpius frigida, rarius calida, quæ si inæqualis, multos elevat vapores, & *Tollitur* Venæ sinistri vel dextri brachii, pro-ut pulsus in hoc vel illo magis inquietus est, & plethora adest, sectione. Cucurbitularum ad crura affixione. Causæ suppeditantis & moventis ablatione. Discussione. Valet hic *Oleum Citri*, cum aliqua conserva, *Rhaponticum verum* scrup. ij. pondere in vino exhibitum., *Confectio Alkermes*, *Aqua Theriacalis* camphorata Crollii. 2. Vel à *partibus inferioribus*, Ventriculo, utero, hypochondriis, &c. mittitur, & tum illarum partium ratio habenda est. 3. Vel est *malignus*, & *venenatus*; & tum magna adest motus vehementia, quæ in omnimodam inæqualitatem, lipothymiam & syncopen transit. Laudatur, *Cordiale Crollii* ex auro septem sigillis munito. *Emulsio margarit.* cum aqua borraginis & Cinnamonii. *Experimentum Thanckii* ex corall. rubr. præparat. Margaritis, in aqua Lavendulæ per inspersiorem ol. sulfuris vel vitrioli solutis. *Aqua Cinnamonicum* spiritu juniperi, &c. *Epithemata ex Alexipharmacis*. 4. Vel *Non venenatus*, cui superiora applicari possunt.

II. Alia est *ab Humore*, qui ex eo *Cognoscitur*, quòd non ita subito invadat; & diutius duret. 1. Vel est *Aqueus* in pericardio hærens, qui difficulter cognoscitur, etsi malum sit continuum, & ægri de suffocatione cordis conquerantur. Discutientib. tam

K k

internis,

internis, ut *Theriaca*, *Confect.* *Alkermes*, *speciebus diambra*; quàm externis, ut *pâne calente* aqua cordialiter irrorato & regioni cordis applicato, tollitur. vesicatoria, & venæ-sectionem respuit. Vel *aliunde mittitur*, & vel mole sua venas, arterias, & ventriculos cordis nimis gravat, ut liberè moveri nequeat, ut fit in vulneribus, formidine, terrorè; vel qualitate idem infestat, quod præcipuè à bile prætorrida & præassata fieri solet; & tum, Evacuationibus & revulsionibus opus. Cauteiis *nulle Cantharides* immiscendæ. *Theriaca* in materia frigida extra adhibita, commendatur. 2. Vel est *Non malignus*: de quo jam dicta accipi debent. vel *Malignus & venenatus*, & tum magna varietas in pulsu, magnitudinis præsertim & parvitatibus ratione accidit, &c.

III. Alia est à *Tumore*, qui si *Calidus* est, magna erit in corpore inflammatio, respiratio difficilis: si *Durus*, & in pericardio, motus est continuus, æger sensim sine causâ manifesta contabescit. *Curatio* ad *Tumorem* est obvertenda.

IV. A *Vermibus*, quos convulsio detegit. *Curatio* integram vide apud *Hartmannum*. *Lapis Bezoar* hic valet.

V. A *Spirituum defectu*, qui ex antegressu causarum dissipantium cognoscitur. *Curatur* Reficientibus, ut *vino odorato*, &c.

VI. Ab *intemperie calida*: de qua liber secundus consulendus est.

CAPUT II.

De Animi deliquio.

A Nimi deliquium est præceps subitusque virium omnium vitalium cumprimis lapsus, cum pulsu imminuto seque abolito, & sudore frigido, à summa cordis debilitate, vitio & defectu spirituum vitalium,

lium, quorum etiam reliquum à corpore ad centrum confluit, exortus.

Pro diversitate graduum, diversa etiam sortitur nomina. *Εκλυσις* est leve deliquium, *λειποθυμία* & *λειποθυμία* est gravius, *συσκοπή* est gravissimum: quæ si eo usque deveniat, ut in toto corpore pulsatio aboleatur, *ἀσφυγία* dicitur. In definitione ejus habetur ratio.

Signa & quidem *Imminentis* sunt in assueris præsertim, improvisa anxietas, vertigo, alieni & varii coloris observatio, pulsus iterata sæpius immutatio. *Præsentis*, subitus omnium virium lapsus, pulsus debilissimus, obscurus: sic ab *Apoplexia* & *uteri strangulatu* distinguitur totius corporis maxime extremorum frigiditas, sudor frigidus, syncopiticus idè dictus, præcipuè in temporibus, collo, & thorace erumpens; qui cum pulsus abolitione pathognomonicum est.

Causa est, spirituum vitalium subitus defectus, sine quibus nec cor, nec ulla pars in corpore suas actiones edere potest: de quo fusiùs in differentiis.

Curatio est *Alicujus spei*, si est ex simplici cordis intemperie; si ex evidentibus causis, si per consensum. *Nullius*, si æger sæpe & sine manifesta causa animo linquitur, si in corpus debile incidit. si ab ea homo post irrorationem faciei cum aqua rosarum & vini exhibitionem, post ptarmica etiam non restituitur. si cor primaria affectione laborat. si febricitantes, ob magnam humorum copiam, cum ventriculi & hepatis inflammatione, affligit. *Respicit* 1. *Paroxysmum*, in quo spiritus, Aceto flor. *runica*, *Ruscæ*, *sambuci*, balsamo *succini albi*, naribus admotis, *vino*, *Aqua rosarum*, *cinnamomi*, *carbunculi*, &c. reficiendi. In calidis morbis frigida, in frigidis calida adhibenda, foeminis odoramenta graveolentia admodum. Cordis regioni Epithemata, & inunctiones ex

theriaca, Mithridatio, oleo Citri adhibendæ. *Vinum odoratum* verus est efficacissimum. II. *Intermissio-* nem, de qua in differentiis agetur.

Differentia à Causis spirituum defectum inducentibus sumuntur.

I. Aliud est, quod *spiritus non generentur*, seu ob defectum materiæ, sanguinis nempe nimium evacuati, & aëris corrupti, seu ob facultatis vitium, tam propter morbos cordis insigniores, intemperiei & instrumentales; quam propter cerebri & hepatis, imò ventriculi & uteri affectus; ubi illorum omnium habenda est in Curatione ratio.

II. Aliud à *spirituum genitorum dissipatione*, quam inferunt, 1. *Evacuationes insensiles* per habitum, seu ob nimiam cutis raritatem; & tum, odorem & boni succi cibis agendum. Cutis oleo myrtino, mastichino, densanda; seu ob contentorum tenuitatem, ubi cibi non facile dissilabiles locum habent. 2. *Evacuationes sensiles*, tam sanguinis quam aliorum humorum, ubi *nota*, Sistendas illas esse. Corpus frigidis conspergi non debere. In sudore largo, illa solum quæ cutim constringunt, locum habere. 3. *Morbi*, ut vigilæ: de quibus superius. Dolor vehemens, cardiacus, colicus, nephriticus, dentium, &c. Ruptio apostematis subita, in qua instauratio cibis, odoribus, & quiete fiat. 4. *Evidentia*, fames, venus, exercitatio nimia, &c.

III. Aliud à *Spirituum alteratione & corruptione*, quam maligna materia, seu externa seu interna adfert, ut humorum putredo, venenum assumptum, morsus animalium; & tum Curatio ex suis locis petenda est.

IV. Aliud à *Spirituum suffocatione*, quam inferunt. 1. *Sanguis nimius*; & tum plethoræ signa adsunt. Venæ basilicæ sectio juvat. 2. *Humor crudus & crassus*, circa cor ejusque venas & arterias, capsulam & membra

bra vicina redundans, vel ibidem collectus, vel à capite aliisque partibus transmissus; & tum habitus est hydropicus. nec venæ-sectio, nec purgatio sustineri potest. frictiones deorsum factæ, inunctiones per olea laxantia, *Oxymelitis* cum decocto aliorum incidentium usus, inedia, nisi pulsus subito ad imbecillitatem mutetur, juvant. 3. *Fuligines præva* copiose circa cor & membra vicina congregatæ, quibus respiratio læditur. Discutientibus maximè tolluntur. 4. *Repentinus terror & metus*, cui Evacuatio, ne ex affluxu sanguinis obstructio aliqua in vasibus aut inflammatio excitetur, convenit. De reliquis consule Practicos.

TITULUS VIII.

De Mammillarum affectibus.

CAPUT I.

De Mammillarum morbis.

ARTICULUS I.

De Tumoribus.

Mammillarum affectus sunt vel Morbi, vel Symptomata. Ad illos pertinent, *Tumores, Cancer, & Magnitudo*.

Tumores mammillarum sunt quatuor.

I. *Inflammati*, quæ tumor durus. *Cognoscitur* ex rubore, dolore, pulsu & calore, quibus à grumescatione & abundantia lactis differt. *Oritur*, à sanguinis attracti, transmissi, vel suppressi copia. *Curatur* 1. Victu tenui infrigidante & humectante. 2. Diversione, quæ sanguinis ex talo missione; si menses suppressi sunt, perficitur. 3. Evacuazione per sanguinis ex ejusdem lateris internâ venâ missionem, & lenem purgationem. 4. Topicorum, in inflammatione consuetorum appositionem. Ubi *nota*, *Repellentia* debere

debere esse temperata, ne cor nimis infrigidetur. In augmento laudari cerevisiam calidam cum butyro applicatam. *Indurationem* feliciter medicamento ex medulla cruris vituli unc. ij. assyrii unc. j. Croci ser. iv. Cumini triti ser. ij. composito, prohiberi. *Suppuratum*, quod mammillæ sint spongiosæ & cavernosæ, variis plerumque in locis aperiri. *Mammillam* affectam, raro, ni alterius sanæ lac exsiccetur, quod sanguis æquè ad utramque ducatur, sanari. Dolorem, optimè æstate foliis hyoscyami, hyeme radicibus ejusdem sub cineribus coctis, & cum axungia porcina contusis, leniri.

II. *Oedema*, quod interdum per totam mammam diffunditur, ut eadem tota æqualiter intumescat. *Cognoscitur* ex eo, quod sit mollis, per intervalla certis temporibus, menstruationum nempe, tumor ac dolor exacerbatur, semper tamen tumoris aliquid remaneat. *Ortus & Curatio* ex generalibus petenda. Hic duntaxat *observandum*, 1. *Quod* in mensium retentione tosta & assa minus conveniant. 2. *Quod* maturantia, quia materia hic tenacior est; fortiora sint eligenda. 3. *Quod* ventriculi, qui pituitæ receptaculum, ratio quoque sit habenda.

III. *Scirrhus* mammillarum, est vel *Exquisitus*, vel *Non exquisitus*. 1. *Exquisitus*, varius est. 1. Alius *Incipiens*, qui ad contactum dolet; minimum tamen, qua ratione ab incipientè Cancro distinguitur: & difficulter Curatur. Alius *Inveteratus* qui durus est, sine dolore, medicamentis incurabilis, præsertim si Capparorum colorem refert, vel si ei pili supervenerunt; manus opera interdum curatur. 11. Alius est *per Congestionem*, humoris per se crassi, in quo curando aceto nec inter initia nec diu utendum, ne vel residuum lapidescat, vel substantia partis exsiccata tabescat; Nec manuale opus tentandum, si tota mamma induruit, & tumor

tumor thoraci ita adhæsit, ut citra periculum avelli nequeat. Alius *per Resolutionem*, in quo tenuior pars præposteris medicamentis exsiccata est, quemque Galenus evaporatione ex aceto acerrimo, super lapidem pyriteum candentem effuso, sed præmissis liquidantibus, curavit. In omnium *Curatione*, videndum, ut lienis & suppressorum mensium ratio habeatur, & Emollientia cum resolventibus alternatim applicentur. 2. *Non Exquisitus* Scirrhus ex eo *Cognoscitur*, quod sit tumor major cancro, coloris cinericii, cum duritie ac venis in ambitu nonnihil livescens varicum instar: & quod interdum, imminutibus præsertim menstruis, vexet. *Oritur* ab atra bile melancholiæ commixta, præsertim in sterilibus, vel quæ citò parere desierunt, vel omnimoda mensium suppressione laborantibus. In *Curatione* inter Repellentia absque adstrictione laudatur Unguentum de Ranis, quod apud Castrensem l. 1. de morbus mulier. cap. 21. vide. De Manus opera vide eundem.

IV. *Tumor flatuosus*, qui ex eo *Cognoscitur*, quod dolor sit acutus mamma præsertim sinistra, cum brachii, totius lateris, costarum & scapularum cruciatu. *Oritur* à crasso halitu, ex suppressis vel mensibus vel semine, vel aliis excrementis elato, easdem tendente. In *Curatione*, nota, linteum Saponis spuma delibutum, vel aqua madefactum & exsiccatum, ad dissipationem laudari. Dolorem pane calido, ut ex furno extrahitur, oleo nardino & rutaeco madido, bene mitigari.

ARTICULUS II.

De Cancro, & magnitudine
Mammarum.

I. *Cancro* mammarum, signa, Causæ & Curatio ex iis quæ lib. secundo de Cancro dicta sunt,
K k 4 depromi

depromi possunt. Heic adicere sufficiat, 1. *Non exulceratum* mitiorem reddi, si menses in pristinum statum vel à natura vel à medicamentis revocati redeant; vel si corpus à cacochymia liberum, seu victus ratione seu medicamentis fervetur. Potest eadem & Ungentum ex *Lithargyrii* in marmorea pillula cum plumbeo pistillo ducti *unc. ij.* cum *aqua rosar.* & *ol. rosar. ana unc. iij.* incorporatis, compositum applicari. II. *Exulcerati* Curam, apud Hartmannum, qui cum *aqua fuliginis* mundificante, *Oleo arsenici fixi* in aqua plantaginis distemperati, &c. firmissimè sanari scribit, vide.

II. *Magnitudo mammarum* indecora visui est exposita. Oritur à crebra earum contrectatione, flarulentorum inprimis copia, retentione mensium, &c. *Curatio* adhiberi vel ideò debet, quòd quò majores sunt mammae, eò facilius cancris afficiantur. *Peragitur.* 1. *Cibis* adstringentibus, sed minimè flarulentis. 2. *Repercussione* sanguinis vel aliorum humorum affluentium; ubi succus cicuræ, & ova perdicis illita locum habent. 3. *Discussione* illius quod allapsum est, ubi Ungentum quod ex *luti in molis tonsorum reperti unc. ij.* *Ol. myrtini unc. j.* *aceti unc. f.* componitur, laudatur. 4. *Compressione* per formas mammarum plumbearum interius illitarum oleo *seminis hyoscyami*, &c.

CAPUT II.

De Symptomatibus Mammarum.

ARTICULUS I.

De Lactis defectu, Redundantia, & Coagulatione.

Symptomata Mammarum sunt *Lactis defectus*, *Redundantia*, & *Coagulatio*.

I. Defectus

I. *Defectus lactis* pro ratione Causarum duplex est.

Alius enim est *Vitio sanguinis*, qui deficit ob morbos exsiccentes: ob Epatis intemperiem: ob inediam, ob Evacuationes nimias: quorum omnium in Curatione habenda est ratio. Ad lactis autem generationem faciunt, *Crystallus* præparatus, folia, radix & semen *fœniculi* viridia & recentia. *Lumbricorum terrestrium* præparatorum pulvis in vino. *Electuarium* Zacuthi Prax. Hiftor. l. 9. c. ult.

Alius est *vitio facultatis lactificæ*, quando illa ita debilis est, ut sanguinem neque attrahat, neque coquat; seu propter causas externas refrigerantes, & adstringentes; seu propter alios morbos; ad quos in Curatione respiciendum est.

II. *Redundantia* lactis à sanguinis copia & forti facultate lactifica procedit. In Curatione, Naturæ in gignendo lacte luxuries cohibenda est; & Lac excedens dissipandum & exsiccandum. Facit huc venæsectio. Repulsio per medicamenta, quæ supra mammas versus brachia poni debent. faciunt & Medicamenta lac absumentia, qualia sunt, *Muria cum pulvere cymini*, *Cicuta* in aqua Charosfolii & Aceto decocta, &c.

III. *Coagulatio* lactis fit, quando partes subtiliores & tenuiores sensim exhalant, & crassiores remanent; unde glandulæ indurefcunt, & tumores, imò & abscessus, exoriuntur. In hoc casu, infans ex ubere affecto lactari non debet: sugendum tamen lac, ne id quod de novo gignitur, à caleato lacte coaguletur, & pars coagulati quæ incipit dissolvi putrescat. Ad Dissolutionem facit *jusculum Caulium*, Ablutio mammillæ cum *aqua*, *vino* & *aceto* insimul mistis. Fomentatio decocto *Altheæ*, *sanigraci*, *Melilori*, &c. superimposito linimento ex *ol. rosar.* *amygdal. dulc.* *succo apii*, *petroselinii*, *aceto*, in quo

prius coagulum leporis sit dissolutum. *Aqua Cicuta* putatur utramque palmam obtinere.

Et tantum de morbis pectoris.

I D E Æ MEDICINÆ PRACTICÆ

LIBER X.

De morbis infimi Ventris.

TITULUS I.

De Affectibus OEsophagi.

CAPUT I.

De morbis OEsophagi.



AFFECTUS infimi ventris comprehendunt sub se affectus, *OEsophagi, Ventriculi, Intestinorum, Ani, Mesenterii, Epatis, Lienis, Renum, Vesicae, Partium genitalium in viris, Partium genitalium in mulieribus, Umbilici, & Abdominis.*

Morbi OEsophagi sunt *Intemperies, Tumor, Angustia, Vultus, & Vlcus.*

ARTICULUS I.

De OEsophagi intemperie & tumore.

I. *Intemperies OEsophagi est ejusdem à nativa temperie ad praternaturalem recessus. Cognoscitur, ex laesa deglutitione. Dividitur in Calidam, quæ Extra, à fumis, pulveribus, &c. Intrà, à*

vaporibus in febribus ardentibus, ureri calida & sicca intemperie, accidit. *Tum* rorer & asperitas in lingua percipitur, adest fitis, per refrigerantia, lentorem habentia *curatur.* 2. *Frigidam*, quæ vel à potu nimis frigidus, vel aliunde accidit, & Calefacientibus tollitur. 3. *Humidam*, quæ à Catarrhis defluentibus, salivatione &c. existit, & relaxationem OEsophagi, ita ut pars ipsius inferior, & os superius ventriculi hient, infert. 4. *Siccam*, quæ à siccis exoritur, ac asperitatem infert. forbitionibus ex jure pulli, butyri non salito *curatur.*

II. *Tumor OEsophagi est ipsius in magnitudine suâ excessus. Cognoscitur, ex dolore in deglutendo in posteriore magis parte & dorso; deglutendi impedimento, si magnus bolus deglutendus est, ut interdum potus per nares effluat. Oritur ab iisdem causis, à quibus tumores in genere oriri diximus. Curatur sæpe difficulter, quia periculosus propter suffocationem. Eo modo quo alii tumores, nempe, in principio repellentibus, in augmento resolventibus externis, internis; in statu discutientibus. Vomitus metu suffocationis vitetur, nisi forte suppuratione facta, tumor rumpi debeat. Dividitur* 1. In *Calidum*, cui adest febris, fitis major, dolor, in cujus Curatione venæ sectio locum habet: & *Frigidum*, in quo minor dolor, & in cujus Curatione repellentia mitiora, resolventia & discutientia fortiora esse debent. II. In *illum, qui superiori OEsophagi parti insidet, & tum cibi non descendunt: & Illum, qui inferiorem infestat; & tum cibi, postquam aliquousque descendunt, hærent.*

ARTICULUS II.

De Oesophagi angustia, Vulnere & Ulcere.

I. **A**ngustia Oesophagi est, quando illius meatus immittitur. Cognoscitur ex eo, quod facilius liquida quam solida deglutiantur. Dividitur pro ratione Causarum; Nam Alia est à Causis externis, seu medicamentis constringentibus, seu re aliqua deglutita. Tum, ex adstantibus vel ipso ægro res cognoscitur. Aut vomitu vel tussi rejicienda est: aut humectantibus & emollientibus extra & intra adhibitis promovenda: aut spongia Oleo amygdalarum dulcium illita detrudenda: aut singulari Fabricii Hildani instrumento eximenda. Alia à Tumore, Vermibus, ex ventriculo & intestinis ascendentibus, Scorbuticis & hypochondriacis vaporibus Oesophagum distendentibus & arteriam asperam comprimantibus, Luxatione vertebrarum Cervicis & dorsi, quæ in suis locis videantur. Alia à pituita crassa, lacte coagulato, &c. inhaerentibus, Ubi Oxy-mel scilliticum, & vomitus locum habent.

II. **Vulnus** Oesophagi, in duplici, ratione Causarum, est Differentia. Vel enim à telo infertur; & tum, situs vulneris id ostendit: si vomitus accidit, aliquid per illud ejicitur, difficulter Curatur. Vel ab ossiculis deglutitis; & tum facile patet. Medicamenta ventriculo grata adhiberi debent.

III. **Ulcus** oesophagi Cognoscitur, ex dolore, quando res acris, austera, salia, etiam in parva quantitate deglutitur; mordicatione, & puris reiectione. Curatur difficulter propter difficilem coalescentiam, utpote in parte membranosa. Differentias à Causis fortitur. Aliud est ab Externis erodentibus, ut aqua forti, mercurio sublimato. Tum vomitoriis lenien-

lenientibus & lentorem habentibus, ut est mucilago semin. Cydonior. juscula pinguis, agendum. Aliud à Vulnere; Tumoribus, Apostematibus. Aliud ab Humoribus acerbis rejectis, &c.

CAPUT II.

De Oesophagi symptomatibus.

I Nter Oesophagi symptomata præcipuum est Deglutitio læsa, quæ duplex. Alia enim fit ob Resolutionem Oesophagi, facultate ob nervorum sextæ vel septimæ conjugationis resolutionem læsâ. Cognoscitur ex eo, quod facilius deglutiantur solida, utpote quæ leviori conatu detruduntur, quam liquida, quæ quod impellenti cedant, majori vi opus habent. Oritur, vel à Defluxione, Tum Capitis gravitas, tensio colli & defluxio ipsa sentitur: vel vel ab alio aliquo morbo. Periculosa est, & remediis antiparalyticis curari debet. II. Alia ob Convulsionem, quæ à vulnere etiam exoritur. periculosissima est senibus. Alia à Partis affectibus: de quibus superius à nobis actum est.

TITULUS II.

De Affectibus Ventriculi.

CAPUT I.

De Morbis ventriculi.

Affectus ventriculi vel sunt Morbi, vel Symptomata. Ad illos pertinent Intemperies, Tumores, Vulnus & Ulcus. Hæc vide inferius.

ARTICULUS I.

De Intemperie Ventriculi in genere.

Intemperies ventriculi est similiarium ejus partium præternaturalis in primis qualitatibus constitutio.

Signa illius sunt Concoctio & appetitus læsa. Excrementorum mutatio, ventriculi gravitas, fluctuatio, destillationes capitis quæ plerumque accidunt.

Causa, quicquid vel internè vel externè eundem alterare potest. *Curatio* peragitur I. *Intemperiei per contrariæ alteratione*, Tum Medicamenta debent esse ventriculo grata, solida potius quàm liquida. Cibi potius medicamentosi, quàm medicamenta exacta. Adstringentibus ne ventriculus laxetur, permista; non acris, salsa, erodentia, ne orificium ventriculi laceßant, si externa, mucronatæ cartilagini versus umbilicum, & in dorsum ad 12 & 13 vertebrae applicentur. II. *Causarum tam externarum quàm internarum remotione*. III. *Ventriculi corroboratio*, ubi appropriata, ut Magisterium corallorum rubrorum, *Tunica ventriculi gallinæ interiores*, &c. locum habent.

Dividitur in Intemperiem sine vel cum materia, de quibus in sequentibus articulis.

ARTICULUS II.

De Intemperie Ventriculi sine materia.

Intemperies ventriculi sine materia, est similiarium ventriculi partium, præternaturalis in qualitatibus suis dispositio, à causis internis & externis nulla humorum præsentia illata.

Signa ejus & *Causæ* in differentiis exponuntur. *Curatio* sola alteratione & causarum remotione nititur.

Divi-

Dividitur secundum qualitates.

I. Alia est *Calida*, quæ *Cognoscitur* ex cibi inappetentia, ructibus nidorosis, salivæ lentitudine, faucium & linguæ ariditate. *Oritur* externè à sex non naturalibus, calorem ipsius augentibus: internè à morbis internis, febribus ardentibus, inflammatione epatis, lienis, &c. *Curatur* I. Refrigerantibus, sed levibus, nec diu applicatis. 2. *Diæta refrigerante*, ubi locum habet *Aqua hordei*, emulsio quatuor *seminum frigidorum* majorum.

II. Alia *Frigida*, quæ *Cognoscitur* ex appetitus intensione, nisi sit nimia; ructu acido, si nec multi nec frigidi cibi assumti, nec pituita redundat, flatu, salivæ nimietate. *Oritur*, Externè à sex non naturalibus: Internè ab incumbenibus partibus, Epate, Liene, musculis abdominis frigiditatem inducentibus. *Curatur*, I. Calefacientibus appropriatis, sed non nimis, intus & extus humidis, ne siccitas inducatur. 2. *Diæta*, ubi vinum absinthites locum habet. *Distinguitur* in *Positivam*, de qua nunc actum est: & *Privativam*, quæ *Conjungitur* cum siccitate. *Oritur* ex defectu calidi innati, quem inducunt nimia calefactione, ut vini usus frequens, alimentorum defectus, partium incumbenrium, ut epatis, musculorum abdominis & omenti calor & siccitas.

III. Alia *Humida*, quæ *Cognoscitur* ex absentia sitis, salivæ redundantia, &c. *Oritur* à causis externis humiditatem inducentibus. *Curatur* I. Siccantibus citra insignem caliditatem vel frigiditatem, ut sunt, *Cinis intestinorum gallinarum, hirundinum cervi cornu ustum, corallia rubra, trochisci de viperis, galanga, sal ustulatum*. 2. *Diætâ oppositâ*.

IV. Alia *Sicca*, quæ *Cognoscitur* ex regionis ventriculi extenuatione & contractione, ad quam gravitas totius corporis sequitur. *Oritur*, externè à diætâ siccante, evacuatione nimia, fumis metallicis: internè,

ternè, à partium incumbentium siccitate. *Curatio* est *Difficilior*, quia cum febrili calore marasimum inducit. si vomitus accedat. caloris innati summam inopiam indicat. *Peragitur* 1. Humectatione, quæ per alimenta medicamentosa optimè perficitur. 2. Diætâ, ubi lac locum habet ab exigua dosi incipiendo, *Ova recentia, Amygdala, passula, pinea, &c.*

Alia Composita, cujus ratio ex simplicibus colligi potest. Calidâ & siccâ intemperie laborantes, habent sanguinem paucum, ad nutriendum ineptum, sunt macri, alvi adstrictæ, venarum eminentium, ad scabiem siccam proclives.

ARTICULUS III.

De Intemperie ventriculi cum materia.

Intemperies ventriculi cum materia est, quando ventriculus à suâ temperie propter aliquem humorem vel ibi genitum, vel aliunde delapsum, desciscit.

Signa & Causæ in definitione ponuntur: in *Differentiis* prolixiùs explicabuntur.

Curatio absolvitur, 1. Humoris peccantis alteratione & evacuatione. 2. Partis ipsius per externa & interna appropriata roboratione. Vide in *Differentiis*.

Differentia intemperiei hujus sunt variae.

I. *Alia est à materia in ventriculo genita.* Tum symptomata continuè apparent. totum corpus & membra omnia salva sunt. *Curatur*, per Evacuationem materiæ, quæ commodè *Aloëticis, hiera picra, Mechoacannâ*, perficitur: & Roborationem partis. *Alia à materia aliunde delapsa.* Tum membrum quod per periodos afficiebatur, non laborat amplius, aliqua consueta evacuatio supprimitur. Vel consueta diætâ mutata est, vel in toto aut in aliqua parte aliquid hæret, symptomata remittunt. In *Curatione* ratio membrorum mittentium habenda.

II. *Alia*

II. *Alia est à materia in cavitate ventriculi habente.* Tum fluctuatio est vel nausea, quam vomitus vel alvi dejectio sequitur. *Alia à materia tunicis impacta.* Tum, nausea est absque vomitu, sæpe cum singultu.

III. *Alia est Biliosa*, calida nimirum & sicca, quæ præter superiora signa *Cognoscitur* ex nausea, oris amaritudine, rosionis cujusdam sensu, & vomitu interdum bilioso. *Oritur* à bile seu ex vesicula fellea eo delapsa, seu ex cibis corruptis generata. *Curatur* 1. Diætâ, in qua jus pullorum lactuca & endivia conditum præstat. 2. Materiæ educatione, tum per vomitoria ex pulvere *julor.* seu *florum juglandis* in fumo siccatorum, & drach. j. pondere cum hydromelite datorum, parata; tum per purgantia ex *hiera picra* composita. 3. Alteratione per refrigerantia & humectantia, inter quæ præstant *Aqua Cichorii violar. Syrupi granator. Corallor. Quercet. Fragor. de Ribes. Tinctura Rosarum.* Condit. *lactuca Cichorii, &c.*

IV. *Alia est Pituitosa*, frigida nimium & humida, quæ *Cognoscitur*, tum ex signis superius recensitis, tum ex gravitatis in ventriculo, præsertim post cibum aliquot horis sensu, fluctuatione, ructu sæpe acido. *Oritur* à pituita vel tentu, vel crassa. *Curatur* 1. Evacuantibus tum per vomitum, cui in crassa, incidentia in forma solida exhibita, (præstat *Diatrion piper. diacalaminth. Essentia melissæ, pulegii &c.*) præmitti debent: tum per purgationem, ita, ut purgantia vel sola vel præparantibus mixta exhibeantur: vomitoria sunt *salis vitrioli* dr. f. in jussulo, *Oxymel* cum decocto *raphani* vomitorium ex *helleboro Hæternii.* 2. Roborantibus, in quibus *intra Radices calami aromatici, & cortices citri, aurantium*, cum spiritu vitrioli philosophico, *Elixir pro-*

potatis præstant; *Extra*, inunctiones, ex oleis stil-

L l

latitiis,

latitiis, *Abſinth. mentha, cumini, pulegii, maſti-
ches* compoſitæ, cerotum ex *ladani puri parte j. cum
partibus duabus cere*, una hora ante prandium ad-
hibitis, valent. III. Diæta oppoſita.

ARTICULUS IV.

De Tumoribus ventriculi.

Tumor ventriculi eſt, quando idem in juſto mayo-
rem magnitudinem elevatur. Continet ſub ſe
tria.

I. *Inflammationem*, quæ *Cognoſcitur*, tum ex ſi-
gnis generalibus, tum ex dolore vehementi, æſtu,
ſiti, febre ardentiffima, vomitu aut frequenti deje-
ctione alvi, niſi quando orificium aut pylorus obſi-
detur; accedunt ſymptomata facultatum principum,
ſi cerebrum in conſenſum trahatur. *Oritur* à ſangu-
ine præter naturam per venas à porta derivatas effu-
ſo, ſive puro ſive mixto, ſive tranſmiſſo, ſive attra-
cto. *Curatur* ad modum aliarum inflammationum,
ubi obſerva: 1. Evacuationem per vomitum aut al-
vum non convenire, niſi ad collecti puris eruptio-
nem. 2. Repetendam potiùs venæſectionem, quàm
ut una vice multum ſanguinis evacuetur. 3. Inter
Repellentia externa *saccharum Saturni cum aqua
plantaginis vel ſolani* adjecto abſinthii vel menthæ
pauſillo, laudari: Interna actu moderatè frigida ex-
hiberi debere. 4. Reſolventia, quæ lenia & emol-
lientia eſſe debent, adſtringentibus ob partis præ-
ſtantiam caſtiganda eſſe. 5. Si ſuppuratio prohibe-
ri non poteſt, calorem moderatè calidis, humidis &
viſcidis, tam intra quàm extra fovendum. 6. Abſ-
ceſſum *ſucco ſcabieſe vel ſolo, vel cum melle mixto* o-
ptimè rumpi poſſe. *Dividitur* pro ratione partium
ventriculi. Alià eſt *Totius*, in qua æger, quocun-
que etiam ſitu decumbat, dolore afficitur. Alià eſt

Partis,

Partis, 1. vel *Externa*, in qua dolor poſt cibi co-
ctionem, ob fibras tranſverſas intentas, intenditur,
appetitus ſe non ita male habet, nihil de abſceſſu vo-
mitu ejicitur. Vel *Interna*, in qua omnia ſunt con-
traria. melius verò, ſi in hanc pus abeat, quàm ſub
peritonæum: quia ibi facilè expurgari poteſt, hic
non item. 2. Vel *Superioris*, in qua quia pars exqui-
ſito ſenſu prædita eſt, graviffima accidunt ſympto-
mata, anguſtia ſub finem deglutitionis, ubi attractio
viget, maximè percipitur. Vel *Inferioris*, in qua do-
lor magis in cibi coctione intenditur. 3. Vel *Ante-
rioris*, in qua tactu tumor deprehenditur. Vel *Po-
ſterioris*, in qua, ſi externa occupatur, æger gravi-
ter decumbit ſupinus; ſi interna, graviter pronus.

II. *OEdema, & Scirrhus*: de quibus nihil ſingu-
lare occurrit.

III. *Inflatio* quando ventriculi magnitudo à fla-
tu in ejus capacitate concluſo augetur. *Cognoſcitur*
ex tenſione, ventriculi regionem ſupra umbilicum
inſeſtante, tumore, & reſiſtentia tactus ibidem ob-
via, ruſtibus, quibus malum levatur. *Oritur* à ma-
teria flatuſ ſuppeditante, de qua in Differentiis. *Cur-
ratur difficulter*, ſi convaleſcenti accidat, quia reci-
divam ſignificat. ſi ſit in febris acutis, quia calo-
rem naturalem à præternaturali abſumi indicat. ſi
diu duret, quia in hydropem ſiccum terminatur.
Quomodo peragatur, vide in Differentis. *Dividitur*
pro ratione cauſarum. 1. Alià eſt ab *Alimentis fla-
tulentis*, quæ ex ægri relatione cognoſcitur. Diæta
bona & diſcutientibus baſſamo nempe ſceniculi,
oleo carni intra & extra adhibitis, balneo aquæ
calidæ, cui *radices Ebuli incoctæ*, ſacculis, *pa-
ne* à furno calente oleo rutaceo perſuſo, curatur.
II. Alià à *Materia pituitosa*, flatuſ excitante, quæ
ex ſignis intemperiei pituitosæ cognoſcitur. Eva-
cuatione materiæ præparatæ, & Diſcuſſione fla-
tuum

tuum tollitur. Discutiunt etiam cucurbitula magna, cum multa flamma, absque incisione, applicata ac sæpius repetita. *Talorum suillorum* adustorum & cum aqua rutæ præparatorum drach. una in haustu vini exhibita, &c.

ARTICULUS V.

De Vulneribus & Ulceribus ventriculi.

I. **V**ulnera ventriculi exinde cognoscuntur, quod abdomen profundius è regione ventriculi sit solum, singultus, & bilis vomitus insekuatur, cibus potusque interdum rejiciatur. *Curan- tur, nullo ferè modo*, si totum ventriculi corpus perforatum sit, vel si superior ipsius pars circa orificium vulnerata. *Difficulter*, si exterior saltem tunica, & si fundus ventriculi, qui carnosus est, & medicamenta sustinere potest. *Peragitur Curatio*, ut in aliis vulneribus. *Mastiche* omnibus modis sumta, utilis est. Vulnus penetrans & amplum consui debet, orificio inferiore parte relicto. In diætâ ab omnibus acribus abstinendum.

II. *Vlcus ventriculi cognoscitur* ex dolore pun- gente & ulcerofo, ardore, à cibo calido ingesto exci- tato, supra umbilicum infestante. ructibus foetidis, causis ulcus generantibus, febre lenta, &c. *Oritur*, 1. *Ab externis*, ut medicamentis & venenis acribus, & tum, relatio ægri indicio erit. 2. *Ab Humoribus acribus* vel aliunde allapsis, vel ibi genitis; & tum, ad intemperiem cum materia recurrendum est. 3. *Ab Apostemate* post inflammationem rupto, & tum illa præcessit. 4. *A ruptura vena*, & tum sanguinis vomitus præcessit. *Curatur difficulter*, tum quia detergentia dolorem excitant, tum quia semper à chylo humectatum exsiccari nequit. Inveterata lync- teriam adferunt. In *Curatione* nota, 1. Humorem, si adest,

si adest, lenientibus duntaxat educi dedere. 2. Vo- mitum planè vitandum, ne quod ulceratum est, ma- gis dilaceretur. 3. Consolidantibus internis, aliquid mediocriter abstergentium semper admiscendum.

CAPUT II.

De Ventriculi symptomatibus.

ARTICULUS I.

De Dolore & Ardore Ventriculi.

Symptomata ventriculi sunt, *Dolor, Ardor, Ano- rexia, Nimia appetentia, Appetitus vitiosus, Si- ris nimia, Concoctionis læsio, Singultus, Ructus, Ru- gitus, Nausea, Vomitus, & Cholera.*

I. *Dolor Ventriculi est tristis ejusdem sensatio, à rebus distendentibus vel mordicantibus, & sic con- tinuum ejus solventibus exorta.*

Signis in hoc symptomate opus non est, nisi mens ægri laboret.

Causa in definitione est exposita, & largiùs in Dif- ferentiis de ea.

Curatio respicit 1. *Ipsam symptomata*, si nimis ur- gens est; in quo obrundendo valet, *sacculus* ex ra- dic. althææ, flor. chamomillæ, rosis rubeis & absin- thio confectus. *Aqua Quercetani* Anodyna in phar- macop. restituta. *Oleum* chamomillæ saphirinum, *Bolus* ex electuar. diaphænic. dr. iiii. philonii Ro- mani scr. ii. formatus, de Leonibus laudatissimus, *laudani opiati* gr. iv. cum decocto chamomillæ, post quorum omnium usum roborantia ventriculum ex- pedienda sunt. II. *Ipsam Causam*, de qua in Different.

Differentia à partibus & causis sumuntur.

I. *Alius est Tunicarum*, qui Dolor est simplici- ter, & cui superiora applicari debent. *Alius Orifi- cii*, qui se animi deliquio & syncope, interdum im-

moderato sudore & anxietate prodit: & tum, ab *Attritione ventriculi*, quæ post cibum sumtum cum frigore, pulsum constrictione & anhelitus compressione accidit, à cibo seu antequam excernatur exæstuante, seu in pituitam verso oritur, & *Ol. nardino* calido ventriculo imposito, & dr. j. *piperis* exhibita, curatur. tum ab *Adstrictione* ipsius, quæ propter utriusque orificii adstrictionem evenit, & descendente cibo quiescit, discerni debet. *Curatio* est *Nullius spei*, si in eos inciderit, qui exquisiti sensus orificium habent. si extrema frigeant, & si à venenatis procedat.

II. Alius est à *Causis externis*, ut nucleis, aciculis, cibo acriore, corruptionem passio, multo, & tum vomitus prodest, & si venenum assumtum est, *Alexipharmaca* mox admovenda.

Alius à *Causis Internis*, 1. *Humoribus* nempe biliosis, pituitosis, seu aliunde allapsis, quod in febribus fieri solet, seu ibi genitis; qui, si hi admistis cibis minus acres evadunt, assumto cibo sedatur; si tunicis adhærescentes, sumto cibo agitantur, aut fundo adherentes eleantur, post cibum exacerbatur. *Curatio* ex capitibus de Intemperiebus peti debet. Nota *Hieram* in viscido humore fortioribus miscendam, ut materiam vincat. *Syrupum Zacuti & pulverem* l. ult. c. 2. n. 11. Hist. laudabilem esse. 2. *Vaporibus*, seu ibidem conclusis, de quibus tit. 2. c. 1. a. 4. seu aliunde, ex utero, vermibus &c. missis. 3. *Vermibus* ad orificium ascendentibus: de quibus suo loco.

III. Alius est à *morbis ventriculum infestantibus*, intemperie nempe, tumoribus, vulnere, ulcere, &c. de quibus supra actum.

II. *Ardor ventriculi est humorum in ventriculo, vi caloris praternaturalis concitata ebullitio, ita ut fervor ad gulam usque sentiat.*

Signis in hoc symptomate opus non est.

Causa

Causa sunt halitus acres, seu à cibo natura sua acri, in *πικροχολοις*, durante cibi coctione, & ventriculo valido motu turbato excitati; seu à bilioso humore, elati, qui dum erumpere per œsophagum coguntur, ibi hærentes eum & ventriculi orificium urunt.

Curatio est *difficilior* in illis, quibus ventriculi substantia bile quasi imbuta est, quod ejusdem regio à vesicula bilis croceo colore tingatur, eademque macula ad internam usque membranam penetret. *Respicit* 1. *Ardorem ipsum*, cui sedando multa remedia dantur. Præcipua sunt ista, *bolus* ex sacchari rosati dr. ii. Ocul. cancri præp. unc. ii. boli Armeni unc. f. compositus, & per particulas deglutitus, *pulvis* ex crystall. calcin. dr. j. β. Margarit. præp. fer. j. Corallor. præp. Cretæ ana dr. j. sacchari candi dr. ii. compositus, & drachmæ unius pondere cum cerevisia datus, *Spiritus vitrioli coagulatus* scrup. j. pondere in cerevisia exhibitus, quem linimentum ex pomadæ opt. unc. f. camphoræ dr. j. olei lateritii dr. ii. Axungia Taxi unc. f. salis vitrioli dr. j. excipere debet. 11. *Causam ardoris*, quæ temperanda & evacuanda.

ARTICULUS II.

De Anorexia.

Anorexia est prostrata ciborum omnium appetentia, ex defectu sensus suctionis in orificio superiore ventriculi exorta.

Signis ipsum symptoma non indiget. Aeger conqueritur, & ab adstantibus ipsis observatur.

Causa est sensus suctionis in orificio ventriculi inferiore defectus; qui unde proveniat, in Differentiis dicitur.

Curatio est *Dubia spei*, si in declinatione morbi,

bi, seu ex ejus diuturnitate, seu virium imbecillitate, seu immodica evacuatione accidat; quia calor naturalis extinctionem indicat, & recidivam minatur. si in pueros, qui natura edaces & plurimo alimento indigent, incidat, quia magnus præter naturam excessus significatur. si in morbo diuturno, cum sinceris dejectionibus affligat, quia extinctionem facultatis appetentis in orificio ventriculi, seu ob maximum frigus, seu ob materiam maximè putrefactam indicat. si ex læsione nervorum sextæ conjugationis à cerebro oriatur. *Nullius ferè*, si in morbo aliquo eam subitò, non præcedente ulla crisi vel morbi imminutione, ingens cibi appetitus sequatur, quia cerebri læsionem & virtutis sensitivæ extinctionem significat. *Respicit* causas: de quibus in Differentiis agemus.

Differentia appetitus prostrati sunt variæ.

I. Alia est *Major*, quæ propriè *Anorexia* dicitur, in qua nihil omnino appetitur; cui & definitio superior competit. Alia *Minor*, seu *δυσσυχία* dicta, in qua minus aut tardius quàm pro naturæ exigentia cibus appetitur, & oritur ex debilitato & labefactato suctionis sensu.

II. Alia est *sine Nausea & abominatione ciborum*, quæ *Inappetentia* dici potest: de cujus causis sequenti Differentia agitur. Alia *cum abominatione*, & dicitur *Ciborum fastidium*. Oritur à succis biliosis & corruptis, aciditatis tamen & salsedinis expertibus, qui quia alendo corpori apti non sunt, orificium tamen ventriculi obsident, à venis non surgunt. *Curatur* iis, quæ calidam intemperiem corrigunt, & humorem evacuant. *Cataplasma* apud Zacutum l. ult. c. 1. num. 5. vide.

III. Alia est à *suctionis carentia*, quam inferunt
1. *Alimenti in toto corpore abundantia*, in qua vires non prosternuntur, quæque inedia, exercitiis, frictio-

frictionibus, &c. tollitur. 2. *Corrugationis in ventriculo impotentia*, vel propter intemperiem sive calidam ventriculum relaxantem, & materiam fundentem; sive frigidam calorem nativum, primam appetitus causam, labefactantem. *Vel* propter vitiosi humoris, inprimis excrementi crudi, inspidi, lenti & pituitosi, sive ex cibis geniti, sive aliunde affluentis redundantiam. Curatio ex capite de intemperie peti debet. 3. *Attractionis defectus & imbecillitas*, vel ob intemperiem frigidam & humidam: vel ob interceptionem viarum, à mesaraicarum & cavi epatis obstructione, cujus in curatione ratio habenda est. 4. *Diaphoresis negata*, seu cum substantia corporis non evacuatur, vel ob constipationem pororum & cutis densitatem, quam balneum aquæ dulcis tollit: vel caloris nativi debilitatem, seu ex intemperie frigida seu otio, acquisitam: vel humidi substantifici, quod calori miti ac placido depascenti non facillè cedit, tenacitatem, fixamque & stabilem concretionem.

Alia à *suctionis non perceptione*, quam tollunt

1. *Morbi cerebri*, in quibus aut nervi sextæ paris afficiuntur; aut spiritus animales vel non generantur, vel influere impediuntur; vel, quod in acutis febribus accidit, languent; aut facultas, ut in phreneticis, &c. aliò convertitur. Curatio morbos illos respicere debet. 2. *Ventriculi ipsius morbi*, sive illi sint intemperiei, sive compositionis, sive solutæ unitatis, de quibus supra actum est. Excitatur sublatiis causis appetitus, partim refrigerantibus. si causa calida præcesserit, partim calefacientibus, si frigida. *Pisum absinthites* vehementer commendatur.

ARTICULUS III.

De Nimia appetentia.

Nimia appetentia in duas distinguitur species; Caninam nempe appetentiam, & Bulimum.

I. Canina appetentia, est continua ac insatiabilis vorandi cupiditas, à vehementi suctionis in ore ventriculi sensu exorta, aliquando cum vomitu, aliquando cum diarrhœa affligens.

Signis opus non est, cum sint in definitione exposita.

Causa est sensus suctionis & stimulationis in orificio ventriculi vehemens: unde verò is veniat, in Differentiis exponetur.

Curatio, quæ tempestivè adhibenda, ne ægri vel in vomendi consuetudinem, vel in coeliacam passionem, vel in hydropem incidant, respicit. **I.** Famem ipsam, quæ compescitur vel pinguium usu, vel vitellis ovorum aqua induratis, vel quod optimum est, vino. **II.** Causas, de quibus in Differentiis agemus.

Differentiæ sumuntur à causis, suctionem stimulantibus.

I. Alia est à nimia alimenti in corpore indigentia, seu propter vermēs chylum depascentes, qui se morſu exerunt, & usu hieræ picræ deturbantur: seu propter nimias evacuationes tam sensibiles, quàm insensibiles, per habitum corporis, ob calorem nimium partium, & humiditatum substantiam dissolventem, cui multum conferunt humorum tenuitas, corporum raritas, pororum laxitas, &c. tum sudores infestant, & Curatio ad morbos ipsos obvertenda est: seu propter longum usum alimentorum detergentium, ut ficuum, gari, &c.

II. Alia ab Humoribus frigidis acidis, & austerioribus orificium ventriculi corrugantibus, compressa-

primentibus, & vellicantibus; ut sunt pituita acida, & melancholia in ventriculum effusa; & tum, interperiei frigida signa adsunt. Inter purgantia hiera picra valet, ut & vinum Zacuti lib. ult. Hist. Prax. c. 2. n. 9.

II. Bulimos est appetitus magnus, periodicus, qui sæpe in nauseam cum lipothymia & virium dejectione desinit.

Signa in definitione sunt exposita.

De Causa inter medicos dubitatur: plerique tamen interperiem ventriculi frigidam statuunt, unde per altam nivem iter longum facientibus sæpius accidere solet.

Curatio est Nulla, si in morbis chronicis accidat: interdum post febres & alios morbos recidivam minatur. Respicit **I.** Tempus paroxysmi, quando animi deliquium accidit, in quo frictionibus, & refocillantibus, ut odore vini, aceti, &c. agendum. **II.** Tempus extra paroxysmum, in quo postquam se æger recollecterit, cibi boni succi, panis vino madidus, &c. dandi; & per externa calor ventriculo restituendus.

ARTICULUS IV.

De Appetitu depravato, seu Pica.

Pica, (ab ave ita dicta, quæ eodem affectu laborat) quæ & xirca & ygdaxia, est appetitus absurdus substantia aliena, liquida vel solida, præter naturam & rationem alimenti, ex tristi suctionis sensu, & iudicii res esui idoneas vel ineptas discernentis corruptione, à vitioso excremento tunicis imbibito, peculiari substantia proprietate os ventriculi infestante.

Signa manifesta sunt, quia cibos vitiosarum qualitarum appetunt: præcessit ingluvies, indigestio, usus ciborum & potuum pravæ qualitatis, suppressio mensium, &c.

Causa

Causa est tristis suctionis sensus, quem excitat *materia tunicae ventriculi* impressa, seu tota substantia agens, seu manifesta qualitate, ex prava victus ratione orta vel aliunde, ut, ab utero, unde utero gerentibus circa secundum & tertium mensem est familiaris, missa, infestans. Solet autem in principio, dum causae alterant *contrariarum rerum* cupiditas excitari; quando verò longa consuetudine familiaritas est contracta, *similia* efflagitantur.

Curatio est festinanda, ne cacoehymia vel hydrops accersatur.

Vomitum materia peccans commodissimè ejicitur, qui in praegnantibus lenioribus concitari debet. Ventriculus roborari potest *Aqua Cinnamomi*, *Corricum aurantiorum*, Magisterio corallorum, &c.

ARTICULUS V.

De nimia siti.

Nimia sitis, seu *τοξοδυσία* est major & frequentior potionis consueta appetentia, ob tristem suctionis in ore ventriculi sensum, ex alimenti humidi defectu, & propria humiditatis alteratione exorta.

Signa symptomatis per se manifesta sunt.

Causa est tristis suctionis sensus, quem humores inopia & caloris copia excitarunt. Unde verò ista procedat, in Differentiis exponetur.

Curatio respicit 1. *Symptoma nimis urgens*, quod leniunt *crystallum* vel *corallium* in ore detentum, *aqua frigida* modico aceti castigata, *succus cancerum vivorum* cum aqua violar. & sempervivi, paulillo nitri aspersus. *Looch ex mucilag. semin. psyllii, semin. cidoniorum ana unc. f. sacchari candi violati pulveriz. amyli, tragacanthi ana dr. i. syrupi violati q. f. compositum*, *Aqua fontana* cum saccharo candi decocta, pomo citrio inciso addito, &c. 11. *Causas*, de quibus in Differentiis agetur.

Dis-

Differentia sumuntur à causis.

I. *Alia est à rorida ventriculi substantia defectu*, quod *Cognoscitur* ex causis praecedentibus, fastidii absentia, &c. *Oritur* ab iis quae humidum absorbere possunt, ut sunt ladores, vigiliae, inedia, immodica evacuatio &c. *Curatio* cibo potius quam potu peragenda. *Aqua*, quae in illis vomitum & alvi fluxum excitat, vitanda est. Initium ab humectatione, quam lenis refrigeratio sequi debet, sumendum.

Alia ab humiditatis in ventriculo per calorem dissipatione, quae *cognoscitur* ex cibi fastidio, faucibus asperis, sapore amaro, saluginoso, nitroso. *Oritur* 1. Aut per se, seu ab *Externis*, aëre calido, cibis acerbis, salsis, potionibus calidis, motu vehementi linguarum, venenis, quae omnia amoveri debent: seu ab *Internis*, ut Intemperie ventriculi inaequali potissimum, ubi Evacuandum. Emulsione ex quatuor seminibus frigidis majoribus humectandum. 2. Aut ad alios morbos, nempe, Febrem, pulmonum caliditatem, hydropem, &c. quorum curatio ex suis locis petenda.

II. *Alia est sine febre*, quam bilis aut pituita salsa excitant.

Alia cum febre, in cujus paroxysmi principio potus non dandus, ne aestus major accendatur, sed sitis illis quae in ore detinentur fallenda; in vigore gargarismis humectantibus, & refrigerantibus agendum; in declinatione, potus, nisi aeger abstinere velit, concedendus est, ut sudores largius erumpant.

ARTICULUS VI.

De Coctionis seu chylosteos laesione.

Coctionis laesio est concoctricis facultatis in sua circa alimentum actione vitium, quo fit, ut vel non, vel tardè, vel depravatè concoquat.

Tria

Tria itaque sub se continet, *βραδυπείψις*, & *πείψις*, & *σπομπή*.

I. *βραδυπείψις* est tarda debilisque coctio, quando cibus vel semicrudus relinquitur, vel nonnisi longo tempore conficitur, frustratione facultatis, & imbecillitate caloris, & frigida potissimum intemperie proveniens.

Signa sunt, ventriculi à flatibus ad plenariam ciborum coctionem distentio, odor ciborum post plures etiam horas palatum feriens, ructus acidi, vomitus pituitosi, dejectiones humidæ & crudæ, alimentorum coctu facilitum vix longo tempore coctio, &c.

Causa adequata est facultatis concoctricis frustratio, quæ aut impeditur per morbum organicum, tumorem nempe, inflationes, &c. vel labefactatur per intemperiem frigidam, inductam ab iis, quæ aut refrigerant, aut suffocant, aut dissipant, aut pabulum subtrahunt: vel impeditur ab errore externo, quem aut excrementa in ventriculo coacervata vel aliunde missa: aut alimenta non legitime iusta quantitate, qualitate, tempore & ordine assumpta; aut somnus inferunt.

Curatio, nisi ab errore externo affectus proveniat, ad intemperiem frigidam obvertenda præcipue est. Faciunt huc intra, Tinctura ambra, magisterium corallorum, Elixir proprietatis, Diacorum nobile, condit. fructuum cynosbati, Extractum calami aromatici, granorum juniperi, xedoaria, spiritus vitrioli, si crassi humores ventriculo inesse præsumuntur; tum pessimus, ubi ventriculi calor languet. Absinthii cœruleus vel viridis. Elixir vitrioli Mynsichti. Syrupus granorum juniperi. Conserva rosar. vitriolata. sal philosophicus ex sale nitri præpar. fusi, gemmæ. ana dr. ij. Absinthii, Carduibened. Tamarisci ana dr. j. Galangæ, Cubebar. Macis ana scr. ij. confectus pulvis

pulvis ex rad. Aronis preparata Birckmanni in Pharmacopœa Quercet. Corticum aurantiorum, oleum absinthites, potabile Bartoleti, Nuces moschatæ, Cinnamonomi, Masticin. destillatum, &c. Extra optimè conveniunt, Oleum stomachale Cratonis, tacamahaca, balsamum Peruvianum, scutum stomachale Hartmanni, Cerotum ex ladano Stockeri, &c.

II. *πείψις* est abolita alimentorum in ventriculo coctio, ex privatione alteratricis ejusdem, quæ fit, ut cruda ad intestina descendant, proveniens.

Signa ipsius sunt; causarum prægressus, ructus, post sex vel septem horarum spacium, ciborum naturas ac qualitates referens. incoctorum per vomitum rejectio, vel per alvum excretio, &c.

Causa sunt validiores illis, quæ in *βραδυπείψις* allatae sunt.

Curatio etiam exinde peti debet. Laudatur Arcanum Tartari, singulis diebus in juscule gutt. x. sumrum.

III. *Δυσπείψις* seu *Δυσφορέα*, est ciborum corruptio, & in alienam qualitatem ex frustratione facultatis concoctricis ventriculi mutatio.

Signa illius sunt, ructus nidorosi, adusti, acidi, pingues, foetidi, quos sæpe ventris rugitus, borborismi, dolores, mordicationes, vomitus, graveolentium dejectiones, sequuntur, difficilis inediae tolerantia, anxietas, &c.

Causa est intemperies ventriculi & sæpius calida, quæ cibos adurit, corrumpit & putrefacit: quodlibet autem corruptum, pro natura sua alienam qualitatem induit; inde fit, ut res diversa oleant. Inprimis caloris soboles est *nidiosa corruptio*, quæ oritur à morbis calidis, alimentis ejusdem qualitatis, & facile corruptibilibus, ut lacte, piscibus, fungis, fructibus horariis. *Corruptio acida* à frigidityte provenit.

Curatio ad intemperiem est obvertenda, calidam inprimis

inprimis, de qua superius diximus. Spiritus acetosa, & corallorum Quercetani syrupus hic primas tenent.

ARTICULUS VII.

De singultu.

Singultus est motus ventriculi convulsivus, tensione & dilatatione fibrarum partis superioris constans, quo expultrix irritata, noxia tunicis ventriculi, inprimis oris & œsophagi, infixæ, cum sonitu & vehementi contorsione elidere tentat.

Signa recensere non est opus. Auditur ab adstantibus.

Causa est materia, in toto ventriculo interdum residens, sed ventriculum, seu qualitate inimica, seu compressione vellicans.

Curatio est Nulla, si delirium in eo obvenit, quia aut à ventriculo inflammato vapores acres ad caput attolli, aut à cerebro inflammato malum cum nervis orificii ventriculi communicari, indicium est. si insomno profundo, animi deliquio aut tetano oboritur. Dubia spei, si in eo lipothymia metuenda est. si senibus supra modum purgatis obvenit. si ab inflammatione hepatis oritur. si à vomitu invadit, quia ventriculum vel cerebrum non parvam pati inflammationem indicio est. si in vomitibus sinceris accidit, quia magnum aliquod partium circa ventriculum incendium significatur. si ab ileo incurrit, quia partem nervosam cerebro consentientem affici indicio est. si cum aphonia conjungitur. Respicit I. Symptoma ipsum, quod cohibetur stuporem inducentibus, ut philonii Romani scr. j. Croci, Cinnamomi ana gr. ii. Laudani opiati gr. j. cum ol. Salviæ q. s. II. Causas: de quibus consulantur Differentiæ.

Differentiæ sumuntur à causis, & aliis.

I. Alius est à Causis externis, ut refrigeratione, seu

seu ob aërem, seu ob potum frigidum, ubi compressio spiritus, & inunctio dorsi ac ventriculi oleis calidis juvat; Alimentis vel medicamentis acris, ubi ptisanæ cremor, vel oleum amygdalorum dulcium remedio est. Evacuatione nimia, quam siccitas & corrugatio ventriculi insequitur, ubi emulsio seminis quatuor, cum analeptics temperatis locum habet. Cibis corruptis, quos aloë exturbat. Veneno assumpto, cui Theriaca obviat.

Alius ab Internis, ut sunt I. Humores calidi & acres, qui vomitum vel purgationem lenem exposcunt. Terra sigillata, bolo armeno, mitescunt. II. Humores frigidi, qui incidendi & evacuandi. Valet Extractum Castorei, Oxymel scilliticum, Elixir proprietatis. Habet & sternutatio locum. III. Flatus, qui nodulo ex semine anethi & papaveris composito, Oleo cumini, Cineribus quernis vino malvatico aspersis impositis, emplastro de baccis lauri, discutiuntur. IV. Pus, quod in inflammatione hepatis fieri solet. V. Morbi interni, ut inflammatio hepatis, uteri, ventriculi, cerebri, vel alterius partis: nec non febris, in quibus nota. In principio febris leni evacuante tolli debere. In statu, quia crisis futuræ per vomitum signum est, metuendum non esse. In augmento, vel humorem ad ventriculi cavitatem confluere, & tum singultus est rarior, & assumto cibo vel levimedimento sedatur: vel in ventriculi substantiam; & tum singultus est ita frequens, ut præ eo æger suffocari videatur: stupefacientibus, si ob vehementiam febris purgare non licet, sistendus est.

ARTICULUS VIII.

De Ructu, & Rugitus.

I. Ructus est violentia & sonora flatus in ventriculo stabulantis per superiora eruptio.

M m

Si-

Signis non est quod discernatur; manifestus enim est.

Causa est flatus in ventriculo genitus, vel ex aliis partibus hypochondriis præsertim eo missus.

Curatio non negligenda, Nam si sint frequentes & multi, causæ vehementiam significant, & coctionem turbant; si ante cibum fiant, ad Colicam; si post, ad hydropem disponunt. *Bonus* tamen ructus est: si asthmatis supervenit. si in longo alvi fluxu, cum prius non fuerit, obtingat; quia aliquam iterum coctionem fieri indicio est. *Respicit præcipuè Causam*, de qua alibi.

Quantum ad *Differentias*, dividitur tripliciter.

I. Alius est *Moderatus*, qui (quia per os excrementa flatulenta excernit) cohibendus non est. Alius *Frequens*, qui tollendus.

II. Alius est *Acidus*, qui vel est à cibis difficilis coctionis, vel ab intemperie ventriculi frigida; & tum mel, saccharum & alia, in aciditatem abeunt. hydropem vel lienteriam si diu continent, minantur. ægri non facile pleuritici fiunt. *Curatio* ad intemperiem obvertenda est.

III. Alius *Nidrosus*, qui vel est à cibis talem halitum de se edentibus, ut sunt raphanus, cepæ, frixæ, ova frixa: vel à calore ventriculi nimio cibos ita corrumpente, sive is sit talis per essentiam, si ve per consensum.

IV. Alius *Inspidus*, qui vel à cibis flatulentis, vel ab eorum copia provenit, & si longo post sumtum cibum tempore, ejusdem saporem redoleat, magnam chyloleos imbecillitatem significat.

II. *Rugitus* est sonitus ventris excitatus ab humoribus vel flatibus, in ventriculo aut intestinis discurrentibus.

Causas habet easdem. Sortitur *differentias*, & pro di-

diversitate soni, cujus *causa* est excrementi copia, & viarum amplitudo; & partis in qua continetur ratio. Est enim *Siccus* & *tenuis*, qui acutum; *Humidus* & *Crassus*, qui gravem sonitum facit. Est vel in *intestinis crassis*, unde graviores bombi erumpunt: vel in *tenuibus*, unde clariores & acutiores; & si humiditas adsit, murmurillus oritur, qui instantis humidae dejectionis prodromus est. Est vel in *Cavitate*, vel *intra tunicas*; imò visus est flatus per gulam ascendisse, futuræ suffocationis speciem præbens, & post horæ spacium ad ventriculum recurrisse.

ARTICULUS IX.

De Nausea & Vomitu.

Nausea est inane vomendi desiderium, cum tri-
sti molestia, astu & anxietate, quo ventriculus
constrictis inferioribus & dilatatis superioribus, eji-
cere quidem quæ sibi molesta sunt conatur, sed præ
imbecillitate, vel paucitate, aut contumacia mate-
rie, nihil præter tenuem & aqueum humorem per os
excernit.

Signis opus non est. *Causæ* sunt in Definitione
expositæ, & secundum magis & minus duntaxat, ab
illis quæ vomitum producant, differunt. Itaque de
iis de vomitu agemus.

II. *Vomitus* est materia molesta in capacitate con-
tenta, per superiora, sensibilis & palpabilis cum impe-
tu rejectio.

Signis non est opus, cum symptoma sit manife-
stum. Res autem est non de *Critico*, qui ut opus na-
turæ in commodum ægri accidit, & vel materiam
imminuit, vel tollit; sed *Symptomatico*, quem præ-
nunciant, capitis dolor per consensum exortus, te-
nebræ ante oculos apparentes, rigor, inferiorum

hypochondrii partium frigiditas, agitatio labii inferioris, multæ salivæ effluxus, &c.

Causa est, quicquid superius orificium ventriculi infirmi offendere, & ad expulsiōem, vel *copia*, vel *qualitate* mordaci, vel *substantiaratione* & dispositione irritare potest.

Curatio est *difficilior*, si omnes colores vomantur, quia difficiles in corpore affectiones significant. si vomitus sit prasinus, aut niger, quia calorem in venis insignem & magnam humorum corruptionem indicat, nisi vel ex quorundam ciborum cruditate proveniat, vel criticus sit. *Nulla ferè*, si sit lividus & graviter oleat, quia putredinem cum caloris nativi extinctione notat. si cum eo alia materia, quæ ex corruptione in corpore nigredinem, ipsa naturâ non nigra, contrahit. *Respicit* 1. *Ipsium Symptoma* urgens, quod sistendum. 1. *Revellentibus*, seu illa sint clysteres acres & fortes; seu calida extremitatibus apposita. 2. *Expultricis motum comprimentibus*, & ventriculū roborantibus. *Intra* laudantur *pillula Zacuti*. 9. *Hist. prax. cap. 1. num. 4. Lignum aloës* pulveriz. & cum syrupo acetosifatis citri exhibitum. *Juccus Cydoniorum* crudus, in cochleari propinatus, *laudanum opiatum*, vomitus. *Extra*, *Emplastrum theriacæ*, *Cataplasma Zacuti*, *Epithema* ex decocto absinthii, menthæ, in aqua ferrariorum.

Differentia à Causis præcipuè sumuntur.

I. Alius est à *Causis Externis*, ut sunt, cibi vel nimia copia sumti, vel qualitate noxia infesti, medicamenta emetica, (tum laudantur, *Theriaca recens*, *spiritus vini*,) potatio immodica & ebrietas, motus post cibum vehemens, infueta per mare navigatio, tussis valida, imaginatio & intuitus rerum abominabilium, percussio corporis, vulnus cranii, venenum assumptum, &c.

Alius

Alius est à *Causis internis*, sive morbis sive humoribus: de quibus sequenti Differentia agetur.

II. Alius est à *morbis ventriculū infestantibus*, ut sunt: Ulcus, Tumor, Angustia & parvitas, Occlusio oris inferioris, quorum ratio in Curatione habenda est.

Alius ab *Humoribus*, qui vel *ibidem nascuntur*; & tum in victu peccatum est, nausea est continua: vel *aliunde affluunt*, & tum ratio partium est habenda: vel in *ventriculi cavitate latent*, & tum levissimo conatu rejiciuntur, inest tensio & anxietas exalimento, etiam sine cibo fit vomitus: vel *tunicis adherent*, & tum non vomunt nisi ingesto cibo, citra cibum nausea admodum molestat. Sunt autem, 1. *Chylus*, cui citò occurrendum, ne atrophia obrepat. accidit is in ulcere ventriculi. 2. *Fæces*, quæ in iliaca passione, ut & clysteres, ejiciuntur. 3. *Sanguis*, qui *Aut* propter membri alicujus abscissionem, vel post suppressam aliquam sanguinis evacuationem, ejicitur: ubi *dissolvendus* est, ne putrescat, *Oxymelite*, in quo *ebuli radix* efferbuit, post evacuandum. tandem *Restringendum* aquæ *Vtricæ major.* unc. vi. cum spirit. victrolis q. s. ad gratiam aciditatem. Essent *Croci Martis* cum gelatina cydon. conserva rosar. vetere, & tragac. exhibita. *Aut* propter vasorum apertionem, ubi idem agendum. Valet in adstringendo syrupo *de portulaca*, cum terra sigillata. 4. *Bilis*, interdum per ductum chologogum si ventriculo inseratur, eo devenit; & tum natura humoris rejecti spectanda, vomitus jejunos magis molestat. *Salvatella* sectione, si Zacuto credimus, interdum feliciter sistitur. 5. *Pituita*, *Melancholia*, *Pus*, *Vermes*, *Caliculi*, &c. qua suis signis optime deteguntur.

Mm 3

AR-

ARTICULUS X.

De Cholera.

Cholera, sive illa $\delta\acute{o}\delta\ \tau\eta\varsigma\ \chi\omicron\lambda\acute{\alpha}\varsigma$, id est, bile flava, à qua frequentissime oritur; sive $\delta\acute{o}\delta\ \tau\acute{\alpha}\nu\ \chi\omicron\lambda\acute{\omega}\delta\alpha\nu$, ab intestinis veniat, duplex est: *Humida & Sicca*.

I. *Cholera humida*, quæ & vera, est assidua & immoderata humoris pravi, cum vehemēti perturbatione & violentia, per superiora & inferiora rejectio, à facultate expultrice valde irritata exorta.

Signa sunt, excretio frequens biliosorum humorum, dolor ventris & intestinorum ingens, cardialgia, sitis, pulsus parvus & frequens, quib. sæpe animi deliquia, & extremorum refrigeratio accedunt.

Causa est materia acris & corrupta, seu ex cibis per se pravis, ut barbi piscis ovis, fungis, melonibus, cucumeribus, prunis, pinguibus, oleribus, porro, cæpis, &c. exorta: seu alicubi nata, & ad ventriculum, ut in Differentia dicitur, transmissa.

Curatio est festinanda propter acumen mali; sunt tamen quidam, quibus cholera & diarrhoea certis intervallis omnem corporis redundantiam evacuat. Respicit 1. Evacuationis alterutrum, si una nimia sit. altera parca promotionem. 2. Humorū temperationem. 3. Partis roborationem. 4. Virium & spirituum refectionem, cui scopo vinum si febris abest, infervit. 5. Symptomatum mitigationem, de quibus in Differentia.

Quantum ad Differentiam,

Alia est quando materia irritans in ventriculo continetur, quæ cognoscitur ex eo, quod adsit nausea, angustia, morsus ac dolor ventriculi. Oritur etiam à medicamentis purgantibus fortioribus. De Curatione nota, 1. Non cohibendum esse fluxum,

si

si evacuatio est copiosa, & vires non dejiciuntur. 2. In irritatione magna & evacuatione parva, promovendum vomitum lenioribus, purgationem benignè purgantibus, & laxantibus. 3. In evacuatione magna, & irritatione parva, simul adstringendum & roborandum. 4. Si vomitus est ingens, ducendam esse alvum; si fluxus alvi nimius, vomitoriis ex sero lactis cum syrupo rosarum confectis agendum. 5. Optimè siltere *Intra, Crocum Martis* ritè præparatum, Decoctum *caryophyll. mastiches.* & *rosarum rubrarum* in vino rubeo. *laudanum opiatum*: Spongiam salicib. adnasci solitam gr. iv. pondere in vino rubello. *Extra*, spongiam marinam in aceto fortiter bullitam, stomacho impositam.

Alia, quando materia aliunde, ex epate nempe, pancreate, intestinis, mesenterio, ad ventriculum confluit. Cognoscitur ex eo, quod febris maligna ferè adsit, & convulsiones infestent. Materia peccans tum est *bilis vitellina, flava, adusta, vel salsa, nitrosa, & corrupta*. In Curatione 1. Materię fluentis fluxus impediendus statim non est. 2. Si nimium fluit, vel seu ad cutim, seu ad urinæ vias, per medicamenta est avertenda: vel ad exteriora, per frictiones, ligaturas, & similia revocanda. 3. Eadem est temperanda, & partes roborandæ. *Intra* valet *CrySTALLUS* dr. f. pondere exhibitus: *Extra* epithemata ex succo *Endivie*, *portulacæ*, cum farina hordei composita, & ventri applicata. In *Dieta* valet panis succo granatorum imbutus, &c.

II. *Cholera sicca*, quæ & *Notha*, est spiritus flatus per superiora & inferiora, cum inflatione ventris, strepitu, & lumborum ac laterum dolore excretio.

Signa & Causa proxima in Definitione sunt exposita.

Curatio, quæ etiam festinanda, respicit 1. Spiritus

Mm 4

tus

rus flatuosi eductionem, & discussionem, ubi clysteres & decocta carminativa locum habent. II. *Causa*, à qua oritur, *ablationem*: de qua in Differentiis.

Quantum ad *Differentias*.

Alia est à *calore ventriculi igneo cibos corrumpente*, & in nidorofam materiam & acres vapores convertente; in qua, Cura ad intemperiem calidam obvertenda, & extra, æstuantia hypochondria refrigeranda.

Alia ab *alimentis acribus & flatuosis*, raphano, semine erucæ, ovis frixis, & similibus: & tum materia evacuanda, & diatrion piperion exhibendum.

Alia à *Bile atra*, & aliis humoribus adustis & falsis circa hypochondria latentibus, & alterius humoris permissione effervescentibus, prout videmus sales & spiritus salinos cum spiritibus acribus permixtos, magnam spirituum copiam suppeditare.

TITULUS III.

De Affectibus intestinorum.

CAPUT I.

De Morbis intestinorum.

MOrbi intestinorum sunt præcipuè: *Inflammatio*, *Angustia*, *Vermes*, *Hernia*, *Vulnus*, *Vlcus*, & *Intestini recti affectus*.

ARTICULUS I.

De Inflammatione intestinorum.

Inflammatio intestinorum est eorundem tumor, à sanguine extra vasa in illa elapso & putrescente, exortus.

Si-

Signa sunt, dolor fixus & distendens, tumoris perceptio, ut intestina chordæ instar convolutaprehendantur. alvi suppressio, urinæ interceptio, febris præsentia.

Causa in definitione exposita est. Autumno ob tenuitatem, sanguis inprimis, affluit, quia æstate geniti humores tenues & mobiles autumnii frigore inæquali in profundum corporis pelluntur.

Curatio est ad aliarum Inflammationum normam instituenda, & quidem citò, quia malum est acutum: & sæpè in gangrænam & sphacelum abit. In ea refrigerantia quæ exhibentur, absque adstrictione esse debent. A purgantibus planè abstinendum, ne locus affectus exasperetur.

Dividitur, secundum locum & Causas.

I. Alia est *per se*: de qua jam egimus. Alia ab *Emphalo*, de qua suo loco. Alia ab *Enterocæle*, in qua intestina statim reponi debent. Alia à *Contusione*, in qua reliquis quæ inflammationis causa adhibentur, aliquid lenientium & concoquentium addatur.

II. Alia est in *tenuibus intestinis*, quæ est frequentior, & in qua stomachi distentio, spiritus angustia, vomitus assidui, ut nec potus contineri queat, urgent, dolor & tormina magis ad superiora vergunt. Alia in *Crassis*, in qua dolor ad hypochondria magis pertingit, lumborum adest gravitas, vomitus non ita continuò durat.

ARTICULUS II.

De Intestinorum angustia.

Angustia intestinorum ex eo præcipuè cognoscitur, quod fæces alvi non rectè per alvum excernantur.

Differentias pro ratione Causarum sortitur.

M m 5

I. Alia

I. Alia est ab externis adstringentibus & exsiccantibus, ut cydoniis, & aliis, quæ ex relatione ægri & adstantium cognoscitur. In Curatione humectantia & emollientia, pingua &c. requirit.

II. Alia à Facibus induratis obstruentibus, quæ Cognoscitur ex eo, quod nullus sit tumor, dolor, fæces tamen non excernantur. Oritur eò præsertim loci, ubi tenuia desinunt, & crassa terminantur, vel à materia sicciore & potu minùs diluta; vel à vicinarum partium calore, quicquid humidum est exfugente.

Curatur lenientibus, balneo aqua dulcis cum herbis emollientibus, pinguedine de anseris asino, cum clystere infuso, inflatione intestinorum per sollem, quam clyster fortis cum dr. f. salis gemmæ insequi debet.

III. Alia ab Inflammatione, de qua superiori capite dictum.

IV. Alia ab Intestinorum coalitu, quæ incurabilis est.

V. Alia ab Hernia vel vermibus: de quibus infra dicetur.

V. Alia à Pituita crassa, quæ cognoscitur ex eo, quod causæ eam generantes præcesserint, cruditas, alvi tarda dejectio, flatu plurimi, adsint. Oritur vitio victus & debilis intestinorum caloris; & si diu ibidem hæreat, ita crassescit, ut intestina prorsus obstruat. Curatur pituitam incidentibus, & clysteribus acerbis; de quibus vide caput de Colica.

ARTICULUS III.

De Vermibus.

Vermes sunt animalcula vermicularia, toto genere præter naturam in intestinis ex crasso lento & viscido humore, principium vitale sui generis in se ha-

se habente, à calore virido per putredinem suscitato, genita, functiones intestinorum impediencia.

Signa communia sunt multa: nempe, foetor oris, somnus inquietus cum saltu, tremor, stridor & crepitus dentium, pruritus & frictio narium frequens: facies pallida, nonnunquam per intervalla rubore suffusa, oculi concavi & tenebrosi, quorum album in croceum vel pallidum mutatur, salivæ exore præter solitum defluxus, ventris distentio & inflatio cum murmure, morsus ventris & exacerbatio tempore famis. interdum fluxus alvi, vomitus, epilepsia. Si manè jejunis pueris supra os ventriculi frigida spargatur, in unum congregantur omnes, & habet hoc signum plus ponderis, si ætas sit apta.

Causa est humor pituitosus & viscosus, qui ab ingluvie, cibis faciliè putrescentibus, & crassum succum generantibus, ut caseo, lacte, leguminibus, fructibus horariis, dulcibusque, saccharatis, mellitis, &c. oritur, quippiam semini analogum vi plastica instructum, vivificamque materiam, quæ materiam ad hanc non aliam vermis formam recipiendam disponit; dispositam hac ipsa forma induit, habet, prout videmus ex absinthio, sale marino, equo, vitulo, mori foliis, caseo, melle, peculiare vermes provenire.

Curatio, quæ Difficilis, si sunt plures, majores, rubri & diversicolores, viventes. si in febrium & acutorum initiis, ut & augmento, malitiâ morbi, symptomaticè excernuntur. Persecurit 1. Enecantibus, quæ amara, acrida, salâ, tota proprietate infecta sunt, per superiora sed dulcibus mista, semper; per inferiora, dulcibus præmissis, tum, cum infimis locis vel in intestino recto subsistunt, exhiberi debent. Illis oleum, ut in eo suffocentur. his butyrum quod vehementer reformidant, immiscendum. Præcipua ex Enecantibus sunt, Calida corallina in pulvere drach. j. pondere exhibita, semen santonicum, Centaureum

raureum minus, flores *persicorum*, *myrrha*, *aloë*, *zedoaria*, *succus raphani* & *nasturtii*. *Frigida*, *Cornu cervi ustum*, aqua *portulacæ*, *succus endivie*, Aqua *graminis* cum pauxillo aceti & *sacchari*. Ex *Compositis* internis præstat pulvis *Doctoris Mancelii* profoceri mei, *Compositus ex flor. centaurii minoris*, *Tanacetii*, *hyperic. ana dr. ii. flor. absinthii*, *sabine*, *persicor. ana dr. j. f. Radic. Dictamni albi*, *gentianæ*, *Asari ana dr. j. Coralliorum rubr. præp.* *Cornu cervi usti præpar. ana scrup. ii. semin. Cina*, *Portulacæ*, *Citri*, *Cimini*, *Seseleos*, *Caulium*, *Coriandri præparati*, *acetosæ ana drach. f. Rhabarb. electi dr. j. Myrrha*, *Croci ana dr. f. scammonii præpar. Trochisc. albandal. ana scr. ii. salis Absinthii scrup. f. Corallina unc. f.* quem pondere à scr. j. ad dr. j. jejuno stomacho duabus horis ante cibum in lacte vaccarum dabis. Extra laudatur cerotum xx *myrrhæ*, *Croci*, *Aloës hepat. ana q. f. cum aceto rosarum & felle bovis compositum*: & tum ori ventriculi, tum dorso applicatum. Plura vide apud Authores. II. *Expellentibus*, quæ sunt, *Butyrum liquefactum*, *oleum copiosum*, *inseffus in lacte dulci fumante*, si vermes adhuc sunt vivi: *Diaturbith cum Rhabarbaro*, *pillulæ*, *Rufi*, de trib. *solutivis*, si sunt mortui.

Differentia sumitur ab ipsorum figura.

I. Alii sunt *Teretes*, seu rotundi, in quibus morfus ventris est vehementior, ruficula sicca frequentior, singultus, nausea, abominatio, syncope Cardiacæ, insomnia turbulenta cum tremore, surrectione, clamore, maxillarum motione, &c. Clysteres in iis non conveniunt, nisi sint mortui.

Alii sunt *Lati*, in quibus sunt excrementa cucurbitæ seminibus non absimilia, inexplibilis ciborum appetentia, cita eor. quæ sumuntur dejectio, gracilitas & atrophia major dolor modò in dextris, modò in sinistris. Valent contra eas *Filix* vel ejus aqua, *Nu-*

ces

ces juglandes, *Theriaca* cum aceto vel succo limonium. De lato lumbrico vide *Tulpium* in observationibus.

Alii sunt *Ascarides*, in quibus est continuus dolor, pruritus circa anum molestissimus, ac si formicis plenus esset, cum gravitate dorsii, assidua ad egerendum irritatio, tinea excretis alvi graveolentibus undique aspersa, &c.

ARTICULUS IV.

De Hernia intestinali.

Hernia intestinalis, est intestinorum de sua sede prolapsus.

Dicitur Græcis κήλη, Latinis aliter *Ramex* & *Ruptura*.

Signa sunt, tumor qui modò minuitur, modò increfcit: prout major portio descendit, vel flatibus aut stercore repletur, dolor adest nullus, nisi fortè fæces eo delapsæ sint. Compresso aut resupinato ægro, relabuntur intestina in abdomen, & quidem cum murmure, &c.

Causæ sunt illa, quæ processum à peritonæo productum, vel laxare vel rumpere possunt: ut in Differentiis dicitur.

Curatio non est negligenda, tum, quod membrana illa tenuis & nervosa facillè uniri non possit: tum, quòd interdum æger intestinis inflammatis in vitæ discrimen conjiciatur, & intestina inflammata spha-celo corripiantur. *Respicit* I. *Intestinorum repositionem*, quæ si *Flatu turgent*, quod rugitus in intestinis & flatuum emissio patet, discutientibus agendum est: si *facibus induratis*, emollientibus tum clysteribus tum cataplasmatibus & fomentis. si *pituitosâ materiâ*, sensum per clysteres & suppositoria evacuandum, & per interna incidentia

atque

attenuandum : si istis nil proficitur , ad *Chirurgiam* (de qua authores confule) confugiendum. II. *Eorundem in suo loco retentionem*. Appropriata hic sunt , *Hippoglossum*, quod præstantissimum, *pilosella* pulvis in cibis exhibitus , *Perfoliata* , *Herniaria*. *Cinis lactentis leporis* in vino rubello propinatus, *semen sophia* , *herba filicula* pondere ana dr. f. pulverisata & data.

Differentia à Causis & locis, in quæ procidunt, sumuntur.

I. Alia est à *peritoneo rupto*, quæ *Cognoscitur* ex eo, quodd tumor subito exciteretur, qui etiam subito incrementum sumit; intestinum ad fundum usque prolabitur. *Oritur* à causis violentis, casu, conatu excernendi seu foetum, seu alvi fæces, spiritus retentione, vocis intentione, vulneribus peritonæi, &c. In *Curatione*, ligaturâ adhibitâ, *Essentia consolidæ major*. Cochl. j. cum *Balsami salis gemma* gutt. ij. intra exhibebuntur. *Extra*, Emplastrum de *arietina Villanovani*, *Mynsichti* p. 364. *Armam*. Ejusdem *Unguentum contra rupturam* p. 352. *Axungia Erinaei*, de qua apud Hartmannum, applicabuntur. Si nihil ista, à *Chirurgia*, (de qua apud Platerum) auxilium petetur.

Alia à *peritoneo laxato*, quæ ex eo *Cognoscitur*, quod tumor sensim crescat, nec intestinum ad fundum usque descendat. *Oritur*, tum à peritonæi humiditate, unde pueri in herniam sæpe incidunt; tum ab illis quæ rumpunt, si peritonæum, sensim & sæpè, nec tam violenter impetant.

II. Alia est *ἐκ χειρὸς*, quando intestina in ipsum usque scrotum descendant, visu dignoscitur. Alia *Bubonocoele*, quando ultra inguina non delabuntur. Hæc interdum cutem valdè extendit, & sub eam exporrigitur, magnumque tumorem excitat. *Vitæque*, vel est *ὀντερονήλη*, quando intestinum ileum maximè excidit:

excidit: vel *ἐπιπλοκήλη*, quando omenti aliqua pars. Vide *Geigerum in Kelegraphia*. Pertinet huc *ἐξ ὀμφαλῶ* seu *ὀμφαλοκήλη*, cum luxatus vel ruptus umbilicus, nunc nucis, nunc pomi magnitudine sese exferit, imò interdum, sacci instar, tumor aliquando excitatur. Si est recens, fovetur primò decocto *usneæ*, *prunella*, in vino stiptico; postea *cataplasma* ex plantagine & lentibus apponitur. Si est *vetus*, post similes fomentationes, unguento ex *fungis nucum* cum decenti ligatura extrinsecus, essentiâ *consolidæ majoris* cum *arcano salis gemmæ* intrinsecus, curatur.

ARTICULUS V.

De Ani procidentia, ac vulneribus, & Ulceribus intestinorum.

I. **A** Ni procidentia, est exterioris in recto intestino partis, extra prominentia.

Signis opus non est. *Causæ* in Differentiis dicuntur.

Curatio requirit I. *Ani prolapsi repositionem*, quæ molliter manu perficitur, fomento ex emollientibus & humectantibus, si intumuit, præmissò. II. *Repositi in suo loco*, seu per decocta adstringentia, seu per pulveres, è thure, mastiche, &c. *retentionem*. Laudatur *Intra*, Decoctum *radic. prunella sylvestris* bibitum. *Extra* *Cinis scarabæorum pillularum* super intestinum sparsus.

Differentia à Causis petuntur. I. Vel est à *magno conatu*, qui aut fit in egestionem fæcum; & tum laxa alvus tenenda; aut in partu. II. Vel ab *irritatione magna*, quæ vel in dysenteria vel tenesimo affligit, ad quæ *Curatio* obverti debet. Vel ab imbecillitate musculorum, qui post alvi egestionem, anum propulsus retrahere solent, seu ob frequentem ani proci-

procidentiam: seu ob refrigerationem, & tum nervi sunt roborandi, & intemperies frigida corrigenda.

III. Vel à *Resolutione*, seu ob nervorum circa ossis sacri aut Coccygis regionem contusionem; ubi consolidantia locum habent: seu ob eorundem validam refrigerationem, de qua nunc dictum: seu ob abscessum vel fistulam circa musculos sphincteris exorta.

II. *Vulnera intestinorum* (taceo perforationes à vermibus, flatibus, &c.) vel sunt *Tenuium*, in quibus cibus & potus exit, bilis vomitu rejicitur, dolores cum febre magni adsunt, quæque quod tunica sit nervosa, & multis vasis referta, nulla ferè ratione, vel saltem difficillimè curantur. Vel *Crafforum*, in quibus stercus egreditur, alvus supprimitur, quæque, si sunt secundum longitudinem, & parva, facilius: si ampla & per transversum, difficilior curantur. Nullo modo, si livida evadunt. *Curacionem* vide apud Præcticos.

III. De *Vlceribus* in Dysenteria agetur. *Sphacelus* interdum, herniam, ileum, & inflammationem excipere solet. Accidit & in vulneribus, si extra abdomen prolapsa, ab aëre alterantur, & livida evadant.

CAPUT II.

De Symptomatibus intestinorum.

ARTICULUS I.

De Iliaca passione.

Symptomata intestinorum sunt, *Iliaca*, *Colica*, *Alvi retentio* & *alvi fluxus*.

Iliaca est dolor in intestinis tenuioribus acerbus, à violenta continui solutione, cum tumore ventris ad similitudinem chordæ involuti, tantaque alvi obstructione, ut nihil descendat, sed humores & excrementa

menta interdum per vomitum violentè rejiciantur, exortus.

Pars affecta est intestinum ileon & reliqua tenuiora. Licet enim crassa quoque aliquando affici possint; tamen in iis tanta vehementia & periculum non est, quia laxiora & ignobiliora.

Signa sunt, Doloris sensus in intestinis superioribus, supra umbilicum circumvolutus, acutissimus, sursum sese ad dextrum potissimum latus extendens, Inflatio & distensio, vehemens, tumor epigastrii & intestini tenuis eminens, perfecta stercorum & flatuum cohibitio, ructus inanes nihil allevantes, murmura intestinorum tenuium, ferèque superiorum. Si malum intenditur, omnia sursum feruntur: hinc vomitus accedunt enormes, extremorum & totius corporis frigiditas, spirandi maxima difficultas, urinae suppressio, &c.

Causa synectica est violenta continui solutio, ab obstructione, erosionem, & aliis (de quibus in Differentiis agetur) procedens. Tum enim expultrix intestinorum ad expellendum, quod iis molestum est, insurgit, & cum deorsum naturali modo movere nequeat, quia viæ ad anum ducentes valida obstructione obsecæ sunt; vel quia pars dolens aut inflammata pondus aut acrimoniam humorum vel excrementorum perferre nequit; motu converso & peristaltico, contractis intestinorum fibris, sursum, primò noxia, deinde ob violentiam motus, omnia in intestinis contenta, protrudit.

Curatio est *Majoris spei*, si intestina secundum partem afficiantur. si pueris accidat, quia calidum innatum robustum habent, & humores minus acres & modaces. *Dubia*, si senes affligat, si stranguria superveniat, nisi febre accedente, & materiam illam dissolvende, copiosior urina fluxerit. si singultus, aut vomitus, aut convulsio, aut desipientia

accedat. Nullius ferè, si ad stercoris vomitum, vel furditas, vel febris acuta, vel cum eadem & hypochondrio sublimi, parotides accedant. *Respicit* 1. *Causas*: de quibus in Differentiis. 11. *Dolorem*, qui emollientibus & Anodynis mitigandus. *Sanguis vesperilionis* hypochondrii illitus, mirificè experientià valere creditur.

Differentia sumuntur à Causis.

Alia est ab *Externis*, ut aëre vel nimis calido exsiccante, vel frigido meatus constringente, lethali-
bus medicamentis & venenis, fabarum, pisorum, for-
borum, cydoniorum, mespilorum, &c. usu. tum vo-
mitui res committenda.

Alia ab *Internis*: de quibus sequenti Differentia.

II. Alia est à *Morbis* 1. *Vicinatorum viscerum*, qui suis signis patebunt. 2. *Hernià*: de qua superius diximus. 3. *Inflammatione*, quæ frequens est, & in autumno. qui æstate conceptos tenues & mobiles humores in profundum trudit, præcipuè accidit. Cognoscitur & Curatur, prout superius dictum est. 4. *Ulcere & aliis tumoribus*, nimirum scirrho, cum diuturna duritie, & cancro, qui vix curabiles. *Resident*, vel in *interioribus*; & tum stanti intestina quasi detrahuntur, difficilis est sæcum exclusio: vel in *exterioribus*; & tum tumor ipse est conspicuus.

Alia ab *Humoribus obstruentibus*, qui sunt 1. *Fæces induratae*. Et in hac, omnia sunt mitiora. diuturna alvi obstructio præcessit. Emollientibus pingui-
bus intra & extra acceptis, curatio instituitur. Lau-
datur ex omento & intestinis vituli, cum brodio decoctis suffitus: intra *Cremor Tartari* in jusculis ad dr. j. f. exhibitus. 2. *Humores* vel crassi & viscidii, vel acres & mordaces; qui, si possibile, deturbandi.

Alia à *Flatibus*, in quibus clysteres ex sulfureis & salinis laudantur.

ARTI-

ARTICULUS II.

De Colica.

Colica est dolor intestini coli, à rebus continuum solventibus exortus.

Signa sunt, sensus doloris in intestinis crassioribus terebrans & perforans, præsertim in inguine sinistro, ubi colon angustius est, ab umbilico deorsum maximè delatus; hypogastrii inflatio ac distensio, sæcum ac flatuum suppressio, nausea, ructus, vomitus, dysuria; quæ certiora evadent ex antecedentium *αυαπονοει*, & consequentium *διπλοει*. *Distinguitur* à *Nephritico*, quod magis pungat, amplum spacium occupet, post cibum propter compressionem ventriculi intendatur, minus dorsum & crura affligat, vagetur, & nullas in urina arentilas ostentet. Ab *Vterino*: quia hic mensum fluxu subsistente, plerumque accedit. Coxis & inguinibus tantum communicatur.

Curatio est festinanda, quia dolor omnes vires ac spiritus dissolvit, & partes principes in consensum trahit. *Parva spei*, vomitus est creber, & potus retineri nequit, ac nihil vel parum excernitur. si in abscessum intestini coli mutatur. si in dorsi dolores, materià quæ in hypochondriis continebatur fusa, & in spinam delatà, abit, & malignitate contractà, Epilepsiam gignit. *Perficitur* 1. *Causarum* (de quibus in Differentiis agemus) *ablatione*. 2. *Doloris mitigatione*, si nimis vehemens est. Ubi nota. Clysteribus anodynis commodissimè agi. *Externorum* frequentiore usum, si aliqua præcessit evacuatio, esse posse. *Narcotica*, nec viribus fractis, nec in causa frigida locum habere. *Compositorum* quàm simplicium tutiorem usum esse. Securius eadem per alvum infundi,

N n 2

quàm

quàm ore fumi. *Appropriatorum* nunquam obliviscendum, ut sunt *intestina lupi* exsiccata & pulverizata, *testiculi equorum*, *pulvis Quercetani* ex Tunicæ interioris ventriculi gallinæ & stercoris albi ejusdem ana unc. f. pulveris pelliculæ interioris, quæ in putaminibus ovorum reperitur, dr. ii. f. *Herniariæ*, *Cinnamomi* ana scr. iv. *Nucleor. mespilor.* dr. ii. *femin.* Anisi, fœniculi ana dr. j. Compositus, dosi à dr. f. ad. j. ad summum cum vino albo, &c. Ad *præservationem* præscribit Crato, 1. *Clysterem* ex decocti veronicæ in juscul. gallin. lb. j, addendo vini Malvatici lb. f. Myrrhæ. dr. f. confectum. 2. *Extra;* oleum Myrrhæ. 3. Post cœnam tribus horis *sc. j. Zedoariæ* incisæ. 4. Singulis mensibus manè ante cibum *Theriaca* scr. j. Vide plura in Practicis.

Differentia vel à parte ipsa, vel à causis sumuntur.

I. Alia est *Totius intestini*, in qua dolor est circa utrumque ilium, & infra ventriculi propè umbilicum regionem, quæ etiam est periculosa. Alia *Partis*, in qua, si *Principium* urgetur, dolor in ilio dextro affligit: si *Medium*, in sinistro se ostendit: si *Finis*, umbilici regio à sinistro proxima dolet. minus periculi propter clysterum accessum oritur. sed nota, interdum ilium, cum dolore supra umbilicum in hypochondriis affici.

II. Alia est à *Morbis*, ut 1. *Vermibus*, quorum signa & Curationem vide suo loco. 2. *Inflammatione intestinatorum*, quæ superius descripta est, & esculentis ac potulentis calidioribus irritatur. 3. *Calculis*: de quorum cura alibi.

Alia ab *Humoribus*, 1. *Crassis & viscidis*, inter intestinorum tunicas hærentibus, quæ ex eo *Cognoscitur*, quod dolor pali infixi speciem, ob tunicarum violentam eo loci distensionem exhibeat, nec ructibus vel flatibus emissis demulceatur, & ipsum intestinum,

num, quod à pituita vitrea fit, corrodat. *Oriuntur* imprimis in illis qui crapulæ & otio dediti sunt, & in quibus bilis, expultricis stimulus ad ea loca non defluit. In *Curatione* nota, 1. *Clysteres* fortiores, à principio injectos & iteratos, quod materiam agitent, sed non educant, nocere magis quam prodesse. 2. Non utendum in attenuazione insigniter calidis, ne materiâ subito resolutâ, flatus multiplicantur. 3. Ad attenuandum & discutiendum valere *Oleum Zedoariæ* à gutt. iii. ad scr. j. sæpius exhibitum, *marrubium album*, *decoctum veronica*, oleum *Corticum aurantium* ad gutt. iv. cum vino exhibitum. 4. Si dolor perseveret, ad sicca fomenta transeundum, quibus id quod liquatum & attenuatum erat, exsicceatur & discutiatur. 5. Ab *Agarico* ob metum vomitionis, quæ tum minimè tuta, abstinendum. 6. Ubi mitiora purgantia prodesse nolunt, *Essentia trochiscor. alhandal*, cum vino malvatico destillato extracta, & *Spiritus vite aureus* Rulandi ab unc. f. ad unc. j. f. ad summum, exhibenda. 7. Ab *Opiatis* in totum desistendum. II. *Acribus & biliosis*, in tunicis & vasis hærentibus, qui *Cognoscuntur* ex dolore acuto, siti, oris amaritudine, vigiliis. licet à primo clystere fæces ejiciuntur, postea tamen nihil ferè evacuatur, sæpè conjunguntur febres tertianæ, duplices, nothæ. In *Curatione* nota, 1. Colicam ab istis causis diurnam esse, & multis recidivis ægrum affligere solere. 2. *Humores* istis ad articulos misos arthritidem, ad dorsum, dorsi dolores, ad nervos, paralyfin excitare. 4. *Extracto Rhabarbari*, vel *hierâ picra*, cum refrigerantibus, ne caliditate officiant, mistis, optimè deturbari. 5. Si dolores post evacuationem durarint, *malvaticum* cum oleo amygdalorum dulcium bene exhiberi. 6. Lac calidum in clysteribus etiam dari cum melle mercurialis posse.

posse. 7. In Diæta, *cucurbitæ fructus*, naturali quadam proprietate, ei adversari.

III. Alia est à *Facibus duris & retentis*, de quibus superius; & in quibus, in principio ab omnibus purgantibus per superiora exhibitis, ne excrementa moveant, abstinendum.

Alia à *Flatibus in cavitate contentis*, exitu carentibus, qui *Cognoscuntur* ex ventris tensione, rugitu, murmure, quæ in flexu sinistri lateris se produnt. *Oriuntur* imprimis à cibis fermentationem humorum producere aptis; quales sunt, fructus fugaces, uvæ, mustum, cerevisia recens vel sacculenta, &c. In *Curatione* observa: 1. Curam à clysteribus Anodynis & emollientibus inchoandam esse. 2. Si hi nil proficiunt, laxans aliquod ex Manna, oleo amygdal. dulcium, & aliis in juscule pingui exhibendum. 3. Hinc, discutientibus utendum. Laudantur intra, *Clyster* ex vini Malvatici & ol. Nucum ana unc. iii. Aquæ vitæ unc. j. ol. Junip. & Rutæ destill. ana dr. ii. compositus, & calidissimè applicatus. Mixtura ex *spiritu vini & spir. nitri* ana dr. f. vel scr. ii. in aqua communi tepidè exhibitæ. *Tincturæ cortic. aurantior.* cum spiritu vini extractæ, cochlear unum. *Sperma ceti* cum ol. amygdal. dulcium. *Extra Gummi tamacahaca & caranæ* umbilico impositum, Balsamus *Antapoplecticus*, cum gr. j. vel altero *Zibethi*, &c.

I V. Alia est *Exquisita*, de qua hætenus dictum.

Alia *Notha*, cujus causa vel in peritonæo, vel in membranis, quæ abdomini ventrisque partibus obtenduntur, hæret. *Cognoscitur* exinde, quod dolor sit gravissimus, & admodum diurnus, ac neque clysteribus, nec medicamentis, neque fomentis; neque iis remediis, quibus, qui verè sunt colici dolores, deliniuntur, deliniri possit: & quod diurnis febribus, aliisque biliosis morbis, quorum est difficilis

lis solutio, succedat. Natura quippe, crisin noxiæque humoris depulsionem, in alvum molita, quum nusquam evacuandi viam promptam & expeditam nanciscitur, illum è venis & visceribus in membranas sæpe avertit, ubi dolores exsurgunt priore morbo graviores. Observatum à *Fernelio*, & continuas & tertianas, sæpius quartanas febres hisce doloribus finiri, qui diu circuitu certo exacuebantur, paremque accessionum ordinem retinebant. Vide de ea *Matthæum Martini* in De morbis Mesenterii.

V. Alia est *quæ ad paresin tendit*, quam Palmarius *Syrupo* ex vini albi unc. vi. Aquæ Rosar. unc. ii. pulver. Alarhazi, seu Antim. præp. dr. j. Cinnamon electi dr. j. f. per noctem infusus, & per inclinationem colatis, additis sacchari unc. viii. composito, dosi ab unc. f. ad j. post haustum juris pulli, tollere solebat.

ARTICULUS III.

De Alvi retentione.

Alvi retentio est *facum* vel nulla, vel pro ratione assumptorum admodum parva dejectio.

Signis opus non est. *Causa* in Differentiis exponitur. Curatio non est negligenda. Inde enim vapore caput tentatur, universum corpus ingravescit, ventriculi concoctio impeditur, & appetitus dejicitur, lumbi imbecilles (gravatis scil. renibus, excitatoque in eis præternaturali calore) redduntur. *Movetur* interdum alvus sternutatione & tussi; interdum, si æger nudis pedibus humi obambulet, &c.

Differentia à facibus & intestinis sumitur.

I. Alia est *Vitio facum*, quæ vel non sunt, propter inedia & ciborum euchymorum usum. Vel non stimulant, seu propter minorem quantitatem: seu propter bilis, quæ vel ad alias partes, ut in iustero, delata est; vel ex cibis frigidioribus non gignitur.

carentiam. Vel *Dura sunt*, seu propter inediam & calidum corporis habitum; seu propter diutnam cohibitionem, quâ fit, ut continenter siccescant, & mesenterii venæ aliquid succi exfugant; seu propter cibum crassiorum, viscidiorum, adstringentem, primâ mensa sumtum, non dilutum, majore hepatis & renum calore: & tum Partium istarum ratio habenda est. Emollientibus agendum. Probatur *linimentum Solenandri*, quod ex ol. amygdal. dulc. recent. pinguedin. anserin. butyri majal. ungu. dialtheæ ana dr. ii. Colocynthid. gr. xvj. salis scr. j. f. specier. hieræ simpl. scr. j. Diagridii gr. iv. componitur, si eo umbilicus inungatur.

II. Alia *vitiò intestinorum*, quæ, vel non sentiunt, seu ob diuturniorem assuetudinem, seu stuporem; qualem insigunt veteris, paralytis, apoplexia; seu pituitæ tunicis adhæsiōnem. de qua in colica. Vel non dimittunt, seu ob viarum angustiam, ab intestinor. obstructione, de qua superius: vel mesenterii aut viscerum intestina prementium tumore; seu musculorum abdominis vitiis; seu retentricis ex moderata siccitate robore.

ARTICULUS IV.

De Alvi fluxu.

PUNCTUM I.

De Lienteria, & Cœliaca.

Alvi fluxus sunt, Lienteria, Cœliaca, Diarrhœa, Dysenteria, & Epaticus fluxus. Lienteria est nimis celer, alimentorum ea forma qua assumpta sunt, per alvum excretio, vitiò retentricis & expultricis ventriculi & intestinorum proveniens.

Signa sunt evidentiâ, sive consistentiam, sive colorem,

lorem, odorem, & cæteras assumptorum qualitates spectes.

Causam in definitione in Retentricis & expultricis vitia conjecimus: de quibus inferius in Differentiis.

Curatio est festinanda, quia hoc symptoma à magna caloris nativi prostratione, & toni ventriculi debilitatione provenit. Difficilis est, si acutis & chronicis morbis supervenit, quia vires sunt dejectæ. *Respicit* I. *Causam*, quæ auferenda. II. *Symptoma*, quod sistendum per adstringentia & ventriculorum ac intestina roborantia.

Differentia à Causis sumitur.

Alia est *vitiò Retentricis*, quam lædunt I. *Refrigeratio intestinorum*, quam infert I. *Immoderatus frigida potus*, præsertim cum corpus æstuat, aër astrinuit nimis humidus, intense frigidus in raræ texturæ corporibus præsertim, &c. 2. *Intemperies frigida*, quæ à pituita seu ibidem genita, seu aliunde missa, oritur, rugas intestinorum obducendo, eadem lubrica & laxa reddit, calorem obtundit, & venarum mēfaraicarum oscula obrurat. In hac plerumque Cœliaca præcessit. diuturnæ, ructus acidus, qui prius non fuit, superveniens, bonum signum est. *Curatio* exigit materiæ seu per vomitum, seu per alvum deturbationem, cui *Myrobal. Chebula, Citrin. Tamarindi, Rhabarb.* inserviunt. Eiusdem per ol. *maslichin. destill. absinth. mentham*, &c. cohibitionem. Ventriculi roborationem. Diætæ usum, in qua vinum locum habet. III. *Laxitas*, ab oleosorum pinguium & emollientium diuturno usu. unde mollificatio nimia pylori; quo pertinet & resolutio nervi sextæ paris villos interioris tunicæ constringentis. IIII. *Aliena qualitas* inusta, & quidem vel à perversa cœli constitutione, quod fit in populari lienteria: vel fungorum, melonum, cucumerum, &c. intempestivo esu. IV. *Cicatrix densa & lævis*, qua

qualis magnæ Dysenteriae & ulcerationi profundæ succedere solet, quæ densitate sua obturatis mesaraicis distributionem, laxitate retentionem præpedit. Hæc acrium rerum comestione, attenuantibus & abstergentibus validis, *sinapi, capis, alliis, melle rosæ, oxymel, scillitico*, admixtus parùm adstringentibus, veluti defricanda & abstergenda est.

Alia *vitio Expultricis*, quæ irritatur 1. Ab *ulcerosa dispositione* superficiiei intestinorum & ventriculi, aphtharum instar insidente. *Cognoscitur* exinde, quod coeliaca non præcessit, sensus morfus & dolor ventriculo inest. In *Curatione*, si *ventriculus* peccat, vomitoria vitentur, alvus lenientibus cum adstrictione quadam laxetur. pingua vitentur. Si *intestina* sunt affecta, vomitus prodest. 2 Ab *humoribus* acris, sive ibi genitis, sive aliunde, ex jecore præsertim allapsis. *Cognoscitur*, ut superior dispositio. *Curatio* est *ardua*, si est diuturna, quia in dysenteriam transit. si sit cum difficili spiritu & lateris punctura, & humor ex cerebro sit delapsus, ita ut pars ejus in thoracem decubuerit, quia in tabem definit. si longa cum torminibus, lumbricis & doloribus, quia iis solutis comitem habet intumescentiam. Acredo demulcetur decocto hordei, cichoraceis & aliis refrigerantibus. Si diu perseveret Rhabarbarum in aqua rosarum præparatum, efficax est. 3. A *veno hausto*, & tum Alexipharmaca sunt admiscenda. Commendatur *succus dictamni* cum syrupo granatorum.

II. *Coeliaca* est *celer esculentorum & potulentorum ex ventriculo ad intestina transitus*, quo illa chyli aut cremoris specie profluunt.

Signa sunt evidentiæ. Transitus ille sex vel octo horas post cibum fit, ita ut tenuiores quidem & subtiliores alimenti partes alterentur & concoquantur, & sic corpori in alimentum cedant; corpus tamen, quia

quia non sufficienter nutritur, contabescat. pulsus est frequens, & calor tanquam febris affligeret, dejecturis, leviculæ animi defectiones obrepunt. ante eruptionem abdomen distenditur, venterque prominet.

Causa ipsius præcipuè est, *mala chyli distributio*, quam peperit, vel *Mesenterii, lienis, hepatis* obstructio, & tum chylus excernitur albus, obstructions sunt aperiendæ. Vel *trahentis in epate facultatis imbecillitas*: & tum chylus colore subrufo nonnihil tinctus est. hepar est roborandum. Vel *alimentorum fugacium & potus immoderata copia*. Hinc enim multa illuvies successu temporis congeritur, aucta in illis partibus corrumpitur. copia vel qualitate expultricem stimulat.

Curatio causas respicit, ut diximus, vacuato humore omni supervacuuo, profluvium sponte conquiescit, interdum eodem quo cœperat die, interdum postero.

PUNCTUM II.

De Diarrhoea.

Diarrhoea est immoderata, frequens, ac diuturna alvi defectio, qua humores excrementitii & sinceriores, quantitate vel qualitate expultricem ventriculi & intestinorum stimulant, sine phlegmone, lienteria, exulceratione, tenesmo, aut vehementi doloris sensu, profluunt.

Signa non est quod tangam: sunt enim in definitione exposita.

Causa est omne id, quod expultricem ventriculi & intestinorum vim, præter naturam irritat ac intendit; retertricem contrâ debilitat ac destruit, sive id per se, sive per consensum fiat.

Curatio est difficilis, si muliere prægnanti accidat,

dat, quia alimentum foetui subtrahit, ligamenta per concussum laxat, & tetrorum vaporum elevatione, abortum infert. *Facilior*, si vomitus superveniat, quia materia ab inferioribus ad superiora revellitur. si post ophthalmiam accidat, quia materia à superioribus ad inferiora revellitur. si Leucophlegmatia de-
tento, etiam si sit fortis, supervenerit, morbi initio, integris viribus ac salvis visceribus, quia materiae morbum facientis à toto habitu, per alvum fit evacuatio. *Non statim tentanda*, si qualia oportet purgantur, si confert & facile ferunt, si febris abest. Sæpe enim uno die vel pluribus fluere alvum, pro valetudine est, si intra septimum diem id conquiescat. si præsumitur ex conditionibus esse critica. *Peragitur*, I. *Materia ipsius evacuatione*, per Rhabarbar. in substantia, Mechoacannam, Tamarindos, Myrobalanos, & Syrupum rosar. solutivum. II. *Revulsione*, quæ per venæsectionem, vomitum, frictions, ligaturas, urinas, sudores perficitur. III. *Adstringentium uso*, ex quibus, si simplicia spectentur, præcipua sunt, Radices Tormentillæ, plantaginis, caryophyllata, prunorum sylvestrium. Folia plantaginis, lysimachia, bursæ pastoris. Semina portulacæ, nasturtii tosti. flores Rosarum, balaustia. Ligna, santalum rubrum. Aromata, Nux moschata. Mineralia, Terra sigillata, Bolus Armenus, Crysellus, &c. Si composita, sunt, Tragæa granor. ætes Quercetani Pharmacop. c. 21. Ossa hominis calcinata, Terra dulcis virrioli, Crocus Martis, Cornu cervi ustum, Theriaca recens, conserva rosarum antiqua, Diafcordium Fracasiorii, Sperniola compositum, & si fluxus sit nimis vehemens, Philonium Romanum, & Laudanum opiatum. IV. *Dieta*, in qua locum habet, aqua chalybeata. Emulsio amygdal. dulcium in aqua tormentillæ, vel decocto foliorum quercus, pulvis diatragac. in ovis sorbilibus, &c.

Dis-

Differentia Diarrhoea sunt variae.

I. Alia est *ab Externis*, ut medicamentis purgantibus, hypercatharsin causantibus; quæ sistitur *radice filipendulæ* in vino exhibita, lacte chalybeato per clysterem infuso, *laudano opiato*: *venenis*, cui alexipharmacum opponendum, smaragdi inprimis præpar. grana aliquot, in aqua conveniente. Alia *ab Internis*: de quibus infra.

II. Alia est *à Toto*, quæ est *vel* cum febre, *vel* sine febre, ut sequente differentia dicitur. Alia *à parte aliqua*, quam Differentiâ quintâ vide.

III. Alia est *cum febre*, materiâ fluxum excitante, à toto transmissâ, quæ *cognoscitur* ex eo, quod cruda admodum humida & aquosa, vel frequenter & paulatim, vel multum & confertim cum stridore ejiciantur, & febris signa adsint. *Curatur difficilior*, si in morbo diuturno cum cibi fastidio, sincera, id est, quæ nullam humiditatem aquosam permixtam habent, deiciantur, quia exustionem humiditatis nativæ à calore debili indicant. si cum stridore crebro, & nimium excernatur, quia ille crudam vitiosorum humorem defectionem indicat; istud, quia frequent desidendi labor insomnium facit; hoc quia periculum defectionis imminet: si crassa, alba, viridia, crocea, spumantia deponuntur, quia cruditates, impeditum fluxum, bilis flavæ in intestinis copiam, spiritus flatulenti cum humore commixtionem demonstrant. Nullo interdum modo, si dejecto sit nigra, pinguis, livida, æruginosa & foetida. *Curatio* iisdem administratur, ut supra habita febris ratione. *Dividitur* dupliciter. I. Vel est *Critica*, quæ sinenda & promovenda, vel *Symptomatica tempore*, quam natura à materiæ copia vel qualitate stimulata, ante coctionem, sed cum virtutis robore instituit; quæ nec sistenda nec promovenda, nec interdum naturæ relinquenda,

da, sed materia evacuanda, revellenda, alteranda. Vel *Symptomatica* plavæ, quæ à caula morbifica irritata, illaque quasi invita fit, cui per superiùs enumerata remedia occurrendum. II. Vel est *Colliquativa*, vel *Non*: de quibus vide sequentem Differentiam.

Alia est *sine febre*, quæ *Cognoscitur* ex eo, quod humor rarò sub propria forma: sed mutatus excernatur; & quod nimia cibor. corruptorum ingestione, vel aliis causis proficisci, nullis signis indicetur; partibus alicujus singularis affectu nulla signa adsint. Fit aliquando, quando serosi humores leucophlegmatice causa, per alvum excernuntur; vel quando hominibus sanis, quibus serum in venis plurimum redundat, frigus autumnì nocturnum aut matutinum, altius in corpus penetrans, à vasis exterioribus, serosos humores versus interiora, & in majores venæ cavæ meatus repellit; qui tandem ad viscera delati, & ad mesenterii ramos repentes, in intestinorum cavitatem confluunt. De Curatione nota: Medicamenta rectius in solida forma exhiberi. Vomitoriis oleum immiscendum non esse. Incrassantibus & abstergentibus simul agendum. serositatem per sudores optime dissipelli.

IV. Alia est *Colliquativa*, quæ aliàs fluxus colliquativus vocatur: quæ *Cognoscitur* ex eo, quod excrementa sint plerumque vario colore prædita, plerumque foetida, aliquando pingua & viscosa; quod adsit febris vel ardens, vel maligna, vel hæctica, corpus statim præter modum extenuetur, &c. Accidit in febribus ardentibus, hæctica, phthisi, inflammationibus, in quib. à calore ingenti non solum humores in venis, sed & proximum partium alimentum colliquatur; & si tenuius est, dissipatur; si crassius, ad ventrem confluit. *Curatio* est ut plurimum frustranea, in hæcticis præsertim, & phthisicis, quibus

bus capilli defluunt. Refrigerantibus, humectantibus, & nonnihil adstringentibus agendum: quæ non tam extra quàm intra adhibenda, ne caloris præter naturam effluxus impediatur.

Alia *Non colliquata*: de qua in tertiâ Differentiâ.

V. Alia est *ab Intestinis*, quando materia Diarrhoeam ferens in iis existit, & tum in Causa sunt I. *Vermes* interdum, quorum signa præstò erunt, & suis medicamentis pellentur. 3. *Venarum mesaricarum*, ut chylum non attrahant, qui ibidem collectus, intestina copiâ suâ stimulat, obstruunt; & tum chylus albus excernitur. atrophiam, si fluxus diu duret, consequitur. Aperientibus maximè agendum est, & quidem eis, quæ simul epati sunt utilia, nec alvum irritant.

Alia à Cerebro, quod pituitam inspidam vel salisam in intestina, noctu inprimis, ægro supino dormiente, mittit, quæ vel lubricam ventriculi & intestinorum tunicam facit, vel cibis commixta concoctionem labefactat. *Cognoscitur* ex eo, quod signa infirmitatis cerebri adsint, & balbis maximè, propter humiditatem, familiaris sit. In Curatione vitandi gargarismi & masticatoria, ne materia Catarrhi in stomachum trahatur. *Vesicatoria* ad primam & secundam cervicis vertebraam poni possunt.

Alia à Ventriculo, quæ *Cognoscitur* ex signis affectu ventriculi. Oritur, vel à cibis corruptis, seu perferat, quia natura valdè irritatur, reliqui in corpore humores concitantur, mala dispositio ventriculo inducitur. Diarrhoea periculosa est: seu propter assumendi modum, & tum minus est periculi. Vel ab humoribus, ob vitiatam concoctionem excrementitiis ibidem collectis, qui interdum etiam aliunde mittuntur, ab hepate propter malitiam non attrahuntur, & expultricem ad excernendum stimulant.

Curatio nihil singulare habet.

Alia

Alia *ab Epate*, quod vel *obstruitur*, aut in *suma* parte, ubi de obstruentibus agendum; aut in *gibba*, & tum Diuretica profunt. Vel *bile nimis abundat*, & tum intemperati epatis signa aderunt. In *Curatione*, laudatur ratione adstrictionis, *Casus antiquus*, comminutus, aqua aliqua refrigerante & adstringente ablutus, & in sartagine tostus. Diuretica ne sint acria.

Alia à *Liene*, qui humorem melancholicum collectum, vel aliunde acceptum deponit, ita ut dejectio, picis instar interdum nigra sit, propter sanguinem ex aperto in hypochondriis vase in intestina effuso, ibique in nigredinem exusto; & tum Lienis affecti signa adfunt. Sanguis extra vasa elapsus & concretus, si sistatur lipothymiam & alia gravia mala infert. Scorbuticum malum interdum concurrit. Ne humor mordax intestina exulceret, clysteres detergentes & temperantes sæpe injici debent.

Alia *ab Vtero*, quando humores & menses detenti ad epar deducuntur, inde ad intestina. Tum periodi interdum servantur. Ratio mensium in Curatione habenda est.

PUNCTUM III.

De Dysenteria.

Dysenteria est alvi frequens cruenta, & purulenta, cum dolore ventris, & intestinorum exulceratione, à materia acri, erodente, & peculiariter intestinis infesta, dejectio.

Nomen Dysenteriae etiam Diarrhoeae tribuitur, in qua humores qui excernuntur tormina inferunt, licet exulceratio absit: & cum hac, si sanguis interdum excernitur, fit id à reseratione vasorum potius, quam intestinorum exulceratione.

Si

Signa sunt, frequens alvi dejectio, quia intestina ab humoris acrimonia stimulantur; interdum continua, si materia suppeditatur, interdum periodicè de tertio in tertium rediens. Dolor ventris ac tormina praesertim excernendi tempore, & paulò ante excarnationem. quae excernuntur, sunt modo biliosa & varia, modò mucosa & cruenta, modò toto genere à naturali excrementorum genere aliena. Febris Interdum statim in principio, interdum ubi per aliquot dies affectio duravit, propter inquietudinem & putredinem oboritur. Differentiam à fluxu hepatico, vide in hujus capite. Ab abscessu, ad cujus eruptionem eliquationes quasi puris consequuntur, differt, quod in isto dolor pulsatilis juxta affectum locum praecedat, neque morsus neque decursus adsint, &c.

Causa sunt humores acres intestina erodentes, iisdem peculiariter infesti, & nescio quid antimoniale, helleborinum, vel aliquid pulmoni marino, pulmoni, & cantharidibus vesicae infestis, simile continentes. Hi per contagium dysentericum infecti, in venas & arterias penetrantes, fermentationem efficiunt, & similem sibi dispositionem, per *placenta*, toti massae sanguineae imprimunt, ac eandem cum aliis humoribus more purgantium concitant: pravam quoque dispositionem intestinis affigunt, ita ut chylus praeterfluens, in humorem vitiosum mutetur, nec faeces alvi naturalem elaborationem & qualitatem recipiant. Interdum occultis astrorum influentiis, in corporibus humanis tales redduntur. Hinc pueri lactentes, qui in aërem liberum nunquam venerunt, & lacte materno tantum alebantur, dysenteria interdum afficiuntur. Dant autem iis ortum, Aqua per plumbeos & veteres canales derivata. Aër vernus post hyemem siccam & aquiloniam pluviosus & australis, tum propter prohibitam

O o

hu-

humorum exsiccationem; tum propter vim putrescentem in humido validam: Calidus & siccus, inde initio autumnii & fine æstatis morbus excitatur, & in calidissimis regionibus potissimum viget. *Cibi* pravi & insoliti. hinc in *Ægypto* & *India*, quia carnibus animalium, quæ cassia fistulari nutriuntur, vescuntur, frequens. *Fructus* autumnales, tum quod facile putrescant, tum quod eos qui putrescunt, adstrictione retineant. *Uvarum* & multi usus, quod fermentationem faciant, & à rubigine, carbunculo, nebulis, facillimè afficiantur.

Curatio est difficilis, in mulieribus, propter molitiam & virium defectionem: in pueris, propter humidiora, & ideo putredini obnoxia intestina; in senibus, propter magnitudinem causæ, id est, humorum acrimoniam in corpore indispósito, & virium defectionem. *Dubia spei*, si defectiones sint sinceræ, id est, nulla aquosa humiditate permixtæ. si ei effusio puri sanguinis adveniat, venas enim majores erosas indicat. si cibi fastidium cum febre affligat, quia ventriculo in consensum tracto, concoctio labefactatur, & ulcerosa aliqua in intestinis putredo adest. si vomitus biliosus initio oboritur, quia magnavis bilis æstuantis indicatur, quæ ventrem superiorem & inferiorem turbat. si defectio sit continua, vel ea cessante novus fluxus dilutus, cruentus, instar hepatici, aut foeda *Diarrhoea* subsequatur. si cum febre, aut variis alvi defectionibus aut epatis inflammatione, &c. invadat. si mulieri gravidæ accadat, nec post secundinæ & foetus exclusionem remittat. *Alicujus*, si excrementa mutantur, nisi mutantur in prava. si ructus vel crepitus ventris superveniat, quia naturam coctionem incipere indicio est. si lienosis superveniat, quia humores melancholici transponuntur, ubi bene sanguis melancholicus, in intestinis concretus, ab atra bile distinguendus est. si maniam excipiat,

piat, quia materiam à capite ad inferiora transferri indicio est. *Nullius ferè*, si sua sponte, nulla præcedente febris, neque concoctione bona apparente, atra bilis excernitur, quia nihil à cancro exulcerato differt. si convulsiones & deliria ei superveniant. quia materiam ad caput ut genus nervosum ferri, indicant. si carunculae deiciantur, quia nec substantia intestinorum regni, nec cicatrix tam magnæ exulcerationi obduci potest. si quis ex aliquo morbo acuto relevatus, ea corripiatur, quia vires sustinere non possunt. si in progressu morbi singultus superveniat. si pistula nigra, similis orobo, post aurem sinistra, cum siti magna, appareat: quia mortem in vigesimo futuram significat.

Peragitur Curatio, I. *Humorum* ad intestina ruentium *revulsione* & *derivatione*, ubi locum habet *venæ sectio*, si sanguinis adsit copia. si vehementer cum humoribus ad intestina ruat. si vel sit, vel metuatur, inflammatio. si febris continuo affligat. si calidum epar materiam suppeditet. *Nota tamen*, paulatim esse evacuandum, tempestivè & intra primos dies, ne vires deiciantur. medianam vel epaticam angusto foramine secandam: malleoli, si evacuatio solita subsistat tundendam. II. *Humorum erodentium evacuatione*, ita ut ferociora, quia humores ad intestina movent, vitentur. purgatio ab initio, antequam major exulceratio sequatur, fiat; & ut humor tollatur, sæpissimè. Laudantur, syrupus *rosarum ex infusione rosarum pallidarum* paratus, *Myrobolani*, *Tamarindi*, *Rhabarbarum* in infuso, sine tostione primò, mox tostum, si paulò adstringendum. *Mechoacanna*, cujus usu frequentiore alvus siccatur. Decoctum *Myrobalanorum*, quod apud Sennertum vide. III. *Humorum eorundem abstersione*, per clysteres, ex hordeo, vitellis ovi, melle rosato, saccharo, & aliis, prout exulceratio major est vel

vel minor, factos. IV. *Doloris mitigatione*, cui interserviunt, *Lac vaccinum*, modò corpus sit purgatum, & febre præsentem, cum aqua plantaginis misceatur, vel cum silicibus decoquatur, cum vitellis & mucilagine, seminum cydonior. per clysterem injectum. *Thapsus barbatus*, sævum hircinum eidem inditum, clyster ex capite *vervecino*, apud Sennertum descriptus. V. *Fluxus adstrictione*, per medicamenta in Diarrhoea relata, quibus adde *forba* cruda, si fluxus est desperatissimus, *Nucem moschatam* in cineribus tostam, si febris abest, *Decoctum argilla furnaria* in lacte chalybeato, *Theriaca recentem*, si inflammatio non accessit, Pulvisculum *stercoris canini* per triduum ossibus nutriti, cum lacte caprillo haustum. *Laudanum opiatum*. Ista verò ita adhiberi debent, ut modò calida, modò frigida dentur. Refrigerantibus calida concoctionem juvantia misceantur. Omnia in parva quantitate, ne fluxus subito sistatur; sæpius, quia diu in intestinis non hærent, exhibeantur. VI. *Mundificantium*, *ulcus cavum implentium*, &c. usu, in quibus observa, cum detergentium usu dolor exasperetur, reddito clystere, alium ex lacte injiciendum esse. VII. *Topicorum applicatione*, de quibus notandum. Adstringentia in macilentis potius, quam obesitis valere, cum in his penetrare non possint. Nec facultate nec actu admodum frigida eligenda. Accurum vel vinum album tenue iis admiscendum. Cataplasmata in Dysenteria à bilis acredine non valere, cum mordacitatem relinquunt. VIII. *Diaeta*, in qua locum habet, panis bis tostus, lac amygdal. dulcium, sacchari farina, &c.

Differentia Dysenteria sunt variae.

I. Alia est *Fiens*, quando exulceratio in superficie tantum intestinum incipit, & mucosum quid ex quo admodum cruore perfusum ejicitur. *Mucosa*

eus iste, vel est pinguedo intestinum abrasa; vel mucus, quo intestina ad faciliorem excrementorum transitum oblinuntur: vel denique pus ex sanguine & humoribus ad intestina affluentibus, & ibi ab iisdem *φλεγμονώδη διήσει* patientibus, temperie everfa, ortum.

Alia est *facta*, quando erosio altius penetrat, & vel fibræ pelliculæque interioris tunicæ cum sanguine exeunt: vel frustula substantiæ carnosæ de propria intestinum substantia decisæ, cum ramentis membranosis, crureque plurimo, ac purulenta excernuntur, quæ extremus malignitatis gradus est.

II. Alia est *Intestinorum tenuium*, in qua dolor propter ipsarum membranositatem acutissimus, alvi longior post tormina excretio, Cruor cum stercore exquisitè propter longiorem viam miscetur, sanguis magis nigrescit. Medicamenta purgantia per os sunt exhibenda. Incurabilis ferè est.

Alia *Crassorum*, in qua dolor est minor, propter ipsor. carnositatem; præcipuè circa umbilicum percipitur, propter situm. alvi post tormina cita fit excretio. Cruor & purulenta materia alvi excrementis supernatant. *Nota*, plerumque intestina crassa attingi. attractis medicamenta oprimè per clysteres exhiberi. interdum ventriculum & partes vicinas in consensum trahi. interdum ventrem è regione ulceris & foraminis ob communicatam illi putrefactionem perforari.

III. Alia est *ab Externis*, nempe aut *venenis*, cujus curatio peragitur vomitu. Obtundentibus dum vellicant, ut lacte, *Oryza jusculis* pinguibus. Antidotis, præcipuè *Smaragdo præpar.* ad gr. vi. sed per decem horas à cibo abstinendum & sudandum. Aut *Pharmacis purgantibus* vehementioribus; & tum, si Curationem spectes, prodest

post abstergentia Lactis tepidi potus , Theriaca recens, &c.

Alia *ab Internis*, de quibus inferius.

IV. Alia est *Epidemia & maligna*, in qua Alexipharmacis agendum, inter quæ C. C. Terra sigillata, *Corallia*, *Sapphirus*, *Scordium*, *pulvis Bezoardicus aureus*. purgantibus eadem misceantur.

Alia *simplex*, cui superiora applicentur.

V. Alia est à *Bile flava*, à qua plerumque incipit, quæque nunc in ventriculo, nunc in intestinis gignitur, nunc ex vesicula, venis mesaraicis, toto corpore ejicitur.

Alia à *Bile atra*, quæ si ratione *κρίσις* febrilium morborum excernatur, curari potest. nonnisi præmissa temperatione purgari, & quidem lenioribus debet.

Alia à *Bile prasina & arginosa*, quæ quamvis exurgente natura ejiciatur, tamen non statim.

Alia à *Pituita salsa*, quæ interdum in capite à calore majore, interdum in ventre producit: ad intestina delata, & lentore suo ipsis diutius inhaerens, ea exagitat, tandem exulcerat. Difficiliter curatur. *Agarico & Mecchoacanna* benè extirpatur.

PUNCTUM IV.

De Fluxu alvi sanguineo & Epatico.

I. **F**luxus alvi sanguineus *Cognoscitur*, tum ipso visu; tum ex eo, quod sine dolore & exulceratione excernatur. *Oritur* I. Ob *copiam*, profectam vel ab intemperie hepatis calida; & tum, plethoræ signa aderunt. excernitur sine dolore, & corporis extenuatione; urina est tenuis, subaurea; sitis urget, tam ob absorptionem humidæ substantiæ, quam ob epatis caliditatem. In *Curatione* victus imminuendus est. Epar per cichoracea & alia refrigerantia

rantia appropriata, lac chalybeatum, &c. corrigendum. si bilis admiscetur, evacuanda. *Vel* à membri alicujus præcisione, & tum, sanguis ordinariè mitti debet. *Vel* ab Evacuationis consuetæ suppressione; & tum frictionibus agendum, suppressio aperienda.

II. Ob *ruptam vel apertam venam*, quod *Cognoscitur* ex eo, quod vomitu etiam effundatur. aliquis vehemens casus præcesserit. lipothymia ob putredinem in ventriculo inducatur. Curatio est difficilis.

II. *Fluxus hepaticus*, est vel *Exquisitus*, qui ex eo *Cognoscitur*, quod id quod exit, ut lotura carnis animalis recens macerata dilute rubeat, non concresecat, frequentius effluat, non tamen tanta crebritate, ut in dysenteria; sine mordicatione, nec tamen sine dolore gravante; palpebræ inflentur, pedes tumescant, excrementa sint cruda. *Oritur* ab imbecillitate Epatis, & calidi innati in eo defectum, à causis dissipantibus vel suffocantibus. *Curatio* festinanda, quia morbus ad cachexiam, hydropem, & tabem ducit. *Difficilis* est, incipientis & in juvenibus. *Nulla* ferè, inveteratæ, & in senibus. sed & illis, quibus sputum cruentum, subpallidum, sive biliosum meracum, obvenit. Excludit purgantia, & solis medicamentis alterantibus, cibis mistis (commendantur epata gallinarum., testes pullor. anserum) perficitur. Vel *spurius*, in quo sanguis aut est acris, ob permissionem bilis: Aut crassus, ob diuturnam in hepate vel alibi moram: Aut Feculentus, ob epatis limositatem, quod lien partas sæculentas non attrahat.

TITULUS IV.

De Recti intestini affectibus.

CAPUT I.

De intestini recti morbis.

Intestini recti morbi sunt : *Inflammatio*, *Verruca*, *Rhagades* & *Fistula*.

I. *Inflammatio* fit vel à causis violentis, vel à medicamentis, & cauteriis corrodentibus. *Cognoscitur* ex dolore acri & lacinante, in una eademque sede defixo, desidendi cupiditate inani, & qua præ obstruentis tumoris magnitudine nihil minimumve deiecitur. *Curatio est difficilis*, tum quia pars acuto sensu prædita est, tum quia excrementa alvi, applicationem, impediunt : tum quia ob localitatem & humiditatem in ulcera morbus degenerat.

II. *Verrucæ* sunt aut *Condylomata*, seu tumores pelliculæ ani, tubercula nimirum dura & occallescentia, ex humore melancholico excrefcentia, rædio quam dolore molestiora. Aut *Thymi* seu verrucæ asperiores, angustam basin & latam superficiem habentes, quæ in eadem facili sanguinem fundunt, qui si multum excrecant, *Ficus* dicuntur; si sanguinem fundunt, pessimi sunt, si præsertim canerositas accedat. Aut *Cristæ* seu carnis excrefcentiæ ex præpostera Venere ortæ. *Tolluntur* vel *Cineribus stercoreis murium*, cum vino coctis & applicatis : vel *conchyliis oblongis* juxta flumina repertis, calcinatis, & eodem modo coctis & applicatis. Ne renascantur, *Cinere sarmentorum* vitis cum aceto illiniri debent.

III. *Rhagades* seu *Fissuræ* sunt oblonga ani sine tumore ulcuscula, eaque superficialia vel profunda : callosa,

callosa, vel callo carentia; humida & saniem fundentia, vel sicca & canerosa. *Oriuntur* 1. *A fecum duritie nimia*, quæ in exitu cutem rumpunt. 2. *Ab intemperie sicca*, acres humores, interdum & malignos conjunctos habente, ubi humectantia locum habent. 3. *Ab humorum acrium, erodentium, & lentorem* quandam, ob quam parti adhærent habentium *affluxu*, & tum pruritus & dolor acerrimus cum ardore infestat. Evacuantia lenia & humectantia esse debent. *Virulentiæ*, quæ se tetra odore & sanie prava prodit, ratio est habenda. Clyster ex *mucilag. tragac. semin. psylli ana unc. j. s. Butyri non saliti unc. iii. sacchari rub. unc. j. ol. violar. unc. v.* laudatur.

IV. *Fistulæ*, inflammationes, tumores & ulcera ani malè curata sequuntur. *Cognoscuntur* ex orificio angusto, sinu verò intus latente. Excernitur inde sanies aliquando aquosa, aliquando virulenta. *Dividuntur* in eas quæ *non penetrant*, seu in intestinum rectum, seu in vesicam, quod stylo immisso deprehenditur; quæ, si magnum incommodum non adferunt, decocto duntaxat agrimonie cum pauxillo aluminis, *mundanda* sunt : & foramen, si nimis angustum, medulla sambuci, ne sanies retineatur, dilatandum : quod, si *curari debent*, universalibus præmissis, eluendæ, dilatandæ, & incidendæ sunt. Et eas quæ *penetrant*, vel *ad intestinum rectum* : & tum per eas fæces alvi excernuntur, liquor immixtus per intestinum exit : vel *ad vesicam*; & tum urina per eas redditur. Vel *ad utrumque*, & tum crepitus è pudendo perinde ac podice emititur. Hæ omnes rarè curantur. Inter consolidantia laudat Ioël pulverem *Mercurii præcipitati* inspersum, emplastro communi imposito. *Auripigmentum* præparatum, vel in oleum redactum, inspersum, emplastro dicto superposito. Si fistula est *in sphinctere*,

tere, fæces alvi sponte prodeunt. Vide de illis Hippocratem.

V. Huc pertinet & *Intertrigo*, quæ est *partium ano vicinarum excoriatio ob motum vehementiorem exorta*. Curatur sævo cervino & hircino

CAPUT II.

De Recti intestini symptomatibus.

Recti intestini symptomata sunt: *Pruritus ani, Tenesmus, Hæmorrhoidum fluxus, & eorundem suppressio.*

ARTICULUS I.

De Pruritu & Tenesmo.

P *Pruritus ani est ejusdem dolorosa quedam titillatio.*

Signis opus non est. *Differentia* à causis sumuntur. I. Alius est ab *Humoribus acerbis, salsis & viscidis*, sphincteri adhærescentibus, qui evacuandi: potest verò decocto folior. malvæ, violar. rosarum, cum aqua plantaginis & pauco alumine eluendus. II. Alius à *facibus relictis*, quæ decocto verbasci benè abluuntur. III. Alius à *vermibus*: de quibus suo capite. IV. Alius ab *Ulcere*, ad quod curatio obvertenda.

II. *Tenesmus est assidua per alvum ejiciendi cupiditas, cum dolore, in qua vel nihil, vel pauca mucosa dejiuntur.*

Signa non est quod addam. prolabitur interdum intestinum rectum, & urinæ stillicidium vel difficultas, propter vicinitatem ac consensum harum partium accidit.

Causa est, quicquid intestini recti extremitati affigitur,

figitur, & ejus facultatem expultricem stimulare potest: quid autem illud sit, in Differentiis exponetur.

Curatio non est negligenda, quia ex neglecto ulcus sordidum sæpe relinquitur, quod interdum in fistulam transit. Respicit Causas & dolorem, qui mitigandus.

Differentia sumuntur à Causis.

I. A *nimia intestini recti refrigeratione*, qui decocto flor. verbasci chamæmeli, melil. anethi, cum semine lini, scœnogræci fursur. tollitur.

II. A *Calculo*, aut *Vermibus*: de quibus suo loco vide.

III. A *causa dysenteriam inferente*, & tum eadem ferè, quæ dysenteriae, curandi ratio. Clysteris quantitas sit parva, ulcus abluatur, & consolidetur. Valet *Mucilago semin. Cydonior. & psyllii*, cum aqua plantag. solani, liquida extracta, addito bolo Armeno, vel aloë lora, per clysterem injecta.

IV. Ab *humoribus biliosis, vel pituitosis & salsis*, eidem adhærentibus: ubi habet locum clyster ex jure carnis vervecinæ, cum ol. ceræ gutt. aliquot injectus, &c.

ARTICULUS II.

De Hæmorrhoidum fluxu, & suppressione.

Hæmorrhoidum fluxus est nimia sanguinis per venas hæmorrhoidales dejectio.

Signis hic affectus opus non habet. primò fluit sanguis niger, feculentus & crassus, & destillando quasi effluit, dum podicem tergun: dein bonus ac rutilus, tandem citrinus & pallidus. Inde crura labascunt, coxæ dolorem gravantem sentiunt, faciei color

color vitatur. Interdum periodos suas observat, interdum negligit.

Causa est, quicquid vel expultricem venarum & arteriarum, jecoris vel lienis irritat; vel retentricem earundem lædit.

Curatio suppressionem indicat, quæ *Revulsione* per venæsectionem, & *adstringentium* externo & interno usu perficitur. *Extra* à proprietate valent, *Cingulum ex foliis hellebori nigri* conquassatis, recentibus, nudo corpori circumdatum, ad quod si pustulæ excitentur, dolor suis remediis tollatur. *Spongia*, quæ in balneorum hypocaustis sub scamnis nascuntur, si in olla nova in pulverem comburantur, & inspergantur. *Colcothar*, sive crassamentum illud ab olei vitrioli destillatione relictum, si eo tangantur, unâ relictâ. *Intra* commendatur *Essentia Martis*: de qua apud Hartmannum. Confectio è *scoria ferri*. Conserva rosarum antiqua cum bolo armeno, &c.

Differentia à partibus & Causis sumuntur.

I. Alius est *Internarum*, quæ à ramo splenico oriuntur, per mesenterium circa colon & intestinum rectum extensa, in musculis ani & intestino inferiore, sociam arteriam habens, ipsa unica, terminatur. *Cognoscitur*, ex pondere circa sedem, egerendi difficultate, clysteribus, glandulis, aut instrumento; sed & si cucurbita, quod Zacutus fecit, applicetur.

Alius est *Externarum*, quæ à venæ cavæ ramo epigastrico procedunt, & in externas recti intestini partes ani scilicet musculos, disseminantur: duæ autem sunt, arteriam sociam ab hypogastrica habentes. Videntur tamen omnes inter se communionem habere. *Cognoscitur* ipso visu: & quia major est, periculosior etiam erit. In *Curatione* externa commodum locum habent.

II. Alius est *vitio sanguinis*, qui vel *multus*: & tum,

tum signa plethoræ adfunt. Revellendum per venæ cubiti sectionem; vel si vires non ferunt, cucurbitularum lumbis, vel hypochondriis affixionem. Vel *Acris & tenuis*, & tum magis meridionalibus accidit, maribus præsertim qui sanguinei. Serosi humores, si vires ferunt, evacuari debent. sin minus, refrigerantibus & increstantibus, inter quæ portulaca, trochisci de spodio & carabe, prævalent, utendum. Vel *fluit ex hepate*; & tum aquæ, in qua carnes recens mactatæ lotæ sunt, assimilatur. *Coraliorum syrupus* prodest. Vel ex *superioribus partibus*; & tum sanguis niger est & retorridus. Vel ex *Mesenterio*, & tum paucus, subalbidus & serosus. Vel ex *intestinis*, & tum cum excrementis commiscetur.

Alius *vitio venarum*, quæ vel *sunt aperta*, in quo casu utendum *ροδανθης*, ut fungo qui crepitus lupi dicitur, &c. Ustione & sectione, quæ tamen periculosa, in inveteratis præsertim ac diuturnis. Vel *Exesa & rupta*, & hæc dejectio hominem in hydropem & alios morbos conjicit.

II. *Hæmorrhoidum suppressio est sanguinis per venas ani elabi conantis interceptio, unde istæ in tumorem cum dolore elevantur.*

Signa sunt, Tumor & tubercula in capitulis venarum ani, modò dura & verrucis similia, modò mollia moralia dicta, modò purpurea & uvæ granis similia, dolor punctorius, modò mitior, modò gravior, distentis venis, quarum ora tanquam ex capitulis prominent, & membranâ, quæ venarum orificiis prætenditur, intensa & compressâ.

Causa est sanguis faculentus & crassus, elabicipiens.

Curatio est festinanda, tum quia hydropem, si sanguis ad epar recurrat, minatur, tum quia nisi tempestivè succurratur, ratione magnæ attractionis, & humorum affluxus, inflammationem, apostema vel fistu-

fistulam inducit. *Peragitur* I. *Doloris mitigatione*, qui sedatur mica panis hordeacei in lacte muliebri macerata, addito ovorum vitello & croco: tollitur, *laudano* in lacte muliebri dissoluto, & cum melle adhibito, sed maximè butyro, saccharo, seu anima Saturni, *scarabeis* pillularibus in oleo lini ad consumptionem animalculorum coctis, cineribus suberis exusti, cum axungia capi coctis, unguento ex linaria: de quo vide *Hartmannum*. II. *Aperitione*, præmissis universalibus, per hirudines applicatas; vel antequam id fiat, per unguentum ex medulla colocynthidis, & oleo amygdal. dulcium. per succum caprarum cum aloë mistum, & panno asperiori fricando appositum; Clysteres acres plus intestina lædunt, quàm hæmorrhoides cient. Nisi vehementer tumeant & doleant, naturæ debent permitti.

In Differentiis internarum & externarum venarum habenda est ratio. Illarum suppressio ani expressione, & specillo eidem immisso percipitur. Harum visui occurrit.

TITULUS V.

De Mesenterii affectibus.

CAPUT I.

De Mesenterii intemperie & Obstructione.

Mesenterii affectus sunt, *Intemperies*, *Obstructio*, *Inflammatio*, *Abscessus* & *Dolor*.

I. *Intemperies Mesenterii* plerumque est calida & sicca, quæ à materia simili oboritur, quæ vel ibidem colligitur, vel aliunde transmittitur. *Colligitur* vel in *venis* & *arteriis* ipsius: & tum, quia pectoris maximus est cum hæmorrhoidali arteria consensus, quod truncus ex quo arteria oritur, à corde descen-

dens, in primo statim exortu, intercostales ramos propaget, pectoris & diuturni quidem sentiuntur dolores: vel etiam *inglandulis*, laxitate sua materiam facilè imbibentibus. *Curatio* non est negligenda, quia hydropem siccum præcedere solet. Nihil autem singulare habet; hoc excepto, quod per illas arterias non solum primæ viæ, sed etiam universum corpus expurgari, sive cathartica exhibeas, sive clysteres infundas, possit. & hæc fortè causa est, quod medicamenta purgantia umbilico applicata alvum movent.

II. *Mesenterii obstructio* est duplex, Alia, quando *vena lactea sunt obstructa*: quod *Cognoscitur* ex eo, quod fluxus alvi chylosus & albus infestet, & atrophia, materiâ ad corpus nutriendum necessariâ denegatâ, insequatur; *Oritur* id, seu à chylo crasso, crudo, lento, viscido, ex similibus cibis genito; seu à glandularum tumore easdem comprimente. Alia, quando *vena mesaraica intercipiuntur*, quod *Cognoscitur* ex eo, quod materia coercita, distentionis & gravitatis sensum exciter, arteriarum circa dorsum pulsationes sint molestæ, à sumto cibo malum incredescat, & ventriculus comprimatur, &c. *Oritur* id vel à *vaporosis* & crassis flatibus; vel ab *humoribus acerbis*; & tum, dolor est vehementior, interdum, evaporatione perseverante, malum universam thoracis cavitatem occupat, ut aliquid suffocationi simile præsto sit; interdum tumor circa os ventriculi concitatur, ructusque inanes, suppressis iis, quæ per inferiora excluduntur, producuntur. *Curatio* peragitur I. *Aperientibus*, & illis quidem clementibus, robor Epati & ventriculo conciliantibus, penetrantibus, incidentibus, exsiccantibus, putredinem lenientibus, & paulisper stringentibus. non dulcibus, sed amaris, in electuariorum vel pillularum formam redactis, sed ut liquor post hauriatur.

Tarta-

Tartareis, nisi faldco vel acredo humor. obftet, *Oxy-mel*. redolentibus. II. *Purgantibus*, nisi flatulentia obfit, & illis lenibus, non continuis, *ὀμοιοτέτοις* per *Epicrasin* datis, liquidis. III. *Vomitoriis*, sed non violentis. laudatur *essentia genista* Plateri. IV. *Diureticis* crassos humores fundentibus, &c. Epar roborant, *pillula de scoria ferri Leonii*. *Antidotus ex chalybe Mercati*. Arcanum ex *vitriolo*, *sulfure*, & *salicibus Penoti*, &c.

CAPUT II.

De Mesenterii inflammatione, & Abscessibus.

Mesenterii inflammatio est ejusdem tumor, ab humoribus cum sanguine nutriende in spatia ipsius effusus, vel glandulis altius impactis, & calore externo accedente, putrescentibus, exortus.

Signa sunt, febris lenta, plerumque semitertiana, dolor lumborum, nunc in utraque parte, nunc in dextra, qui se ad anteriorem regionem ventris, supra & circa ventriculum extendit, alvus suppressa, egestiones chylosæ, quas ut plurimum ichor tenuis, modò sincerus & citrinus, modò fæcibus permixtus, insequitur. Differt à doloribus *ventriculi*, *uterini*, *Colicis* & *Nephriticis*, signis in ipsis expositis. A *pinguedine ventris*, quia hic manu totus comprehenditur, quod summæ cuti inhærescat, secernique à musculis abdominis potest. A *musculorum abdominis tumore*, quia is, circa pressum, dolore afficit, nec alvum ita remoratur.

Causa in Definitione exposita est. Effunditur sanguis eo, quia ipsi ad intestina præclusa via est, seu ab adstringentibus, quod in dysenteria malè curata accidit; seu ab humoribus copiosis, crassis, lentis, confertim ad intestina ruentibus.

Curatio

Curatio non est negligenda; Periculosa namque tum propter febrem, quæ æger contabescit: tum propter putredinem, quæ mesenterium corrumpitur. Extenditur verò interdum ad quadragesimum, interdum octogesimum diem: interdum per vitæ tempus durat, febre & colicis doloribus mox redeuntibus, mox cessantibus. *Peragitur*, ut in aliis inflammationibus. modò nota. Refrigerantia benigniora esse debere, ne materia magis impingatur. *Purgantia* vel nulla, vel lenia, nec in principio, ne plus attrahatur; sed inflammatione ad concoctionem tendente. Sed nec *Cassia* in curationis auspicio satis tuta.

Quantum ad *Differentias*, Aliquando *intestina simul inflammantur*; & tum omnia sunt asperiora. Aliquando *inflammatio circa glandulas hæret*; & tum leviora. Aliquando *jecur vicinum in consortium trahitur*, & tum febris ardens magna ex parte præcedit, malo deinde ad suppurationem vergente, lenta insequitur.

II. *Abscessus mesenterium* infestantes sunt varii. Nam I. Si *locum* spectes, vel sunt supra umbilicum, vel infra, vel circa. II. Si *constitutionem*, interdum mesenterium ex multis magnis scirrhis conflatum invenitur. Interdum *lapilli* in eo reperiuntur. Interdum *infinitos* habet *abscessus*, sine sensu ac dolore, folliculo proprio inclusos, ac gypseam, glutinosam aut liquidam materiam continentes. *Coquuntur* autem difficulter, & interdum non nisi post mortem, si tamen venter intumuit, & symptomata adfuerint, nec hydropis vel alterius alicujus affinis morbi, signa præsto sunt, suspicari de illis debemus. *Excluduntur* autem prodigiosè. Aliquando sponte ad alvum hæc saburra erumpit, & non rarò facto circuitu revertitur. Aliquando inter peritonæum & abdominis musculos copiosè profusa, vel in cavitatem ventris rupto peritonæo defluit, aut per abscessum exterius

P p

terius

terius erumpit, &c. *Aliquando* ægro benè ferente id accidit. Aliquando eidem mortem accelerat. De eorum *Curatione* hæc in genere notanda. 1. Alvum semper debere esse fluidam. 2. Resolventibus materiis, sed levibus, vim aromaticam habentibus, blandè stringentibus, festinandum. 3. Inter detergentia, *Syrupum Mercati ex chalybe*, palmam obtinere. 4. Ad consolidandum, *Terebinthinam Cypriam*, quovis modo præparatam, inprimis si materia peccans in lumbis ac circa renes delitescit, omnibus præferendam. 5. Ad citiorem abscessus maturationem *balneum aqua dulcis* frequentandum. 6. Vires etiam egregiè *Essentia persicaria* cum oleo chalcantino roborari. 7. Acidulas, quod facultate penetrandi & extersoriâ ulcera erodant, & temperiem pessumdant, vitari debere.

CAPUT III.

De Mesenterii dolore, & Omenti ac Pancreatis affectibus.

Dolor Mesenterii est tristis ipsius sensus, qui à materia calida & acri, in membranas ipsius detrusa oritur, cum ventris & lumborum perpetuo dolore, per intervalla, autumnali præcipuè tempore accedente, affligit, interdum & in caput & totum corpus distribuitur.

Signa *Futuri* sunt, Ictérica dispositio in oculis ac temporibus passim conspicua, appetitus deperditus, hypochondriorum gravitas increfcens, alvi dejectiones raræ, urinæ rubicundæ. *Præsentis*, flatuum & excrementorum suppressio valida, dolor ventris & lumborum vehemens, remediorum per vomitum exturbatio, clysterum successus rarus, &c. vires expulsiu æstimandæ non sunt. Est enim hic in omni gravi dolore exiguus. *Invalescentis*, Ægri spem omnem

nem deponunt. nephritis magna ex parte vires acquirit, vicini abdominis muscoli, & peritonæum ab interna putrilagine saniem concipiunt, dolores in univcrsum abdomen sese diffundunt, imò ad extremos artus, maximè tamen ad humeri articulos ac pedes transeunt, tandem convulsorii motus exercent. *Distinguitur* à doloribus *Vteri*, *Renum*, *Ilui*, *Ischia-dico* signis, quæ ibi tradita sunt.

Causæ sunt, Humores acres, putridi, & qualitate omnibus visceribus, hepati inprimis & ventriculo inimica, imbuti, qui in mesenterium, quod nihil aliud est quàm peritonæum duplicatum & ad lumbos affixum, postquam eorum evacuationem per alvum frustra natura tentavit, deponuntur.

Curatio est dubia spei, si dolores sunt submissi, quia fortiores. si supra umbilicum sentiuntur, nec ullis medicamentis solvuntur. quia in hydropem siccum desinunt. si dolores renum ob vicinitatem mineræ superveniunt. si novis obstructionibus succedentibus, malum indidem recrudescit. *Exigua* vel *Nullius*, si vomitus, frigidi sudores, & frequentes singultus afficiant. si diu durent, ægri febricitent & cibos averfentur: quia metus est, ne dolor ad caput progressus, repentè convulsorio modo illos occidat, si vigilæ pertinaces sint, & vehementes. si motus naturæ inversus accedat. si hæctica vel peritonæi & vicinarum partium suppuratio, oboriat. *Perscitur* 1. *Causarum ablatione*, ubi locum habent 1. clysteres, qui ad emolitionem debent parari ex *lacte caprino* cum cassia & oleo violaceo; ad abstersionem, addendum aliquid hieræ picræ & mellis violacei. 2. *Purgantia* per intervalla, si obstructiones ex urina rubicunda perspicias, repetita, benigna, à quibus tamen *Manna* ob flatuum ubertatem exulare debet. 3. *Præparantia* & *aperientia*, ex decocto *scorzonera*, *Graminis*, *fragaria* cum floribus cordialibus, quibus

quibus præmittenda inunctio abdominis ex oleo *violaceo*, *anethino*, *chamamel*. Butyri momento, quibus *spolium serpentis* prius incoqui debet. II. *Doloris mitigatione* per cataplasma, inunctiones, fomenta, balnea aquæ dulcis, Narcotica etiam cum purgantibus mista, &c.

III. *Pancreas obstructione* præcipuè laborat, unde ventriculus ob vicinitatem afficitur, dolores, ponderis sensus, circa regionem ventriculi & in dorso excitantur pulsationes: ob compressionem arteriæ cœliacæ, ut & difficilis respiratio ob consensum Diaphragmatis infestant. *Curatio* iisdem remediis perficitur, quibus lienis obstructiones.

III. *Omentum*, per rami splenici furculos, sæpe feculentos à liene suscipit humores, in illa præcipuè parte, quæ est inter lienem, septum & ventriculum, in cavitate sua in sinistro hypochondrio sub Diaphragmate, ex ventriculi, omenti, coli & viscerum connexu orta, nec exitum habente. Sæpe inde abdomen in sinistra parte versus umbilicum in tumorem attollitur; sæpe, compressio ventris, sonus & strepitus auditur. *Evacuari* non possunt, nisi continuo *thermarum* vel *acidularum* potu evanescant. Si *putrescat* vel *abscessum* patiatur, curatio est frustranea.

TITULUS VI.

De Epatis affectibus.

CAPUT I.

De Epatis morbis.

ARTICULUS I.

De Epatis intemperie.

MOrbi Epatis sunt, *Intemperies*, *Obstructio*, *Inflammatio*, *Scirrhus*, *Vulnera* & *Ulcera*.

Intem

Intemperies epatis est ejusdem à temperamento naturali propter causas externas & internas deflexio.

Signa ex actionis ipsius læsione, & aliis (de quibus in Differentiis) petuntur.

Causa sunt vel non naturales & externæ: vel vicinæ partes, ut ventriculus, cor; idque vel per contactum, vel materiæ communicationem: vel materiæ ab aliquod epatis vitium, sive innatum, sive acquisitum, in vasis aut parenchymate collectio.

Curatio pro ratione Differentiarum variat. Remedia interna, quia epar loco profundiore situm est, efficaciora esse debent. *Perficitur* Alteratione, & Materiæ peccantis remotione.

Differentiam quod spectat, Intemperies est quadruplex.

I. Alia est *Calida*, & ista aut simplex, seu *sine materia*, quæ ex eo *cognoscitur*, quod cibi maximèque carnis fastidium insit, ac nihilominus inedia obfit, sitis vehemens infestet, corpus universum maximè palmæ manuum & pedum caleant, & vel simul madeant, vel arescant, alvus propter humiditatem ex chylo extractionem sit sicciore. *Curatur* Refrigerantibus. inter quæ præcipua: Radic. *Taraxaci* & *fragor*. Fol. *cichorii*, *Endivie*, *Acetosæ* semina, *frigida* *majora* & *minora*. Lign. *santalinum*. Fructus, *Cerasa*, *Ribes*, *fraga*. Ex compositis, syrupi *Corallo*. *fragor*. *Acetosellæ*, *Citri*, *Cichorii*. Sal. *Corallor*. Pulveres, *diatrionsantal*. *diarrhodon* *Abbatis*, *diarmargariti* *frigidi*, *Nitrum viuriolatum* *Mynsichti*. Inter externa, *saccar. saturni*, *Cerorum santalinum*, *oleum omphacinum*, *Mixtura ex Aqua Nenuph. hyoscyami*, *flor. liliorum alborum*, *plantag. rosarum rubear.* ana unc. j. f. *salis saturni*, *Camphoræ in S. V.* *dissoluta* ana scr. j. *salis prunellæ* scr. f. addito paululo *Tragacanthi*, composita, & dextro hypochondrio applicata, &c. Aut cum materia, quæ ex eo

Pp 3

cognæ

cognoscitur, quod oris amaror, cibi fastidium, & sitis vehemens infestet, febris aut tertiana intermittens, aut lenta, aut errabunda, qua corpus paulatim exarescit, molesta sit. quod bilis vomitione & dejectione primum tenuis ac pallida, deinde crassa, verè flavida & foetida prorumpat. *Oritur* à bile, seu in eo genita, seu à vesicula fellea, obstructione laborante, vel aliunde, transmissa. *Curatur* 1. *Revulsione* per venæ in brachio sectionem, scarificationem, vel frictionem, si aliunde humores affluunt. 2. *Alteratione* per cichoracea inprimis, si influxere. 4. *Evacuatione*, seu per *alvum*, ubi Syrupus rosar. fol. Rhabarbar. & Tamarindi locum habent: seu per *urinas*, ubi *serum lactis*, *radix gramin.* *hordeum obtinent.* 4. *Epatis* ne plura colligat *roboratione*.

II. Alia est *Frigida*, & ista Aut est *simplex* & *sine materia*, quæ ex eo *Cognoscitur*, quod major sit cibi cupiditas, sitis nulla pituitosa, cruda, & sæpe liquidiora excernantur. sanguis generetur aquosus & crudus. *Curatur difficilius*, quod epatis naturæ & functioni magis repugnet, & curatur *Alterantibus*, ex quibus præcipua sunt, Radices *pimpinella*, *acori veri*, Folia *absinthii*, *agrimonis*, *centaurii minoris*, *Betonica*, *Capillor. veneris*; *passula*, *Caryophylli*, *Nuxmoschata*, *Cinnamomum*, *Agallochum*. Ex compositis *tinctura cassia lignea Mysichiti*, *Theriaca*, *Mithridatium*, *Rotula Aromatica Mysichiti*. *Confectio Rhabarbari Cratonis*, species *diamargariti calidi*. Aut *cum materia*, quæ *Cognoscitur* ex causarum similium prægressu, faciei & totius corporis colore albo, habitu cororis molli, dejectionibus pituitosis, gravitate in dextro hypochondrio. *Ortus & Curatio* intemperies alias sequuntur. Valet *Essentia Martis*, cujus præparationem vide apud Hartmannum.

III. Alia est *Humida*, quæ *Cognoscitur* ex
pulsu

pulsu molli, sanguine aquoso, excrementis liquidis, urina spicea. *Curatio* fit per siccantia.

IV. Alia *sicca*, quæ se contrario modo habet, nec de Curatione quicquam singulari occurrit. Composita enim plerumque infestat.

ARTICULUS II.

De Epatis obstructione.

Obstructio epatis, est vasorum in epate angustia, à materia ipsorum cavitatem implente producta, alimenti distributionem impediens.

Signa sunt, dolor in dextra hypochondriorum parte gravativus & obtusus, qui post sumtum cibum magis aggravatur, præsertim si mox à cibo vehementior exercitatio subeatur. excrementa à naturali modo evariantia, sæpius liquidiora & copiosiora, quia chylus non recipitur. Coloris inprimis in facie mutatio, propter læsam sanguificationem & distributionem, &c. Est autem *frequens*, quod vena è portis per jecoris substantiam in ramos tenuissimos dissipata, obliteretur, huicque alii non minus tenues è vena cava convenient, per quos omnes debet alimentum produci & exportari.

Causa est materia cavitatem vasorum vel etiam ipsam epatis substantiam implens, sive ibi generetur, actione ipsius læsa, seu ob intemperiem, seu ob errorem externum: sive aliunde confluat, seu ob attractionem, seu ob receptionem.

Curatio est *difficilis*, tum propter venarum in hepate angustiam, tum quod plures eandem morbi insequantur. *Peragitur De obstruentibus*, inter quæ laudantur, *Extractum pillular. de Ammoniaco Riviæ*, ex *gummi ammoniaci in aceto Squillitico* soluti dr. iii. *specier. hiera picra* f. dr. i. f. *aloës*

cruda scr. iv. *myrrha* scr. j. *Crocis* g. 6 cum *synupo ab-
sinthite* factar. Pillulæ *Tartarea Quercetani*, à Sen-
nerto reformatæ. Tinctura *Martis*, cujus descriptio
apud Petrarum, ab unc. j. ad ii. iii. & plures. Pul-
vis *Deodati* ex *speciebus Diarrhodon. diatrag.* ana dr.
ii. *Agrimon. radic. Rubia, siliis pulveriz. semin. ace-
tosa, portulacæ* ana dr. i. *Magister. perlar. Corallor.*
Croci Martis citra corrosiva facti, Croci Martis ex
oleo sulphur. parati ana scr. iv. cum sacchari tabar-
zet. q. f. compositus, dr. j. superbibita superiore tin-
cturâ, exhibitus: Pillulæ *de chalybe*. Decoctum ex
*Tartari albi*ssimi mundificati & pulverizati lib. j.
cum *chalybis crudi* unci i. & aquæ fontanæ congiis
duob. factum, & unc. ii. pondere in jusculeo aperiens
oblatum. Spiritus *aperiens Penoti*, &c. In *Cura-
tione* hæc notatu digna obveniunt. 1. Universalia
particularibus & topicis præmittenda esse. 2. Me-
dicamenta nonnisi longissimè à cibo, ne humores cru-
dos secum ad eparabriant, propinari debere. 3. E-
mollientibus adstringentia, spica nempe, spodium, ad-
denda, ut tonus epatis servetur. 4. Attenuantia, dif-
ficutientia & resolventia, ne tenuioribus partibus dif-
cussis crassiores remaneant, moderata esse debere.
5. Dulcibus, non ut cibis, sed ut condimentis uten-
dum esse. 6. Medicamenta liquida, vel tenuissimè
pulverata exhibenda. 7. Topica nunquam actu fri-
gida applicanda. 8. Post usum chalybeatorum mo-
vendum corpus; nisi excrementa nigra subsequan-
tur, ab iisdem est desistendum.

Differentia obstructionis hujus sunt varix.

I. Alia est *Recens*, quæ facilius solvitur. Alia *In-
veterata*, quæ putredinem & febrem excitat, & icte-
rum, scirrhum & hydropem inducit.

II. Alia est in *cava epatis*, quæ exinde *cogno-
scitur*, quòd foris nihil percipiatur, ob latitantem in
profundo partem, ventriculus in consensum traha-

tur.

tur, unde cibi fastidium, nausea, vomitus, sitis, ex-
crementa liquida. *Curandum* est evacuantibus per
alvum.

Alia in *gibba*, quæ exinde *cognoscitur*, quòd ab-
domen eâ regione pressum resistit diaphragma in-
primis, quòd ipsi hepar annectatur, renitatur, excre-
menta alvi sanguinolenta, propter levem chyli in
sanguinem mutationem, appareant. *Curatio* est fa-
cilior, ob medicamentorum penetrationem, & mate-
riæ obstructis per latiore viam evacuationem:
Diureticis maximè est agendum.

III. Alia est à *Sanguine*, vel *puro*, cui solâ basili-
cæ dextræ sectione succurritur. Vel *bilioso & calido*,
quæ cum dolore conjungitur; in jecore diutius præ-
ter naturam coërcitus, nec tempestivè expurgatus
mirè crassescit. Vel *pituitoso* viscido & crasso, qui ex
cibis crassis, viscosis, multis, balneis, aut motu, in
tenues venas impulsis vel raptis oritur: interdum
ex cerebro in ventriculum procumbit, mox præter-
fluens, sensim in tenues jecoris venas cum alimento
penetrat.

Alia à *Flatu*, crasso sub tunica concluso, vel in ve-
nis hæsitante, quæ exinde *cognoscitur*, quòd dolor
sit major, sed non continuus, tumor dextri hypo-
chondrii adsit tantus, ut universum hypochon-
drium oppleat, neque costarum extrema percipi
possint: est tamen sine gravitate, & pressus cedit,
nullum murmur edit, & nullam vomitæ latentis su-
spicionem præbet. *Oritur*, vel à *cibis flatulentis*, à
quibus cavendum: vel ab *imbecillitate epatis* mate-
riam vincere nescientis; & tum materia præparata
evacuanda est: vel à *membris vicinis*, & universo
corpore, in febribus præsertim pituitosis, transmi-
titur. *Curatio* in genere Carminantia postulat, de
quibus in Hydrope.

ARTICULUS III.

De Epatis Inflammatione.

E Patis inflammatio est ejusdem tumor calidus ex sanguine impacto, & in ipsa epatis substantia putrescente exortus, cum febre continua, dolore gravativo, sensuque ponderis in dextro hypochondrio, affligens.

Signa sunt, sensus gravitatis in dextro hypochondrio, à membranis quibus epar in nonnullis ad costas nothas annectitur. Tumor in eodem, qui major ægro in sinistro latus decumbente apparet, minor corpore in dextrum reclinato, & epate sub costas nothas cedente. Dolor à jugulo ad costas nothas prætenus, ob conclusam materiæ congeriem, quæ fucingentem thoracis membranam convellit. Febris, cujus vehementia inflammationis magnitudinem sequitur, & noctu ad incalescentem phlegmonem exacerbatur. Tussis arida, per intervalla ob vapores ad pulmones elevatos, & diaphragma compressum affligentes. Difficultas spirandi, quod febris majorem refrigerandi necessitatem adferat. Decubitus difficilior, tum in dextro latere, quod à ventriculo & intestinis epar comprimatur; tum in sinistro, quod epate suspenso membranæ tendantur. Pulsus celer & inæqualis ob auctam in affectu calido refrigerandi necessitatem, &c. Distinguitur, ab musculorum abdominis & pleuræ inflammatione, signis ibidem apposis.

Causa est sanguis impactus & putrescens, qui vel attrahitur, vel transmittitur, vel affluit, seu ob qualitatis vitium, tenuitatem nempe, fervorem & acrimoniam: seu ob quantitatem & exsuperantiam: seu ob causarum externarum impulsus, ut, dum medicamenta calida ventriculo apponuntur.

Cui

Curatio est difficilis, quia pars princeps afficitur, & ipsius occasione hydropis aut atrophix metus imminet. Exigua spei, vel Nullius ferè, si singultus superveniat, quia epar ad maximam inflammationem pervenisse, & sic ob nervorum *rigor* os ventriculi in consensum trahi, indicio est. si ventris solutio accedat, quia hæc excretio materiæ crudæ à virtute imbecilla proficiscitur. si febris ardens & continua comitetur, quia vehementer inflammatum istud viscus esse significatur. si ad *suppurationem* perveniat, quod ex eo *cognoscitur*, quod id post diem vigesimum, si natura debilis non est, accidat; dolores & febres, cum aliis symptomatibus, noctu tamen magis invalescant; rigores, quos caloris exacerbatio sequitur, nullo ordine, nullaque ratione invadant; quia ex abscessu ulcus oritur sordidum, quoniam alimento & humorum colluvie perpetuo alluitur; & cum substantia jecoris solida, utpote spermatica reparari nequeat, incurabile. si ad *indurationem* tendat, quod ex eo *cognoscitur*, quia post dies XL. febris & dolor falsè delitescunt, absque sensibili evacuatione, remanet in loco tumor & durities cum prostratione appetitus, & quotidiana corporis extenuatione. *Alicujus*, si per resolutionem abituram spes est, quod à primo invasionis momento, ad diem decimum quartum circiter accidit, & ex remissione symptomatum & urinæ colore cognoscitur. *Peragitur* iisdem, quibus aliæ inflammationes curantur. *Observa* tamen, 1. Basilicam vel mediam cubiti dextri primâ statim vel secunda die rundendam. 2. Repellentia mitiora esse debere, ne vel viis epatis nimium constrictis obstructio efficiatur, vel nimium refrigerantibus scirrhus producat, vel sanies ex ipso phlegmone refudans, in hepar regeatur. 3. Eadem debere esse clementer adstringentia, illis quæ modicè aperiunt & abstergunt, castigata. 4. Non esse actum fri-

frigida, nisi sit erysipelas, & fervor insignis, applicanda. 5. Rupto ad renes abscessu, serum caprinum cum emulsione seminum quatuor propinandum. 6. Fislâ & exesâ epatis substantiâ, si pus in abdominis cavitatem excidit, ad unctionem & incisionem abdominis accedendum: de qua vide Authores. Discussioni bene inservire creditur, Cerotum ex *ol. Mercurii* d. j. *dulced. saturni* d. ii. f. *ol. de galbano* unc. f. *cera rubea ex cinnab.* q. f. formatum, & visco juniperino, cum *succo ungulae caballinae, aut galbano* exceptum & impositum.

Differentia hujus inflammationis sunt aliquot.

I. Alia est *Magna*, in qua omnia sunt vehementiora. Alia *Exilis & obscura*, in qua tuberculis & abscessibus furunculorum instar, nullo hypochondrii tumore vel dolore, epas obsidetur, febris adest non admodum ardens, cum siti & fastidio. *Solvitur* sanguinis profluvio per directum ex dextra nare exorto, primis septem diebus, interdum nono, undecimo, rarissime decimo quinto, si praesertim patiens viginti quinque annis minor sit.

II. Alia est *in gibba*, in qua spirandi difficultas, quam Paulus irruptum suspirium vocavit, tussis & gravis dolor jugulum premens, magis infestant. decubitus dexter, ut quo pars affecta premitur, difficilior est. dolor contactu & pressu exacuitur. Urina est reses, quæ si simul sit cum contento ervino, colliquationem attestatur. tumor promptè percipitur, interdum prominens & oculis conspicuus est. Hæmorrhagiâ narium, si è directo sit, sudoribus bonis, & urinis copiosis *solvitur*. *Diuretica*. Catharticis sunt longè utiliora.

Alia est *in Cava*, in qua nausea, sitis, cibi fastidium, singultus, biliosa vomitio aut dejectio acrius urgent, decubitus sinister gravis & laboriosus est, tumor non promptè contactui obvius est. Excrementis

mentis alvi biliosis, cruentis, sudoribus & vomitibus solvitur. *Clysteres* lenientes exhiberi possunt, *purgantia* per os exhibita cavenda.

III. Alia est à *sanguine puro*, quæ *Exquisita* dicitur, & in qua omnia mitiora. Alia à *Mixto*, quæ *notha*, illoque vel *Bilioso*: & tum febris est ardens, marasmi metus angit, sinceræ bilis vomitio, & interdum per alvum dejectio, quæ vel diarrhæam vel dysenteriam infligit, afficit. Vel *Pituitoso*, quæ rara est, & in qua Topicis mastiche, nardus, absinthium, & ex his parata olea addi debent, &c.

ARTICULUS IV.

De Epatis Scirrho.

Scirrhus epatis est ejusdem tumor durus, indolens, ab humore crasso in visceris substantia impacto & indurato genitus.

Signa sunt, Tumor *sinistri* hypochondrii, qui tactu si gracile & adipis expers sit, abdomen deprehenditur, & facilius erecto vel in dextrum latus inclinato ægro, quam decumbente supino animadvertitur: jecoris autem situ & figura circumscribitur, & in sinistro decubitu, mole sua ventriculo & præcordiis incumbit. Dolor obscurus, quia partes vicinæ sensu præditæ à tumore epatis comprimuntur, &c.

Causa est in Definitione exposita. Non subito autem, sed peditentim tumorem infert. Nam primò tenues jecoris venas infarcit. dein auctus in omnem visceris substantiam redundat. hinc multò plenior cumulatus, jecur in amplam molem, uti turgidum appareat, distendit, denique siccatus, & tenui parte vi caloris dissipata, reliquus totus obdurescit.

Curatio, quæ est exiguæ spei, *Instituitur* 1. *Lenientibus* præparantibus & evacuantibus: prout in obstructione dictum, 11. *Emollientibus* & dis-

discutientibus, cum moderatè adstringentibus, ne ex illis solis putredo & cancer; ex his solis indurationis majoris periculum oriatur. Laudantur, *Ladanum cum balsamo Indico & cera*, Emplastrum de *Cicuta*, & *mandragora cum ammoniaco*. Unguentum de *Cicuta Fabricii Hildani*, &c. III. Deobstruentibus, inter quæ valet *Tartarum vitriolatum* cum pafulis, cinnamomo & agrimoniz foliis. *Tartarum Tartarizatum Bartoleti*, quod per urinam pellit, &c.

Differentias quod spectat.

I. Alius est *incipiens* cum dolore conjunctus, qui *Nothus* dicitur, & Curationi cedit. Alius *Confirmatus*, *Exquisitus*, indolens, qui hydropem inducit, nec curari potest.

II. Alius est à *materia biliosa*, qui ex eo *cognoscitur*, quod causæ biliosum succum coacervantes antecessere, bilis exsuperantis & concalescenti jecoris signa adsunt. Ictero succedit & febrem lentam committit, ac in hydropem, qui ascites dicitur, præcipitat.

Alius à *materia pituosa*, in quo causæ crassum succum coacervantes præcessere, jecoris refrigerati signa adsunt. Cachexia & leucophlegmatia inducitur. Morbus citra ullum incommodum diu persistit; & si in hydropem vertitur, primò in cachexiam, deinde in leucophlegmatiam transit.

Alius à *materia melancholica*, cujus etiam signa aderunt.

III. Alius est *in gibba*, ubi Topici aliquid proficitur. Alius *in sima*, in quo interna etiam remedia adhiberi debent.

Huc pertinet *Tumor Epatis* absque scirrhus, qui ex eo *cognoscitur*, quod brevi tempore nascatur, minus renitatur, digiti manus sub extrema costa configi nequeant. Occupat ambientem duntaxat epatis membranam, interdum tamen totum hypochondrium

drium replet. *Oritur vel* à viscido humore, *aut* à cibis ejusmodi nato. *aut* tali per alterantia frigida circa evacuationem adhibita factò: *vel* à cruditate tenui, à cibis, potu & aliis frigus inducentibus exorta: *vel* à flatu tenui. *Curatio* aperientibus & evacuantibus perficitur.

ARTICULUS V.

De Vulneribus & Ulceribus Epatis.

Vulnera Epatis, quæ in senili & cachectico corpore sunt valde *periculosa*, ob longam verò sanguinis effusionem *lethalia*, vel sunt ab *Externis causis*, quæ adstringentibus & glutinantibus, (rosæ rubræ siccæ laudantur) curantur vel à *Contusione*, quæ vomitum vel dejectionem per alvum vel urinam sanguineum conjunctum habet, vulnere periculosior est, & in abscessum degenerat. In *Curatione* exigit. 1. Venæ in cubito sectionem. 2. Portiones ex adstringentibus compositas. 3. Subsistente profluvio concreti sanguinis per sua medicamenta dissolutionem.

Vlcus epatis est ejusdem à pure vel succo erosio.

Signa sunt, ulcerosus in dextro hypochondrio dolor, Tussis, color faciei ictericius, putridorum, faniosorum & cruentorum per alvum vel urinam dejectio, atrophia, quia nec sanguis conficitur, nec homo alitur.

Causæ sunt, quæcunque substantiam epatis erodunt: de quibus in Differentiis agetur.

Curatio non est negligenda, quamvis *exigua sit spei*. Perpetua enim colluvie, quoniam alimento continenter alluitur, sordescit. Instituitur, ut in cæteris ulceribus.

Differentia ulcerum epatis sunt variaz.

I. Aliud est *in superficie*, quod minus periculosum. Aliud *in substantia*, quod exitiale, quia pars spermatica regenerari non potest.

II. Aliud

II. Aliud est in *gibba*, quod *cognoscitur* ex urinis purulentis absque signis exulcerationis in vesica & renibus, difficili respiratione, septi transversi dolore. Aliud in *Carva*, quod *cognoscitur* ex cruenta interdum purulenta alvi excretionem, intestinorum ob materiæ acrimoniam dolore, punctiois & gravitatis circa epas sensu.

III. Alia quod *inflammationem sequitur*, quæ in abscessum defuit: & hoc periculosum est, si præsertim materia in substantia jecoris contineatur. Aliud, quod à *succis acribus* & *erodentibus* oritur, quod exinde *cognoscitur*, quod sensim serpat viribus constantibus, febris in progressu oritur, typum non servans, quæ tandem in hecticam desinit. Ciborum, maxime carniū fastidium affligat, &c. Oritur alimentorum vel corruptorum vel septicorum vitio, vinum generosum viscus calefacit, & exsiccat, putridumque quendam lentorem & saniem exaggrat.

CAPUT II.

De Epatis symptomatibus.

TITULUS I.

De Imbecillitate Epatis.

Symptomata Epatis sunt, *Imbecillitas*, *Cachexia*, *Hydrops*, *Icterus*, & *Atrophia*.

Epatis Imbecillitas, seu à *robia*, est *facultatum ejusdem à causis suis ducta lesio*.

Signa ex excrementorum alvi, urinarum & coloris in toto corpore consideratione sumi debent: ut in Differentiis patebit.

Causa hepatis facultatis lædentes, sunt intemperiei morbi, sive illa sit calida, sive frigida; cui
ac-

accedit error externus, quando nempe vel chylus in ventriculo non rectè elaboratur: vel bene elaborato, aliquid vitiosi permiscetur, &c.

Curatio debet perfici Epar roborantibus eidemque appropriatis, ut sunt *Epar lupi*, *vituli*, *gallinarum*, *cochleæ*, *passula*, &c.

Quantum ad *Differentias*,

Alia est ratione *facultatis sanguificatricis*, quæ vel læditur ab *intemperie frigida*, seu calidi nativi defectu; & tum alvi excrementa, carnis recens macerata loturæ sunt similia, quæ frigiditate se intendente cessant, cruditates fiunt, quibus primum pedes, dein & cæteræ partes, quod venæ jecori malè affecto, utpote suæ origini condolent. Huic curando inservit *Geranium Rupertianum tusum*. *Lixivium* è *sarmenis vitium* cum vino, &c. Vel ab *intemperie calida*, in qua chylus quasi adurit, excrementa sunt facci sanguinis similia, &c.

Alia est ratione *facultatis Attractricis*; & tum Liquida defluunt ab alvo cremoris specie, etiamsi nulla ventriculi sit offensa, nulla mesenterii obstructio.

Alia ratione *Retentricis*, & tum alvus, rarè tamen, liquida & saniosa, carnis loturæ recens macerata similia, reddit, &c.

ARTICULUS II.

De Cachexia.

Cachexia est universi corporis in aquosam & tumidam molliem, nutritionis culpâ, diffuso.

Subiectum est corpus univèrsim; sed illæ partes in primis, quæ oculis incurrunt, ut cutis & muscoli.

Signa sunt, color propter pituitositatem sanguinis aliquando albus, aliquando propter bilis aut melancholiæ mixturam lividus aut plumbeus. Tumor cum gravitate & inertia, in pedibus & manibus præsertim, ob humorum serosorum descensum, &c.

ipforum à corde distantiam : sed & circa oculos in facie , genis , palpebris , quod patres illæ laxitate sua humores serofos facile recipiant.

Causa est Nutritionis vitium. Quamvis enim quod apponitur , concrefcet & adhærefcat : tamen , propter nimiam crudiratum copiam , non affimilatur . Scilicet , *sanguis est pituitofus , crudus , & serofus* ; ilque talis generatur , vel propter *alimenta impura* , corrupta , & ferum abundans generantia : vel propter *viscera* , quæ aut sunt *Impura* , seu à scirrho , ut dictum est ; seu à corrupti humoris effusione , ut in mensum suppressione animadversum , purulentam materiam ex ureterum obstructione , in venas regurgitantem , sanguine infecto , totum corporis habitum infecisse : seu à corrupta ipforum substantia . Sic enim vitiosus corruptusque sanguis profertur , & in partes singulas evectus , illicque concrefcens , vitiatam substantiam pro utili reponit : hinc cachexia pro sanguinis conditione varia . Pituitosa virgines afficit , & leucophlegmatiam denunciat . Aut sunt *Imbecilla* , quod læsa fuerint seu morborum diuturnitate , seu nimis evacuationibus , seu diuturna incarceratione , &c.

In *Curatione* diligenter observandum , 1. Utratio illorum morborum , à quibus cachexia procedit , habeatur . 2. Si humores abundant , hydragogis , præsertim evacuentur . 3. Ad deobstruendum , laudatur *pulvis Cacheticus* ex chalybis præpar . p. j. Cassiæ lignæ p. lii. sacchari albi p. iiii. pulvis stercoris anserum juniorum . 4. Sudores feliciter *Antimonio diaphoretico* cientur . 5. Cachexiam virginum pellit *aqua ex nucibus juglandibus* recentibus in taleolas dissectis , in vino albo per viginti quatuor horas maceratis , destillata , saccharo Canario dulcorata , & ad solem per aliquot dies exposita , & unc. iii. pondere , in sequente exercitio , sumta .

A R

ARTICULUS III.

De Hydropse in genere.

Hydrops vel in genere spectatur , vel in specie.

Hydops in genere consideratus , est tumor corporis vel partis ejus præter naturam , ob humoris aquosi & serosi , vel flatus collectionem , exortus .

Signa ipsius sunt , Tumor & inflatio corporis , gravitas , difficultas spirandi , dolor extensionis in dextro vel sinistro hypochondrio , scœdus faciei color ex virore albicans , vel ad citrinum aut plumbeum declinans , urina pauca & tincta , sitis assidua , partim ex defectu humidi naturalis & nutritii , partim ex adscensu calidorum salforum halituum os ventriculi exsiccantium , partim ob diminutam aëris adductionem , unde cor & pulmo siti quoque æstuant . De *Tumore verò pedum* notandum . 1. A corporis exercitatione potissimum & vesperi tumere , quod aquosus humor pondere suo deorsum vergat . 2. Noctu detumescere perfecta coctione , ob augmentum caloris , adjuvante ipsius lecti calore . 3. In convalescentibus seu ex acutis , seu ex diuturnis morbis , quod languens calor tantum concoquere non possit , quantum ab ægro assumitur , & crudum ac serosum quod inde oritur , ad pedes convolet sine insigni periculo , modò maturè succurratur , sæpe intumescere .

Causa est nutritionis vitium ab epatis intemperie frigida profectum , quæ inducitur vel Extinctione caloris , seu immediata ; à sex non naturalibus , seu mediata , à totius vel partium aliarum morbis ; vel *Dissolutione* , seu Dissipatione , seu à nimio calore , seu aliis causis .

Curatio non est *difficilis* , si hydrops est recens . *Difficilis* , si ex alio morbo corpus labefactatum comprehendat . si est inveteratus . *Observandum* in ea :

Q 9 2

I. A

1. A lenioribus incipiendum. 2. Quia chronicus morbus, longiore tempore remedia usurpanda. 3. Ne natura nimis assuefcatur, varianda. 4. Interdum per aliquod tempus, ne natura opprimatur, cessandum. Modum vide in specialibus.

ARTICULUS IV.

De Ascite.

Hydrops in specie consideratus est, vel *Ascites*, vel *Tympanites*, vel *Anasarca*.

Ascites est abdominis ab humore aquoso, seroso & salso, in abdominis capacitate, Epatis, lienis & Renum vitio effusi; cum pedum, femorum, & scroti aliquando tumore discentio.

Signa sunt, Tumor ventris, qui ab inferioribus partibus utpote à fonte caloris corde, remotissimis incipit. superiorum partium gracilitas, raucus, percussio ventre, veluti ab utre semipleno sonus, ægro circumvoluto de latere in latus, murmurantis & fluctuantis aquæ sonitus. Morbo invalescente, succedit dispncea ob copiam aquæ Diaphragmati incumbentem, Tussis, interdum seu ex compressione diaphragmatis, seu ex aquæ in thoracem penetratione, unde suffocatio brevi oritur. Impressio digitorum manifestum post se in carne vestigium relinquit.

Causa est aquosus & serosus humor: unde hydro-pici parum per urinam emittunt, qui post magnos haustus multum emittunt, hydropes non afficiuntur, & quidam abstinentia à potu sanitati restituti sunt. Colligitur iste humor, si *Locum* species inter ventriculum & renes, per quæ alias naturaliter serum evacuari solet. præsertim in vena splenica, mesaraica, & fortè arteriæ splenicæ ramis, & radicibus earum venarum circa cava viscerum, gastricis & Epiploicis. Unde post febres quartanas & diurnas, quarum causa

causa in venismesaraicis, hydrops sequitur: si *Causam*, colligitur à nimio potu & humidis cibis, accedente vitio viscerum, quæ serum vel attrahunt vel continent: quo fit, ut illud in ventre subsistat, & post in cavitatem abdominis effundatur. *Effunditur* autem in abdominis capacitatem, seu spacium illud, quod est inter peritonæum, omentum & intestina, per ramos epiploicos & gastro epiploicos præcipuè: ita tamen ut nec *Omentum*, quod venas à sola vena portæ habet, & facile saburram mesenterii & lienis excipere potest; nec *pancreas*, quod in medio splenicam venam ad lienem transeuntem, cum cæliacæ arteriæ sinistro ramo habet, extra culpam sit. *Effusus* humor, quamvis frigidus sit, quia tamen multas partes salvas continet, & calorem à vicinis partibus mutuatur, calidus etiam est. quin temporis diuturnitate putrescit. Unde corruptio viscerum, febris, sitis, dum vapores os ventriculi percutiunt, suscitatur.

Curatio est Melioris spei, si æger est juvenis & robustus. si servus, qui famem, sitim & alia tædia ferre potest. si plus humoris per urinam excernitur, quam assumitur. si aqua quæ in venis est, salvis visceribus, in ventrem seu alvum confluit. *Nullius* ferè, si ex acuto morbo existat, quia viscera absumto humido radicali frigidam & hecticam intemperiem, quæ corrigi non potest, contrahunt. si aqua in omentum erumpat, illudque corrumpatur. si lienosis post diurnam dysenteriam advenerit, quia pravi humoris transitu caloris innati symmetria in intestinis & visceribus perit. si eidem tussis superveniat, quia aquosam humiditatem in tantum crevisse, ut in thoracem penetraret, & asperas arterias jam occupet, indicat. si abscessus vel maculæ in cruribus erumpant. si levatus remediis, integrè renascitur, quia viscera corrupta & vel scirrhus vel marasmo

& hæctica intemperie obfessa esse significat. si à colli-
 liquatione oriatur, quiavires omnes exsolvuntur, &
 corpus languescit, *Perficitur*, 1. *Aqua in abdomine*
effusa evacuatione, præparatione humorum crasso-
 rum, si interveniunt, præmissa. Evacuuntur autem,
 1. *Per alvum*, medicam. hydragogis. *Mitioribus*,
 ut *Mechoacanna*, *Ialapæ* quæ adfer. *ipsæ* dari potest.
 succo *ireos* depurato, qui ad dr. iii. cum syrupo de
 Endivia dr. vi. Aqua Petrosel. unc. f. & specier. dia-
 rhod. Abbat. scr. j. exhiberi potest. *Floribus*, *Perfico-*
rum siccis, & in vino coctis. *Fortioribus*, ut *gummi*
gotte, quod à gr. vi. ad xv. (vide de eo *Reudenum*)
 datur. Extracto *Esula Rulandi*, *Trochiscorum Alhan-*
del. seu *spiritus vitæ aureus* ejusdem. *Elaterii*, *Mal-*
fariæ laudatissimo, à gr. i. ad iii. Magisterio seu Cry-
 stallis *Luna Tentzelii*, decrefcente maximè lunâ ex-
 hibito, à gr. iv. ad v. *Mercurius vitæ*, longa digestio-
 ne fixior, *Crocus metallor.* *Absinthiacus Mynsichtii*,
 ejusdem *Tartarus Emeticus*, &c. quæ omnia paribus
 diebus, non nimis frequenter, nec visceribus ni-
 mium corruptis danda; an bene ferant post ipsorum
 usum, videndum; & viscera semper roboranda sunt.
 De *Paracenthesi* vide Authores. 2. *Diureticis*, quæ
 hydragoga sequi debent, inter quæ palmam ferunt,
 Pulvis *terrestrum vermium* dr. j. pondere cum deco-
 cto Asparagi vel fœniculi exhibitus. Sal *fraxineus*
salinatus, *Billichio* prodente. Vinum per Cinerem ex
straminis fabarum man. vi. summit. genistæ, juni-
 peri ana m. ii. f. matrisilvæ m. j. f. combustis, bister-
 ve colatum, & un. vi. pondere exhibitum. 3. *Sudo-*
riferis & exsiccantibus, ut sunt, Radix *Asclepias* in
 vino macerata & decocta. *Antimonium diaphore-*
ticum, Decoctum ligni *sassafras*. *Theriaca* ju-
 gland. nucis minoris magnitudine cum olei sulfur-
 guttis aliquot in vino. *Lapide serpentis*, de quo
 apud Joëlem. Extra *Emplastrum de Cineribus Myn-*
sichtii.

sichtii. 11. *Partium*, ne aqua iterum colligatur, *ro-*
boratione. Valent, Trochisci de *Absinthio*; *Dia-*
cubeba Paracelsi, &c. 111. *Diæta*, quam in au-
 thoribus vide.

Differentia à partibus, quorum vitio serum col-
 ligitur, sumuntur.

Alius est vitio *Renum*, serum non attrahentium,
 seu quod *Exulcerentur*, & tum aliquid puris in
 urina apparet; mictio quàm in cæteris causis longè
 parciore est: seu quod *Vreteres rumpantur*; & tum
 subito oritur. plerumque id in caliculi exturbatio-
 ne fit.

Alius vitio *Lienis*, qui cum, tanquam spongio-
 sus, aquam ex ventriculo, officio eo à natura sibi
 delegato, per vas breve trahere debeat; quæ hinc
 per arteriam splenicam in coeliacam, mox à trun-
 co arteriæ aortæ per emulgentes arterias ad venas
 derivetur; illud vel nimis avidè, ob *negligentiam* in ve-
 nis obortum, perficit: quod *cognoscitur* ex alvi
 profluvio pertinaci, quod nec tumorem ventris nec
 dolorem propter intemperiem hæcticam tollit, &
 vel ab imbecillitate venarum alimentum non at-
 trahentium, vel ejusdem corruptionem & contri-
 nuam biliosi excrementi evacuationem cum æstu
 intestini jejuni & mesenterii affligit. Vel *omnino*
negligit, seu propter obstructionem viarum ad cum
 tendentium à crassis humoribus factam: seu ob ca-
 loris dissipationem, à scirrho, nimia evacuatione,
 calidorum usu, partium vicinarum intemperie,
 morbis acutis: seu ob caloris suffocationem ab usu
 frigidorum nimio, à menstribus suppressis, à super-
 fluis evacuationibus, &c.

Alius est vitio *Epatis*, serum seu ob easdem cau-
 sas non attrahentis, aut retinentis: seu ob idem *negligentiam*
 nimis allicientis: & tum, Tussendi desiderium
 adest. Excrementa sunt pauca & sicca, propter sero-

fitatis in abdomen missionem, & cæterorum à calore epatis exultionem.

ARTICULUS V.

De Tympanite, & Anasarca.

Tympanites est abdominis ex multo flatu, à calore vel debili vel torrefaciente excitato, in illius capacitate concluso, distensio.

Dicitur & *Hydrops siccus*, quamvis plerumque cum aqua conjungatur.

Signa sunt hæc. Cutis instar pellis tympani extenta apparet, & percussa sonum tympani edit, umbilicus multum extrinsecus prominere. major est ventris inflatio, sed minor gravitas. compressio non adeò conspicuum post se vestigium relinquit, sed fovea statim repletur, ructus & crepirus cerebri prorumpunt, borborigmi & rugitus obmurmurant. *Distinguendus* est à *Thoracis* post vulnera distensione, quæ pectus, dorsum, lumbos, scrotum, brachia, collum, imò totum habitum interdum occupat. Ex eo oritur, quodaer, qui recta per os ad pulmones transire, & ex pulmonib. iterum per os exspirari debebat, patente inter musculos duos, vel musculos & cutem via, è vulnere quasi è folle, in spaciū intercutem & musculos inflatur, & hinc porro in vicinam penetrat.

Causa est flatu, qui, si *Ortum* spectes, vel à calore debili, vel ab eodem nimio & torrefaciente, qui id quod subtile est violenter agitatū in vapores resolvit, ut in atra bile ventriculo substrata videtur; oritur. si *Locum*, nec in ventriculo est, quia per ructus ejiceretur: nec in intestinis, quia per alvum excluderetur, sed inter mesenterii & intestinorum tunicas plerumque generatur. Nam in hydrope sicco, tormina circa umbilicum, labores, & lumborum dolor affligunt: at mesenterium antrorsum

tenetur.

tenuibus intestinis, in dorso, lumborum verberis à quibus nascitur, unde distentio, annectitur. Invenitur tamen & in intestinorum cavitate, & eo per orificia venarum melsaricarum, se insinuat.

Curatio requirit, I. *Materia* flatu procreatrix *eductionem*: ubi locum habet *vinum* Ferdinandi *antipneumaticon*: de quo in *Histor.* 38. *Spiritus salis* coagulatus, cum aqua absinthii, & spiritu sambuci. II. *Flatuum discussionem*. *Extra* per cucurbitulam magnam ventri appositam: per frictions cum *allio* in vino generoso decocto & contuso; per somentum ex *urina pueri* & *lapide prunella*: de quo vide *Hartmannum*. *Intra*, per decoctum *ligni Ebeni*, spiritum *ligni guajacini*, arcanum *cumini* & *carvi*. Liqueorem *florum tapfi barbari*, &c. III. *Calida viscerum intemperiei*, si adest, *emendationem*: si imbecillis est, *roborationem*.

II. *Anasarca*, seu *ἰσχωροειδὴς* & *Leucophlegmatia*, est molis corporeæ præter naturam per totum corpus æquale incrementum, vitio alimenti exortum.

Signa sunt, incrementum molis corporeæ, majus quam in cachexia, per totum corpus æquale, ita ut pedes & tibiæ initio tumeant, corporis molities, laxitas, pallor, & ad laborem minimum debilitas, febribus assidua, lenta, cum pulsu parvo, crebro & inæquali, urinæ albæ, tenues, crudæ, &c.

Causa est alimenti vitium, quod propter immodicam epatis & venarum refrigerationem (de qua in intemperie dictum) pituitosum & crudum est; imò corpus aqua lenta & concreta suffunditur: & quamvis nutrimentum & concresecat, & nutriendæ parti adhærescat: tamen non assimilatur.

Curatio est *facilior* quam in aliis, quod humor pituitosus propius ad sanguinis naturam accedat, quam serofus: quin & accedente, in principio, integris adhuc viribus fortiore diarrhæa, solvitur morbus. *Ab-*

Q 9 5

solvitur,

Solvitur, 1. *Materia aquosa* per corpus sparsæ *evacuacione*, tum per *Evacuancia inferiora*, inter quæ *Extractum* vel sal *Gratiola*, *Rhabarbaro* admistum, laudatur: tum per vomitoria, quæ alibi videt: tum per venæsectionem, si ex causa plethorica aut sanguinem retinente oritur, ne frigidioris copia calor obruatur, quod in principio faciendum est. Tum per sudorifera, ut decoctum vincetoxici, in *Laconico* præsertim usurpata, ante cujus ingressum bene *Aqua Weckeri* (de qua apud Hartmannum) aliquid exhibetur. II. *Viscerum*, Epatis inprimis & ventriculi, *roboratione*: de quibus suis locis. *Ferdinandus*, *Ægri* in acervum tritrici demersionem ad materiæ exsiccationem laudat.

ARTICULUS VI.

De Ictero.

Icterus vel est *Flavus*, vel *Niger*: de quo in symptomatibus Lienis dicetur.

Icterus flavus est humoris flavi vel viridescentis in habitum corporis, à causis suis procedens, effuso.

Dicitur, à nomine aviculæ & *galgulus*: à varietate coloris in arcu cœlesti, *arquatus*: & quia mollior in aulis tractatur, *Regius*, vel quod multa regio potu sanari creditus est.

Signa ipsius sunt, Totius corporis flavedo, citrinitas, aut pallens viriditas, quæ in albo oculi & interno ejus angulo, ubi venæ majores, observatur. Venarum sub lingua distentio. hypochondrii dextri dolor, vel etiam durities. salivæ amaror, cum vomitu bilioso, singultu, & dolore capitis.

Causa humor concolor, qui in habitum corporis, ob causas in *Differentiis* dicendas, effunditur.

Curatio pro ratione *Differentiarum* variat. *Respicit* tamen duo: I. *Causam*, quæ amovenda. II. *Symptoma*,

ptoma, quod tollendum, postquam universalia præmissa fuerint. Laudatur pro facie & oculis fumus ex *aceto calido*, cui *Rosmarinus* incoctus: *specifici* sunt, *Extractum Aquilegiæ* & *Chelidonis*, quod cum paulo *Bezoar* ditioribus exhibetur. *Emulsio seminis Aquilegiæ*, cum ejusdem aqua stillatitia, in pauperioribus pulvis *lumbriorum terrestrium*, *pediculi* tres vel quatuor vivi in ovo forbili, si *Zacutho* credendum, quod remedium sordidissimum est. *Tinca viva* umbilico imposita, donec moriatur. *Aranea viva* in testa nucis de collo suspensa, & scrobiculo cordis imposita donec moriatur. Inter *Magica* ponuntur, *Viticarum* ab ægro permictio. *Panni* in ejusdem urina intincti, & aëre expositi, & alia plura, de quibus vide *Petraum*.

Differentia ex Causis sumuntur.

Alius est ab illis quæ bilem copiosam generant; quæ sunt, Aut *Externa*, ut *Dulcia*, cibi potusque calidi. *Venena* inprimis, ut fel leopardi, viperæ, & venenator. morsus: & tum *Alexipharmacis* agendum est, veneni naturæ speciatim oppositis, in quibus etiam manifestarum qualitarum ratio est habenda, Aut *Interna*, ut sunt 1. *Epatis intemperies calida & sicca*, & tum urinæ vehementer sunt coloratæ & crassæ. fæces alvi croceo colore tinguntur, pedes & manus calent. 2. *Inflammatio* & *Apostemata* ejusdem: de quibus superius.

Alius ab illis, quæ sanguinis depurationem bilisque secretionem & exclusionem præpediunt, ut sunt, 1. *Compressio* vesiculæ fellæ: à scirrhus epatis vel alio tumore, quæ vide supra. 2. *Obstructio* ejusdem, à pituita crassa, bile copiosa, calculis & aliis causis, quæ fit vel in meatu exporrecto ad hepar per quem allicitur, & tum fæces tinguntur: vel in illo ad duodenum, tendente per quem ejicitur, & tum fæces albicant. Vel fit vitio Epatis, & tum hypochondrii dextrum tenditur, si durum evadit, hydropem prænunciat:

nunciat: *Vel* vitio folliculi ipsius, & tum subito invadit, alvus pigrior est, fæces, quia non tinguntur, albicant. *Curatur* I. *Deobstruentibus*, inter quæ prævalet *Cuscuta*, decoctum *fragariae* cum marrubio & passulis, succus *radicum urticae* in vino contusarum, cum croco; *Anserculorum sterces* verno tempore collectum exsiccatum, & dr. j. pondere datum, *Cremor Tartari* vino chalybeato dilutus, spiritus *Tartari*, &c. II. *Purgantibus*, per vices cum deobstruentibus adhibitis, inter quæ *Rhabarbarum* & *Hiera picra* optima.

Alia ab iis, quæ bilem repente ab interioribus ad circumferentiam corporis expellunt, quod præcipue fit in Febribus acutis, in quibus *vel* ejicitur Criticè, ac tum præcesse signa coctionis, & solvitur morbus. *Vel* symptomaticè, propter copiam & acrimoniam; & tum ante septimum diem accidit. Si *sine rigore* sit, *vel* à debilitate naturæ, *vel* ab inflammatione esse censetur. si *cum rigore*, materia febrilis è visceribus & venis ad cutem ejicitur. In *Curatione* ratio est & febris & Epatis habenda.

ARTICULUS VII.

De Atrophia.

Atrophia est totius corporis exsiccatio & extabescencia, ob frustratam ejus nutritionem exorta.

Subjectum est totum corpus, ratione præcipue partium molliorum, pinguedinis & carnis. Partes duriores exsiccati quidem possunt; sed ita imminui, ut inde totum corpus decrescat, non possunt.

Signis opus non est. Cum visui affectus appareat.

Causa est frustratio nutritionis, quæ *vel* vitio alimentis, quando illud aut deficit, quod non assumatur, non attrahatur, non apponatur, discutiatur, &c.

aut

aut vitiosum est: *Vel* vitio facultatis nutrientis, quando calor natus aut humidum radicale deficit, provenit.

Curatio respicit I. Symptoma ipsum, ubi locum habent, *Balneum* ex decocto capitis & pedum vervecis, salicis rubræ. Aquæ dulcis, in quo cineres corylorum, semen lini, ossicula vervecum contusa ebullierunt. *Diaeta humectans*, ex emulsione amygdalorum dulcium, seminum quatuor frigidorum majorum. Lacte caprillo, &c. *Curatio magnetica*: de qua apud Hartmannum, in Chymiatría. *Inunctiones* unguento Amati Lusitani, apud Sebastianum Austriam de morbis puerorum. p. 555. II. *Causas*, de quibus in Differentiis.

Differentiæ Atrophiciæ sunt variæ.

I. Alia est *Universalis* totius corporis: de qua nunc dictum. Alia *Particularis*, quæ à peculiari partitis vitio proficiscitur. In *Curatione* locum habent *Fomenta*, *Dropacæ*, *Picationes*, & *Percussiones*, quibus partis siccitas corrigitur, calor obtusus excitatur, & alimentum allicitur.

II. Alia est à *Vermibus Draconitibus*, qui pueros exagitant.

Alia à *Ventriculo*, chylum non benè elaborante.

Alia ab *Epate*, quando istud aut calida & sicca intemperie laborat, & bile multâ perluitur. aut obstruitur vehementer, ut nutrimentum difficulter penetret.

Alia à *Liene*, cui eadem accidere possunt.

Alia à *Mesenterii obstructione*, quæ Indis Orientalibus est familiaris, plerumque bulimiam cum lenteria conjunctam habet; sed & in abscessum (qui integrum mesenterium ita absorbit, ut intestina nullo ordine confusa, tenuibus duntaxat pelliculis inter se cohæreant) abit. In *Curando gramen crucis*: de quo apud *Alpinum* de plantis *Ægyptiis* cap. 40. lauda-

laudatur. Vide de his & *Bontium* in *Medicina Indorum* p. 156.

Alia à *Corde*, quod fit in *Hæctica*.

Alia à *Pulmonis ulcere*, quod in *phtisi* accidit.

TITULUS V.

De Lienis affectibus.

CAPUT I.

De Lienis morbis.

ARTICULUS I.

De Lienis Obstructionibus.

Morbi Lienis sunt *Obstructio*, *Inflatio*, *Inflammatio*, *Scirrhus*, *Ulcera* & *Vulnera*.

Lienis obstructio est ejusdem ab humoribus crassis infarctio.

Pars affecta est Lien, vel secundum venas & arterias, vel secundum totam substantiam.

Signa sunt ista. In principio gravitas hypochondrii & dolor lienis infertur: hinc humor cum sanguine permistus, & in totum corpus diffusus, livido colore ipsum tingit, respirationem difficilem post exercitium reddit. in ventriculū effusus, nauseam & vomitum: in intestina, diarrhæam efficit. interdum, propter siccitatem, alvum adstringit.

Causa est Humor terrestris & crassus, qui sæpe ab aëre paludoso & cibis crassis colligitur, & propter lienis imbecillitatem & viarum interceptionem expelli non potest. *Interdum* propter lienis calidam intemperiem, & chyli incocti attractionem, quod post decubitum frequentem in latus sinistrum, & nimiam exercitationem accidit, cumularur. *Interdum* ob hæmorrhoidum consuetum fluxum interceptum, vel mensium suppressionem subsistit.

Curatio

Curatio instituitur, prout in aliis obstructionibus. Nota tamen. Causarum à quibus prodit, rationem habendam. Vomitoria, cum recta sit à liene ad ventriculū per vas breve via, prodesse. Ex *purgantibus polypodium & Epithymum* cum passulis, *sennam* cum cremore Tartari valere. Ex *aperientibus* flores *genista*, & *Electuarium de chalybe Saxonia* laudari. *Emplastrum de Ammoniaco* in aceto squillitico soluto rectè applicari, præmissò aliquo conveniente fomento. *Electuarium roborans Solenandri* vide apud Hartmannum.

II. *Lienis inflatio est ejusdem in tumorem à flatu elatio.*

Signa sunt ista, Tumor & distentio cum aliquo dolore, sed sine sensu gravitatis & ponderis percipitur. Murmur & sonitus editur. Compressus lien cedit.

Causa sunt, vel Aquæ frigidæ largiori haustu: vel cibi flatulenti, ut pisa, castaneæ, fabæ, bulbi. *Vel Humores crassi & visci*, qui à calore imbecilli vinci possunt, & in vapores resolvuntur, qui lienem, quia spongiosus, facile inflant.

Curatio ut in aliis. Chymici *Spiritum saturni* ardentem in extracto silicis laudant, & eodem regionem lienis ter in die inungunt. Purgatio in causa externa improbat. Inunctio per oleum rutæ, caprarum, &c. sufficit.

ARTICULUS II.

De Lienis inflammatione, & Scirrho.

Lienis inflammatio est ejusdem à sanguine in substantiam ejus effuso, in tumorem elatio.

Afficitur Lien interdum *totus*, interdum *non item*.

Signa sunt, Tumor in sinistro hypochondrio versus anteriora quasi protuberans, & hominum quasi medium cingens, sic à renis sinistri qui dextro elatior dolore

dolore & inflammatione distinguitur: Pulsatio & palpitatio illius lateris, ob arterias quibus abundat, Febris continua quartanæ periodum servant. Respiratio, ob Diaphragmatis compressionem difficilis.

Causa est sanguis effusus & putrescens: qui vel purus est, vel mixtus, & suis se signis prodit.

Curatio aliarum inflammationum methodum sequi debet; modò largior à purgatione potus fugiatur, ne humor ad substantiam hepatis feratur.

I. Scirrhus lienis est tumor ejusdem durus, ab humore crasso, glutinoso & indurato procedens.

Signa sunt, Tumor renitens cum duritie oblonga in sinistra parte, & quidem sine dolore; cui accedunt difficultas respirationis, oris siccitas, pedum inflatio, decubitus in sinistram latus gravis, fudor molestus, &c.

Causa est Humor crassus & glutinosus, qui vel statim erat talis, à cibis crassi succi, laboribus, vigiliis, quæ illud, quod spirituosum est, in humoribus absumunt, ortus: vel post, cum per se tenuis, aut caloris vi, aut medicamentis nimium discutientibus, aut naturâ tartareâ, ad indurationem eunte, est induratus. Hic in totum corpus cum sanguine diffusus, illud lividum & coloratum reddit: & ad tabem, quod officio suo sanguificationis, oppressus lien satisfacere non possit, adducit.

Curatio est difficilior, si ægris Diarrhæa oboriatur, & lienteria, vel aqua intercus excipiat. *Respicit* ea, quæ Scirrhus Epatis. Inter *Digerentia* laudantur intra, Radix *silicis*, *Lamii* seu urticæ mortuæ pulvis in cibo, lignum *Tamarisci* in aqua chalybeata decoctum ad tertias. *Compositum ex radic. silicis unc. j. Cuscuta dr. ij, in vini potentis unc. viij. ad tertia partis consumptionem* decoctum. Externè inter emollientia valet unguentum *Fabricii*, ex *gummi Ammoniaci unc. j. ol. amygdal. dulc. lilior. alborum, pin-*

pinguedinis gallina ana unc. ii. succi Cicutæ unc. iv. Aceti scillitici unc. ii. compositum.

Differentia sunt eadem, quæ scirrhî epatis.

I. Alius est *Recens*, qui dolore ad jugulum usque se extendente affligit. Alius *Inveteratus*, qui omni dolore caret, nec facillè hominem, nisi epar in consensum trahatur, tollit.

II. Alius Lienem duntaxat secundum suam substantiam afficit, qui etiam lienis figura circumscribitur, quamvis & hic interdum secundum longitudinem ut teres appareat; interdum secundum latitudinem, interdum secundum omnes dimensiones intumescat. Alius in alias quoque partes vicinas effunditur, ut omnem plerumque ventris sinistram regionem complectatur.

ARTICULUS III.

De Ulcere & Vulnere Lienis.

DE Ulcere nihil est quod observes, nisi Inflammationes & tumores sequi, pus interdum per urinam vomitum vel alvum fundere. Expurgari, abstergi, consolidari.

Vulnus vel est in superficie, quod minus lethale est. Vel in substantia, quod propter effusionem sanguinis est mortiferum. Ubique tandem sit, nigrum sanguinem fundit, plerumque simul ventriculū afficit. sitim, & dolorem ad jugulum, excitat. Pus interdum per urinas excernitur, deductum per arteriam celiacam, ad arteriæ magnæ truncum, & hinc ad emulgentes. Vulnerariis potionibus etiam sanatur.

CAPUT II.

De Symptomatibus Lienis.

ARTICULUS I.

De Dolore Lienis & Ictero nigro.

Symptomata Lienis sunt, *Dolor Lienis, Icterus niger, Affectio hypochondriaca, & Scorbutus.*

I. *Dolor Lienis* à solutione continui, & tensione membranæ oritur. Hæc tum ab *Externis*, percussione, casu, &c. infertur: ab *internis*, inflammatione nempe, inflatione, tumoribus, ulceribus, &c. Diligenter verò *distinguendus* est, tum à doloribus illis, qui in sinistro latere, præsertim post cibum vel equitationem percipiuntur, qui proveniunt vel à flatibus, vel ab humoribus serosis, qui in spacia peritonæi eo loci tunicis pertinaciter adherentis influentes, ipsos à musculis distendunt: tum à Musculorum dolore, qui si isti parum premantur, sentitur. *Curatio* Narcotica non exigit. Cum enim exili tantummodo tunica vestiatur, exquisitus ille dolor non est.

II. *Icterus niger* est cutis totius corporis in *nigrum* mutatio. Cognoscitur ex ipso colore. Oritur ab iisdem causis, à quibus Icterus flavus, nisi quod ibi epas, hic lien peccet. *Curatur autem difficilis*, quia, si vesiculæ felleæ vitio fit, major adest bilis corruptio; si vitio lienis, humor est contumacior, & metus est hydropis. Medicamenta è *Chalybe* sunt in illo commoda: sed & balneum siccum, post quod corpus emulsione *seminis canabis*: facies, aqua *florum fabarum* cum vino mixta, abstergenda est.

ARTICULUS II.

De Affectione hypochondriaca.

Affectio hypochondriaca est vitiosorum, in *vena porta, arteria cœliaca & mesenterica ramis*, ob *lesam*

lesam lienis coctionem, absque putredine collecta, & per vaporum emissionem multa symptomata inferens, colluvies.

Hypochondriaca dicitur, ob locum utriusque hypochondrii, quo pars illa corporis, quæ sub nothis costis ad illa usque utrinque protenditur, & cum musculis viscera ipsa complectitur, intelligitur. Dicitur & *πυλινδρος*, apud Dioclem & Ætium, propter familiaritatem flatuum, in sinistro hypochondrio contentorum. Tum *Melancholia* nomen sortitur, cum cerebrum per consensum afficitur: ut superius dictum est.

Signa ex symptomatibus facultatis naturalis, vitalis & animalis petuntur. Adest **1.** *Ventriculi cruditas*, ob eundem à liene per venam portæ malè nutritum, quam excipiunt continua exspuitio pituitæ humiditate os opplente, vomitus crassiorum partium humoris, vel in ventriculo geniti, vel à liene transmissi, & interdum ita acidi, ut dentes stupeant, quem antecedit ejusdem ebullitio in ventriculo, flatus vicinas partes distendens, ut interdum in lipothymiam homo incidat: tenuium humoris partium per *ἀδηνον* *ἀγποήν* discussio, cum febrili horrore interdum, quem calor quidam sequitur, sudore mox evanescens. **2.** *Ventriculi dolores*, qui ad dorsum usque procedunt, ingestis cibis redeunt, concoctis iisdem vel ejectis sedantur. renes in consensum communione membranarum trahunt. **3.** *Alvi adstrictio*, tum ob vasorum in utroque latere siccitatem: tum, quia cibus in humorem pituitosum & viscidum mutatur, & sic ab intestinis non promovetur, & pertinacius iisdem adherens, constrictionis causa est. **4.** *Æstus hypochondrii* quasi inflammatorius, qui motu, cibo, potu, calidioribus magis ingravescit; quem interdum sequitur malarum & totius faciei rubor ob vaporum ascensum. Ephemera febris sudore

evanescens, ob eorundem ex largiore potu per totum corpus dispersionem. 5. *Vrina* modò tenuis propter vias obfessas, & flatus retentos, unde paroxysmi initium: modò turbida, propter humoris admixtionem, cum arenarum rubratum interdum subfidentia, in qua tartareæ sanguinis partes coagulantur. 6. *Flatulentia*, & in sinistro hypochondrio præsertim fluctuatio, flatibus in cavitate, sub diaphragmate, ex ventriculi, omenti, coli & viscerum connexu exorta, inclusis. 7. *Anxietas*, tum quòd cibus femicoctus inflatus resolvatur, & angustiam pariat: tum quòd ad vasa vicina calida intemperie laborantia deductus, à calore igneo quasi ebulliat, & hypochondria distendat, ac sic angustiam in partibus, quæ nervos à sexta conjugatione habent, excitet. 8. *Cordis palpitatio*, vel ob ventriculi consensum: vel ipsius partis contra vaporum malignitatem certamen; quæ nonnullis magis crescente lunâ propter serum copiosius in massa sanguinea ebulliens frequentior. 9. *Pulsatio in sinistro hypochondrio*, quem vel cæliacus ramus post iram & motum præcipuè excitat: vel arteriarum in Mesenterio, per glandulas, magnam, præsertim quæ in centro, compressionem. 10. *Palati, oris, & lingus siccitas*, propter vaporum resolutorum per oesophagum & asperam arteriam adscensum. 11. *Respiratio difficilis*, tum propter nervorum musculis pectoris dicatorum, affectionem; tum propter materiæ prævæ in musculorum spacia effusionem. 12. *Cerebri perturbatio*. Nam vapores resoluti, si sunt acres, *Epilepsiam* concitant. si obscuri, spiritus obfuscant, & *deliria melancholica* inducunt. si copiosi, *vertiginis* authores sunt. si sicci, vigilias producant, quæ post mediam noctem plerosque molestare solent, quia chylus distributus & ad secundam coctionem, lienem & vasa vicina perductus, humores in iis latentes agitât, & vapores

ex

ex iis elevat, qui versus cerebrum feruntur. si in oesophagum, musculos laryngis & asperam arteriam, *strangulationis* metum, ob illius distentionem, istorum contractionem inducant. si in nervos linguæ, brachiorum, secundum nervorum ductum, insiliant, *stuporem*, & formicantem nunc in hoc, nunc in illo digito, pulsus inferunt. Et hæc sunt symptomata, quæ tamen non omnes invadunt.

Causæ sunt Humores pituitosi, biliosi & melancholici. Melancholici tamen præsertim, non tantum primis & secundis qualitatibus, ut sunt adusti, viscosi, fixi: sed & secundum *διωρύκτες ἀποθνήσκουσιν καὶ ἰσχυροί*, amaritie nempe, salsedine, acerbitate & aceditate nocentes. *Colliguntur*, si *Locum* species, in venæ portæ, arteriæ cæliacæ, & mesentericæ ramis, majoribus præsertim, & quæ sinistram hypochondrium perlunt; nec vase brevi, seu arterioso, seu venoso, nec omento, quod venas amplas à vena portæ habet, exceptis. Si *Causam*, colliguntur 1. Propter *lienis coctionem* læsam, & quidem *Vel* propter intemperiem calidam, qua succum crudum aquosum prius, crassum posterius attrahit: qui in venis vehiculo destitutus, subsistens, incrassatur & aduritur, flatibusque generationem præbet. *Vel* propter siccitatem, duritiem & scirrhositatem, calore ipsius defervescente, per quem chylus non attractus subsidit, & excrementa non repulsa remanent, quod in sedentaria vita accidit. hinc circa annum ætatis trigesimum iste morbus plerumque invadit. *Vel* propter errorem externum, cum chylus non coquitur, seu vitio ciborum, seu ventriculi, seu affectuum animi, qui dum cibus coquitur calorem ad alias partes avocant, bilem in ira commotam cibis permiscet, lienem qui arteriis multis abundat in actione sua turbant. 11. Propter *Vitium glandularum*, quæ vasa mesenterii fulciunt, dum illa vel tumore comprimiunt,

R r 3

vel

vel in vita sedentaria compressæ, angustiora reddunt.

Curatio est difficilis, propter symptomatum congeriem. *Facilior*, si sit incipiens. si in ætatem nec provectam, nec declinantem inciderit. si hæmorrhoides, varices, menses superveniant. si mares potius quam feminas, pingues & albos, quam fuscus afficiat. si hæmorrhagia naris sinistra accedat. si urinæ nigricantes, citra febrem liberalius profundantur. *Respicit* 1. *Chirurgiam*, ratione cujus *sanguis mittendus* est: ubi nota, venam brachii secari posse, si magna pars materiæ, venæ cavæ communicata est, & circa epar φλόγῳσῖς aliqua affligit. Hæmorrhoidales externas optimè aperiri, quia eidem intestino recto insertæ, communicationem osculorum cum internis habent. 11. *Pharmaciam*, ratione cujus 1. *Humor corruptus* in prima corporis regione hærens est *educendus*: ubi locum habent Enemata & vomitus, si præsertim copia in ventriculo. 2. *Via aperienda*, & humor per incisionem & attenuationem præparandus, ubi nota. Omnia in forma potius liquida usurpanda; quod si in solida, haustus liquoris postea superbibendus. A lenioribus incipiendum, in vehementioribus desinendum. Inter illa sunt, *Ex simplicibus* Radic. *Scorzonera Filicis maris*, Herbar. *Fumaria*, *scolopendria*, Flores, *Borragin*. *Bugloss*. *Poma Burboriana*. *Ex Compositis* Syrupus *pomorum redolentium*, *Fumaria*, species *Diacurcuma*, *Essentia Fumaria*, *chamadryos*, &c. de quibus supra in Lienis & Epatis obstructionibus. Ex his *Acidula*, *Therma*, *chalybs*, qui, præmissa primarum viarum evacuatione, in conserva borraginis à scr. ii. ad dr. j. f. jejuno ventriculo primò tertio quoque die ad vigesimum antequam assueveris, vere & autumnò exhibendus: post, haustus vini addendus, & duarum horarum si fieri potest deambulatio, quartà post summationem

tionem subsequente prandio. si non descenderint excrementa nigra, desistendum: sin planè supprimantur, alvus movenda. 3. *Humor præparatus evacuandus*, per medicamenta purgantia, benigna, humectantibus castigata, per epicrasin, circa ultimam lunæ quadraturam exhibita, balneis & fomentis humectantibus interpositis, myrobalanis & cassia exclusis. in cruditate nidorosa magis cholagoga, in acida phlegmagoga & melanogoga, subsequente secundà post horà cibo, ne medicamentum ultra epar ascendat. 4. *Vapores effumantes*, à capite & præcordiis *divertendi*, per frictiones, Clysteres, Cucurbitulas, Cauteria, & medicamenta alia, ut *Elixir proprietatis*, conferv. *rosarum* cum spirit. sulf. & vitrioli. 5. *Partium, quas infestat roboratio, & symptomatum aversione*: de quibus suis locis.

Differentia à partibus semuntur.

I. Alia est *per Essentiam*, quam hæcenus explicavimus.

Alia *per Consensum* aliarum partium, & hæc

II. Alia est *stomachica*, quæ *Cognoscitur* ex spūti post pastum frequentia, ructibus acidis & æuginosum quid resipientibus, orificiis & faucium velli-catione, quæ sic affecti haustus frigidum desiderant, vehementibus ventriculi doloribus, qui nonnullis ad dorsum usque procedunt, concoctis cibis quiescunt, mox aliis ingestis revertuntur, &c. *Curatur* Evacuatione, divertentibus per sanguinis missionem & cucurbitas, si dolor ingens affligit. Extergentibus, siccantibus, roborantibus.

Alia *Epatica*, quæ *cognoscitur* ex dolore hypochondrii dextri, eduliorum fastidio, febre lenta & erratica, doloris ad humeros & claviculas extensione, &c. In *Curatione*, quam in intemperiebus vide. Si hæc sit calida, serum lactis cum succo limonum vel pomorum redolentium recens expresso, confert.

Alia ab *Utero*, cujus sanguis vitiosus facillimè, vel è venis in arterias propter anastomoses, vel ex arteriis in hypogastricam quæ ventriculo, pancreati, omento, tenui intestino, &c. ramos largitur, mox in cæliacam regurgitat. *Cognoscitur* ex illis accidentibus, quæ hysteriis accidere solent. In Curatione habenda est affectuum uteri ratio.

Alia *Hæmorrhoidalis*, ex hæmorrhoidum sup-pressionione accidens: de qua suo loco. Vidè *Matthæum Martini* de morbis Mesenterii abstrusioribus, accuratè ista pertractantem.

ARTICULUS III.

De Scorbuto.

Scorbutus est cachexia ab humore melancholico, peculiari modo corrupto, orta, cum crurum debilitate, maculis, gingivarum tumore, & sanguinolentia, dentium laxitate, & aliis symptomatibus affligens.

Scorbutus veteribus notus, partim sub *oscedine*, partim sub *scelotyrbe* & *stomacace*; partim sub *volvuli sanguinei* nomine venit, & nationibus mare & paludosa loca incolentibus familiaris est.

Signa in definitione posita sunt, & agitur de iis inferius. His adde *Vrinæ* & *Pulsus nimis variantes*. *Illud*, nam initio sunt tenues & citrinæ materiâ tartarea in iis subsistente, nunc crassæ & albæ. humoribus magis corruptis rubræ, & propter falsedinis adustæ admisionem, cum lixivii splendore; & tum absque omni putredinis nota & siti, arenulæ rubræ, marulæ sæpe adhærescunt. Interdum turbidæ sunt & permanent: interdum clarescunt, & rubrum sedimentum quod farinam laterum refert, ad fundum deponunt: interdum multa cruda & pituitosa excrementa supra sedimentum quasi suspensa hærent: quibus verò hæmorrhoides suppressæ ma-

lo occasionem dedere, iis guttatim cum dolore & ardore profluunt, & materiam tartaream, mucosam, salisam & nigricantem continet. *Hoc*, quia pulsus nunc debilis est, inæqualis ac sæpe vermicularis: deliquio verò animi imminente, propter summam ejus necessitatē, & quod cor vapores expellere conetur, fortior.

Causa est *Humor melancholicus*, illeque 1. *Crudus*, quod ostendit tum victus, tum etiam symptomata, quæ melancholicos affligunt. 2. *Serosus* & ichorosus, ut sit instar lixivii, quod ex aqua & salis, fæculentis, ac adustis partibus constat: quod ex doloribus vagis & ulceribus animadvertitur. 3. *Pituitoformis* interdum ac vitiosorum humorem *socius*. Nam venâ apertâ, sanguis in scorbuticis quasi glutino albo virescente vel flavescente obducitur. 4. *Peculiari*, postquam diu ibi mansit modo, *corruptus*. Hinc multi splenis obstructione & humoribus melancholicis laborant, qui scorbuto non afficiuntur; & in iis regionibus, quibus humoris atri ex aëris fervore collectio est familiaris, scorbutus ignotus est. 5. *Contagiosus*, quod in aliis melancholicis morbis non invenies. 6. *Ex cibis sale volatili destitutis*, ac proinde *πρωμαγνάν* in coctione impediētibz: unde tartarea & fæculenta, in primis viis subsistunt, & post ad lienem in tanta copia, ut scerni non possint, confluunt, *progenitus*. Sanè cibi fumo & sale indurati, in quibus aut parum est salis volatilis, aut quod fuit, fumigatione absumtum est, ita ut nihil nisi sal fixum & tartareum remaneat, aër crassus, loca maritima, ad ipsius generationem faciunt. Medicamenta, quæ adhibentur trita & gustata, vaporem acrem, subtilem, & citò evanescentem, qui à sale volatili procedit, dimittunt: eadem exsiccata vel decocta, minus recentia & condita, exactius operantur. 7. *Primariò* in mesenterio, omento, prius viis, locisque inter ventriculum,

epar, & lienem mediis & utrique visceri vicinis; secundario, in totius corporis venis residens. Illud, Nam si chylus *πρωτοταρτε* sua minus sit depuratus, seu ob imbecillitatem partium, seu errorem externum; in illis propter crassitatem subsistit, appulsu aliterius augetur, eundemque faculentia & salitate sua, quam concipit, inficit. Vicinum epar & partes coctioni dicatas, tum contactu tum fumorum emissionem debilitat & inquinat, unde qualitas illa ab iisdem cibis & chylo communicatur. Hoc, nam colluvies illa, per aliquod tempus ibi detenta, beneficio humoris ferofi, ad epar deferretur: inde per venas & arterias in totum corporis habitum, tot symptomatum causa futura distribuitur.

Curatio tria respicit. I. *Dietam*, quæ debet esse incidens, attenuans, abstergens, deobstruens: ubi nota. Esu columbarum sylvestrium laudari. Veneris exercitio hunc morbum quibusdam in locis curari, fortè propter naturalis caloris *ἐλάμψιν* saccharata & lacticia fugienda esse. II. *Chirurgiam*, ratione cujus vena basilica, mediana, salvatella, vel malleoli secanda est; sed ita, uti si maculæ jam prodierunt, superfedeatur; si nulla sit spes hæmorrhoidum, & febris afficiat, in actum deducatur. parè, ne vires collabantur, evacuatio instituatur. III. *Pharmaciam*, ratione cujus I. *Præparanda est materia peccans*, primis viis ablutis, ita, ut à lenioribus incipiatur; magis attenuantibus, si morbus jam invaluerit, vel in crasso aëre homines vivant, agatur; illa, quæ tota proprietate agunt, adhibeantur; & potius in succis, essentis, conservis, quàm decoctionibus & extractis, in quibus medicamentorum sal volatilis evanescit, propinentur. *Appropriata sunt Cochlearia*, seu *Britannica*, quæ laudatissima, *Beccabunga* seu *Anagallis aquatica*, quæ aliquid humiditatis obtinet, *Raphanus rusticanus*, seu *Armoracia*, *Chelidonium minus*,

nus, *Numularia*, *Sinapi*, *Trifolium aquaticum*, &c. Ex *compositis* sunt, *Electuarium Danicum* ex baccis quas multiber vocant, confectum, *Syrupus Scelytricus Foresti*, nec non *Antiscorbuticus Mynsichti*. Essentia *Chamadryos* & *Fumaria*. Spiritus & conserva *Cochlearia*. Tinctura *Martis Mynsichti*, appropriatis roborata, &c. 2. *Evacuanda est*, seu per inferiora, ubi locum habent *Pillule Tartares* Quercetani: seu per sudores reliquias discutientes, qui seu in Laconico, seu extra, *Theriaca Saxonica Mynsichti*, Essentia *fumaria* cum sale absinthii benè excitantur: seu per *Diuretica*, cum aquis appropriatis exhibita. 3. *Partes*, ut epar, ventriculus, &c. roborandæ sunt.

Symptomata quæ scorbuticos affligunt, sunt varia, quæ per periodos ut plurimum afficiunt, non omnia in omnibus reperiuntur: alia magis sunt familiaria, alia minus: sunt autem sequentia.

I. *Difficilis respiratio*, & pectoris angustia interpolata, quæ absque stertore, sibilo & rufsi afficit: interdum caliginem oculis suffusam, lipothymiam, ac ægrorum de sanitate desperationem, conjunctam habet. *Oritur* à vaporibus vel humoribus in cavitate omenti hærentibus, & septum transversum comprimantibus, qui post vehemens exercitium moti, symptoma exacerbant. *Curatur* Thoracis & Antiscorbuticis, quibus adde aliquid de confectioe *Alkermes Eichstadii*, & *croci*.

II. *Gingivarum pruritus, tumor, & putrefactio*. Cum enim caro ipsarum sit mollis ac laxa, faciliè ab humoris tenuiore & acriore parte eo ascendente eroditur. Pueros maxime infestat, & cum dentium nigredine, sideratione & vacillatione, alveolis à pravo humore occupatis, quæ tamen subito evanescit, ob humoris recursum, afficit. *Curationem* ejus juvant, Aquæ appropriatorum, si iis os colluatur. plantarum adstringentium in vino austero decoctio, addito

dito spiritu vitrioli & alumine, quæ efficacissima.

III. *Macularum in cruribus copia*, quæ adultos ut plurimum infestant. Primò rubicundæ & pulicum morsibus similes, mox purpureæ & sublividæ evadunt, tandem ad nigrum colorem declinant. ob majorem copiam interdum pectus, collum, brachia & faciem invadunt; interdum subito evanescent; interdum ad annos multos durant. nonnunquam in squammas abeunt: & quo magis lividæ, eò magis perniciosiores sunt. *Oriuntur* à parte humoris descendente, & à natura ad ignobiliores detrusâ. *Curari* discutientibus & emollientibus, ut balneis ex *baccis juniperi, nasturtii, cochlearia, chamameli*, &c. possunt. *Sulcerosa* sunt, difficulter curantur, cum ab iis totum crus gangrænâ corrumpatur.

IV. *Dolor crurum*, qui tensivus obtusus, *ὀστέον*, in profundo latens, sub noctem ingravescit, ob humoris melancholici circa id tempus motum. *Oritur* à serosis humoribus, interdum à capite descendentibus, & membranis adhaerentibus; interdum è sede colluviei per venæ cavæ crurales ramos extra venas effusis, & crurum musculis insinuat. *Mittitur* cataplasmate ex *lacte coagulato*, cum floribus chamameli, nasturtio aquatico, & baccis juniperi in lacte coctis. *Exasperatur* pinguibus ante macularum eruptionem adhibitis.

V. *Dolor ventris*, qui interdum ita lancinat, ut ægri in peritonæi rupturam inciderint. per intervalla cum pulsu & urina scorbuticis infestat. ad quadragesimum usque diem interdum durat, nec coli ductu circumscribitur. & quidem, cum ventris depressione, ut cum umbilico introrsum revellatur, & hic lumbis quasi annexus videatur, cum distensionis secundum longitudinem perceptione, intestini recti sursum revulsione, ut nihil planè prodeat.

Ori-

Oritur, ab effusione materiæ istius per venas mesentericas, quæ in intestina non hiant, inter duas intestinalium tunicas. Hinc distentio, convulsio, vellicatio, partium vicinarum in consensum tractio, febrium, quarum in viscerum vasis focus, antegressus. *Curatur* Remotione causæ. Mitigatione per laxantia, & clysteres, quibus excretio stimulari debet. *Elixir proprietatis* valdè prodest.

VI. *Dolor pedum circa talos & plantas*, qui est macularum prodromus, & ob tenuitatem materiæ partes quasi penetrat. Medicamento ex *floribus sambuci manipul. ii.* in vino coctis, additis *saponis dr. ij.* factò, & panno loco dolenti applicato.

VII. *Dolores Hypochondriorum incircumscripti*, quod status exitus non habeant. *Nephritici*, vel quod materia per vasa emulgentia ad renes descendat: vel quòd congesta, & accessu causæ externæ, ad majora vasa detrusa ad renes defluat. *Lumborum*, qui interdum à sanguine vitioso eo loci contento; interdum per modum catarrhi, à capite per venas in spinalem medullam descendente, oriuntur. Hinc à scapulis dolores incipiunt, & sensim ad lumbos serpunt.

VIII. *Dolores capitis*, qui circa vespèram infestant, ei cum calore quodam febrili, qui sudationibus matutinis evanescent, junguntur. Illos præcipuè qui ex hæmorrhoidum suppressione hoc malum contrahunt, affligunt. Ex vaporibus eo ascendentibus oriuntur. Ut in majore dosi *beccabunga* exhibeatur, calefacientium dosis minuat, aperientibus hypochondria illinantur, exposcunt.

IX. *Arthritis*, de qua nota. *Vagam* esse, si præsertim topica frigida apponantur. Plerumque cum levi paralyfi, cum dolore cessante & redeunte jungi. Ab humoribus serosis, tenuibus, & ad motum promptis

ori-

oriri. Mire *deprehendi*. Nam si loco maximè dolenti lumbricus vivus imponatur, exsilit, circumgyratur, incurvatur, tabescit, & emoritur. Inter *Sudorifera* appropriatum est, quod ex *rad. succisæ* anc. j. *Aristolochia rotunda* dr. iij. *Herb. salvia nob. Batonana* m. j. *Abrotani*, *Rutæ*, *vinca pervinca*, *Sabina*, ana p. j. &c. paratur, vide *Horstium*, de arthritide scorbutica vaga, Tomo primo Observationum.

X. *Paralysis*, quæ interdum crura, interdum totum alterutrum latus involvit. A *paralysi vetrum* differt, quod aliquis motus remaneat, interrupta sit, paulatim prius tentet, antequam sedem figat. sequatur, non tam fixum stuporem, coli & ventris dolores tumores quavis parte erumpentes, & faciliè evanescentes. *Oritur* à materia scorbutica in medullam spinalem per ramum, qui ab arteria aorta non longè à ramo mesenterico porrigitur, & serpit in spinam ejusque vertebrae. *Curatur*, si tendines rigidi non sunt, semel atque iterum purgato corpore, usu beccabungæ & cochleariæ. si indurentur & rigescant, emollientibus cataplasmatibus, præmissis *fomentationibus* ex aqua, in qua sol. salviæ, beton. rorismar. cum flor. sambuci & meliloti, decocta sunt.

XI. *Convulso & contractio*, quæ ita interdum invalescit, ut ægri nullum articulum extendere possint, & quasi in orbem contrahantur. *Conjungitur* aliquando cum rigore cardinis oris, in quo gena inferior sub via audiendi revertitur, ita ut os strictius conniveat, quo minus in rectum queat expandi. *Oritur* à rigiditate tendinum, quando in tartareo illo, sed seroso humore, isto discussio, ille relinquitur & exsiccat. *Curatur* emollientibus & discutientibus.

XII. *Sopor profundus*, qui nonnunquam cum febre lenta continua, aliquando intermittente, affligit. Cum paroxysmo advenit, & recedente cessat.

Na-

Nasturtio aquatico, quod in limpidis aquis nascitur, curatur.

XIII. *Cordis palpitatio & lipothymia*: de qua sciendum, quod maximè corripiat, dum ægri in lecto surgunt, humoribus commotis. interdum tanta sit, ut subito extinguantur. Certo scorbutum indicet, si in morbo ad sensum parvo affligat. Medicamentis sexies vel octies de die datis, cum antiscorbuticis oppugnari debeat.

XIV. *Vomitus*, qui potius est vomendi inanis conatus, nullam ventriculi gravitatem vel dolorem antecessorem habet. Ventriculum roborantibus medicamentis non tollitur, lacticius potius, quod humores demulceant, sedatur.

XV. *Sputatio nimia*, quæ *Oritur* partim ex vaporibus ad os elevatis ex locis ventriculo vicinis: partim ex cibis in ventriculo corruptis, & secundum ductum membranæ œsophagum investientis in os eVectis; partim ab humore seroso ex liene per vas breve in ventriculum effuso. *Præcavetur*, acrium & calidorum medicamentorum, quæ materiam fundunt, fugâ.

XVI. *Alvi fluxus tam diurnus, quàm nocturnus*, qui profert fæces compactas, sed copia cibum excedentes, coloris nunc herbacei, nunc cineritii, *Oritur*, vel quod alimentum debilitate epatis non attractum corrumpatur: vel, quod humor serosus à liene ad intestina refluat: vel quod serum, quod halitus forma per ambitum dissipari potuit, frigore poros densante ad intestina repellatur, vel vasis præsertim matutino tempore, per corpus calore patens, ab eodem contractis, versus majora vasa retrudatur, & secum, quicquid in via invenit, ad intestina rapiat. Et tum in *Curatione*, *Astringentia* sunt maximè *noxia*. Victus ratio sicca usurpanda, Vinum absinthites decocto cichorii dilutum prodest. vel quod

quod dum à calore febrili serofus humor effervescat, & exhalare non potis eò convertatur; & tum syrup. rosarum solutivus, & cichoracea valent. Est interdum *sanguinolentus*; sed sine dolore, & cum aliis scorbuti signis. *Oritur* à sanguine sæculento in venis abundante & per extremitates earum in intestina effuso.

XVII. *Febres, quæ longè ab aliis febribus differunt.* Nam frigoris sensus ad sex vel septem horas se extendit. Pulsus est tardus, debilis, inæqualis in declinatione, magnus & durus in vigore, urina qualem supra diximus, interdum ter, quater interdum in die infestant. frequentissimè sunt ex continuæ & tertianæ typo mixtæ. Continuæ, si purgantibus medicamentis vel calidis potionibus exasperentur, enecant.

XVIII. *Hydrops*, qui & cum tumore duriore manifesto, & tensione lienis, epatis, vel ventris, & cum majore respirandi difficultate, quàm alias, quæ post usum purgantium maximè excruciat, & quia à vaporibus crassis procedit, discussis cessat, affligit.

XIX. *Erysipelas*, quod interdum singulis septimanis, interdum mensibus infestat. ab humoribus ichorosis, peculiari modo corruptis, procedit. In *Curatione* prodest aqua florum sambuci cum aqua Carduibenedicti.

XX. *Vicera*, quæ sicca sunt, nec pus vel saniem fundunt. magis eos, qui temperamento sunt bilioso, infestant. non tantum crura, sed & alias partes occupant. interdum ita gangrenosa fiunt, ut nec ferrum quidem inflictum sentiant. *Curari* debent citra ullam mordicationem aut dolorem. becabunga sola in cerevisia cocta, bis de die imposita, multum præstat: sed & unguentum *Diapompholygos*, in putredine magna aliquid *Mercurii præcipitati*, vel *Spiritus vitrioli* admiscendum.

XXI. *Th*

XXI. *Tubercula dura in toto corpore*, & tumores magni, qui in inguine, glandulosis corporis partibus, musculorum specie hærent. sine dolore sunt, dum ægri quiescunt, cum cruciatu dum ambulant. si subito erumpant, & mox evanescant, paralyfin prælagiunt. Cataplasma ex *radice consolid. majoris bryonia*, *absinthii*, *medulla panis albi*, in lacte coctis, in curatione laudatur.

XXII. *Atrophia*, quæ in principio, quod facultas ob vitiosum nutrimentum frustretur, procedit, in progressu, quod partibus ab humorum defluxu, vitiosa dispositio sit impressa, oritur. Ad *Curationem* commendatur *Lac caprinum*, si capra anti-scorbuticis alatur. Reliqua omitto. Vide de hoc morbo Sennertum, Hortium, & alios.

TITULUS VIII.

De Renum affectibus.

CAPUT I.

De Renum morbis.

ARTICULUS I.

De Renum angustia.

Renum morbi sunt, *Angustia*, *Inflammatio*, *Calculus*, *Vulnus* & *Vlex*.

Angustia est vasorum in renibus à causis suis inducta obstructio vel compressio.

Signa ipsius sunt, urinæ retentio vel paucitas, & exinde tensionis, & gravitatis circa lumbos sensus, in uno vel utroque latere, &c.

Causæ in Differentiis explicabuntur, continens, in Definitione posita est.

Curatio pro ratione Differentiarum variat.

Sf

Dif

Differentia sumuntur à causis obstructionem vel compressionem inferentibus.

I. Alia est à *tumore*, *phlegmone*, *scirrbo*, *compressantibus*, *nimia siccitate* dum substantia corrugatur & contrahitur; quæ suis se signis prodent. quamvis ultima difficillimè cognoscatur.

II. Alia ab *Humoribus*, viscidis, crassis, lentis, quæ *Cognoscitur* ex ipsorum redundantia, doloris & febris absentia. *Curatur* 1. Evacuazione per alvum vel vomitum. 2. Deterfione, incisione, & Diuresi. Laudantur, Aquæ ex *petroselino*, *ononide*, cum syrupo de *Raphano Fernelii*, spiritus *salis*. Tartarum *viriolatum* cum julebo violato, &c.

III. Alia est à *grumo sanguinis*, qui extra sua vasa excidit, & ibidem concrefcit. *Cognoscitur* exinde, quod mictio sanguinis præcesserit, & causæ inferentes, ut concussio, lapsus, &c. *Dissolvitur*, aqua *charesolii*, *Rubia tinctorum* cum semine nasturtii, spermate ceti, & mumia, ut fiat pulvis.

IV. Alia à *Pure*, quod ibi generatur, vel aliunde affluit. *Cognoscitur* è signis ulceris vel abscessus in renibus, & urina aliquando purulenta. *Curatur* abstergentibus.

V. Alia à *Calculo*: de quo in sequentibus agitur. Observa interim. Interdum id *arenulas* facere, quæ vel in propria renum substantia proveniunt; quæ exinde *Cognoscuntur*, quod duræ sint & rubræ, & illine fluentis urinæ impetu raptæ, in cavum ferantur, pōst in vesicam detrudantur, & in urinā reddita subsideant, & digitis difficulter comminuantur. *Velex* adustione humorum in venis & epate oriuntur, quæque in declinatione febrium tum acutatum tum diuturnarum excernuntur. *Cognoscuntur* exinde, quod non subsideant, sed substantiæ urinæ permisceantur, matulæ urinariæ instar pulveris adhærescant, & facile digitis comminuantur.

A R.

ARTICULUS II.

De Renum inflammatione.

Renum inflammatio, seu Nephritis est eorundem à sanguine in ipsorum substantiam effuso, & ibidem putrescente intumescencia, cum vehemēti dolore, fibrosis aut arenosis excretionibus conjuncta.

Signa sunt, Dolor circa lumbos ad primam vertebam gravativus & extensivus, qui hisce à *Colico differt*, quod in ventrem medium aut in omnem illius regionem murmure nullo evagetur, non semper citata & expurgata alvo mitescat, immanitate & ferocia peritonæum convellat, creber admodum ac frequens est. Febris continens inordinata, quæ modò crescit, modò imminuitur, circaque noctem magis exasperatur. Viscerum & ventriculi subversio. Pituitosorum primò, deinde biliosorum per vomitum rejectio. Urinæ cum malum incipit paucitas, tenuitas, aquositas, interdum suppressio, mox ea copia & crassities cum compulso ad mejendum ex ardoris quodam sensu. Stupor & obdormitio cruris propinqui, propter compressionem nervi. Difficilis corporis erectio. Decubitus in ægram partem dolorem demulcens, in adversam exasperans.

Causa est sanguis sive purus, sive mixtus, sive per viam collectionis in renibus coacervatus, sive per viam fluxionis seu à toto, seu à parte detrusus, ut sæpissimè alibi dictum. *Occasionem* fluxui rardant, Renum firmitudo & durities: sæpe medicamenta Diuretica, quæ sanguinem ad renes deducunt.

Curatio est facilior, si hæmorrhoides superveniunt. si abscessu rupto per vias urinæ pus album, læve, æquale, non foetidum evacuat. si ad resolutionem tendit. *Difficillima*, si abscessu post suppuratio-

Sf 2

nem

nem rupto, pus per emulgentes ad epar & intestina viam molitur. si ad indurationem tendat. *Nulla* ferè, si urina alba, tenuis, aut purulenta, absque febris & symptomatum remissione, & crurum ac femorum extenuatione, profluat. *Instituitur*, prout in aliis inflammationibus. *Observandum* tamen, 1. Modicè refrigerantia & adstringentia cum anodynis pro repulsione usurpanda. Extra quidem, ne humores circa externas carnosasque partes consistentes, intrò in renes compingantur. Intra autem, ne, cum adstrictionem suam circa ventrem aut hepar venasque incipiant, vel sanguinem ad renes deturbent: vel meatus angustos coarctando, ischuriam pariant. 2. A purgantibus, quia humores accendunt & exagitant, abstinendum: lenientia tamen & benigna, si bilis in melsaraicis & ventriculo hæret, ne eo devolvatur, exhibenda. 3. Diuretica, nonnisi perfectè sedata inflammatione esse propinanda. Habet hic locum *Tartar. vitriol.* scr. f. cum julepi rosacei & aquæ cinnamomi dr. ii. & alia.

Differentiæ à parte affecta sumuntur.

I. Alia est in *dextro rene*, in qua lumbi in dextro latere dolent, dolor magis ad epar ascendit, crus dextrum stupet.

Alia in *Sinistro*, in qua dolor ad vesicam descendit.

Alia in *utroque*, in qua symptomata utrobique urgent.

II. Alia est in *carnosa renis parte*, in qua major gravitas afficit.

Alia in *partibus*, in quas arteria terminantur, in qua pulsans dolor urget.

A R

ARTICULUS III.

De Calculo Renum.

Calculus renum, est substantia solida & lapillosa, mucilaginea, limosa, tartarea, facultate *διόρσιντις* instructa, in renibus, adjuvento caloris exorta.

Signa sunt præcipua quinque. 1. *Dolor*, qui in lumbis afficit, sensum gravitatis, propter renum substantiam sensus expertem infert; in descensu in ureteres, propter ipsorum, qui densa & crassâ membranâ constant, distractionem augetur; si præsertim sit crassiusculus, salebrosus & asper. A *Colico* distinguitur, quod nec sit tam gravis, nec tam amplus, quod figatur, & regione renum circumscribatur, & si in vesicam incidit, ductum ureterum sequatur, nec cum flatibus afficiat. 2. *Urina cruenta* propter vulnerationem partium, quas transit. quæ principio est pauca & aquosa, mox suppressâ, remoto è renibus calculo turbulenta, & arenosum sedimentum habens. 3. *Stupor* crurum, qui in dolore colico non accidit, quia musculus, cui ren incumbit, quique cruri flectendo dicatus est, & in cruris partem anteriorem inferitur, comprimitur. 4. *Testiculi* ejus lateris, propter vicinorum vasorum, quæ ad testes tendunt, iisque inferuntur, retractionem, *retractio*. 5. *Nausea & vomitus*. Nam renes cum ventriculo mediante peritonæo, cujus membranâ utrumque viscus participat, connectuntur, & bini sextæ conjugationis nervi à stomacho orti, in internam renum runicam implantantur. *Arenularum excretio* fientis calculi signum est.

Causa est, non *pituita*, multi enim ea infestantur, quibus cum calculo nihil commercii: & multi sunt calculosi, qui accuratam vitæ rationem

servant: sed *succus lapidescens*, hinc calculosi sæpe urinam reddunt, quæ mucum refert, mox in lapidem concrefcit. *Provenit* autem is ex fæculentia alimentorum, quæ si retineatur, huic vel illi parti se agglutinat, per novum materiæ appulsum quotidie augetur: aucta sensim exsiccat, atque ubi materiam viscosam, crassam, terrestremque apprehendit, eam coagulat, & adveniente postea spiritu salis microcosmici interno, & quem ob naturalem suam visciditatem, seu mucilaginitatem Tartarum istud facile recipit, inque se recondit: tandem in perfectum tophum coagulatur.

Curatio est difficilis, si bullæ per aliquot dies stabiles in urinis visuntur; quia magnam tartareorum ac mucilaginosorum humorum copiam, unâ cum flatibus in renibus abundare, indicant. si urina manet subtilis, & sic aliquando perdurat, quia ingentem obstructionem arguit. si ex eo ulcus renum exoritur. si æger est ex parentibus nephriticis. *Respicit* 1. *Præcautionem*, ne vel generetur, vel augmentum capiat. Et tum 1. *Victus ratio* est habenda, in quo Cibus & potus ad calculum faciens fugiatur. Cibi oppositi sunt in usu. Intereos laudantur, *Asparagi* modicè decocti, cum oleo aceto & butyro, prima mensa sumti, fructus *Cynosbati*, *Acini ipsius* in jusculis decocti. *Charesolium*, *raphanus*, ol. *olivæ*. & *Amygdal. dulcium*. 2. *Materia collecta, maturè, ne concreseat, evacuanda*. Vomitu singulis mensibus bis vel ter adhibito, Medicamentis lenioribus, *cassia præsertim, terebinthina*, & hydragogis. Commiuentibus si quid concrevit, inter quæ, Decoctum ligni nephritici, hadera terrestris, succus de *veronica* cum aqua, & alia (de quibus infra) laudantur. 3. *Renēs ad suum statum reducendi*, & hic valet, venæsectio si epar intemperiem calidam in iis excitavit. Aquæ fragorum, portulacæ, hordei exhibitio,

bitio, & frigidior. unguentorum inunctio. 11. *Geniri calculi sublationem*, quæ, perficitur 1. *Primarum viarum per evacuantia molliora*, flatus discutientibus castigata, mundatione. 2. *Venæ in brachio sectione*, si plethora in toto, & dolor est ingens; malleoli vel poplitis, si ad partem affectam decubuit. 3. *Viarum laxatione & lubricatione*, intra syrupo de *Althæa*, *Liquiritia*, *Violarum*. Extra, *Unguento ex unguenti dialthæa* dr. ii. pingued. gallinæ, medullæ cervinæ recentis ana dr. j. olei liliorum alborum dr. j. scorpion. scr. ii. ol. ceræ stillatæ & spirit. Terebinth. ana scr. j. ceræ & croci pauxillo, composito. *Balneo aquæ dulcis*, in quo sumi possunt, oleum Amygdal. recent. unc. ii. ol. Tereb. gutt. vi. cum vini calidi haustulo. 4. *Calculi remotione, comminutione, & expulsionē*, per medicamenta id præstantia. *Præstantiora* sunt ex simplicibus; Magisterium Tartari vitriolati, Oculorum cancri, Mandibula lucii piscis & lapidis Indaici. Lapis prunellæ, Essentia Crystallosum, Lapis nephriticus. Aqua vitæ juniperi. Horstius T. 1. p. 481. Ex compositis, Confectio seu conserva lapidis nephritici Zacuthi. l. 8. c. 16. Liquor Nephriticus Mynsichti Armament. p. 338. Mistura ex magisterio Tartari vitriolati, solut. oculor. cancri, lapide prunellæ, sale volatili succini, & aqua saxifragiæ Untzeri. Ejusdem vinum generosum, in quo raphanus acris decortic. & in taleolas concisus, per integrum diem maceratus erat, cum magisterio oculorum cancri & spiritu salis exhibitus. Mistura Musseti Angli, Cistæ Medicæ p. 34. Libavii, ex aqua saxifragiæ albæ; cum saccharo violaceo & rosaceo collata, cum pauxillo spiritus vitrioli. Expulsorium calculi Zuingeri. Cist. Med. p. 35. 111. *Doloris amotionem*, quæ unguento superius ad viarum laxationem præscripto, hemicupio cum anodynīs parato,

Cataplasmate Cratonis, ex parietaria, petrosel. cepis, &c. perficitur. IV. *Flatuum discussione*, si qui sunt. Vide de Calculo egregios, & sufficientissimos *Vntzeri*, *Francisci Collatii*, & *Beverovicii* tractatus.

ARTICULUS IV.

De Ulcere & Vulnere Renum.

DE Ulcere renum hæc observasse sufficiat.

I. Rarò admodum illud ex *abscessu phlegmones* à profluentis materiæ acrimoniâ renem exedente, ictu vel casu venas disrumpente, accidere: si tamen accidat, curationem, ut humorum allapsus diæta, venæ-sectione, & purgatione sistatur: Iidem allapsi, refrigerantibus, nephriticis temperentur, Terebinthina cum vitello ovi in liquorem, vel cum pulvere liquiritiæ in bolum redacta, evacuetur, requirere.

II. Semper verè à calculo intus coërcito fieri, qui vel ponderè renem contundit, vel attritu comminuit exeditque. Tum urina, antequam purulenta esse incipit, cruenta præsertim ab exercitatione & labore evadit. febris nullà vel obscura fatigat. si quando obstructo ureteris capite pus cohibetur, id sensim vel per emulgentem, in majores venas redundans, sanguinem habitumque corporis inquinabit; vel eâ sede congestum, ilia lumbosque distendet, è quibus etiam aperta cute, diu multumque manat.

III. In Curatione omnibus aliis palmam, *Decoctum petroselini*, à *Doringio in Mithridatotechnia* p. 150. descriptum, præripere.

De Vulnere Renum hæc notasse satis erit:

I. Cognosci, ex situ, urinæ suppressione vel difficultate, cruentatione, dolore ad inguina extenso.

II. Dividi in illud, quod est in superficie & parte carnosa, & tum sanguis multus effluit, urina non

non egreditur, fortiora glutinantia statim adhiberi posse. Et quod ad ipsam usque cavitationem penetrat, & tum sanguis cum aqua egreditur. In Curatione, sanguis est sistendus: Hoc subsistente glutinantia immittenda & imponenda, ac valet hic unguentura sanctum *Andreas à Cruce*, quod in Sennerto vide, &c.

CAPUT II.

De Renum Symptomatibus.

DE Renum symptomatibus, *Seri*, nimirum *laxa secretionem*, & dolore, pauca occurrunt.

I. *Seri secretio* læditur, vasorum emulgentium & renum vitio, quæ vel intemperie frigida laborant, & tum urina subito non supprimitur: Vel angustia, de qua superius. In Curatione Diuretica hora una vel altera ante cibum exhibenda sunt.

II. *Doloris* ratio ex capite de inflammatione & calculo renum peti potest. In renis situ fixus alterutro latere stabilis est, nisi quod interdum vel ad coxendicem, vel ad testem, qui è directo jacer, ureteris tractu protenditur. Assueti propter dilatatos ureteres non ita facile, nisi fortè sit crassius & scaber, afficiuntur; sed qui nondum, aut certè rarò & leviter nephritico dolore tentati sunt, minimo calculo distorquentur, &c.

TITULUS IX.

De Vesicæ affectibus.

CAPUT I.

De Vesicæ morbis.

ARTICULUS I.

De Vesicæ Calculo.

Vesicæ morbi sunt, *Calculus*, *Inflammatio*, *Vlcus*: quibus *Meatus urinarii angustia* adjungi debet.

Calculus vesicæ quid sit, ex Calculi renum definitione percipi potest.

Signa ejus sunt, pruritus dolorque acerbis in collo vesicæ, pube & perinæo, qui progressionē & vesicæ distentione, ingenti cruciatu torquet, ægri pudendum scalpere & sæpe distendere solent, ac urinam summo cum dolore guttatim reddunt; eaque calculo coeunte tenuis est & clara, colore subalbida, eodem concreto, oleaginis more subsidere solet, cum sedimento arenoso, albo, scabiei simili, si calculus sit friabilis.

Causa & Curatio ex capite de Calculo renum petenda sunt. Si comminui & expelli non potest, excindendus est: de quo vide Chirurgo. *Comminuendo* inservit *compositum* ex salis Tartari albi unc. j. & Aquæ petroselini libr. j. invicem mistis, & per charitam bibulam colatis, colore croceo per cortices aurantiorum donatum; nec non *pulvis millepedum* seu oniscorum, de quo *Laurentbergii* peculiarem tractatum consule; quin & *sanguis hirco* lithotripticis herbis nutriti, destillatus, assumtis in cibo farcimimbus, quæ ex ejus renibus, & cæteris visceribus ac intestinis

testinis confici debent. *Dolori mitigando* prodest *Balanum*, quod illitus scroti, pectinis & perinæi, ol. *composito*, ex ol. scorpion. amygdalar. amaran. axungia cuniculi & gallinar. ana unc. j. f. & succi parietar. dr. ii. formato, insequatur.

Differentia Calculi occurrunt aliquot.

I. Alius est *Exiguus & levis*, in quo vaga & oberrans circa pubem & perinæum titillatio affligit, quique facilius comminui potest.

Alius *paulo grandior*, in quo incumbētis gravitatis pondus percipitur, ut idcirco difficilis & doloris plenus sit per salebrosa loca incessus, multoque difficilius saltatio, mictio crebescit, & urina vix potest cohiberi; quæ est alba, crassa, turbida, cum sedimento purulento, aut narium mucori persimili; quum mejendum est, obviam impulsio calculo, urinæ fluor intercipitur, acerrimus dolor sub emictionis finem, quum calculus urinæ cursu incitatus, quasi proditurus, sphincterem violentius comprimit, alias universum pudendi ductum, alias glandem afficit. mejendi conatum, desidendi cupiditas, quod calculi magnitudo è perinæo rectum intestinum ut vesicæ cervicem exstimulet, comitatur. *Curari* is vix alia ratione potest, quàm sectione.

II. Alius est *concretus*, qui nihil arenularum in urina de se emittit. Alius *non concretus*, in quo aliquas illasque seu albas seu rubras, quæ à renalibus aliis vesicalis calculi signis discernendæ sunt, urina deponit.

III. Alius est, qui in *ipsa vesica nascitur*, cui superius dicta competunt. Alius, qui à renibus per ureteres ad eam descendit, & tum signa calculi renum præcessere, dolor secundum longitudinem ureterum à renibus ad vesicam protensus, aderat, nephriticus vel cessavit, vel minus exercet. Hunc quidam herba Indiana *Payco* Monardi dicta, & aliis frangi posse, credunt.

IV. Alius

IV. Alius est, *qui vesicæ non adhærescit*, ideoque tutius per sectionem extrahi potest. Alius, *quæ summa vesicæ adhærescit*, & *quasi ex illa propendet*; & tum omnia symptomata superius recensita, sunt obscuriora: visi sunt qui nullo dolore illum gestarunt; imò, nulla fere ratione removeri absque ægri dispendio potest: de quo vide Tulpium observ. l. 2 c. 5.

ARTICULUS II.

De vesicæ Inflammatione, Scabie, Ulcere, & Fistula.

Vesicæ inflammatio non tam ipsius substantia, quæ tenuis & exanguis, insidet, quam sphincteri cervicis ipsius musculo.

Signa ejus sunt, dolor in perinæo cum rubore & ardore acerbis, urinæ cum summo mejendi conatu suppressio, alvi (quia rectum intestinum inflammationis magnitudine coarctatur) adstrictio, pubis atque pettinis ad umbilicum propter urinæ copiam distentio.

Causa est eadem, quæ aliarum inflammationum.

Curatio est difficilis, quia affectus; est plerumque circa septimum in primis diem, accedente febris, & urinæ atque alvi retentione, lethalis; si tamen sit levior, & inflammatione in pus mutatâ, abscessus intro rumpatur, & per urinam evacuetur, melior spes est: sed & Erysipelate juxta cutis superficiem oborto, ac urinâ copiosâ emissâ, repente interdum solvitur: *Instituitur* ad modum aliarum inflammationum. *Repellentia* non diu applicanda sunt, quia vesica membranosa est, & facillè constringitur, urinâ suppressa, & nervi læduntur.

II. *Scabies vesicæ cognoscitur* ex pruritu in pettinæ, urinæ gravi odore, furfuraceo sedimento in fundo residente. *Oritur* ab humoribus acerbis & salis, superficiem illius internam erodentibus. *Curatur*

in

in senibus ægrè. Humores sunt partim evacuandi, partim demulcendi, per semina quatuor frigida, flor. violarum, fraga, vel intus assumpta, vel extus per urethram injecta.

III. *Vlcus vesicæ* quid sit, non est quod dicatur. Patet ex superioribus.

Signa ejus sunt, squammulæ & pus, quæ cum urina duntaxat effluunt, & in urina subsident, & sic ab exulceratione meatus urinarii, in quo pus & sanies vel urinam prævenit, vel statim in primo exitu apparet, vel etiam sine urinâ effluit, distinguitur. Adest & indefinens circa vesicam, pubem, & perinæum cruciatus. Urina quoque est crassâ, & modò à pure, modò à sanguine perfusa, &c.

Causa sunt variae: de quibus in Differentiis.

Curatio est *Exigua spei*, tum quia vesica est membranosa; tum quia urina, quæ mordax, continuo decursu, consolidationem impedit. *Instituitur* ad modum aliorum ulcerum.

Differentia à causis præcipuè sumuntur.

I. Aliud est à *Cantharidibus*, & tum, si recens est, lac copiose exhibendum; mox consolidandum: si inveteratum, ut alia ulcera curandum.

Aliud ab *Urina acriore*, quam vini meraci & ciborum calidorum usus intulit, & tum refrigerantibus diureticis agendum.

Aliud ab *Humoribus acerbis vel salis, superficiem ejus internam quasi erodentibus*; & tum 1. *Evacuandum* cassia & terebinthina. 2. *Temperandum* Nymphæa, lactuca, Endivia, &c.

Aliud à *Calculo*: de quo superius.

II. Aliud est *in fundo*, in quo dolor circa pubem percipitur.

Aliud *juxta meatum urinarium*, in quo tempore mictionis dolor magis deprehenditur, & in primis ubi mingere incipiunt & desinunt.

IV. Fi-

I V. *Fistula* curationem vide in *Langio*, l. 3. E-
pistolâ quinta.

ARTICULUS III.

De Meatus urinarii angustia.

Meatu urinarii angustia, est ejusdem à causis suis
profecta, & urina suppressionem inducens, in-
terceptio.

Signa, *Causa*, & *Curatio*, si in genere affectum
istum spectes, nihil habent singulare.

Differentiæ ex causis petuntur.

I. Alia est ab obstructione, quæ fit i. Aut à
Calculo; quæ cognoscitur ex eo, quod signa calculi
præcessere, urina modò liberè redditur, modò inci-
dente calculo ex fundo vesicæ in ipsius orificium,
repente supprimitur, dolor ad radicem vesicæ ma-
gis urget. *Curatio* consistit in Remotione ejusdem
per concussionem crurum, si magnus ad orificium
hæreat; per deductionem ad meatus urinarii extre-
mum, si parvus loco moveri potest; per fomenta la-
xantia, & calculum frangentia, si digitis loco mo-
veri non potest. ii. Aut à grumo sanguinis, quæ
Cognoscitur ex eo, quod vulnus vel ruptura vasis
præcessit, sanguis cum urina effusus fuit. Extra, ci-
nis communis cum melle apponi potest. iii. Aut
à Pure, quod aut in renibus, aut in vesica fuit, aut
rupto in superioribus abscessu eò delatum est. iv. Aut
à pituita crassa & viscida, & tum Urina ferè totali-
ter supprimitur, signa pituitæ adsunt: incidendum,
& attenuandum est.

II. Alia est à Constipatione, per carunculam,
callum, verrucam, in meatu urinario enata, quæ co-
gnoscitur ex eo, quod nec urina liberè excernatur,
nec semen emittatur, graves dolores adsint, cathete-
re vel candela cerea immisâ exploretur. Quia verò
urina

urina semper similiter profluit à calculo; quia nun-
quam ferè totaliter intercipitur ab obstructione pi-
tuitosa, eà ratione dignoscitur. *Curatur Absumen-
tibus, & consolidantibus*. Ex illis laudatur, præmissis
universalibus, inter quæ Chinæ & Sassafras decocta
pono, Ol. Mercurii cum pauxillo sacchari saturni &
camphoræ. Pulvis ex Mercurii dulcis unc. f. Anti-
monii crudi unc. j. Tutia præpar. dr. ii. conforma-
tus: de cujus usu consule chymiatrîam Hartmanni.

III. Alia est à Compressione, quæ fit; aut ab in-
testino recto frigido; aut partibus vicinis inflam-
matis; aut pene & collo vesicæ intumescens; aut
cervice vesicæ contortâ; aut vesica in scrotum
delapsâ. *Curatio* ad morbos obvertenda est.

CAPUT II.

De Vesicæ symptomatibus.

ARTICULUS I.

De Incontinentia Urinæ.

Vesicæ symptomata, Incontinentia urina, Dia-
betes, Ischuria, Stranguria, Dysuria, Mictio
cruenta, purulenta, &c.

Incontinentia urina est ejusdem, propter sphincte-
rem resolutum, vel vesicam compressam, sine acrimo-
nia & doloris sensu, præter imperii arbitrium emissio.
Signis in tam manifesto affectu opus non est.

Causa in sphincteris resolutionem (de cujus causis
in Differentiis,) & vesicæ compressionem conjicitur:
quæ fit, aut à musculorum abdominis convulsione;
aut à foetus circa ultimos menses magnitudine; aut
à tumore supra vesicam posito, quorum in Curatione
respectus esse debet.

Curatio pro ratione Differentiarum variat.

Diffe-

Differentia à Causis resolutionem sphincteris inducentibus & tempore sumuntur.

I. Alia est à *Nervorum*, qui è lumbis in eum inseruntur, paralyti, propter quam se contrahere nequit; & tum difficilior est curatu, si medulla spinalis affecta est, vel ipse musculus vulneratus. Causæ, ob quas fit paralyti, ex capite suo inquirendæ sunt, & pro earum varietate curatio varianda.

Alia sola *sphincteris laxitate* & *mollitie*; & tum neque acrimoniam, neque exsuperantiam urinæ, animalibus viribus sopitis, ægri ferri possunt. Laudantur in ejus cura, *Diacymnum*, *Thus* è vino potum; *Guttur galli* tostum & exsiccatum, ut in pulverem teri possit, sub noctem cum vino adstringente rubello exhibitum; *vesica capra* in clibano exsiccata, & pulverizata dr. j. pondere, similiter exhibit.

II. Alia est *Diurna* etiam, quæ apoplecticos & paralyticos affligit.

Alia *Nocturna*, quæ pueris ob muscoli frigidam & humidam intemperiem, vel inanimadvertentiam, accidere solet. successu ætatis, sicciore & robustiore vesicæ musculo, desinit. propter continuum potum, ad mortem adultos plerumque insequitur.

ARTICULUS III.

De Diabete.

Diabetes est celerrima & copiosissima potus non transmutati emissio, ab intensa renium atrectrice exorta, & cum siti valida & perpetua affligens.

Pars affecta sunt Renes, ita tamen, ut & vesica, copia urinæ pressa, consentiat.

Signa sunt, mictus copiosus, parum vel non mutatus, sitis valida, nec ulla ex liquoris alicujus ingestione satietas, dolor, punctura, & gravitas circa lumbos,

lumbos, totius corporis colliquatio ventris ariditas & siccitas.

Causa est inter Medicos controversa, Nos, Renum attractricem intensam, à validè calida earundem intemperie exortam, ponimus, quam affluxus humorum acrium & mordacium, bilis nempe & pituitæ, falsæ, renum substantiæ impactorum, inferunt: nimia amplitudo vasorum emulgentium & ureterum, epatis caliditas, febres pestilenciales, retractoris ventriculi infirmitas, juvant. Sic, cum renes copiosius serum è venis trahant, nec id ob imbecillitatem continere queant, ad vesicam ablegant: venæ rursus è jecore, hoc ex ventriculo trahit. Unde hujus officio inanito & exsiccat, sitis continua oboritur, &c.

Curatio est nimis *Difficilis*, & plerumque in hecticam & totius corporis siccitatem transit. *Insti-tuitur* I. Renum intemperiem corrigentibus, ubi & venæsectio locum habet. II. Humorum acredinem obrudentibus, & sanguinem ac cum eo humorem serosum ad motum tardiores reddentibus. Prævalere creduntur, *Essentia croci Martis* à Crollio descripta, *Balnea ex aqua ferrariorum* parata, potus sed exiguus ex decocto cornu cervi, sal Coralliorum, &c.

Differentias quod spectat, unica illa est.

Alius est *Diabetes exquisitus*, de quo jam egimus.

Alius *Nothus*, qui nihil aliud est quam profluvium urinæ colliquativum, dum succi in venis aut ipsa corporis substantiæ in serosam saniem transmutantur, quæ à renibus attracta, per eandem elabitur, inque vesicam descendit.

ARTICULUS III.

De Ischuria.

Ischuria est urina ob frustrationem facultatis expultricis suppressio, ita ut hujus nequaquam exire possit.

Signis in affectu manifesto opus non est.

Causa est facultatis expultricis frustratio, cujus causas in Differentiis exponemus.

Curatio est maturanda, ne in totum corpus reurgitet, jecur opprimat, sanguinem inficiat, & suffocationis periculum inducat. Sæpè humores putrescent, febres accenduntur, & nisi ante septimum diem mingant, ægri pereunt. Nulla est, si ob lethales accessiones concursus suboritur. si ob sauciatam spinam aut vertebrarum luxationem accedit, si singultus vel tenesmus supervenit. Respicit 1. *Ipsum symptoma*, ut urina provocetur. Hic occurrunt, compressio abdominis halitu compresso. Catheteris, nisi obster inflammatio vel candelæ cereæ oleo amygdal. dulcium illitæ immissio. Glandes & clysteres aciores, propter communionem intestini recti cum vesica. *Fomenta* pubis & perinæi decocto parietariæ, meliloti, chamæmeli. *Cataplasmata* ex raphano rusticano tuso, & in butyro frixo. Exhibitio, succi gammari pistati & per setaceum transmissi, cum vino; salis corticum fabarum. *Decocti* Rhamni in vino: flor. tunicæ cum radice in umbra siccatorum: cum vino cydoniorum, &c. 11. *Causas symptomatis*, de quibus in Differentiis.

Dividitur Ischuria dupliciter.

I. Alia est à *vesica morbis*: quæ cognoscitur ex eo, quod assiduum mejendi desiderium premat, pubes collectâ urinæ copiâ distendatur, ac doleat, immisso cathetere copiosior urina cum levamento profuat.

fluat. Morbi illi sunt: 1. *Stupor*, propter quem stimulum non sentit, seu ob nervi paralytin & obstructionem, seu ob spirituum aversionem; & tum, etsi vesica sit plena, nullum est mingendi desiderium, & nullus dolor percipitur. 11. *Intemperies frigida*, à causis refrigerantibus contracta; & tum causæ præcessere, diuretica locum non habent, nisi corpore purgato. 201. *Angustia*, seu propter musculi cervicem circumdantis tumorem; seu propter calculum, & alia quæ suprà allata sunt. Ab hoc, emulsione ex feminis violar. purpurear. cum aqua veronicæ facta interdum tollitur. 1v. *Extensio nimia*; & tum urina præter voluntatem diutius retenta fuit. Fomentum parietariæ cum oleo amygdalarum dulcium agendum est.

Alia à *mentus urinarii angustia*, quæ cognoscitur exinde, quod vesicæ compressione urina non reddatur, & quod catheter cum difficultate immittatur, Curationem suo capite vide.

II. Alia est *Exquisita*: de qua modò actum est.

Alia *Notha*, quæ cognoscitur ex eo, quod vesica inanis & vacua sit, ita ut ne immisso quidem cathetere, urinæ quicquam effluat: nullavel gravitas vel tensio, vel dolor circa pubem vel premendo percipiatur. *Oritur*, vel *vitio Renum*, qui urinæ materiam, seu ob proprios morbos, de quibus superius, seu ob errorem externum, quod nempe serum vel absumentum, vel ad alias partes conversum sit, non attrahunt, aut non expellunt. Vel *vitio Preterum*, qui vel adstringuntur, vel obstruuntur; & tum laborans utriusque renis dolori fuit opportunus, lumborum summa gravitas est, ac vehemens interdum dolor undique excruciat, nulla aut minima mingendi cupiditas urget. Cæterum *Specificæ* in hoc morbo esse creduntur, *Vermes terreni* n. v. triti, & cum vino mulso bibiti, *Testa ovi* expurgata, è qua pullus exiit.

Vrina hirci calidè epota, omento & intestinis ad ventrem applicatis, &c.

Ad *Ischuriam* pertinent, *Vrina imminutio*, quæ in febribus malignis & acutis ideò mala, quia nervosum genus affici indicio est: & *Vrina tarditas*, quando illa per longiora quàm solet intervalla excernitur. Quia ab *Ischuria* secundum magis & minus duntaxat differunt: ideo de iis pluribus non agemus.

ARTICULUS IV.

De Stranguria.

Stranguria est *urina guttatim facta cum vel sine dolore, & continuo ad mingendum stimulo, excretio, ab assidua expultricis vesicæ, propter affectum sphincterem, stimulatione, vel retentricis minime etiam onere gravata debilitate, exorta.*

Signa manifesti affectus sunt evidèntia.

Causa in definitione exposita est, nempe irritatio expultricis, vel retentricis debilitas: unde verò ista sint, in Differentiis exponetur.

Curatio est *Exigua vel nullius fere spei*, si ileo à crudorum & crassorum humorum obstructione proveniente, nulla insequente febre, quæ humores attenuet, supervenerit. *Instituitur* pro diversitate causarum, de quibus infra.

Differentia ex Causis sumitur.

Alia est *Dolorifica*, ab irritatione expultricis procedens, & *Oritur* i. Ab *urina acrimonia*; quæ, Aut à *Causis externis* infertur, ut cibo & potu calidiore & saliore, ex cerevisia recente & defæcata. quæ cum commodè coqui non possit, & vim humores fermentandi, alvumque laxandi habeat, si ad renes citò deferatur, cruda ad vesicam fertur, & eam stimulat. Tum potus vini Hispanici vel Malvatici, Nux moschata,

schata, Axungia hirci in umbilicum immissa, multum profunt. Aut ab *Internis*, nempe i. *Humoribus acribus*, vel ibi productis, vel aliunde transmissis, qui viscosi lentore suo orificio vesicæ adhærent, & eandem interdum, diuturniore adhæsi exulcerant. *Cognoscuntur* ex eo, quòd urina sit rubra & flava, acris sentiatur morsus, calor & sitis adsit. *Curatio* exigit *Evacuationem* per cassiam & terebinthinam. *Temperatorem* per refrigerantia & humectantia, nec non balneum aquæ dulcis. *Vrina promotionem* per Sal glandium, stipitum fabar. scr. s. Ol. Ceræ gutt. iii. in decocto cicerum rubrorum; per *pulverem* lapillorum ex capitibus limacum expressorum in vino datum. 2. *Pure*, ab epate, renibus, vel aliunde transmissis; & tum ejus aliquid in urina apparebit. serum lactis cum saccharo rosarum prodest. III. A *Calculo*, qui vesicam excoriat, cujus est ratio habenda. IIII. Ab *Inflammatione*, de qua superius dictum. IV. A *Vicinarum partium affectu*. Nam ad recti intestini & uteri inflammationem, purulentosque renes, stillicidium sequitur. In procidentia uteri τὸ ἐξ οὗ τοῦ ἐκείνου ἐκίονος καὶ δολιγὸς καὶ δολιγὸς.

Alia *simplex* & sine dolore, quæ cognoscitur ex urina alba, aquosa, ætate, complexione, victus ratione frigida, causi antegressione: *Oritur*, vel à *vesicæ ipsius* & musculi cervicem claudentis refrigeratione; & tum Diagalanga, Mithridatium, &c. bene intus sumuntur. Ol. Rutæcum bene extra illinitur. Vel à *compressione vesicæ*, quod in gravidis accidere solet.

ARTICULUS V.

De Dysuria.

Dysuria est *urina ardentis, interdum paucæ, interdum copiosæ, cum cruciatu sine interruptione red-*

Tt 3

ditio.

ditio, à causis tam externis quam internis, meatum urinarium afficientibus exorta.

Signa sunt evidētia. Nam ipse dolor ab ægro faciliè percipitur.

Causæ sunt, quæcunque continuitatem colli vesicæ aut meatus urinarii solvere, seu dolorem inter mingendum excitare possunt.

Curatio est difficilis, si in senes decrepitos incidat, si simul urinæ suppressio accadat. Respicit I. Causam, quæ amovenda, per superiùs dicta evacuantia, quæ Essentiæ Terebinth. dr. j. cum aqua Petroselinii, & syrupo citri excipere debet. II. Dolorem, qui mitigatur lacte tepido per catheterem infuso, pudendi in vas lacte plenum immersionem, cataplasmate ex parietar. cum oleo scorpionum, &c.

Differentias causæ dolorem excitantes suppeditant.

Alia est ab Externis, ut Cantharidibus; & tum Lac prodest. veneno, & tum Alexipharmacis agendum.

Alia ab Internis, quæ sunt I. Urina acrimonia: de qua suprâ. Juvat aqua ex floribus fabarum vel siliquis recentibus cum syrupo de liquiritia vel papavere unc. vi. pondere ante cibum exhibita: nec non Electuarium Fallopii apud Schenk. in Exoter. Experim. Cent. iv. 19. II. Inflammatio, cujus dolor exacerbat urina ad urinam emittendam contractâ, & ab emissâ compressâ, quam sæpe sequitur Exulceratio. III. Calculus inter mingendum vesicæ cervici illisus. IV. Semen in masculis morum, sed in ductu hærens, & acrimonia contracta meatum erodens, quod in lue venerea accidere solet. V. Materia alba & lactea, quæ interdum tantâ copiam emittitur; ut dimidiam matulæ partem ubi subfedit, occupet, quæque à vitiata concoctione, in qua partes salis & tartareæ, separatæ non sunt, sed à renibus attrahuntur, oritur. Curatur, universalibus præmissis, vini Hippocratici vel Malvatici usu.

ARTI.

ARTICULUS VI.

De Mictu cruento, purulento, & pilari.

Mictus Cruentus, est sanguinis una cum urina excretio, ob ejusdem in vesica congectionem exorta.

Signa sunt, quod urina non splendeat, habeatque aquæ, in qua recens maceratorum animalium caro abluitur, colorem.

Causa in definitione exposita est: & in Differentia plura dicentur.

Curatio est maturanda, si est malum inveteratum, ne in tabem vel cachexiam incidat. si copiose emittitur, ne in vesica subsistat, & putrescat. Ad causam obverti debet, Symptoma, cæteris paribus adstringentia, condensantia, & consolidantia reposcit, inter quæ millefolium folio albo. Tinctura smaragdi, arcanum agrimonie & quinquefolii. Decoctum Mynsichti, &c. excellunt.

Differentia à partibus sanguinem fundentibus sumitur.

Alius est à Renibus, qui ex eo cognoscitur, quod copiosus sit, urinæ toti exquisitè permisceatur, ut eâ quasi dilutus tenuis sit, rubicundus, liquidus ac minimè concretus subsideat. Oritur vel à vasis alicujus in iis anastomosi: & tum copiosus & floridus redditur: aut violentia aliqua, aut vulnus præcessit: aut plethoræ signa adsunt; aut sanguis tenuitate peccat. Vel ab ejusdem erosione, & tum sanguis minore copiâ excernitur, in initio præsertim. Vel à Αλγινδισει; & tum urina leviter rubro colore tincta est. Curatio etiam venæ in brachio sectionem reposcit: quam adstringentium intus & extra usus excipere debet. Trochisci Gordonii valent.

Alius est ab Epate, vel imbecillo vel sanguine gra-

Tt 4

vato.

vato, vel iisdem morbis, ut jam dixi affecto; & tum signa adfectorum renum nulla adsunt. Caput de epatis morbis consulendum est. Huc pertinet Hæmorrhoidum suppressio, de qua suo loco; ureterum à calculis transeuntibus vulnus, à quo paucissimus sanguis effluit, &c.

Alius à *Sphinctere cervicis musculo*; & tum urina non æqualiter perfunditur, sanguis subsidens in grumos abit, dolor plerumque mejendo premit, ac veluti penis radicem adurit, alia vel ulceris vel ruptæ venæ signa adsunt. *Curatio* est eadem.

Alius ab *intimo virga meatu*; & tum sæpe sine urina exit, quicquid urina effluit, concretus statim subsidet.

II. *Mictus purulentus*, est excretio saniei cum urina in vesica congesta. Congeritur I. *Vitio ipsius vesicæ*, seu quod ista ulcere laboret, seu quod sanguis in vesica contentus in saniem convertatur; & tum pus minus permixtum urinae, cum squammulis fursuracæis excernitur. II. *Vitio ureterum*; & tum paucum capillorum specie innatat. III. *Vitio meatus urinarii, vasorum spermaticorum, & parastatarum*, & tum primo loco sincerum prodit. IV. *Vitio Renum, jecoris, thoracis*, quatenus illæ partes pus per venas ad vesicam transmittunt; & tum pus accuratè urinae permiscetur, si quid crassius seorsum est, sub finem manat.

III. *Mictus pilaris* seu *Trichiasis*, est ubi cum urina, materia mucosa nunc pilis aut capillis, nunc tenuibus foliis similis excernitur. Pili isti aliquando unius aut duorum palmorum longitudinem æquant. *Causa* illorum est crassa & viscida pituita, in venis à calore exsiccata & coacta, quæ in longo per angustas renum & ureterum venas transitu, in tantam longitudinem extenditur. Vide de eo *Epistol. Medicarum* sect. quintam *Horstii*. In Curatione, *Spiritus terebinthinæ cum syrupo Altheæ* præstat.

TITULUS

TITULUS X.

De partium genitalium in viris affectibus.

CAPUT I.

De Earundem morbis.

ARTICULUS I.

De morbis Testium.

Partium genitalium in viris morbi, habent sub se morbos *Testium, scroti, & virgæ*.

Morbi Testium præcipui sunt, qui sequuntur.

I. *Intemperies*, & ista, vel *Calida*, quæ *Cognoscitur* ex propensione in venerem, semine multo nimis & calido, testium calore, venarum circa illos à sanguine turgescencia. *Curatur*, oppositâ diætâ, & Medicamentis refrigerantibus, è *lactuca*, *Nymphaea*, *portulaca*, sed imprimis *saccharo saturni* & *foliis salicis composita*. Vel *Frigida*, quæ *Cognoscitur* ex semine paucò & aquoso, ejusdem cum nulla vel exigua voluptate emissionem, exigua in venerem propensione, præcessere causâ refrigerantes, vel etiam immoderata & intempestiva venus. *Curatur*, oppositâ Diætâ, & medicamentis sumtis; intra, *Betonica*, *Calamintha*, *Majorana*, *Salvia*, *Vrtica*, *Nuxmoschata*, *diamoschum*. Extra, *ol. Costinum*, *Nardinum*, *de formicis*. Vel *Humida*, quæ *Cognoscitur* ex eo quod semen nimis citò emittatur. Vel *Sicca*, quæ paucum & crassum suppeditat. *Curantur* oppositis.

II. *Tumor*, qui aut est *Inflammatiô*, in cujus Curatione, (de reliquis enim non habeo quod dicam, observa. 1. Dum medicamenta illis applicantur, ligaturam semper versus superiora tendere debere, ut minus dependant, & fluxus minor sit. 2. Ad in-

T t 5

ter-

terciendum fluxum, ad latus pubis, ubi venæ & arteriæ ex abdomine ad testes & scrotum tendunt, intercepti ponendum esse. 3. Laudari, paribus cæteris, *Decoctum* agrimonie cum vino & aceto; *radicem* cucumeris agrestis similiter decoctam. *Herbam* Paridis viridem contusam & applicatam, &c. Aut *Scirrhus*, seu alius tumor frigidus & durus, qui ex malè curatâ inflammatione sæpe oritur. Tollitur *Cataplasmate* radic. lactucæ ex mulsa coctæ, cum farina lini, hordei, scœnugræci, cæpis, &c quod insequatur *linimentum* ex Balsamo sulfuris & *Emplastrum* Diasulfuris. Aut *Inflatio*, cui curandæ inserviunt folia *Hyosciami*, & aquæ juniperi unc. j. pondere singulis diebus haustus, cum Rotul. Diacymini.

III. *Ulceræ*, quæ quia in loco humido, sunt periculosa, & interdum in Cancrum seu gangrænam abeunt. Lavari debent *decocto* rosar. folior. veronicæ, & plantaginis. *Unguento* Apostolorum mundari possunt.

IV. *Contusio*, quæ cum ingenti dolore conjuncta est, ovalem ipsorum figuram corrumpit, & gignendi sæpe facultatem demit. Occurrendum est maturæ dolori, ne affluxus conciteretur.

ARTICULUS II.

De morbis Scroti.

Morbis scroti sunt *Inflammatiō*, *Excoriatio*, *Vulnera*, *Ulceræ*, & *Hernia*. De illis non est quod aliquid dicatur. *Excoriatio*, epidermide erosa sæpe à lotio fit, & pompholygis, vel myrtiaridæ subtilissimè tritæ, cribratæ, & cum thure vel myrrhâ mistæ, adpersione curatur.

Hernia scroti est ejusdem tumor, vel ab omento in ipsum delapso, vel à flatu aut aqua ibidem collectis, aut massa carnæa ibidem genita, exortus.

spe-

Species ipsius sunt quatuor, si *Differentias* spectes.

I. Alia est *Ventosa*, seu *πνιδματικήλη*, quæ *cognoscitur* exinde, quòd scrotum interdum etiam testes, valdè sine pondere & gravitate distenditur; flatus, si scrotum manibus prematur, deprehenditur; & de loco in locum cum sono movetur. *Oritur* à flatibus; qui vel ibidem colliguntur, vel à vicinis intestinis & abdomine transmittuntur; puerisque est maxime familiaris. *Curatur*, præmissis universalibus, Carminativis extra & intra adhibitis. Juvat *Cataplasma* ex baccis lauri, farinæ fabar. & scœnugr. fursure, pulvere cumini, ammoniaco, terebinth. oxymelite, & oleo laurino simul mistis.

II. Alia est *Aquosa*, seu *ὕδρικήλη*, quæ *Cognoscitur*, quòd fluctuatio percipiatur, scrotum lucidum quasi appareat: tumor semper ejusdem magnitudinis manet, nec per compressionem in abdomen recedit. *Oritur* ab aqua, quæ plerumque ex abdomine influit, propter causas quarum in hydropes mentio. *Curatur* 1. *Prohibitione*, ne aquosus humor generetur, vel affluat. de qua vide *Differentias*. 2. *Aqua illapse evacuatione*, vel insensibili, cui superius etiam cataplasma inservit; vel sensibili, per scroti apertionem: de qua vide authores. *Dividitur* variè. 1. Alia est à *sola aqua* scrotum distendente. Alia etiam à *flatu* ejusdem conjuncto, in cujus curatione utriusque habenda est ratio. Alia à *Carne* circa testiculum concreta, cujus curatio cautè instituenda, ne in cancrum abeat. 2. Alia est *cum Hydropes*, & tum Curatio ad hydropem obvertenda est. Alia *sine Hydropes*, in qua etsi aquæ tanta copia non est, ut ventrem in tumorem attollere possit; aliquid tamen ejus in abdominis cavitate, ob partium imbecillitatem, accedente imprimis externâ causâ, percussione, &c. colligitur. Tumor vel totum scrotum occupat. Vel unum saltem la-

latus; & *tum* Humor in membrana erythroides testem continente hæret. Nunquam dexter, semper sinister intumescit. *Aut* vitium est in *sinistro rene*, per quem cum serum descendere non possit, per seminalem venam ab emulgente sinistri renis procedentem, in tunicam erythroidem delabitur: à cuius curatione vel abstinendum, vel scrotum in inferiore duntaxat parte incidendum. *Aut* non est; & *tum* scrotum, in superiore parte prope inguina, ut & humor evacuetur, & novi affluxus per cicatricem erythroidis impediatur, secandum est. Vide *Fabricii* Observationes. 3. Alia est, quando *aqua inter erythroidem tunicam & darton* continetur, in qua tumor est rotundior, instar ovi, testiculus visui & tactui occultatur, scrotum ipsum albidius est, & nihil vel parùm intenditur. Alia, quando *extra eam, inter ipsam & pelliculas adjacentes*, in qua testiculus tactui occurrit, scrotum magis intenditur. Alia, quando *in propria pellicula, seu tunica superagnata*, in qua tumor undique conglobatus, alterius testiculi imaginem refert.

III. Alia est *Hernia Carnosa*, seu *Sarcocoele*, in qua aliquid carnosum nascitur. *Cognoscitur* ex tumore duro, sensim aucto, sine inguinis tumore affligente, qua ratione ab hernia intestinali distinguitur: plærumque in testiculo dextro fit, quod natura sanguinem per venam ejus seminalem, à cava ortam, commodissime ad testes depellat. *Oritur* ex sanguine impuriore ad testes & scrotum affluente, sensim ex membranis vasorum exstillante, & à natura nunquam otiosa, in substantiam carni similem mutato. *Curatur* 1. *Repressione*, per repellentia & exsiccantia, pulvis radic. ononidis laudatur. 2. *Sectione*, de qua vide Authores. *Dividitur* in *Scirrhosam*, in qua nec dolor nec calor adest; & *Malignam*, in qua dolor punctorius percipitur.

IV. Alia

IV. Alia est *Varicosa*, seu *Cirfocele*, in qua vasa testiculos nutrientia varicum more dilatantur. *Cognoscitur* ex eo, quod venæ sint turgidæ, & capreolorum more intortæ & conglomeratæ, tumor sit obliquus & uvæ in modum convolutus, vere ac autumnino intestinalis à flatibus distentis, vel pedibus refrigeratis, dolor comiteretur. *Oritur* ab humore melancholico crasso in vasa effuso. *Curatur* difficulter, Exsiccantia, & testium in fascia suspensio profunt. *Sectio* vix sine læsione testis fieri potest.

ARTICULUS III.

De morbis Virgæ.

M Orbi *virgæ* sunt varil.

I. *Disortio*, quæ illis accidit qui veneri nimis indulgent, & diu distento sunt genitali. *Tum* enim spiritus in ligamenti conclusus, in aliquam alterius ligamenti partem impetum faciens, eam relaxat, & fabæ vel glandulæ instar protuberare facit: quo fit, ut, quantum latitudini assuetæ particulæ adjicitur, tantum longitudini detrahatur. *Curatur*, Abstinencia à venere, & illis quæ curandæ herniæ inserviunt. vide *Arantium*.

II. *Inflatio*, & *Inflammatio*, quarum ista interdum ex concubitu cum muliere, cujus uterus est immundus, & acris humoribus repletus, oritur. Nihil de illis singulare occurrit.

III. *Verruca & Excrescentia*, quæ *vellunt* in summo glandis, quæ in fungum canerosum degenerant: *vel* circa glandis carnem, & sub ipso præputio extuberant: suntque molles, fungosæ continuo madent, malè olent, & indies augmentur; iisque qui morbo gallico laborant, familiares sunt. Chirurgiam expolcunt.

IV. *Ulcera*, quæ sunt varia. 1. Alia sunt *Externa*,

na, quæ visui patent, interdum tamen cum sunt circa glandem & præputium, propter membri tumorem videri non possunt. Si glandis regio exulcerata est, medicamenta omnia siccantia esse debent. Alia interna, in meatu urinario hærentia, quæ ex dolore à transeunte urina excitato, & pure ante urinam egrediente pene tumido & tenso cognoscitur. Vel ab apostemate inflammationem insequente; vel ab urina acris; vel à calculis asperis, & asperis transitu lædentibus, oriuntur. Curantur ad modum aliorum.

II. Alia penetrant, ut tam externæ quàm internæ partes exulcerentur, & ulcus ad urinarium usque meatum penetret. Alia non item. III. Alia sunt Antiqua, sordida, & putrida, quæ hydromelite cum vino benè abluuntur. Alia virulenta, qualia in lue venerea obveniunt: in quibus præcipitato, cum linimento conveniente mixtum, donec quod callosum est, absumentum fuerit, utendum. Gangræna si accessit vel sphacelus, secandum est.

CAPUT II.

De membrorum genitalium in viris
symptomatibus.

ARTICULUS I.

De læsa feminis generatione, &
Virgæ erectione.

Symptomata membrorum genitalium in viris sunt Læsa seminis generatio, Læsa penis erectio, Salacitas, Priapismus, Satyriasis, & Gonorrhœa.

Læsa seminis generatio est, quando illud vel non generatur, vel non tale ut generationi inservire possit. Duplex itaque est. Alia, quando semen non generatur: quod fit vel ob defectum materia, seu ob res non naturales,

turales, ut jejunium, vigiliæ; seu ob præter naturales exsiccantes & illam absumentes, cordis inprimis morbus, vel ob ejusdem ab aliis partibus attractionem: quod fit & in puerili ætate, & in pinguibus, in quibus omne alimentum in substantiam corporis mutatur. Vel ob facultatis partium genitalium, seu innatum, seu acquisitum vitium, ut vasorum semen generantium vel deferentium defectum, maleficia, incantamenta, &c. Alia, quando non generatur facundum, quod fit, vel propter materiam minùs commodam, nimis calidam, humidam, aut siccam, vel propter intemperiem partium genitalium frigidam, quæ interdum nimia in prima juventute libidine, unguentis mercurialibus genitalibus illitis, &c. contrahitur. Signis opus non est. Curatio ad causas est dirigenda. Augent verò semen Radix Cynosorchii major, Cubebæ, vitellus ovi recentis cum vino & paucis oleo amygdalar. dulcium, Essentia Satyrionis Crollii, Confectio Magnanimitatis, & de succulata Inda Myrsichti.

II. Virgæ erectio læsa, seu Impotentia virilis, quando illa nullo conatu erigi vel extendi potest.

De Signis non est necesse agere. Causa & Curatio in Differentiis exponuntur.

Differentia sumuntur à causis.

Alia enim est impotentia virilis à semini defectu, seu quod non sit, seu quod vel paucum, vel crudum non stimulet: de quo superius diximus.

Alia est à Spiritus vitalis defectu; vel quod paucus sit, propter cordis frigiditatem & siccitatem, vel quod alio avocetur, quod in meditationibus, timore, verecundiâ, &c. accidit. Vel quod à penis substantia non recipiatur, seu propter membri stuporem; seu propter incantamenta.

Alia est à penis resolutione ex iis causis facta, quarum in Paralyfi mentionem fecimus. Medicamenta huic mor-

morbo servientia vide apud *Stockerum* l. i. c. 55. ubi Satyrionis unc. v. quod cum sanguinis passerum unc. x. misceri debet, & sub brachio teneri potest, mentionem facit. Quidam mirificè venerem excitari dicunt, si dextri pedis pollex oleo, in quo cantharides dissolutæ sunt, illinatur. Sed & pudendorum decocto aquilegiæ simplex ablutio, quam fumigatio dente demortui pulverizato, & super carbones injecto excipere debet.

ARTICULUS II.

De Salacitate, Priapismo & Satyriasi.

Salacitas est nimia in venerem vitio seminis pro- pensio, interdum etiam tanta, ut in furorem vertatur. Vitium seminis consistit. i. In ejusdem copia, seu ex sanguinis abundantia, seu vasorum semini generando dicorum calorem, cujus medio plus attrahitur. In *Curatione* semen absumentibus est agendum; in quibus *mentha*, & *saccharum saturni* excellunt. sed & vena secanda est, & aeger purgandus. ii. In *acrimonia* à cibis calidis, medicamentis & rebus acerbis contracta, quibus occurrendum. iii. In *commotione*, dum exitum quærens pruritum excitat.

ii. *Priapismus* est erectio pudendi circa veneris appetentiam, à flatuoso spiritu, fistulosum penis nervum replente, exorta. Spiritus iste vaporosus oritur, vel in ipso nervo ab intemperie frigida: vel in virga & vasis ex crasso crudoque humore à calore non proportionato, & hic oleum rutæ destillatum locum habet. Plærumque ab ora arteriarum nimis patentia, & dilatata spiritum copiosum effundentia; quia fortè lumbis & renibus calefactis incallescunt, multoque spiritu implentur; quod copioso sanguine abundantibus accidit. In *Curatione*, præmis-

sia

sis universalibus, applicari debent, *Nymphæa*, *semen viticis*, &c. refrigerantia.

III. *Satyriasis est pudendi palpitatio, inflammatoria vasorum spermaticorum affectionem cum tensione consequens.* Accidit potius juvenibus, quam aliis ætatibus. *Curatio* festinanda est, ne in seminariis vasorum resolutionem aut convulsionem delabatur. Cavendum in ea à purgantibus, nisi fortè per vomitum averfio fieri possit; & ab urinam cientibus.

ARTICULUS III.

De Gonorrhœa.

Gonorrhœa est nimia & invita seminis, suo & spermaticarum partium vitio exorta, profusio.

Signa sunt evidentia. Profunditur semen invitis, citra venerem & veneris insomnia, citra colis tentiginem, nullo oblectationis sensu, aut saltem exiguo; unde gracilitas totius corporis, circa lumbos præsertim cum pallore & cavitate oculorum inferitur.

Causa & Curatio in Differentiis explicabitur. Profluvium sistit *Magist. ossis sepia* à gr. vi. ad scr. f. cum conserva rosar. antiqua. *Antimon. fixum* cum aqua plantaginis.

Differentia sumitur à Causis.

Alia est *Vitio spermaticarum partium*. i. *Intemperiei frigida & humida*, quæ vel à causis externis tali vi præditis, ut nimia venere, vel ab humorum affluxu, in quo casu evacuatio & adstrictio calefacientibus admistis locum habet, oritur, & retentricem ipsarum labefactat. *facilius* curatur, modò sit recens, *Terebinthina pulvis* cum lacte per xv. dies exhibitus, prodest. ii. *Laxitatis*, quando folliculi

Vv

se.

semen continentes, vasaque illud deferentia nimium ampliata & laxata sunt.

Alia est *vitis seminis ipsius*, quod est I. *Copiosum*, ex intermissione Veneris, & ciborum bene nutriendum usu; & *tum* venæ sectio, inedia, exercitia, profunt. II. *Acre & calidum* excreticem stimulant, quod ex sanguine simili, ob eparis & renum calorem, provenit; & *tum* priapismus ferè conjungitur; causæ externæ præcessere. *Cura* instituenda, bilis evacuatione, spinæ & lumborum medicamentis refrigerantibus inunctione. III. *Crudum aquosum & tenue*: idque vel ob testium frigiditatem, seu propter assumptorum frigiditatem, seu ob hepatis intemperiem similem; & *tum* semen ad mulieris saltem contactum exit, signa cruditatis adsunt. In Curatione siccantibus & roborantibus agendum. Laudatur *Essentia Terebinth.* dr. j. pondere in syrupo Agrimonix: vel ob humorum vitiosorum in corpore, quæ ad vasa spermatica mittuntur, abundantiam; & *tum* Evacuantibus, & bona diæta agendum. IV. *Virulentum & malignum*, quale in lue venerea contrahitur, quod exinde *cognoscitur*, quod principio virus album aut subcitrinum, è vasis spermaticis sine sensu excidit, tam vigilanti quàm dormienti, quod tempore putret & acrimoniam adsciscit, dum virgæ exedit & exulcerat, unde dolor exoritur, qui & in tentigine quasi funem peni subtenit, & in emissionem tanquam in dysuria acrius stimulat. Id interdum tam altè excavatur, ut foras in penis summam cutem emergat. *Oritur* à spermaticorum vasorum & testium imbecillitate, ex venenatâ lue contractâ, quæ efficit, ut quicquid in his vasis colligitur, in foedum virus facessat, quod contagione alium quemvis contaminat. Quoad *Curationem*, est ista *Difficilis* in senibus, in omnibus, si is præter rationem supprimatur. Intus enim plerumque col-

colligitur abscessus, alias quidem circa testiculum in epididymide; alias in perinæo, qui rupta cute materiam fundit. Abstinentum ab *adstringentibus*, ne rentum partes erodat. Exsiccantia & putredini resistentia, ut sunt, *Acetosa, Theriaca, Mithridaticum*, nec non quæ lue venereæ dicata sunt, profunt.

TITULUS XI.

De partium genitalium in scæminis morbis.

CAPUT I.

De Morbis Cervicis uteri.

ARTICULUS I.

De Tentigine & Cauda.

MOrbi uteri vel sunt *puerendi* seu cervicis uteri, vel *ipsius uteri*. Ad illos pertinent, *Tentigo, Cauda, Angustia, Puscula, Condylomata, Hemorrhoides, & Ulcera*.

I. *Tentigo* seu *frustum magnum*, & *mentula muliebri*, est clitoridis in nimiam molem excrescentia.

Subjectum est Clitoris, seu caro illa nervosa, dura, quam in cervice uteri alæ pudendi junctæ amplectuntur, & in quarum apice ista est; quæque in appetitu venereo turgescit.

Signis manifestus affectus non indiget. moles interdum est tanta, ut per rimam pudendi colli anserini crassitie dependeat, & virile membrum referat, nimium adest coeundi desiderium.

Causa est affluxus nimius vel humoris, vel nutrimenti, ob laxitatem quæ frequenti contactu inducitur,

tur, & ad minimum vestium attritum libidinem excitare solet.

Curatio respicit, 1. *Sanguinis imminutionem*, & alior. humorum educationem, quibus victus tenuissimus & refrigerans, & discutientia, folia inprimis *lenitisci*, *oliva*, inserviunt. 11. *Ejusdem excrescentiæ ablationem*; ubi leniora primò caustica, ut *alumen*, *unguentum Egyptianum*, *Lixivium*, ex quo confici solet sapo cum vitriolo Romano decoctum: adjecto in fine pauxillo opii, & formatis exinde trochiscis, quo pulvere caro aspergi debet, adhibenda: tandem caro præcidenda, vel ligatura, vel sectione, cavendo inflammationem.

II. *Cauda est carnosæ quædam substantia ab uteri osculo exorta, quæ muliebri pudendum replet, & quandoque extra instar caudæ progreditur.*

Signa & Causæ eadem quæ in tentigine, modò quod semina accessum metuant. *Curatio* etiam eadem. si amputanda est, vel equino crine, vel filo serico, in aqua sublimati intincto, vel ferro id faciendum.

ARTICULUS II.

De Cervicis uteri angustia.

Angustia cervicis uteri, est vel ejusdem, vel orificii uteri, seu per compressionem, seu per coalitionem occlusio.

Signa sunt, negatus mensium fluxus, in illis in quibus per cervicem fluere solent. doloris cum pondere sensus.

Causa vel *Naturalis*, quando à nativitate afficit: vel *accidentalis*, de qua in Differentiis.

Curatio pro ratione Differentiarum variat.

Differentia à parte & Causis sumuntur.

I. Alia est *Orificii exterioris*, quod pudendi dicitur,

citur, in qua menses, qui & per cervicem & per uterum fluunt, fraudantur, nec concubitus, nec conceptus fieri potest; quia nec semen, nec mas recipitur.

Alia *Interioris*, quod uteri appellatur, in qua semen receptum illico effluit, conceptio omnino esse nequit.

II. Alia est *per modum compressionis*, quam infert, 1. Omentum pinguius uteri ori incumbens. 2. Crurum divaricatio. 3. Calculus in vesica. 4. Tumor in intestino recto: de quibus suo loco.

Alia *per modum coalitionis*, quæ fit 1. Vel ab ortu, & tum aut Caro, quæ rubra conspicitur, molli tangitur, interceptit; aut *Membrana*, quæ alba videtur, dura tactu sentitur. In *Curatione*, 1. Parte fomentis tepidis humectata, sectio secundum rectitudinem facienda est, cavendo ne collum vesicæ lædatur. 2. Humor eliciendus, & turunda suppurante medicamento imbuta applicanda est. 3. Pulvis adstringens propter metum hæmorrhagiæ in promptu habendus. 4. Sequentibus diebus locus aquâ mullâ eluendus, & cicatrizantibus est agendum. 11. Vel *post ortum*, ab *ulcere* inprimis: & tum, Aut latera cervicis coaluerunt, in quo casu incisione sed cautissimè utendum: Aut callosa substantia adest, quæ prius scalpello abscindenda erit. Aut fungosa & luxurians caro; in qua primò siccantibus & discutientibus, ut Aristolochia, Thure, Myrrha, Mastiche, utendum; post sine dolore excedentia adhibenda, tandem secundum.

ARTICULUS III.

De Uteri Pustulis, Condylomatibus,
& Hæmorrhoidibus.

Pustula uteri sunt tubercula in cervice uteri exorta, quæ acrimoniam pruritum & dolorem accersunt.

Signa sunt, pruritus, dolor, squammarum farinacearum delapsus, quibus speculum matricis, ut melius affectus exploretur, addendum.

Causa sunt humores biliosi, acres, & adusti, crassissimi: qui in loca humida & laxa evacuati, illis se insinuunt & immergunt.

Curatio respicit causas, præmissis universalibus, ubi inter præparantia prævalent, syrup. fumaria, Cichorii cum decocto lupulor. Topica humorem discutientia & mitigantia, in primis Balnea & infusio, quæ excipiat, partis vino cum nitro elutio. Sæpius autem ista iteranda.

Dividuntur in Benignas, & Malignas, seu venereas, quæ rebelles & contagiosæ. Ablui debent aqua, ex aloë quantitate unius ciceris, flore æris quantitate dimidii ciceris, pulverizatis, & cum vini albi unc. j. aquæ plantagin. capitum rosar. ana unc. j. permixtis, & in phiala vitrea servatis, facta.

II. Condylomata sunt rugarum in cervice uteri, cum ardore & dolore intumescencia.

Signis opus non est, quia oculis condylomata apparent, sæpe, si plura sint parvi racemi speciem referentia. Rugæ nodorum instar, qui in pugno clauso apparent, prominent: sed magis, dum menses profluunt, attolluntur.

Causa sunt crassi & adusti humores.

Curatio in genere respicit Causarum ablationem, & Repercussionem, ac Exsiccationem.

Quan-

Quantum ad Differentias,

Alia sunt Cum inflammatione, in quibus dolor & ardor major est, condyloma est durum. In Curatione anodynus infessibus & perfusionibus agendum est.

Alia sine Inflammatione, quæ si Recentia, repellendum & exsiccandum: si Antiqua & Inveterata, emolliendum primò; mox digerendum & siccandum. Habent hic locum, pulvis ex testis ovorum ustis, unguentum ex trochiscor. de chalybe dr. j. in pulverem redacta, & cum oleo rosarum ac cera mixta, addita unc. f. succi verbasci, Unguentum pomi insani, de quo à Castro l. 2. c. 25. de morbis mulier. Si his medicamentis non cedit, vossella rescindendum est condyloma, & pulvis adstringens inspergendus.

III. Hæmorrhoides uteri, sunt tubercula hæmorrhoidibus ani similia, in uteri cervice ob affluxum sanguinis faculenti excitata.

Subjectum est cervix uteri. Nam ibi sunt, ubi venæ desinunt, ut in hæmorrhoidibus ani: & hæc ex affluxu attolluntur.

Signa sunt manifesta. Nam visu si speculum matricis adhibeatur, deprehenduntur. mulieres pallescent, & lassitudine tentantur.

Causa est sanguis faculentus, qui cum interdum tempore non debito ad has venas confluit, ibidem subsistens crassior redditur, ut penetrare orificia non possit.

Curatio instituitur I. Revulsione, per venæ in brachio sectionem. II. Derivatione, per ejusdem in talo vulnerationem.

Dividuntur bifariam.

I. Alia sunt Dolorificæ, quæ ipso dolore à mensibus distinguuntur, & mitigantibus eundem, infessibus in primis, nec non Cataplasmate Castrensis l. 2.

Vu 4

c. 26.

c. 26. de morbis mulier. sed & opio, quod tamen in hæmorrhoidibus ani securius est, curantur. Aliæ *sine Dolo*re, quibus & dicta & dicenda applicari debent.

II. Aliæ sunt *Aperta*, quæ fluunt *vel* moderatè, ac *tum* naturæ res debet committi: *vel* nimium, ita ut vires deiciant, & metus sit ne malus corporis habitus inducatur; & *tum*, ad revellendum sanguis ex vena brachii partitis vicibus demendus est. Purgationi Myrobolani, Tamarindi, Rhabarbarum interserviunt. Sanguinem sistentibus tandem agendum.

Aliæ sunt *Cæca*, in quibus nihil planè sanguinis effluit. *Curatio* perficitur, sanguinis evacuatione. Partis per emollientia & venarum orificia aperientia ac materiam discutientia, emollitione & fomentatione. Earundem arte apertione: de quibus vide caput de Hæmorrhoidibus ani.

ARTICULUS IV.

De Cervicis uteri Ulceribus.

Ulcera *cervicis uteri* quid sint, non est opus definire.

Signa illorum sunt, dolor & perpetua in eodem loco mordicatio, quæ sensim, præsertim si quid abstergentium infusum sit, intenditur. sanioforum humorum & puris per intervalla, cum sanguine interdum, si ulcus magnum vel menses prodeunt, effluxus, mictio frequens & ardens, si vesicæ orificium, dolor sincipitis ad radices oculorum se extendens, si caput in consensum trahitur, febricula quæ successu temporis supervenit lenta, cum crebris horroribus, &c.

Causæ sunt externa & interna omnia, quæ a credine sua continuum in illa parte solvere possunt: de quibus in Differentiis.

Ca-

Curatio est Difficilis, quia in loco exquisiti sensus, humido, & cum multis partibus consensum habente. *Instituitur* eo modo, quo libro primo in genere dictum est. Dolori inhibendo *Lac chalybeatum* infusum conducit. Exsiccationi *Therma*.

Differentia sunt variae.

I. Aliæ sunt à *Causis externis*, ut medicamentis, partu difficili, violento concubitu, &c. Aliæ *ab internis*, ut sunt, Secundina corrupta, Lochia reventa, Fluor uterinus. Gonorrhœa virulenta, Lues venerea, Inflammationes in abscessum conversæ, Humores vel à toto, vel à parte affluentes, vel ibi genitæ; quæ omnia attendi in Curatione debent.

II. Aliæ sunt *Superficialia*, in quibus parum puris profluit, & medicamenta etiam illiniri possunt. Aliæ *Profunda*, quæ se contrario modo habent, & medicamenta injici debent.

III. Aliæ sunt *Mitæ*, cum pure pauco crasso nec foetido, in quibus & abstergentia leniora, ut mel rosatum cum aqua hordei, serum lactis cum saccharo vel decocto lentium, & adstringentia benigniora locum habent. Aliæ *Sordida*, cum pure copioso, & cum dolore effluente, in quibus fortioribus agendum est. *Mundificativum apii*, apud Castrensem l. 2. c. 29. hic laudatur. Aliæ *Depascentia*, cum sanie colorata, viridi, livida, foetida, cum cruciatu effluente; in quibus *Aloë* & *Absinthium* inter mundificantia primatum obtinent.

IV. Aliæ dicuntur *Rhagades*, quæ sunt ulcuscula parva & longa, cutim cervicis uteri exedentia. *Cognoscuntur* tum ex dolore & cruore in congressu excitato: tum visu, si cervix inspiciatur: quin sunt & illis similia, quæ tempore hyberno in manibus oriri solent. *Oriuntur* multis modis. 1. *Externè*, à partu laborioso, coitu violento, & tum Clystere adstringente utendum. 11. *Internè*, ab Inflammatione,

V u 5

con-

condylomatibus, Humorum acrium affluxu, qui prius purgantibus tollendi, antequam ad Topica accedatur. Laudatur in eis *pinguedo*, quæ ex cochlearibus ligneis ad coquendum in culina usitatis, si aliquantulum igni admoventur, & torrentur, edistillat: nec non unguentum pomadæ.

Alia quæ *Fistulam post se relinquunt*, quæ dolore caret, nisi ad partem nervosam accesserit. Ad vesitam interdum & rectum intestinum transit, & tum per eam excrementa ejiciuntur. Si *Antiqua* est curæ palliatiæ, in qua stasis temporibus corpus purgatur, relinqui debet. Callus verò, qui ei semper conjunctus est, si illa est sanabilis, post exsiccationem partis, per portiones vulnerarias, emollitus, absuendus, vel sectione vel ustione.

De *Cancro* & *Gangrana* nihil singulare occurrit. Ille à sanguine menstruo adusto, & cum tumores scirrhusi diu persistunt, generatur. *Ista* hoc in loco, ex inflammatione, cancro, & ulceribus ibidem malè curatis oritur. Cum enim hæ partes sint humidæ, & excrementis scatant, faciliè eæ corrumpuntur & emoriuntur.

CAPUT II.

De morbis Vteri.

ARTICULUS I.

De Intemperie uteri.

Morbi uteri sunt, *Intemperies*, *vasorum angustia*, *Inflatio*, *Inflammatio*, *Scirrhus*, *Hydrops*, *Procidencia*, *Vulnera* & *Ulceræ*.

Intemperies uteri est ejusdem à temperie sua naturali ad præternaturalem intemperiem, à causis externis & internis exorta, deflexio.

Dividitur bifariam.

I. Alia

I. Alia est *Calida*, quæ *cognoscitur* ex pronitate in venerem, menstruorum paucitate, flavedine, nigredine, adustione, acredine, difficili & inordinato fluxu: unde progressu ætatis hypochondriacæ evadunt, pilorum in pube tempestivo exortu, faciei rubedine & labiorum siccitate, dolore capitis frequente, & biliosi humoris in corpore abundantia. *Oritur* vel *ab ortu*, unde viragines & sterilitas: vel *post Ortum*, à causis externis, inter quas calor. usus, nimia venus, medicamenta, quæ calorem & sanguinem ad uterum concitant. *Curatur* I. *Diatâ oppositâ*. II. *Medicamentis refrigerantibus*, tam internis quàm externis, quæ lumbis & dorso applicantur: sed illis Moderatis, ne calor ad conceptionem necessarius debilitetur, substantia uteri frigida, quia membrano-fa, violetur, vasa quæ ob fluxum menstruorum patere debent, densentur, & nervi qui in lumbis & dorso, lædantur. III. *Evacuantibus*, Rhabarbaro nempe, syrupo rosarum solutivo: Manna, &c. *Flores vitrioli Veneris* & *Martis* à gr. iii. ad vj. in aliquo syrupo appropriatum est in utero purgans.

Alia est *Frigida*, calida frequentior, quæ *cognoscitur* ex minore veneris appetentia, & exigua in ea voluptate, mensium subsistentia, mucositate, pituitositate, & inordinato fluxu propter similitudinem humorum in utero collectorum copiam: unde obstructio, flatuum in utero copiâ, seminis cruditate & aquositate, unde istius sine voluptate fluxus, faciei colore pallido, & cæteris superiori oppositis. *Oritur* & à causis iisdem contrariis. *Curatur* I. *Diatâ oppositâ*, II. *Medicamentis calidis*, utero applicatis, inter quæ excellent Internè Radices Aristolochiæ, Caryophyllatæ, Angelicæ, Eryngii. Folia Mercurialis, Melissæ, Dictamni Cretici, Pulegii, Salviæ, Rorismarini, Artemisæ. Flores Cheiri, Calendulæ, Salviæ, Anthos, Borraginis, Aromata Nuxmoschata,

moschata, Cubebæ, Crocus, Cinnamomum. Ex *Compositis* ol. Macis, succini, de Myrrha, Cinnamomi, *Facula* Bryoniæ, *Aqua* vitæ mulierum, *Extractum* Zedoariæ, *Externæ* eadem in suas formas redacta.

Alia est *Humida*, quæ frigidæ plerumque conjungitur. *Cognoscitur* ex menstruorum copiositate, tenuitate & aquositate, locorum muliebrium ob excrementorum humiditatem, madore, & fluoris uterini, ubi & semen excernitur, passione, nulla ex venere delectatione, ad abortum foetu grandiore pronitate. *Oritur* ab iisdem cum frigida causis, & illis præsertim quæ sunt vitæ otiosæ & sedentariæ accidit. *Curatur* ut superior. Observa tamen, *Resuram eboris* & decocti sâlvæ in vino & aqua, fumum per infundibulum ante coenam admissum, laudari. *Thermas sulfureas* palmam obtinere. In externis ab adstringentibus, ne humores excrementitios detineant, caveri debere.

Alia est *Sicca*, quæ *Cognoscitur* ex seminis & menstruorum paucitate, ad venerem tarditie, oris uteri siccitate, labii inferioris colore è rubro nigricante, cum perpetuis fissuris. *Oritur*, Interdum ab ipso ortu, unde agræ temperies sicca, & corporis constitutio gracilis. Interdum *propter senium*, unde parere desinunt. Interdum *ab ipsis morbis*, inflammatione nempe, &c. Interdum *ex defectu sanguinis*, qui cum humectare debebat, sive quod per ipsum propter venarum angustiam & obstructionem non evacuetur; sive quod per cervicem evacuatus ad fundum non perveniat. *Curatur* I. *Diatâ opposita*, in qua nimii labores, vigilia, inedia, moeror sunt vehementer vitanda. II. *Humectantium usu*, inter quæ excellunt, Borrâgo, Buglossa, Mercurialis Althæa, violæ: inter externa Balnea aquæ dulcis, & inunctiones ex oleo Amygdalor. dulcium, lilior. alborum, pingued. gallinæ, medullæ crurum vituli, &c.

&c. *Difficilis est Curatio*, si sit siccitas diuturna & hæctica.

I I. Alia est *Simplex*, ad quam superius dicta spectant.

Alia *Composita*, frigida & humida frequentissima, quæ *Cognoscitur* ex superioribus inter se comparatis. *Oritur* ab humoribus pituitosis, sive à toto deductis, sive à toto progenitis. *Curatur* I. *Præparatione* materiæ per hysterica calefacientia. II. *Evacuatione*, & quidem *Universali* totius corporis per phlegmagoga. *Particulari* ipsius uteri. cujus maxima est habenda ratio, si nec à toto, nec à partibus quicquam proveniat. Et hic pessaria multum faciunt, nec non *Therma sulfureæ* & exsiccentes. *Sudoriferis*, quæ hic maximè laudantur. *Decocto* nempe *ligni sancti*, *China*, *Salsaparilla*, *Ligni lentiscini*, &c. III. *Diatâ oppositâ*.

ARTICULUS II.

De Vaforum Uteri angustia.

Vasorum uteri angustia, est eorundem à causis suis interceptio.

Signa sunt, tum mensium retentio, quod fluere nequeant; tum conceptionis, propter interceptum sanguinis allapsum impedimentum.

Causa & Curatio in Differentiis exponuntur.

Dividitur bifariam.

I. Alia est *ab externis causis*, ut medicamentis & balneis adstringentibus, quæ cognoscitur ex relatione ægri. *Curatur* facilius, & humectantibus ac emollientibus agendum est.

Alia *ab Internis*: de quibus in sequente Differentiâ.

II. Alia à *Cicatrice*, *carne*, *ant membrana orificiis vasorum annata*, vel *orificiorum venarum, post violentam secundinarum extractionem coalitu*, quæ

quæ ferè est incurabilis : tentari tamen aliquid emollientibus potest.

Alia *ab Obstructione*, quam crassi, visciidi & copiosi humores, seu illi è reliquo corpore, calore ipsos extenuare non valente, affluant; seu in ipso utero propter caloris in eo debilitatem cumulentur, inferunt. *Cognoscitur* ex eo, quod signa intemperiei frigidaè adsint, humiditas mucori similis interdum ex utero prolatur. *Curatur*, prout aliaè obstructiones. Revulsio locum habet, si materia affluit. Inter Deobstruentia, Medicamenta acria & amara, mentes moventia, *Chalybeatum vinum*, balnea emollientibus & aperientibus castigata, laudantur.

Alia à *Compressione*, quam infert Vel tumor & scirrhus, in utero vel extra ipsum consistens : & tum signa tumoris adsunt. Malum ferè est incurabile. Vel pinguedo partium vicinarum nimia ; & tum sensui id totum manifestum est. Extenuantibus agi debet.

ARTICULUS III.

De Uteri inflatione.

Inflatio Uteri est ejusdem à flatibus ex materia frigida, pituitosa & flatulenta, vitio caloris imbecillis genitis, distentio.

Dicitur & *Mola flatuosa*, propter falsam conceptionis spem.

Signa sunt, distentio uteri è regione abdominis consistens, quæ nunc augetur, nunc minuitur ; interdum ad latera, interdum ad umbilicum, lumbos & diaphragma extenditur. *Distinguitur* ab *Hydrope*, minori magnitudine, sitis carentiâ, tumoris incremento & decremento, minore superiorum partium macie. Ab *Hydrope Uteri*, causarum flatus generantium prægressu, sonitu, minore gravitate, majore tensione, doloris extensivi & in partibus vicinis puncto.

punctorii perceptione. Ab *intestinarum inflatione*, quod hic nec sint dolores, nec alvus supprimatur ; quod menses supprimantur, pedes ac cava oculorum intumescant, & corporis color mutetur ; quod mulier anhelet, anxia sit, & cum expurgiscitur è somno, recta cervix anhelet. A *Mola*, carentia gravitatis & duritiei in ventre cum pondere, de latere in latus se, cum moventur, movente. A *Conceptione*, sonitu & tumoris incremento & decremento, carentia motus motui infantis similis : si enim abdomen comprimatur vehementius, flatibus ad vicina compulsi, motus quidam palpitationis in toto abdomine sentitur.

Causa in definitione est posita. Materia ipsa vel gignitur in ipso utero, seu propter mensium suppressionem : seu purgationis post partum interceptionem. Vel aliunde provenit, seu per venas, seu per vasa seminalia. *Caloris* vero *imbecillitas*, plerumque ab aëre externo, in puerperis impuritates, quæ exitum quaerunt frigidate suaistente, à partu difficili, abortu, mensibus suppressis, &c. oritur.

Curatio, si methodum spectes, ab aliarum inflationum curatione non differt, modò partis ratio habeatur. *Observa* inter purgantia *Species hieræ*, & *diaphanicon cum castoreo* laudari. Ad suffitus *Nucem moschatam* ; de qua Hartmannus in Chymiatría, ad Emplastra, *Emplastrum de baccis lauri* cum Theriaca ; ad haustus, *nucem moschatam* tusam, cum radicibus matricariæ decoctam, & ex senis vini uncis cum sacchari dr. ii. ebibitam.

Differentia à parte ipsa sumuntur.

Alia est, quando *status sunt in cavitate* ; & tum os uteri ita clauditur, ut nihil ejus exire queat, cum vel mulier movetur, vel manu abdomen comprimitur, sonus & strepitus percipitur. *Contineri* autem eos *in cavitate posse* certum est, tum quia uterus distendi.

di potest quamvis crassius, ut in conceptione, & retineri, ut in mola: tum quia alteratrix & retentrix, facultates nunquam otiosæ semen morbosum inflatus mutant.

Alia, quando sunt in tunicis ejusdem; & tum etiam os uteri apertum esse potest, propter flatuum in angusto loco conclusionem, sonitus exest, & dolores fiunt majores ac latius extenduntur: malum difficilius quàm in cavitate curatur.

ARTICULUS IV.

De Inflammatione Uteri.

Inflammatiō uteri est ejusdem à sanguinis in substantiam ejus elapsi putredine tumor, multis symptomatibus infestus, & modo in scirrhum, modo in abscessum faciens.

Signa sunt varia. Tumor ipse in regione uteri apparet, cum ardore & dolore, uteri occlusionē, & versus interiora retractionē; tota verò cervix rubicunda apparet, venulis undiquaque instar telæ aranearum sanguine tumentibus. Respirationis adest difficultas, cum specie pleuritidis, quia extensa exteriorē uteri tunica, quæ à peritonæo oritur & firmatur, partes etiam quibus illa cohæret, tenduntur. Alvi & vesicæ excrementa ob calorem & alvi siccitatem, & meatum compressionem detinentur. Ventris moles vacua interdum apparet, & alvus aqua impletur, & umbilicus prominet, & osculum gracile fit; & repente menses pauci ac pravi ingruunt. Febris continua & ardens propter uteri cum corde per arterias & vasa magna consensum, interdum lypurias ob humorum versus interiora motum, affligit. Dolor adest Mammarum, cum earundem inflatione ob consensum Inguinum, coxarum, septi transversæ, claviculæ, Syncipitis, qui ad radices oculorum

runt

rum extenditur, & à vaporibus à sanguine putrescente per arterias ad caput elatis, quæ per collum ab utraque vocati infundibuli parte in synciput discurrunt, oritur.

Causa est sanguinis, qui interdum est purus, interdum bile mistus, interdum atrâ bile tinctus. *Alabatur* vel elabatur, propter causas communes, detentionem nempe tempore menstruorum, vel post partum ex aëris frigidi occursum. *Attrahitur* ob calorem vel dolorem, qui fit: *Vel* ex abortu, partu difficili, secundinarum violenta extractione, longiore mensibus instantibus ambulatione: *Vel* ex molesta gestatione, si foetus vel est grandior, vel malè collocatus.

Curatio est *Difficilis*, si præsertim vel totus occupetur, vel suppuretur. Ulcus enim sordidum exinde exortum, lenta febre tandem ægros consumit. *Nulla*, si sit Erysipelas, quia & foetus ipse propter insignem calorem emoritur, unde abortus qui matrem jugulat, sequitur. si in gangrænam lethalem facessat. *Instituitur*, ut in aliis inflammationibus, ubi *nota*. Ad revulsionem non secandam esse in cruribus venam, cum hæ venæ sanguinem ad uterum trahant; sed in cubito, cum sanguis ex epate & venis ei vicinis confluat. Ad derivationem venam popliticam secari posse, nisi ægra sit gravida, ne abortus concitetur. Topica refrigerantia & humectantia absque ulla adstrictione adhiberi debere. Putatur eam proprietate quadam sistere *Decoctum serpilli cum aqua chalybeata paratum*, & extrinsecus cum spongiis applicatum.

Differentiæ à parte ipsa sumuntur.

I. Alia est *totius Vteri*, in qua superius dicta symptomata evidenter affligunt, & paucæ planè evadunt. Alia *alterutrius lateris*, in qua calor in coxam, propter ligamenta uteri quæ eò usque feruntur, tran-

X x

Gr,

fit, crus quod è regione est agrè movetur, inguina ejus joci inflammantur.

I. Alia est *partis posterioris*, in qua alvus supprimitur, dolor magis lumbos & spinam affligit. Alia *Antica*, in qua, quia vesicæ cohæret, urina supprimitur aut difficulter redditur, dolor magis versus pubem abit. Alia *ipsius fundi*, in qua imus venter ita dolet, ut ne contactum quidem ferat, & dolor ad umbilicum magis extenditur.

III. Alia quæ *in scirrhum* abit, in qua evadunt omnia mitiora, pondus & gravitas in vicinis partibus percipitur, malum fit diuturnum, & in hydropem uteri sæpe terminatur. Alia quæ *in abscessum*, in qua omnia augentur, donec suppuratio facta fuerit, horrores sine ordine circa vesperam plerumque invadunt, rupto abscessu (rumpitur autem vel in uteri cavitatem, quod tutius, vel effunditur in alias partes) modò urina, modò alvus supprimitur, cum pubis intumescencia, & fluctuantis rei sensu.

ARTICULUS V.

De Scirrho Uteri.

Scirrhus uteri est ejusdem tumor durus ac citra dolorem renitens, à crasso terrestri & faculento humore procreatus.

Signa sunt, præter generalia alia, nempe, Menses initio supprimuntur aut diminuti fluunt; crescente malo, magnus sanguinis per intervalla fluor, seu a pertis plus justo venarum osculis, seu nequeunte utero consueta sanguinis copiam vel recipere, vel retinere. *Distinguitur à Mola*, quia in hac menses si fluunt, inordinatè fluunt, mammae quoque lacte turgent, quæ in scirrho extenuantur, &c.

Causa est humor terrestris & faculentus, sanguis nempe crassus, interdum pituitosus, interdum, quod ætate

ætate inclinante accidit, & illas, quæ picâ, malaciâ aut bulimo laboravere infestat, melancholicus sæpe ex malè curata inflammatione ob nimium vel refrigerantium, vel discutientium usum.

Curatio est Difficilis, tum quia longo tempore exsiccata emolliiri nequeunt; tum quia calor natus in partibus scirrhi affectis exhaustus est; tum quia dum humor emollitur, facilè in cancrum putredine conceptâ, abire potest. *Processus* curationis non variat ab aliis.

Dividitur ratione ipsius membri affecti.

Alius est *in ipsa substantia*, in quo uterus in coxam & dorsum decumbit, ibique dolore excitat. Alius *in Cervice*, qui digiti contactu exploratur, facilius quàm prior curatur. Si in superiore cervicis parte est, femina in venere offenditur, & vesica à tumore comprimitur: si in inferiore existit, intestinum rectum laborat.

ARTICULUS VI.

De Hydrope Uteri.

Hydrops uteri est ejusdem ab aqua in ipso seu proprio, seu aliarum partium vitio collecta, imponentia.

Signa sunt, Tumor imi ventris laxus, secundum formam uteri extensus, mensium paucitas, pravitas, loturæ quia carnis similes, ante tempus defectus, uteri osculi gracilitas & humiditas, mammarum mollities, & lactis carentia, rigor ac sæpe febris. *Distinguitur ab Inflammatione* febris carentia & mollitie, symptomatibus aliis, de quibus supra. Ab Inflatione, tensionis & sonitus defectu. *A Mola*; quia in hac pondus majus in imo ventre percipitur, mammae tempore partus instantiurgent. *A Conceptione*, quia in hydrope tumor uteri juxta uteri &

ventris amplitudinem extenditur ; in conceptione acuminatus est. In gravidis menstrua non effluunt; hic humor quidam sanguinolentus, pravus, nullo servato ordine effluit, & citò finitur. Ab *Hydrope ventris*, facie patientis colorata, nisi epar labore sitis carentiâ, tumoris à parte inferiore ad superiorem ad censu.

Causa est aqua ibidem, seu *vitio* lienis vel Epatis, de quibus propria capita consulantur; seu ob *Debilitatem* ipsius uteri, propter quam nec bene concoquit, nec bene excrementa expellit; & quam, *Aut* ex abortu frequenti & partu laborioso. *Aut* ex nimio fluxu calore ejus diffante. *Aut* ex ipsorum suppressione calorem eundem suffocante.

Curatio exigit Aquæ educationem, & Uteri roborationem, habitâ ipsarum causarum ratione: Hartmannus *pillulas Antimoniales* laudat.

Differentia à parte sumitur.

Alius est, *quando aqua in cavitate colligitur*; in quo, orificium uteri si tangatur, clausam deprehenditur, tumor major est & fluctuatio quædam percipitur. si conceptum sequitur, aqua illa citrina & foetida intra duos ut plurimum menses foetum perdit, qui tunc cum ea ejicitur. Alius, *quando aqua in substantia & vesiculis agnatis residet*, in quo orificium contrectatum apparet, majores dolores exoriuntur, difficilior evadit curatio.

ARTICULUS II.

De Uteri procidentia.

Uteri procidentia est ejusdem extra abdomen pro-
pensio, à soluta ligamentorum ejus unitate pro-
cedens.

Signa generalia sunt, dolor lumborum, hypogastrii, pudendi, ossis sacri, quibus uterus annectitur; & quidem

quidem in principio, in processu, mitigatur is ob assuetudinem, & solius ponderis molestus sensus, & in ambulando impedimentum adest. *Specialia* pro ratione majoris vel minoris procidentiae variant. In illa uterus ad dimidium coxarum & genua descendit, tumorem ovi anserini instar, in cujus ima parte foramen apparet, exhibet. In hac Tumor quasi extensæ pellis, & veluti ovi majoris pondus circa pudenda percipitur.

Causa est, quicquid ligamentorum unitatem solvere potest. Vide in sequentibus.

Curatio est *Difficilis*, si est major. si adulas affligit. si febris, convulsio, vel alia symptomata accidunt. Imò si id fiat, lethalis est in puerperis: & interdum ab ambiente aëris alteratione, aut violentâ repulsione corrumpitur, & gangrænâ corripitur. *Consistit* 1. In uteri ipsius repositione, ubi nota. si standam esse primò inflammationem, si accessit. Si tumor ab aëre frigido utero impressus urgeat, decocto malvæ, althææ, flor. chamæmel. baccar. lauri, &c. primò membrum esse fovendum. Si status vel stercora in intestinis adsunt, clysterem esse præmittendum. Antequam reponatur, glutinantibus & adstringentibus esse fovendum, aspergendum, inungendum. Laudatur *suffitus ex pelle Anguilla salita*, fumo exsiccatæ & pulverizatæ. Balneum adstringens pete ex Guiljelmi Rondeletii Curationibus. Modum reponendi vide apud Authores. II. In ejusdem retentione, & tum Mulier in lecto reclinata cruribus extensis, ita ut unum alteri incumbat, ponenda. Alvus nec pigra, ne in fæcum egestionem uterus præcipitetur; nec laxa, ne membranæ uterum ligantes laxentur, habenda. Medicamenta agglutinantia & adstringentia adhibenda. Huc faciunt, Pessli, Fomentationes, injectiones per syringam, & alia, sed cave menses iis supprimas.

Differentia fumuntur à Causis.

I. Alia est *propter ligamentorum laxitatem*, quæ quatuor habet; quæ ex eo *Cognoscitur*, quòd sensim generetur, & minore cum dolore affligat. *Oritur*, vel à partu difficili, onerosa foetus gestatione, vel ab humoris pituitosi affluxu. *Curatur*, Evacuatione humorum. Adstringentium & roborantium usu, ut sunt, *Decoctum musci querni, cornu Cervi, foliorum lauri*, Emplastrum adstrictorium. *Magnes* præparatus & appositus.

Alia est à *ligamentorum ruptione*, quæ ex eo *Cognoscitur*, quòd subitò malum exoriat, majore cum dolore affligat, & à sanguinis fluxu interdum excipiat. *Oritur*, vel ab gravi foetus gestatione, vel à partu laborioso, vel ab abortu, vel à violentâ secundinæ extractione.

Alia est à *ligamentorum erosione*; & tum ulceris signa adsunt, puris aliquid effluit.

ARTICULUS VIII.

De Uteri Ascensu, Vulneribus & Ulceribus.

Uterum è suo loco *versus superiora* & usque ad *ventriculū* posse ascendere, quorundam est opinio; sed falsa. Nam I. ligamenti quatuor ita connectitur, ut sursum moveri nullo modo possit. 2. Et si naturalem motum per fibras habeat; tamen quia & recto intestino & pudendis annexus est, si animum haberet, necessariò & illæ partes tenderentur. 3. Et si à flatibus, ut superius dictum, intumescat: tamen non sequitur exinde eum sursum moveri. Quod verò fæminæ interdum corpus & globum quasi circa umbilici regionem oberrantem sentiunt; dicendum est, testes potiùs & vas illud cæcum esse, quam

quam ipsum uterum. Causa hujus in suffocatione uteri exponetur.

II. De *Vulneribus uteri* nota. 1. Difficiter uterum vulnerari; quia undique ossibus obsepsus est, 2. Si vulneratur, cognosci id ex situ, dolore & pure, quod effluit. 3. Curari posse, quod ex partu Casareo apparet, sed propter partis cum aliis membris consensum periculosa esse. 4. Vel uteri fundo accidere, & tum dolor est minor, curatio facilior, vel cervici, & tum dolor est major. Curatio difficilior, quod illa sit magis membranosa & continuò humiditatibus seateat.

III. De *Ulceribus* nihil dignum occurrit, quod non superius attactum fuerit, nisi fortè addatur, ita interdum putrescere, ut & excindatur, & superstitie muliere excidat. Consolidationi *Balsamus sulfuris* & *eiusdem Emplastrum* (de quibus vide Hartmanni chymiatrîam, capite de Tabæ) inserviunt.

TITULUS XII.

De Symptomatibus Uteri.

CAPUT I.

De Symptomatibus communibus.

ARTICULUS I.

De Uteri imbecillitate.

Symptomata uteri, vel sunt mulieribus in omni statu communia, vel sunt, aut Extra conjugium viventibus magis familiaria; aut conjugatis propria. Communia sunt, Uteri imbecillitas, Dolor, Menstruum suppressio, stillicidium, fluxus nimius, difficultas, decoloratio, inordinatus fluxus, Fluor muliebris, Gonorrhœa.

Uteri imbecillitas est ejusdem in actionibus suis

oboundis pigrities vel defectus, intemperiei, occultarum qualitatum, & caloris nativi vitio inducta.

Signa sunt, veneris appetitus languens, inordinatus menstruorum fluxus, instantibus iisdem in lumbis & pectine dolor, parva vel nulla in congressu voluptas, frequentior abortus, flatuum ex utero eruptio. Scilicet Actiones uteri sunt, veneris appetitus, sanguinis menstrui debito tempore excretio, seminis in actu venereo ejectio, & à viro suscepti retentio, foetus concepti ad debitum tempus detentio, ejusdem jam perfecti in lucem exclusio.

Causarum ratio in Differentiis exponetur.

Curatio ad causas (de quibus ibidem) obvertenda erit.

Differentia sumuntur à Causis.

Alia est ab Intemperie uteri: quæ si est Frigida, uterus nec mediocrem alimenti quantitatem conficere potest, idè non multa excrementa accutular: si Humida, nec sanguis, nec semen, nec foetus rectè continentur. Curationem vide supra.

Alia est ab Occultis qualitatibus, quas uterum habere vel exinde patet, quod singularem cum rebus variis habeat sympathiam & antipathiam, semen virile appetat, suavis delectetur, &c. & tum, à nulla evidente causa affectus exortus est. nullus humiditatis vel frigiditatis excelsus deprehenditur. In Curatione medicamenta totà substantià propria applicanda sunt.

Alia à Calore innato, vel suffocato, vel dissipato: & tum affectus est periculofus, quia calor difficulter restauratur. In Curatione restaurantibus agendum, qualia sunt, Cinnamomum, Nux moschata, species diaxyloaloes, Aromatici rosati, &c.

ARTI

ARTICULUS II.

De Uteri dolore.

Dolor uteri est tristis ejusdem sensus, à continui solutione à causis suis inducta, procedens.

Signis opus non est, cum ipsa fœmina dolorem patetfaciat. Afficit mulieres tam liberas, quàm gravidas & à partu solutas. cā ratione, quā dolores colici in infimo ventre excruciat, cum ligamenta uteri ad coxas & lumbos ferantur, eò usque etiam se extendit.

Causa est quicquid continuum solvere potest.

Curatio respicit, I. Doloris mitigationem per Anodyna. II. Causæ remotionem, de qua in Differentiis.

Differentia sumuntur à causis.

I. Alia est, ab Erosione, quæ præcipuè in ulceribus, fluore muliebri, vitiosis mensibus, &c. accidit, & maximè cervicem uteri offendit. Curatio ad affectus istos dirigenda.

Alia à Distentione, quam inferunt I. Grumus sanguinis in uteri cavitate hærens, & tum sanguinis fluxus copiosus ex utero processit, dolor fixus est, & maximè circa orificium uteri percipitur, cum natura ob assiduum expellendi conatum rectum intestinum & vesicam in consensum trahat, cum tenasmo & frequenti mictione conjungitur. In Curatione respiciendum, ad Dissolutionem grumi, ad quam Theriaca cum vino commendatur; & ad Evacuacionem, quod si diutius ibidem hæsit, ad malignitatem. II. Sanguis menstruus, quando vel vasa minus patent, vel ipse nimis crassus est, quod etiam à frigido potu accidere potest, præcipuè si femina ab exercitio incaluit. & tum, Causæ quæ occasionem dederunt, antecessere, mensium suppressorum vel non rectè fluentium signa adsunt. Curatio ad eosdem dirigenda. III. Humores vitiosi in ute-

XX 5

ri ca.

ri cavitate vel vasis hærentes: & tum Evacuantibus, & Præparantibus agendum. **IV. Flatus**, qui ex effervescencia vitioforum humorum, quam interdum coitus causatur, oriuntur. & tum Evacuatio instituenda est. Flatus discutientibus, de quibus in Colica agendum. **V. Inflammatio uteri**, de qua supra. **VI. Semen retentum & corruptum**: & tum, ad suffocationem uteri respiciendum est.

ARTICULUS III.

De Mensium suppressione.

Mensium suppressio est sanguinis menstrui, ob viarum angustiam, vel sanguinis ipsius vitium, retentio.

Signa fæminæ ipsius relatio suppeditat. Quod si fateri nolint. In virginibus ex eo cognoscitur, quod sanguis suppressus per venas hinc inde vagetur, & obstructions pariat, colorem corporis mutet, febrim inducat, &c. In mulieribus, quod ad uterum feratur, & uterinos morbos inferat. Distinguitur à Retentione in graviditate, quia gravidæ parum in animi affectibus mutantur, nativum corporis colorem retinent. Symptomata indies mitiora sentiunt. motum & situm infantis tertio mense percipiunt. Os uteri occlusum & durum habent.

Causæ sunt Angustia venarum, & sanguinis vitium: de quibus in Differentiis prolixius agetur.

Curatio est festinanda, quia suppressio ista plurimos morbos, ut febrem, leucophlegmatiam, hydropem, sanguinis vomitum, &c. producit. Difficilis, si est diuturnior. Sextum si superaverit mensem, plerumque incurabilis putatur, si præsertim ex colli uteri perversione accidat. Tum enim mulier animo linquitur & pituitam vomit, partes ventris & pettinis, Spina dorfi, dolent, ac febris accidit; excre-
menta

menta alvi & vesicæ supprimuntur; lassitudo totum corpus, ob sanguinis rerenti per totum diffusionem, occupat; maximè crura & coxas, propter venarum harum partium cum venis uteri consensum, detinet. Boni eventus, si per alia loca evacuetur, modò id per vesicam non fiat, quia in illa sanguis maximè grumescit. Respicit **I. Venæsectionem**, Nam sanguis, qui singulis mensibus subsistit, in corpore cumulat, & in venis hærens ad uterum revocandus est. De ea nota. Aperiendam venam in talo, quia sic & copia sanguinis imminuitur, & motus eidem ad uterum conciliatur. Si repetenda est, una die sanguinem ex uno crure, postridie ex altero detrahendum. Eam quæ evacuandi gratia instituitur, in principio aperi-ri debere; eam quæ in poplite vel talo aperitur, post purgationes, diebus tribus, quatuor aut quinque ante tempus consuetæ evacuationis secandam esse. Cucurbitulas, quæ venæsectionis vicariæ sunt, prius locis remotioribus cruribus nimirum, dein propioribus, coxis scilicet applicandas esse. Huc pertinent ligaturæ, frictions instante mensium tempore, post totius corporis evacuationem. **II. Materia præparationem**, & huic inservit in pituitosis corporibus. Decoctum ligni Guajaci cum Dictamno Cretico, absque sudoris provocatione. **III. Evacuationem**, quæ per vices instituenda, ut per *ἐνέκκωσις* materia sensim evacuetur. Inter Medicamenta evacuantia laudantur, Agaricus, Hiera Galeni cum castoreo. Aloë cum succo sabine. Pillulæ ex Aloë soccotr. dr. iii. Myrrha optima scr. j. Extractor. calami aromat. carduibened. craci, ana gr. iii. Radic. Gentian. Dictamni ana gr. v. cum syrupo de baccis lauri formata, & scrup. j. pondere vesperti ante cænam exhibitæ. **IV. Deobstructionem**, per illa quæ menses movent. Præcipua sunt, Intra, Decoctum Rorismarini cum floribus cheiri in vino, Vinum chalybeatum Zacuthi
l. 9.

l. 9. c. 10. *Aqua* ejusdem ibid. *Aqua Pulegii bis distillata cum aqua Cinnamomi exhibitā*. Extr. Zedoar. *Angelica, Castorei. Fæcula Bryonia. Terra qua in mineris ferri reperitur, eadem quantitate, ordine & formā, quā chalybs oblata.* Spiritus Tartari. Tabulæ croci Martis Hartmanni. Extra unguentum de chalybe Zacuthi lib. 3. Hiftor. p. 52. Pinguedo Anguille. Colubrina, cum oleo destillato fabinæ. suffitus ex scoris reguli Antimonii, de quo in Hartmanno. v. Reliquiarum Discussionem, per sudorifera, nempe haustu vel ex milio solis Quercetani in pharmacop. restituta; vel decocto chalybeato cum spiritu Tartari, Rob sambuci, &c.

Differentia à causis petuntur.

I. Alia est à *Venarum uteri obstructione*; quam *causantur* sanguis frigidus & crassus: humores viscidii & crassi sanguini immixti, profecti vel ab uteri calida intemperie, quæ humores subtiles & acres dissipat, crassas & terrestres partes relinquit: Vel ab epatis & lienis constitutione frigida: vel ab alimentis similibus, præsertim si tempore menstrui fluxus, quo sanguinis impetus major est, dissipentur: & tum, instante purgationis tempore dolores in lumbis & partibus vicinis percipiuntur, si quid effluit, mucosum, subalbidum, & subnigricans est. rotius corporis torpor adest, cum colore albo, pulsu raro, & urinis crudis.

Curatio ex supra dictis petatur.

Alia à *Compressione*, quæ fit vel à *Causis externis*, ut aëre aquilonio, morâ in aqua frigida; & tum, Relatio ægri id aperiet. Sanguis ad inferiora frictionibus, vinculis balneis retrahendus est. Vel à *Causis internis*, nempe, pinguedine, uteri vel vicinarum partium tumoribus; & tum, Tumor convenientibus remediis tollendus est. Menses aperientia locum non habent.

Alia

Alia à *Constipatione*, dum ipsius uteri substantia durior est, quæ fit vel à *primo ortu*, & tum non facile tollitur. Vel *post ortum*, ab intemperie frigida & sicca: de qua superius.

Alia à *Coalescentia*, quam inducit 1. *Cicatrix* post ulcus relicta. 2. *Caro aut membrana* vasis uteri obnata. 3. *Abortus* frequens, post quem venæ illæ, quibus secundinæ adherent, ita coalescunt, ut postea aperiri non possint.

II. Alia est à *Sanguinis defectu*, qui aut non generatur seu propter causas externas, in ediam nempe, nimiam evacuationem, fonticulos, &c. seu propter internas, ut frigidam partium principalium constitutionem, ætatem senilem, febres. Aut in alios usus convertitur, ut ante pubertatem in augmentum corporis, in gravidis in alimentum foetus, in lactantibus in lac, in obesis in pinguedinem. Aut *Absumitur*, seu propter causas externas, exercitia nempe, nimios labores, terrores, mœrores, balnea, æstuaria, quæ sudores copiosos provocando, & sanguinem versus ambitum corporis rapiunt, & serosam ejus partem, quæ fluxibilitatem præstat, absumunt: seu propter internas, ut sunt morbi calidi & sicci, evacuationes nimix per alias partes factæ, &c.

Alia à *sanguinis siccitate*, quæ fit ab aduotione, cum tempore hyberno fæminæ incensos carbonēs ad frigus arcendum inferiori ventri subdunt: & tum, Refrigerantibus ac humectantibus agendum est.

ARTICULUS IV.

De Mensium stillicidio & difficultate.

Mensium stillicidium est sanguinis menstrui, vel plurium dierum, vel continua, guttatim tamen facta eruptio.

Signis

Signis opus non est, cum vitium mulieris relatione patefiat.

Causa vel in externis, vel in sanguine, vel in vasis consistit.

Curatio rationem Causarum sequitur.

Differentia à Causis sumitur.

Alia est à *Causis externis*, Exercitio, calidis medicamentis & aliis sanguinem fundentibus, & vias aperientibus: & tum, major est sanguinis profusio.

Alia à *Sanguinis faculentia*, viis non satis patentibus; & tum, cum dolore accidit. In Curatione venæ in brachio apertio locum habet. Purgatio per *ἡμέραν* urgeri debet.

Alia à *Retentricis imbecillitate*, accedente simul sanguinis copiâ, tenuitate, & serositate: & tum, Nullus dolor urget, Medicamentis adstrictione & siccitate uterum roborantibus agendum.

II. *Mensium difficultas* est eorundem cum dolore & molestia, gravibusque symptomatibus, ob venarum vel sanguinis vitium fluxus.

Signa ex ipsius ægræ relatione sumuntur. Dolores illi sunt, capitis, ventriculi, lumborum, & infimi ventris. Fluxus vel fit confertim, vel tantum per modum stillicidii, & interdum instantibus mensibus, interdum fluentibus, symptomata accidunt, magisque virgines & steriles, quod venæ uteri minus in ipsis pateant, quàm eas quæ peperere, quod eadem post partum sint dilatatæ, affligunt.

De *Causis* in Differentiis agitur.

Curatio respicit. I. *Symptomata*, quæ mitiganda sunt. II. *Causas*, quæ tollendæ.

Differentia sumitur à Causis.

Alia est à *Venarum angustia*: de qua satis de Mensium suppressione actum est.

Alia à *sanguinis vitiis*, id est, I. *Crassitie* & *faculentia*: & tum, sanguis dum evacuatur, in grumos con-

concrefcit, dolores longè ante evacuationem, ob expultricis conatum ingravescent. *Curatio*, præmissis universalibus, per Attenuantia, & fundendi vim habentia perficitur. II. *Acrimonia*, ab humorum acrium permistione profecta; & tum, partes genitales pruriunt, sanguinis excreti natura, & modus doloris morbum prodit. Acrimoniam temperantibus, ut sunt semina quatuor majora, violæ, flor. nenupharis, agendum. III. *Flatulentia*; & tum, dolor per intervalla redit, subitoque exacerbatur, hinc inde vagatur, excreto flatu cessat. *Curatur* Evacuazione materiæ, & Discussione flatuum.

ARTICULUS V.

De Mensium decoloratione.

Mensium decoloratio est eorundem cum rubea esse deberent, ad pallorem, albedinem, viriditatem, flavedinem, vel livorem, vitio sanguinis, declinatio.

Signa sanguinis ipsius aspectus suppeditat. Accedit foetor, inordinata excretio, sæpe & febres erroneæ, acutæ; horror, cibi fastidium, stomachi dolor, & cætera: de quibus apud Hippocratem.

Causa in sanguinis vitio conjicitur: de quo, ut & de ejus causis, videatur in Differentiis.

Curatio attendit Causas, ideo pro ratione illarum variat.

Dividitur dupliciter.

I. Alia est, quando sanguis vitium contrahit, vel propter totius corporis, vel propter præcipuæ aliqujus partis, intemperiem; quarum ratio in curatione habenda est.

Alia, quando sanguis laborat, vel quia suppressus & retentus est; & tum Mensium suppressio præcessit, dolores in pectore & pulsationes fortes sentiuntur.

tur. si melior habitus est, menses erumpunt, & profuit sanguis & pus graveolens ad octavum aut novum diem: *Vel* quia ab utero excrementis scatente inquinatur; & tum, uteri inquinati signa adsunt.

Alia, quando sanguis à permissione excrementorum humorum inquinatur; & tum, Curationem si spectes, Præparandum est. sed ita, ut cum humores crassi attenuatione indigeant, & verò nimis attenuantia humores serosos colligant, & ad uterum moveant, validioribus abstinemus, & Acetum caveamus. Evacuandum, &c.

II. Alia est, quando menses declinant ad Albedinem, quæ Oritur vel à pituita, cujus ut ut ventriculi imbecillitas signa adsunt: vel à Pure, & tum, Aut ulcera in utero excitantur, & sterilitas insequitur; Aut menses per septem aut octo dies effluunt, & mulier liberatur. Aut iidem ad partes supra inguen prorumpunt citra tumorem, & juxta hypochondria foras prodeunt, & mulier rarò superstes manet. Aut post dies aliquot tumor super inguen magnus, rubeus, sine capite, quia ibi caro impletur, exsurgit & difficulter secatur.

Alia, quando ad flavedinem vel viriditatem, quæ à bile procedit.

Alia, quando ad Livorem, quæ à melancholia oritur.

ARTICULUS VI.

De Mensum inordinato fluxu.

Mensum inordinatus fluxus duo includit, Mensum nempe ante debitum tempus anticipationem; & Eorundem ultra consuetum tempus subsistentiam.

Anticipation mensium pro ratione Causarum dividitur.

Alia

Alia est à Causis externis, Casu nempe, ictu, & aliis venas aperientibus. Curationem vide inferius.

Alia ab Expultrice uteri irritata. I. A sanguinis copia, quæ cognoscitur ex eo, quod sanguis à toto corpore ad uterum mittatur, fluidus & naturalis sit. signa plethoræ adsint. Curatur venæsectione, si copia est major. Diæta, & frequentiore exercitio, si minor. II. A sanguinis tenuitate & acrimonia, quæ ex eo cognoscitur, quod temperies totius corporis sit calidior. Viçtus ratio talem generans sanguinem antecesserit, sanguis ipse sit dilutior, decolor, flavidior. Curatur Evacuantibus Rhubarbaro inprimis. Temperantibus: de quibus supra.

Alia à Retentrice uteri languida, quæ ex eo cognoscitur, quod vasa uteri sint laxa, habitus corporis etiam laxus & humidus. Curatio prohibet nimis adstringentia. Acidulæ & thermæ vim ferri habentes laudantur.

III. Mensum ultra consuetum tempus subsistentia pro ratione quoque Causarum dispescitur.

Alia est, quæ ab Expultricis frustratione procedit, quam infert I. Sanguinis paucitas, quæ ex eo cognoscitur, quod sæmina nullam molestiam ob tractionem mensium percipiat, & quod nimium exercitium, aut viçtus tenuior antecesserit. II. Sanguinis crassities, quæ ex eo cognoscitur. quod Caco-chymix signa adsint, sanguis albidior sit & viscidus. In Curatione, Purgandum antequam multum sanguinis colligatur. Attenuandum menstrua purgatione finita. Calamintha palmam obtinet & Mercurialis. Aliquot ante menstruum purgationem diebus aperiendum. Scarificatio talorum hic locum habet.

Alia, quæ ab Expultricis imbecillitate oritur, quam inducit. I. Vteri Intemperies frigida; de qua superius. II. Eiusdem stupor, qui ex eo cognoscitur, quod morbi stuporem inducentes adsint, vel nimius re-

Y y

frige-

frigerantium usus præcefferit, post debitum purgationis tempus, sanguinis etiam præfente copiâ, nulla gravitas à fœmina percipitur. In Curatione ad Morbum & illius causas respiciatur.

ARTICULUS VII.

De nimio Mensium fluxu.

Nimius mensium fluxus est eorundem vel copiosior vel diuturnior quàm competit purgatio, vel sanguinis, vel uteri, vel venarum vitio exorta.

Signa multis opus non est, si præsertim sequatur inappetentia, cruditas, fœdus faciei color, pedum ac reliqui corporis tumor, atrophia, cachexia & cætera.

Causam in sanguinem, uterum, vel venas coniecimus: unde verò horum sint vitia, in Differentiis exponetur.

Curatio est Difficilis, si diuturnior. Nulla, si senescenti mulieri accidit. *Exposcit* 1. *Cohibitionem*, per Revulsionem, Interceptionem, sanguinis incraffationem, vasorum per adstringentia & alia occlusionem. Sistendum tamen pedetentim; si magna sanguinis copia adsit, & per modum crisis accidat, quod tamen rarò evenit. Hic locum habent, Pulvis *Heurnii* ex semine *hyoscyami albi*, *papaveris albi* ana dr. j. *Hæmatitid.* Coralli rub. ana dr. f. *Caphura* scr. f. pondere dr. f. exhibitus. Pulvis ex succini, sanguin. Dracon. lapid. hæmatit. Corallor. rubr. semin. portul. ana dr. j. Balauftior. scr. ii. Boli Armeni Orient. dr. ii. à dr. j. in Aqua plantag. unc. iij. exhibitus, Lac asininum chalybeatum. Aqua mirabilis Ferdinandi Histor. 33. Trochisci de Carabe, ossa hominis fortiter calcinata, Pillulæ Zacuthi l. 9. Praxis Histor. p. 185. Emplastrum Zacuthi ibid. Saxonix ex fuligin. Camini, farina volat. &c. paratum. Pessus ex

stercore

stercore suillo & asinino cum succo plantagin. & mucilag. semin. cydoniorum formatus. Specifica sunt, *Intra*, Pulvis *Turturis Foresti* l. 28. obs. 10. Sal ex ejusdem cineribus, *Cuticula pedum anserinor. exsiccata*, & à dr. f. ad scr. ij. exhibitâ. Extra, *Cingulum ex foliis helleborastri contusis*: de quibus *Renealmus* observ. 21.

Differentia sunt varix, quæ Causas maximè respiciunt.

I. Alius est à sanguine, qui 1. Vel ex fundo uteri derivatur, in quo sanguis nigrior est, & plerumque grumulosus. Vel ex cervice, qui est rubicundior & fluidior. II. Vel est copiosus, vel Acris, vel Serosus: de quo sequente differentia.

Alius ab Uteri humiditate, de qua superius vide.

Alius à Venarum vitio, de quo tertiam differentiam consule.

II. Alius est à Sanguine copioso, qui ex eo cognoscitur, quod vasa vel aperiantur, vel rumpantur, in fœminis præsertim, quibus menses diu substituerunt, & post copiosius erumpunt. signa plethoræ adsunt. sanguis qui exit, facillè in grumos concrevit. In Curatione respiciendum 1. ad Vensæctionem, quæ si evacuationis gratia instituitur, venam in cubito, hepaticam imprimis concernit. si vires sint debiliores, in salvatella utriusque manus instituitur. si revulsionis gratiâ fit, quia repetita potentius revellit, partienda est. 2. Ad Cucurbitulas, quæ ad evacuationem, cuius parti, ut dorso, scapulis, inferiores si exceperis, & quidem cum scarificatione applicari possunt, ad revulsionem mammis sine scarificatione imponi debent, & difficultate respirationis oborta, removeri. 3. Ad ligaturas, frictions brachiorum, &c.

Alius à sanguine acris, qui ex eo cognoscitur, quod erosio vasorum conjungatur, bilis signa adsint. sanguis

guis in utero detentus & corruptus sit. majore copia elabatur. In *Curatione*, Purgatio per syrupum rosarum solutivum, & folia sennæ administretur. In crassantia videantur supra.

Alius à *sanguine seroso & aquoso*, quod ex eo cognoscitur, quod vel epar imbecillitate peccet, vel renes ob debilitatem serum non attrahant. sanguis minore copia effluat, nec faciliè in grumos mutetur. qui effluxit, si linteo excipiat, & in umbra siccetur, colore se prodat. *Curatio* morbos ipsos attendit.

III. Alius est *ab Anastomosi*, in cujus curatione observa. Frigidis calida admisceri debere, ne venæ obstruantur, ventilatio caloris prohibeatur, & febris inducatur. Pessos si apertio est in vasis cervicis adhiberi posse, ubi folia quercus & unguentum comitisæ valent. Balnea nonnisi frigidiora, aut in quibus vis adstringendi caliditatem vincat, usurpanda esse.

Alius à *Diapedesi*, quæ rarissimè accidit, statim Topica adstringentia reposcit.

Alius, à *Ruptione*, quæ vel à plethora, vel à causis sanguinem agitantibus, partu præsertim laborioso accidit, & præmissa, si opus, venæ sectione, conglutinantibus Medicamentis, curatur.

Alius ab *Erosione*, quæ exinde cognoscitur, quod sanguis parvus, purulentus interdum, interdum serosus fluat. *Oritur* à sanguine aciore & corrupto, interdum & à medicamentis acrioribus. Inter *adstringentia* laudatur *radix filipendula*, vel ejus decoctum.

ARTICULUS VIII.

De Fluore muliebri & Gonorrhœa.

Fluor muliebris, qui alborum menstruorum nomine alias exprimitur, est humoris excrementi-
iii

vi totâ naturâ à sanguine alieni vitio vel totius vel partis alicujus collecti, inordinata ex utero excretio.

Muliebris dicitur, quia mulieres afficit, & quidem virgines etiam, cum in illis causæ locum habeant, & exempla adsint. *Adultiores* tamen frequentius, si præsertim humida & frigida constitutione præditæ sint, delicatam & otiosam vitam agant, & alimentis frigidis ac humidis vescantur: *senes* denique, & quidem ad mortem, ob pituitæ copiam, & facultatis coëtricis debilitatem.

Signa non est quod inquirentur. Ex ipsius ægræ relatione affectus innoscitur. *Differt* à *Gonorrhœa*, quod in ista materia seminalis albidior, crassior, & longioribus intervallis effluit, & in minore quantitate excernitur. A *Pollutione* nocturna, quia hæc cum imaginatione rei veneræ conjungitur, & per somnum saltem accidit. A *Mensibus decoloribus*, quia isti periodum suam etsi non exactè semper, observant, gravidis, & mensium suppressione vexatis non accidunt. rubrum colorem in se exhibent. A *Pure ex ulceribus uteri*, quia tamen signa ulceris prostant, pus ipsum crassius & albidius est. si saniosum est, cruore perfunditur, & cum dolore excernitur.

Causam in Humorem excrementitium conjeci, qui interdum à medicamentis catharticis, excitata eorum usu ad moliendas excretiones naturâ, interdum à Thermis, eadem excrementa quæ per sudorem depelli non poterant, per hanc viam deponente, concitatur.

Curatio est festinanda, nam fœminas plerumque steriles reddit, nisi fortè per vasa cervicis uteri evacuetur. easdem in atrophiam, tabem, melancholiam, hydropem, uteri prolapsum, animi deliquia & convulsiones conjicit. Hinc quamvis in principio haud difficulter curetur: tamen post difficilior.

Nam totum corpus per illam viam excrementa deponere assuescit; & uterus debilior redditus excrementa colligit. Variat pro ratione causarum.

Differentia à parte mandante, & sanguinis colore sumuntur.

I. Alius est à *Toto*, qui ex eo *cognoscitur*, quod cacochymia in toto corpore signa adsunt. fluxus est copiosior. In *Curatione*, 1. Fugienda *venasectio*, tum quia humores ad inquinamentum sanguinis in venas revocari non debent; tum quia vires affectu hoc diuturno deiciuntur, & corpus contabescit. 2. *Discussio* optimè per decocta *Guajaci* & *China*, *ligni lentiscini*, &c. perficitur. 3. Ad exsiccationem *radix filipendula* plurimum commendatur. Stringunt, *pulvis ossium humanorum*, *cinis stercoris caponum in aqua pluviali*. Emplastrum *Zacuthi lib. 9. c. 11. Praxis Historiar.* quod renibus apponi debet. 4. Somnus supinus fugiendus est, ne calore lumborum humores versus uterum ferantur. 5. Frictiones partium superiorum ad aversionem sunt utiles.

Alius est à *parte aliqua præter uterum*: & tum signa affectus partis adsunt. In *Curatione* ratio ipsius est habenda.

II. Alius ab *Utero*, qui ex eo *cognoscitur*, quod signa uteri affecti adsint; fluxus sit minus copiosus. *Oritur* ab intemperie ipsius, cujus in curatione ratio habenda erit. *Suffumigationes de thure, ladano, mastiche, santalis bene* adhibentur. A quacunque vero causa oriatur, *Therma* maximè prosunt.

De *Gonorrhœa* si quæ sciri debent, ex iis quæ de *Gonorrhœa virili* dicta sunt, petantur.

CAPUT II.

De Symptomatibus Extra conjugium viventibus magis familiaribus.

ARTICULUS I.

De Morbo virgineo.

Symptomata viventibus extra conjugium magis familiaria sunt, *Morbus virgineus*, *Suffocatio uteri*, *Furor uterinus*, & *Melancholia mulierum*.

Morbus virgineus (alias febris alba, virginea, pallida, amatoria) est coloris naturalis in facie in virescentem & pallidum mutatio, ab humorum crudorum copia proveniens.

Virgineus dicitur, quia virginibus maximè competit, & quidem pulchrioribus, colore albo præditis, inde facilius à crudis humoribus tinctura.

Signa facies ipsa suppeditabit, cui adde symptomata alia, ut est, Dolor capitis, interdum infania, humoribus & vaporibus eò delatis, & melancholiciæ permistis. Respirationis difficultas cum cordis palpitatione, si moveantur, arteriarum parvo ac frequenti in collo, dorso, ac temporibus pulsû, ob vaporum ex sanguinis crassi incalescentia sublationem. Febres inordinatæ & erraticæ, ob humorem putredinem. Ventriculi multiplices affectus; inter quos, fastidium ciborum, ob minus felicem chyli distributionem. pica, ob pravi humoris in ventriculi tunicis abundantiam. vomitus, ob maximam crudi humoris copiam. Hypochondriorum tum tensio, ob sanguinis menstrui ad majora vasa refluxum; tum rugitus, ob flatuum tumultuationem. intumescentia, tam corporis totius cum laxitate & mollitie ob humoris copiam; quàm vel palpebrarum præcipuè manè post somnum, cum per noctem calor plus vaporum

rum ac seroforum humorum elevaverit, quam discuti potuerit; vel crurum & pedum præcipuè circa malleolos ob humorum seroforum abundantiam.

Causa est Humorum cruditas & copia, orta vel à mensium suppressione, seu propter nativam vasorum angustiam; seu propter acquisitam, ab esu tritici, calcis, cretæ, terræ, nucis moschatæ, potatione aceti, &c. vel à viscerum aliorum obstructione. Nam sanguis menstruus viis non patentibus, ad venas majores & viscera regurgitat, vasa obstruit, & calorem obruit. Hinc mala in visceribus coctio exoritur, & humores ad habitum corporis deferuntur.

Curatio absolvitur I. *Venaesectione*, præcipuè in talo, si malum recens est, nec sanguis in alium humorem abiit. si à vacuatione sanguinis suppressa oritur. II. *Purgatione*, præmissis præparantibus. III. *Deobstructione*, in qua omnium viscerum habenda est ratio. Mensium suppressio maximè attendenda. Laudantur *Chalybs præparatus*, *Radix scorzonera*, *Lapis Bezoar*, *Oleum Crystalorum*, &c. In Dieta acetum fugiendum est.

ARTICULUS II.

De suffocatione Uteri.

Suffocatio uterina est symptomatum nunc actiones naturales, nunc animales, nunc & sapius vitales, per periodos oppugnantium congeries, cum refrigeratione totius corporis conjuncta, à vapore maligno ex utero elevato poecedens.

Vocatur & *Suffocatio mulierum*, *strangulatus ab Utero*, *Hysterica passio*, &c.

Signa sunt vel *Imminentis*, Totius corporis lassitudo, cum crurum imbecillitate, pallor faciei cum aspectu tristi. nausea cui rarò succedit vomitio, sæpe tædium quoddam & cibi fastidium, idque interdum

cum murmure, & ventris rugitu, interdum citra hæc. vel *Præsentis*, in qua vapore ad cor sublato & spiritus vitales inhibente, levis animi defectio inducitur; pulsus paululum immutatur, corpus spiritibus ad cor recurrentibus frigescit, metus & desperatio ægrum concutit: Eodem ad caput & fauces detruso, interdum fauces constringuntur, & ægra suffocari videtur. motus thoracis & diaphragmatis inhibitis spiritibus animalibus impeditur, & respiratio særè intercipitur, viventibus interim per transpirationem ægris. interdum furor uterinus cum garrulitate & iracundia accedit, nonnunquam alia desipientiæ genera oboriuntur. interdum sopor ac veternus inducitur, quo mulier corruens velut attonita, jacet sine motu, sine sensu, respiratione tam parvâ, aut mortua credatur. Vel in *paroxysmo declinantis*; & tum, humor quidam è locis muliebribus effluit, intestina obmurmurant. mox oculi attolluntur, malæ rubescunt, sensus & motus redit. Interdum frigus tum temporis è capite per cervicem in scapulam & brachium illabitur, quod difficilem motum reddit, sed mox discutitur. Non tamen omnia ista signa in omnibus accidunt. Fuere quæ continuo risu, vapore in membranas thoracis sese insinuante vexabantur; fuere, in quibus serpentum sibili, crocitus corvorum, &c. pro viarum & spiritus erumpentis proportionem effingi videbantur. *Differt* ab *Epilepsia*, quod in ista motus convulsivi sunt universaliores, nulla post paroxysmum illorum, quæ circa ipsos accidere memoria. pulsus est major quàm antea, spuma circa os fluitat. Ab *Apoplexia*, quod in ista invasio sit subitanea sine aliquâ significatione, singularis in respirando stertor affligat, tanta sit partium resolutio, ut etiam si pungeantur, tamen non sentiant. A *Syncope*, quod in ista nulla futuræ accessionis sint præsagia, pulsus ad sensum cesser, sudores frigidi

gidi affligant. brevi evanescat, cum hystericus affectus ad unum & alterum diem interdum perseveret. A Mortuis discernuntur sternutatione per sternutatoria excitata, & aliis mediis.

Causa est vapor malignus, tenuis, & spirituosus, uno momento totum corpus penetrans, & materia in utero peculiari modo corrupta, & sive per se, sive per externa, ut sunt res odoratae, terror, ira, agitata, elatus, & sursum non solum per venas & arterias, sed & per occulta spiracula adscendens. Quanam verò illa sit, in Differentiis dicetur.

Curatio est *Dubia interdum spei*, si vetulas diutius affligat, quia virium imbecillitatem infert, & humorum copiam indicat. si in puerperas incidat, partu laborioso, vel abortu antegresso. si praegnantem adoriatur, quia metum abortus incutit. *Melioris*, si respiratio nimium non laedatur. si paroxysmi non saepe redeant. *Respicit* 1. *Tempus paroxysmi*, ubi ratio habenda 1. *Interceptionis*, per ventris circa umbilicum cingulo ex corio cervi in ipso coitu cum cervâ necati confecto, ligaturam. 2. *Excitationis* per ligaturas & frictiones dolorificas, pilorum in pudendis praesertim vellicationem, suffumigia ex *pennis perdicum*, *callis equorum*, *corio anguilla*, facta. *Aspersione*, olei *Tartari*, &c. ad nares applicationem. 3. *Revulsione* per partium inferiorum ligaturas & frictiones, clysteres flatus diseutientes, cucurbitulas sine scarificatione, cum multa flamma, primò furis & femoribus mox inguinibus appositas, suaveolentia pudendis intrusa, ut sunt ol. *Zibethi ser. f. cum ol. nucis moschatae express. ser. j. q.* *Diffusionis* & quidem Internè, per oleum *succini albi* cum pulvere *flor. nuc. jugland.* *castorei extractum*, *extractum lichenum, specificum diazoris Mynsichti*, *Theriacam multorum ejusdem*, *Essentiam granorum chamaectes Hart.* in aquis *pulegii*, *Theriacali*, & aliis appropriatis.

Exter-

Externè per olei *Iovis*, salis *ejusdem à Crollio descripti* in umbilicum immiſsionem, *Emplastrorum ex adipe vacca nigra herbis matricariis pasta*, *ſclarea in butyro cocta*, addito *gummi Tacamahaca & Caranna*, factorum, &c. 11. *Tempus extra paroxysmum*, in quo 1. *Evacuandum*, per *Extractum Bryoniae Grulingii*, de quo in *Curationibus*, per flores *vitrioli Veneris & Martis Agricola*. 2. *Uterus per interna & externa malignitati etiam resistantia roborandus*. *Laudatur saecula Bryonia, Castoreum*, &c. 3. *Diaeta*, in qua odorata, & dulcia, quae uterum commovere solent, fugienda. Ad *praeservationem* vide *pillulas Hystericas Zacuthi Prax. Histor. l. 9. c. 12.*

Differentia à Causis sumitur.

Alia est à *Semine*, partium vel humorum admiſtorum vitio corrupto, & talem vaporem emittente, quae ex eo *cognoscitur*, quod menses se rectè in aegra habeant. Symptomata omnia sint vehementiora, paroxysmo declinante, humor femini similis è locis effluat. *Curatur* universalibus praemissis, seminis per clysteres & pessos uterinos evacuatione. *Ejusdem* per medicamenta semen minuientia, vel vitum tenuem prohibitione.

Alia à *sanguine menstruo subsistente*, & ideo corrupto: quae ex eo *Cognoscitur*, quod menstruus sanguis cum vitiosis humoribus, melancholico inprimis, jungatur. Symptomata sint mitiora. signa suppressionis adsint. *Curatio* ad mensium suppressionem obvertenda est.

Alia ab *Humoribus vitiosis*, de quibus consule caput de Intemperie uteri.

ARTICULUS III.

De Furore uterino, & Melancholia mulierum.

Fvor uterinus est immoderata Veneris appetitio, fœminas ad insaniam ferè redigens, à seminis copia, acrimoniâ, & peculiari qualitate exorta.

Subjectum hujus affectus sunt, vel virgines *Novegæ*, nigrae, & sanguinem adustum habentes: vel viduae juniores & ætate florentes: vel nuptæ, propter impotentiam viri steriles.

Signa sunt varia. Nonnullæ in tristitia & taciturnitate appetitum prementes contabescunt. Aliæ vitæ ratione garrunt, lascivunt, in iram, risum, fletum, sermones lascivos & venereos solvunt: quædam se viris sponte prostituunt.

Causa est seminis copia, caliditas, & acrimonia, quæ oritur si causas internas spectes, ab uteri caliditate, testium præsertim & vasorum spermaticorum intemperie. Hinc multæ inflammatione uteri, & pruritu laborant, quæ furore hoc non afficiuntur: si Externas, à diætâ copiam sanguinis & acrimoniâ generante, haustu vini Hippocratici, in quo aliquid *borracis* &c. fuit.

Curatio absolvitur I. *Vena-sectione*, si sanguis abundet. II. *Purgatione*, si humores calidi & adusti permisceantur. III. *Alteratione* per Refrigerantia, ut sunt, *Lactuca*, *Portulaca*, *Nymphaea*, *Umbilicus veneris*. Occulta qualitate agentia, ut sunt, *Vitæ Ruta*, *Cannabis*, *Camphora*, *Cicuta*, quæ in monialibus potius usurpanda.

Melancholia mulierum est delirium cum tristitia, anxietate, fletu, vel risu per intervalla, sine febre invadens, à vapore melancholico, spiritus animales obfuscante, exortum.

Signa

Signa sunt varia. Fœminæ sunt tristes, de anxietate cordis conqueruntur, nec tamen illius causam exprimere possunt. Arteriæ circa lienem & dorsum solito vehementius pulsant. Dolor sinistri lateris & regione cordis, mammam sinistram aliquando prehensens, vaporibus ex arteriis intercostalibus, in ea loca effusis, & membranas thoracis vellicantibus ac distendentibus affligit. faucium siccitas cum strangulatione interdum molesta est. Per intervalla verò hæc symptomata afficiunt, quia vapor dissipatur, & agitatio sanguinis in arteriis quiescit.

Curatio respicit I. *Vena-sectionem*, quæ Instituenti in principio, sanguine calidiore urgente; Admittenda sæpius in cubito, si menses suppressi non sunt; in talo diebus aliquot ante fluxum, si fecus. *Vena-da* parcius, si malum sit in progressu. II. *Præparationem* per illa, quæ humorem melancholicum alterant, & cor exhilarant; ut sunt *Confectio de hyacintho & Alkermes*. III. *Evacuationem* per melanogoga, quibus utero appropriata semper admiscenda.

CAPUT III.

De symptomatibus conjugatis propriis.

ARTICULUS I.

De symptomatibus circa Conceptionem.

PUNCTUM I.

De Sterilitate.

Symptomata Conjugatis propria, respiciunt Conceptionem, Graviditatem, & Partum. Symptomata circa Conceptionem occurrentia sunt Sterilitas & Mola.

Sterilitas est concipiendi, vitio seu genitivalium, seu seminis,

seminis, seu uteri, seu sanguinis menstrui, proveniens impotentia.

Signis opus non est. *Causa & Curatio* pro ratione Differentiarum variant.

Differentia à Causis & Partibus sumuntur.

I. Alia est *vitio genitalium partium*, seu illud sit *Clausura* uteri ab ortu, quæ findi artificiose potest; seu *tenella* vel ob ætatem vel structuram *constitutio*, ob quam virile membrum non admittitur: seu tumores, ulcera, & excrescentiæ in cervice; ad quæ curatio obvertenda est. Et hæc sterilitas non est propriè dicta sterilitas.

Alia *vitio seminis*, de qua sequente Differentiâ agetur.

Alia *vitio Uteri*, de qua tertia Differentia agemus.

Alio *vitio sanguinis* menstrui, quando vel deest; quod accidit, vel utero cicatrice obducto, vel sanguine in pinguedinem abeunte: vel copiosus est, ut semen obruat & suffocetur.

II. Alia est à *Defectu & Infecunditate seminis*, quæ oritur 1. Propter *ætatem teneram*, vel nimis adultam. 2. Propter *vasorum* semini generando & continendo dicorum *intemperiem*; & tum, Mulier in congressu vel nullam, vel paucam & brevem voluptatem percipit. affecti uteri signa adsunt, vel totum corpus, vel membrum aliquod vitiosa constitutione laborat. *Curatio* ad intemperiem uteri obvertenda est. 3. Propter eorundem *vasorum malam* conformationem.

Alia à *defectu proportionis inter semen virile & femininum*, qui inter manifestas & occultas qualitates consistit; maximè autem oritur 1. A *medicamentis* semen extinguentibus, ut sunt, vulva capræ, mentha, ruta, camphora, quæ vel ægra, vel adstantes patefacient. 2. Ab *Incantationibus*: & tum, Vir cum suâ coire non potest, cum aliis potest, appeti-

tum

tum cum suâ congregandi habet; & si cum uxore coit, semen emittere non potest. In *Curatione* laudatur haustus aquæ frigidæ ex ore equi masculi non castrati in præterfluente potantis elapsæ, & subito vasculo collectæ.

III. Alia est, *quando uterus semen injectum non attrahit*, idque vel propter *intemperiem frigidam* & humidam, de qua superius. Vel propter *morbos aliquos organicos*, & unitatis soluta. Ubi nota, sæpius nimiam pinguedinem, omenti præsertim, os uteri comprimere. Sterilitatem ex ulceribus difficulter curari; imò etiam si ulcus magnum curetur, eandem tamen propter cicatricem relictam, ob quam, nec sanguis utero adhærescere, nec sanguis affluere potest, manere.

Alia est, *quando uterus semen injectum non retinet*, idque 1. vel ob *intemperiem humidam*; quæ ex eo *cognoscitur*, quod uteri fibræ laxentur, ut non possit sese contrahere. semen propter mucres illos eidem adhærescere non potest. idem per aliquot dies retentum ejicitur. *Curatio* ad intemperiem obvertenda est. 2. Vel ob *densitatem uteri*. Nam tum sanguis, à quo semen utero adnasci & incrementum sumere debet, non allabitur. *Curatio* requirit Extenuationem per victum tenuem, exercitium, purgationes, sudores, & alia. 3. Vel ob ipsius *lubricitatem*; & tum, fluor muliebris vel virulenta gonorrhoea accidit. semen conceptum extinguitur & rapitur. *Curatio* ex suis locis petenda est. 4. Vel ob ipsius *orificii hiatus*; & tum, aut difficilis partus, aut abortus præcessit. fibræ ita laxantur, ut se non contrahant. In *Curatione* inter adstringentia fœtus ex foliis lentisci, myrti, &c. locum habent. 5. Vel ob *tussim, sternutationem*, quæ post congressum accidit, &c. quibus semen excutitur.

Alia est, *quando uterus semen injectum non alterat*,

rat,

rat, idque vel ob *intemperiem*, ubi uteri ex immodicâ frigiditate densiores evadunt, angusta sunt admodum & stricta vasorum ad ea pertinentium orificia, unde nec secundæ agglutinari ad vasorum ora possunt: nec in sufficienti copia sanguis, qui etiam est serosus affluit. Vel ob *morbos organicos*, ut tumores, ulcera, &c.

PUNCTUM II.

De Mola.

Mola est massa sine ossibus & visceribus ex imperfectâ conceptione, seminis tum masculini tum feminini vitio, loco foetus genita.

Signa ante quartum mensem non sunt tam exacta, ut certò cognosci possit: temporis progressu, quatuor indiciis detegitur. 1. *Motu*. Nam is tremulus est & palpitans, constrictionis & dilatationis æmulus, decumbitque instar lapidis cum insigni ponderis sensu. in latus, in quod fœmina obvertitur. 2. *Figura & mole uteri*. Nam in ea venter in omnem dimensionem attollitur, cum in vero foetu, præcipuè versus umbilicum attollatur, & versus latera molliter utrinque coarctetur. 3. *Lactis defectu*. Nam in mola mammæ intumescunt quidem, sed in iis cruda quædam tantummodo materia, ex suppressis menstruis ad mammas tendentibus, successu temporis evanescens gignitur, cum in gravidis lac circa quartum mensem generari incipiat. 4. *Symptomatibus*, quæ varia, ut sunt Difficilis respiratio, dolores dorsi & inguinum, &c.

Causa est vitium seminis, tum masculini & feminini junctum, cum facultas formatrix est debilis, vel per se, vel quod à sanguine obruatur. Unde mola fieri solent, si concubitus sit imminutibus vel fluentibus, vel nondum planè cessantibus menstruis: tum feminini separatim, cum sanguine juncti; & tum, mola

mola planè rudes, & quæ aëri diutius expositæ, in aqueam liquefactæ solvuntur substantiam. In virginibus tale quid accedere non potest, tum quia semen ipsarum debile, sanguinem ad conformationem necessarium non attrahet; tum quia ipse sanguis partim propter insuetudinem, & vasa uteri in virginibus angustiora, sponte non affluit. In *Curatione* palmam obtinet. 1. *Venesectio*, ut mola nutrimentum abstrahatur, & quidem largior, si mulier est plethorica; parciore si non item, in talo vel poplite. 11. *Purgatio* valida ac repetita. 111. *Mensum apertio*. 1V. *Chirurgia*, de qua vide Authores. *Præcautio* reposit, 1. Ne coitus nimis frequens sit, præsertim in corporibus non satis robustis, propter debilis seminis generationem. 11. Ne instantibus, fluentibusve mensibus, aut utero intemperie laborante accidat.

Differentias in observationibus medicis vide. Mafsa enim hæc non tantum est sine ossibus & visceribus: sed interdum membranosa est magis, viscida, tenax, nec ferro cedens: interdum formam longam, rhomboidem, &c. refert: interdum omni vitâ destituitur, interdum plantæ vitam vivit: interdum sine foetu, cum foetu, post foetum, excluditur, & exclusivem dysenteria nonnunquam præcedit.

ARTICULUS II.

De symptomatibus Gravidarum.

Symptomata gravidarum in triplici sunt Differentia.

Alia *primis gestationis temporibus* accidunt, & sunt, 1. *Spasmus* suras inprimis infestans, qui inunctione olei laurini ad ignem, injectis post calidis fasciis, tollitur. 11. *Sciaticus dolor*, quem oleum terebinth. venetum inunctum, pellit. 111. *Cibi fastidium*, quod à suppressione mensum, meliore sanguinis

parte foetus cedente, peiore in venis manente, unde ex agitatione vapores ad ventriculi os, cum humoribus mittuntur, qualitas vitiosa ipsi imprimitur, oritur; & quod sponte grandiore facto foetu, cessat. **III. Pica** seu abfurdorum ciborum appetitus, cui tollendo, aqua mense Majo è foliis vitis destillata, infervit. **v. Nausea & vomitus**, qui si facilis, sistendus non est: si difficilis, periculo non vacat. **vi. Tormina & dolores ventris**, qui à flatibus ex humoribus circa uterum excitantur, & interdum in lipothymias mulieres conjiciunt. **vii. Alvi fluxus**, cui tempestivè occurrendum, ne abortus sequatur, **viii. Dolor dentium** à parte humoris acrioris eò delati. **ix. Dolor capitis, & vertigo**, à vaporibus emissis, distendentibus, & turbantibus.

Alia mediis gestationis mensibus infestant, & sunt: **i. Tussis** à vapore acri, vel sanguine tenuiore ad venas pectoris converso, quæ propter concussionem musculorum abdominis, vigilias, dolorem capitis, periculosa est. **ii. Palpitatio cordis** & lipothymia, quæ si à sanguinis copia oritur, prodromus est abortus, & venæsectione curatur. **iii. Lumborum & coxendicum dolores**, vel à sanguine suppresso, in vasa illorum locorum decumbente, vel à grandescente foetu. **iv. Hemorrhagia Vteri, Narium, Hemorrhoidum**, quæ fit **1. A vasorum uteri rupturâ**, ob causas evidentes, quæ ex relatione agræ cognoscitur. **2. A sanguinis copiâ**; & tum, sæmina bono colore prædita est, fluxus bene à gravidâ toleratur, minus periculi est, modò fluxus non sit nimius. **3. A foetus sanguinem non attrahentis debilitate**: & tum, plerumque aut partus ultra debitum tempus protrahitur, aut difficilis fit, aut abortus insequitur, signa **Debilitatis foetus** adsunt, id est, *vel* sæmina profusio alvi laborat, quo foetus alimentum subtrahitur, *vel* menses gravidæ sæpius fluunt. *Vel* mater sæpe aut

aut diu ægrotat, unde vitium alimenti exoritur. *Vel* mammae, quæ antea turgidæ, ob alimenti in venis uteri mammarumque communibus inopiam extenuantur. *Vel* foetus, qui jam moveri inceperat, vel moveri debebat, *vel* non movetur, *vel* movetur languidius. **4. Ab Humoribus pravis expultricem stimulantibus**; & tum, acria, colorata, foetida, cum dolore effluunt. signa **Cacochymia** adsunt.

Alia ultimis mensibus accidunt, ut est **i. Urinae suppressio**, quæ à colli vesicæ per uterum compressione (stantibus inprimis id fit) oritur. **ii. Alvi durities & tarditas**, quæ vel à compressione intestinorum à foetu ipso facta; vel ab extractione humiditatis per eundem commissâ, in mulieribus hepar & lienem calidum & siccum habentibus, oritur. periculosa est, quia violento egerendi conatu partibus omnibus in abdomine repletis, faciliè aliquod damnum oboriri potest. **iii. Tumor & inflatio venarum**, vel in *Cruuribus*, seu ob epatis imbecillitatem, de qua suo loco; seu sanguinis serosioris suppressionem; & tum, gravidæ plerumque sæmellas pariunt, quia humor cum lochiis post partum evacuatur, curatione superfedendum, nisi ambulatio impediatur: vel in *coxis*, ut quasi varicosæ fiant, quod ab eadem causa profiscitur. **iv. Cutis abdominis fissura** ob distentionem præsertim in primo partu, quæ præcavetur, linimentorum laxantium, ut sunt medullæ, olea, illitione. **v. Aqua** quæ gestationis tempore inter membranas foetum involventes colligitur, *effusio*, quæ periculo, quod & foetus exinde aliquam molestim percipiat, & partus difficultas ob humectationis defectum insequatur, non caret.

ARTICULUS III.

De Symptomatibus circa partum.

Symptomata circa partum accidentia sunt etiam haud pauca.

I. Intempestivus sanguinis ante partum fluxus. Unde virium imbecillitas & lipothymia; in cujus cura, evacuantia sunt fugienda, aër prohibendus, cordialia & roborantia exhibenda: cum se os matricis aperit, membrana est disrumpenda, & infans educendus.

II. Abortus, quando ante legitimum pariendi tempus infans editur, qui *metuitur*, si mammae extenuentur, quia vel sanguinem in venis utero & mammis communibus deficere, vel eundem ob violentiam foetus, aut vasorum rupturam ad uterum ruere indicio est. si lac copiosum ex iisdem effluat. si gravis crebros circa ventrem & lumbos dolores, qui versus pubem & os sacrum, cum quodam ex utero egerendi conatu desinunt. si post eos, sanguis vel purus vel ichorosus, aut aqua effluit. *Oritur*, in genere vitio expultricis uteri, quae seu à foetu, seu à morbis aliis, per quae & Retentrix ejusdem debilitari solet, irritatur. In specie fit inprimis, 1. A nimio frigore; & tum dolor, qui circa regionem renum exoritur, ad hypogastrium descendit, & nephritici doloris instar affligit. Fomentationem vide apud Ludovicum Burgesiam p. 1. c. 6. 2. A subitaneo terrore; & tum, extra modò attracta fomentatio applicari; intus aliquid de oxycrato dari potest. 3. A lipothymia, ubi locum habet confectio Alkermes & de Hyacintho. 4. Ab ira. 5. fluxu; & tum cibi exsiccentes exhibendi. lecto aëra continenda, cordialibus & roborantibus agendum.

III. Partus non naturaliter procedens, ubi commune

munus est monitum, ut umbilicus infantis, quocunque tandem modo se foras dederit, retro in uterum protrudatur. *Difficilis* si sit, nec aliter promoveri possit, *Mercurii vitæ* siliqua in vino exhibita, teste Billichio in observationibus feliciter promovetur.

IV. Aquarum mora, cæteris omnibus ad partum paratis; & tum membranæ non sunt rumpendæ, ne vel umbilico, vel alicui membro vis inferatur. fomentatio per aquam tepidam institui debet, quam butyri recentis linimentum insequatur.

V. Aquarum immaturior prolapsus: & tum butyrum recens inter humectantia, ab aëre externo cavendum est.

VI. Dolores colici, qui tolluntur olei Amygdal. dulc. cum aqua Cinnamomi exhibitione, clystere carminativo insequente.

VII. Virium imbecillitas ex partu; & tum exhiberi possunt, Aqua topthorum, cornu cervi, Confectio Alkermes, Aqua Cinnamomi.

VIII. Secundinarum tardus egressus, vel quod nimis crassa & tenaces sint, & lateribus strictè cohæreant; vel quod propter diuturnum partus laborem intumescant; vel quod umbilicus, seu ruptus sit, seu præcisus, antequam secundina egressa fuerit. Laudantur secundinarum specificum, Oculi leporis in Martio capti: de quibus in Chymiatría Hartmanni, &c. Vide Burgesiam l. 1. c. 14.

IX. Dolores post partum propter nimiam vasorum angustiam, qui præcaventur pulveris Reginae, post partum primum exhibito, qui ex consolidæ major. dr. j. Nucleor. persicor. nucis moschatæ ana scr. ij. Ambrae griseæ scr. f. componitur, & dr. j. pondere in jufculo si febris adest, in vino, si non, exhibetur.

X. Nimius sanguinis post partum fluxus, seu ob copiam illius, seu, quod calidioribus usâ fuerit,

ob renuitatem. In *Curatione* locum habent, Ligaturæ, linteum in oxycrato intinctum, lumbis & toti spinæ dorsi, quia ibi vena cava decurrit, adhibitum. *Terra Cimolia* in aceto soluta iisdem apposita.

XI. *Purgatio imminuta*, propter sanguinis per novem menses detenti à calore inductam crassitiem; quæ inde *cognoscitur*, quod in fluxu menstruo major fuerit. In *Curatione* locum habet, *Apertio sapphena*, sed non citius quàm uterus suo loco restitutus fuerit. Usus syrupi *de Capillis veneris* cum aqua hyssopi, Absinthii, suffumigia, fomentationes, &c. Quod si in fluxu menstruo, purgatio major non fuit, nec abundabant sanguine, diætâ, & cibis Eucharystis est agendum.

XII. *Febris*, quæ fit, 1. *Ex lactis generatione*, quæ periculo vacat. Naturæ, regimine diætæ servato, committenda est, & sudores quibus terminari solet, promovendi. II. *Ex lochiorum suppressione*, in cuius curâ nota, 1. Venam commodissimè in talo secari; si id fieri nequit, cucurbitulas cum scarificatione femoribus & cruribus bene apponi. 2. Tempore fluxus præterlapso, & febris urgente, venam in cubito aperiri posse. III. *Ex vitiosorum humorum apparatu*, in quo an purgari debeant vel non, ægræ, accuratè considerandum. Tempore fluxus elapso lenia duntaxat adhibenda. Alterantia, quæ fluxum cohibent, ut frigida, acida vitanda,

TITV-

TITULUS XIII.

De Abdominis affectibus.

CAPUT UNICUM.

De Hernia umbilicali, & Musculorum abdominis inflammatione.

Inter affectus abdominis est *Hernia umbilicalis*, & *Musculorum abdominis inflammatio*.

Omphalocetes, quæ est *umbilici ab intestinis, omento, aqua, flatu, vel carnosa substantiâ, in eundem prolapsis, vel ibidem exortus intumescencia*.

Signa, Causæ, Curatio, pro ratione Differentiarum variant.

Differentia à Causis sumuntur.

Alia est *Intestinalis* seu *ὀντερίμυαλ*, quando *intestina in umbilicum prolabuntur*; quæ ex eo *cognoscitur*, quod tumor nec admodum sit durus, nec mollis; retento spiritu increseat, & ad supinum ægri decubitus, intestinis cum strepitu & rugitu in suum locum regressis, subsidat. *Oritur à percussione, casu, saltu, ponderis gravis elevatione, partu difficili, equitatione, vociferatione, ploratu, risu, &c.* In *Curatione* exigit 1. *Intestinorum in suum locum repositionem*. 2. *Peritonei laxati adstrictionem, ruptæ consolidationem*. Inter medicamenta sunt, *Consolidida, sanicula, perfoliata, herniaria*, in vino rubro decoctæ & exhibitæ. *Incisio* tum demum admittenda, cum alia nihil juvant. *Ligatione* interdum affectui consultitur.

Alia est *Omentalis*, seu *ἐπιπλοίμυαλ*, quando *omentum in umbilicum prolabitur*: quæ ex eo *cognoscitur*, quod tumor ab una parte sit mollior, ad basin latus, & in verticem angustus, quod omnis dolor absit, & eodem digitis compresso, redeunte in

suum locum omento subsidat. *Oritur* ab iisdem causis. *Curatio* est eadem; sed in corpore molliore & juvenili facilior.

Alia est *Aquosa*, seu ὁδρῶδης, quando umbilicus ab aqua in tumorem attollitur, quæ ex eo cognoscitur, quod tumor sit laxus, & si prematur nec augeatur, nec minuatur, quod cum fluctuatione conjungatur, & candelâ appositâ limpidus & perspicuus appareat. *Oritur* ab Aqua inter peritonæum & abdominis cutem collecta, à causis in hydropse enarratis procedente. In *Curatione* habent locum *Exsiccantia* & *Discutientia*, his non succedentibus *lunata sectio*.

Alia est *Flatulenta*, quando flatus umbilicum distendunt: quæ ex eo cognoscitur, quod tumor sit mollis, digitis cedat, tympani instar sonitum reddat, & quocumque tandem modo decumbente ægro non mutetur. *Curatur* difficulter, si causam in visceribus latentem & foveantem habeat. facile in infantibus *Discutientibus* tollitur.

Alia est *Carnosa*, quando carnosa substantia umbilicum in tumorem attollit: quæ ex eo cognoscitur, quod tumor sit durus, nec pressus cedat, & ad nullum decubitum caustico vel ferro peracta, nisi in cancrum desinat; sic enim malum incurabile est.

Musculorum abdominis inflammatio, vel *Rectos musculos*, vel *Transversos* afficit. Si illos, tumor oblongus est, & per totum ventrem extenditur. Cutis non sine colore contrectatur, & apprehensa minimè sequitur. in omni decubitu eadem tumoris magnitudo manet. Si hos, magis partes profundæ afficiuntur, & quia isti muscoli sunt membranosi circa finem, & plures nervos obtinent, dolor est vehementior. Ab Epatis inflammatione eo distinguitur, quod figuram musculorum sequatur, nec ita sit rotundus.

tundus. *Curatio* talis est, qualis in aliis inflammationibus. Et tantum de Morbis infimi ventris.

APPENDIX.

De Arthritide.

A Rthritis est partium circa articulos dolor, à defluxu humoris serosi & acris, è venis & arteriis in eas effusi excitatus, per periodos invadens, & motum impeditum conjunctum habens.

Subjectum sunt partes membranosæ, ac sensu circa articulos præditæ, à quibus nec ligamenta membranosa excluduntur. In illis magis dolor excitatur, tum quod humores à venis & arteriis è detrudantur: tum quod eò delati, angustius habitent.

Signa sunt ex relatione ægri ferè evidentia, primo impetu dolor pollicem pedis, & plerumque sinistri invadit: post tumor, calor, & rubor manifestè percipitur: accedit motus impotentia, & in diurnâ arthritide tophi, &c.

Causa est solutio unitatis, ab humore seroso, salso & acri inducta. Hic ex alimentorum, ut plantarum, Cyprinorum, vinorum insalubrium esu, accedente vitiosa viscerum, ut Epatis & Lienis, constitutione, salis seu Tartari illius effectrice exoritur. Sæpe ad spirituum naturam, qui salem in se mordacissimum habent, unde sæpe vagatur, accedit. Sanguii propter defectum sufficientis secretionis permiscetur. Per venas & arterias, unde instante paroxysmo vasa quæ ad manus & pedes tendunt, & extremis articulis inferuntur, intumescunt, ad articulos propter illorum seu nativam à parentibus, seu adscititiam, à labore, aëris excessu, aliisque articulos alterantibus, unde molliores laxioresque fiunt, imbecillitatem natura, copia stimulatâ, se exonerante, & interdum à causis externis, ut aëre verno vel autumnali,

nnali, affectibus animi, sudoris consueti retentione, &c. adjuta, mittitur. Ad articulos potius, quàm alias partes movetur, fortè quod ligamenta & tendines magis terrestri sanguine, & cum humore tartareo cognationem habente, alantur.

Curatio est in genere *difficillima*, tum ratione ipsius morbi, ob diætæ errores, & aliæ, tum ratione paroxysmi, quod humores per ligamenta membranas & nervos dispersi, propter istarum partium densitatem & frigiditatem, difficulter discutiuntur. Nulla, si morbus aliquis lethales ei conjungatur. si adsit luxatio, quia etsi articulus reponi possit, tamen ligamenta manent laxiora; si in luxatione cavitas articuli materiâ topheâ repleatur, quia antequam ista tollatur, articulus reponi non potest: illa tolli nequit, si sit hæreditaria. *Respicit* 1. *Paroxysmum*, in quo 1. *Humores ad partem affectam ruentes, tollendi*; ubi locum habet, *Venasectio*, si sanguis abundat; eaque *cita*, quia fluxus urget. *Basilica*, si omnes aut plurimi articuli afficiuntur. In *opposito*, si unus tantum. *Nulla*, si sanguis pituitosus prævalet, ne discussio protrahatur. *Purgatio* imminentibus doloribus, cui inservire putatur, *Hermodyctylus*, *pulvis arthriticus Paracelsi*, *Electuarium Caryocostinum Horatii Augerii*, *Gummi ad podagram* in fortioribus, in minùs robustis, materia vehementer ebulliente, *Syrupus de spina cervina Solenandri*, *Mechoacanna*, &c. *Sudor*, qui decocto *China*, radiis *bardana*, *The-riaca C.C. preparato*, *Antimonio Diaphoretico*, egregiè excitatur. 2. *Affluxus per Repellentia impediendus*, si subito & nimio humorum affluxu dolor augeatur: sed non sola, ne motus à natura institutus, cum vitæ periculo sistatur, verum anodynus permittitur. Laudatur *Liquor florum verbasci*, & *C.C. ustum*, in aqua florum verbasci maceratum & coctum, & parti dolenti appositum. 3. *Dolor mitigandus*, ubi locum

locum habet, *Oleum raninura Stockeri* lib. 1. cap. 58. *Praxeos. Aqua Antipodagrica Rulandi* apud Hartman. in Chymiatría, *Unguentum Lacuna* de Ebulis. *Spuma decocti radic. China* apud Zacuth. lib. 3. Hist. Med. Histor. 38. *Oleum ossum humanorum* inunctum. *Secretum Freitagii* ex Opio & Caphura in libro de Opio. *Ejusdem ibidem aliud* ex saccharo saturni, sale ejusdem, &c. *Lixivium* sale sufficienter conditum. *Pulvis lapidis Bezoar. Orient.* vel *C. C.* preparati cum rosaceo melle & acero calore levi permistus, & Cataplasmatris modo impositus, &c. 4. *Materia quæ affluxit, Discutienda*, ubi locum habent, unguentum de *Castoreo*, *Fungus quernus Solenandri*, *Consil. 24. sect. 4.* *Aqua*, in qua æs & ferrum extincta, & postea Mercurius vitæ maceratus. *Decoctum urticae* cum pane triticeo, sale, aquâ & vino factum, &c. 5. *Tophi dissolvendi*, cui negotio inservit ex *casco veteri* & acri in jure carnis suillæ salis intincto, *Cataplasma*, & id quod apud Hartmannum in chymiatría invenies. 11. *Præcautionem*, quæ reposcit 1. *Diætam convenientem*, in qua aëris excessus, cibi materiam suppeditantes, potus vini Moravici Austriaci, &c. animi affectus nimii vitari debent. 2. *Venasectionem*, nisi corpus sit frigidius. Nonnulli venas ad pollices pedum singulis mensibus aperiunt. 3. *Purgationem*, quæ vere & autumno ante æquinoctium institui debet, & leniora potius quàm fortia exposcit. 4. *Antipodagricorum usum*, ut sunt *Chamadrys*, *Chamapytis*, seu *Iva arthetica*, *Aristolochia rotunda*, *Rhaponticum verum*, &c. 5. *Articulorum roborationem*, cui *lixivium* ex cineribus fagi paratum & aliquoties colatum, cum pari quantitate vini, & unc. 11. Aluminis inservit.

Quantum ad *Differentias*, species ipsius sunt, *Podagra*, *Chiragra*, *Gonagra*, & dolor *Ischiadicus*. De illis nihil præter suprà dicta occurrit. De isto obler-

observandum, I. *Distingui debere* ab illo dolore, qui quidem vehementissimus est, sed nec tumorem sibi adsciscit, nec semper circa articulum, sed & in mediis spatiis intra articulos consistit. sæpe postquam hominem semel atque iterum afflixit, toto vitæ tempore non revertitur. II. Eum hoc *propriū habere*, quod latius quàm in aliis articulis, & sæpe ad vicina loca, tum propter ossis coxendicis amplitudinem, tum nervorum, qui à lumbis & ossē sacro ad eam articulationem veniunt, in diversas partes distributionem, diffundatur. III. *Curari* difficillimè, tam propter loci profunditatem & amplitudinem, quàm propter materiæ colligi solitæ copiam. In *Curatione* vena ad malleolum externum, si dolor extrorsum vergat, saphena ad internum si introrsum, ad derivationem bene tunditur. Purgantibus fortioribus agendum. *Discutientia* sunt *Iberis*, seu *Lepidium*, *Nasturtium hyemale*, *Piperitis*, & alia; de quibus consulantur Practici. Nos Ideam duntaxat scribimus. Et hæc de Morbis Infimi ventris & Articulorum sufficiant.



IDEÆ

I D E Æ MEDICINÆ PRACTICÆ

L I B E R X I.

De Morbis venenatis.

TITULUS I.

De Lue Venerea.

ACTENUS de morbis non venenatis actum est. Ad *Venenatos* pertinent, *Pessilentia*, *Lepra Arabum*, *Lues Venerea*, & *Venena*. De prioribus duobus superius egimus; jam de Lue Venerea agendum est.

Lues autem Venerea est virulenta & contagiosa totius corporis cachexia, plerumque cum *dyscrasiâ calidâ*, *desfluvio capillorum*, *maculis*, *tuberculis*, *ulceribus contumacibus* & dolore immani, nocturno præsertim sæviens, epati & facultati nutriendi adversa, ab excremento maligna & venenata qualitate infecto, per contagium, in primis verò concubitus illato, exorta, & plurimis symptomatibus sæviens.

Nomina habet varia. Dicitur morbus Gallicus, Italicus, Neapolitanus, Hispanicus, Indicus, Syphilis, Pudendagra, Variola magna, &c.

Subiectum adæquatum est totum corpus: fomes verò mali est ipsum epar, ex quo inquinato crudus corruptusque sanguis in totum corporis habitum dispergitur, & singularum partium nutritio vitatur.

Signa sunt, *Incipientis*, *Lassitudo* omnium membrorum levis cum gravitate totius corporis, quia spiritus naturales, qui sunt immediatum sustentantis facultatis instrumentum, infecti sunt. *Dolor* per universas partes vagus & parvus, quem vapor ob hepate elevatus inducit. Ab eodem *Color* faciei immutatur,

tatur, & sub oculis circulus lividus quasi in men-
struatis apparet. *Calor* insignis in vestigiis pedum &
manuum etiam in hyeme oboritur. somnus inter-
rumpitur. *Caries* circa pudendum moderata, seu
quia sanies pudendi faminei erosit pelliculam; seu
quia hepar communicatum sibi per spiritus natura-
les contagium ad pudendum propellit. *Bubones* moderati,
parvi, non dolorosi, non validè crescentes;
quia hepar ad inguina tanquam ad partes emulgen-
tes excrementa mala depellit. *Gonorrhœa* Gallica,
quæ ad labefactionem spirituum, facultates testium
regentium infertur. *Confirmati* sunt. *Pistula* in uni-
verso corpore, capite præsertim & barba duræ circa
quartum vel sextum mensem exortæ, aliquando cum
crusta, aliquando non; aliquando cum sanie, ali-
quando non; quæ vel à materia contagiosa ab hepate
transmissa, vel à parte excrementa propter vi-
tium concoctionis congerente, oritur. *Ulcuscula* in
pudendis callosa. *Vulva* in faucibus mollificatio &
dependentia, quam raucedo vocis excipit. spiritu
namque naturali labefactato, in ventriculo pituita,
in cerebro mucus, in venis sanguis pituitosus exoritur,
& processu morbi adustus, acris evadit. *Tumores*
glandularum in faucibus, materiâ infectâ, & ab
emuntoriis excretâ, capiti communicatâ. *Corruptio*
palati & dentium, quæ gradum morbi intensis-
simum indicat. *Dolores* firmi, clamosi, ante vespe-
ram exorti, qui vel à vapore maligno, vel ab excre-
mento circa perioestia cujuslibet partis congesto,
exoritur. *Corruptio* ossium capitis & brachiorum,
antequam ulcus exoriatur. *Ulcera* maligna univer-
sum corpus, propter jam datas causas obsidentia.
Desuviium pilorum. *Crusta*, *calli*, *rhagades*, in vo-
lis manuum & plantis pedum, quæ à materia pitui-
tosa valdè exusta oriuntur. *Tinnitus* aurium, qui, cum
vapor noxius à capite, nec per cutim, nec os, nec
nares

nares, expelli potest, & ideò ultimo conatu ad aures
protruditur, producitur. Plura vide apud Practicos.

Causa est excrementum venenosa malignitate in-
quinatum, totum corpus vel aliquas ejus partes oc-
cupans, sanguinemque in venis contentum corrumpens,
& ad bonam nutritionem ineptum reddens. *Communicatur*
per contagium, quod promovent *Internè*: 1. Vis imbecilla spirituum naturalium, &
ipsius hepatis. 2. Dilatio vasorum, ut vaporibus
& saniei transitus patere possit. 3. Facilis humorum
accensio, qua illud facillimè rapitur. 4. Substantiæ
natura & mollities in partibus. 5. Animi affectio,
quæ si intensa est, non facillè congrediventes inficiun-
tur. *Externè*, *Contractus* per communicationem
substantiæ, saniei nempe, ichoris, vel fuliginosorum
vaporum: quæ facilior est, si partes sint molles, ra-
ræ, & incallescant. quo facit, *Coitus* cum infecto, su-
ctus lactis, salivæ asperfusio, exosculatio, lectus com-
munis, usus vestium infecti, &c.

Curatio est *difficilior*, si semel sanatos adoritur. si
in intemperiem calidam & siccam incidit, quia vel
appropriata adhiberi non possunt, vel si adhiben-
tur, aliud corpori damnum attrahitur. si in tempus
anni calidum & siccum incidit, quia vires tum ma-
ximè exhauriuntur. si febris, tabes, aut aliud grave
symptoma conjungitur. si in artubus callosi, scirrho-
si & duri tumores apparent. si æger est infans, & cum
lacte hoc malum suxit, quia cum lacte virulentia
ventriculum ingreditur, quæ hepar & sanguinem in-
ficit. *Respicit* 1. *Præservationem*, quæ tamen bonâ
conscientia, ne fores vagis libidinibus pandantur,
doceri non potest: nisi fortè præcautionem illam in-
telligas, quâ aliquis infectus, solitis symptomatibus
ne ingruant, occurrere conatur. 1. *Curationem*, quæ
absolvitur, 1. *Sanguinis*, ac *vitiis humorum* be-
ne *præparatorum*, *evacuatione*. Ubi nota 1. *Vena-*
sectionem

sectionem non instituendam, si bubo suppuretur, ne materia ad interiora revocetur: Instituendam, si sanguis abundat, ut tutius medicamenta appropriata calida & sicca dari possint. si materia ad peculiarem partem non movetur. Cephalicam tundendam, si materia ad caput intendit. Basilicam, si ad nullam partem. In pene, si adsit caries, vel gonorrhoea. In partibus inferioribus, si bubo ad suppurationem non tendit. 2. *Purgationem* instituendam in principio, ne corpori impuro per Alexipharmaca noxa detur. Continuandum toto Curationis tempore, si materia colligatur. *Omittendam*, si materia in externis præcipuè partibus hæreat. Mechoacannam & Jalapam additis specificis maximè hic inservire. 11. *Malignitatis & virulentia tam humoribus inhærentis, quàm partibus, & præcipuè epati impressa expugnatione*, quæ per sudorifera & salivationem perficitur. Medicamenta sudorifera, appropriata hic sunt, *Guajacum* quod melius in decocto vel spiritu quàm ulla alia forma præbetur, ut oleaginosa ipsius & resinosa pars, in qua vis tota consistit, educatur; & minore quantitate in principio, ne aliquam noxam nimio calore, catarrhis præsertim præsentibus adferat. *Salsaparilla*, cujus inprimis radice cortex medullâ abjectâ sumi, nec dolore oculorum præsentè adhiberi debet. *China*, quæ temperata, & aliquid alimentarii obtinens, atrophiam præsentè commodissimè adhibetur. *Sassafras* aromatici odoris, *Lignum quercutini* juniperi cum baccis, fagi, buxi: de quibus observat. Renealmi vide. *Bezoarticum animale*, *Mixtura simplex*, *Perficaria arcanum*, *spiritus Mercurii albus*, Hartmanni, ejusdem *rubeus*, &c. *Modum utendi* Fallopius, & Quercetanus in peculiaribus de lue venerea tractatibus, Hartmannus in chymiatría, Sennerthus l. 6. Practicæ luculenter describere. *Salivatio* excitatur *Mercurio* seu argento vivo, vel intra
sumto,

sumto, ubi locum habet Turpethum à gr. i. ad iii. sumtum. pillulæ ex mastichis pulver. scr. j. granis aliquot puta à 3. ad 8. Mercurii sublimati dulcis cum melle in pastillos formata: & ad dies interdum triginta masticata: Vel *extra per inunctionem* quantitate hydrargyri nunc majore, nunc minore, (singulis vicibus scr. ii. adsumi possunt) adhibito, quam antecedere debet Corporis per punctionem aut venæsectionem evacuatio. *Mercurii* puri & ex cinnabari vivificati cum pinguedine porcinâ, oleo, butyro, terebinthinâ, mixtio & mortificatio. *Sequi*, Mercurii ex corpore, ne quid in eo relinquatur, per sudores, aureorum nummorum in ore retentionem. ramentorum auri haustu, & cæter.eductio. Oris & faucium lacte tepido abluto. Inflammationum decocto plantaginis prunellæ, &c. prohibitio. In genere verò observandum, Mercurium adhibendum, cum decocta lignorum propter aliquod prohibens admitti non possunt, vel morbus aliis remediis expugnari non potest; idque nonnisi, cum vires sibi constant. Corpus nec nimis impurum, nec nimis emaciatum. Aër non valdè calidus. Ager ante morbum, paralyseos & tremoris expertus erat. Suffumigia nimis sunt vehementia, ideo inter extrema remedia computantur. 111. *Diatâ conveniente*, cujus accuratam descriptionem apud Authores vide.

Symptomata præcipua in lue venerea occurrentia, sunt.

I. *Caries*, quæ in triplici est Differentiâ. 1. Aut fit per contactum, infecto alterutrius sexus pudendo; & tum pustulæ, primum parvæ & candidæ, quæ crassitiem minimi grani panici non excedunt, erumpunt: his ruptis ulcusculum rotundum, candidum in medio habens punctum, remanet; interdum illis inter se copulatis, tota glans quasi coronâ cingitur, sine dolore, cum levi pruritu. *Curatur*, unguento dia-

pompholigos, vel aqua solani, in qua aliquid aluminis rochæ dissolutum, linteis imposita. Aut per transmissionem excrementi tenuis ab epate ad pudendum: & tum ulcus est rotundum, puncto albo carens, lividum, labra paulisper elata, purpurea, habens. In Curatione repellentia sunt fugienda, ne excitetur Bubo. Ablui potest decocto Guajaci solo cum aqua plantaginis, &c. Aut per Excrementorum pudendo adhaerentium per coitum excalesfactionem, putredinem & infectionem; & tum ulcus est malignum, non rotundum, varix figuræ & coloris, callosa habens labra, serpens, &c. De ejus Curatione consule Fallopium, capite 85. II. Aut est in sinu muliebri, cujus cura post abluionem reposcit Pessarium Fallopii. Detergentia si suppurari ulcera incipiunt. Caustica, si putredo est robusta. Ferrum ignitum, habitâ partis sanæ ratione. Pudendi quotidianam decocto Guajaci cum scabiosa & tormentilla abluionem. Aut in Canali virgæ, quæ ex sanie manante, & maximo tempore mictionis dolore cognoscitur, & eo modo quo sequens curatur. Aut in Glan-de, cui & præcedentia & sequentia applicari debent. III. Aut est cum tumore præputii, ut glans detegi non possit; vel si detegatur, maximo id fiat cum dolore: de quo vide Fallopium cap. 83. Aut cum callo præputii, de quo idem c. 84. Aut cum cicatrice callosa. Aut cum verrucis seu excrescentiis, de qua capite 87. & 88.

II. Bubones, qui ab aliis non gallicis Distinguntur, quod vel caries, vel gonorrhoea contagiosa adsit, & congressus, nulla alia certâ causâ existente, præcesserit. Dum autem isti tumores sunt generum. Aliquando colligitur materia circa glandes in membrana vestiente glandulas, vel implente cavitatem inguinum. Aliquando substantia propria glandulae intumescit, qui tumor interdum in tantam magnitudinem

tudinem ascendit, ut panis unius solidi magnitudinem excedat. In Curatione vitanda venæsectio & purgatio, nisi bubo vel decreascat, vel consistat. Emollit eum & maturat Emplastrum Diachylon; aperto, Opodeldoch bene imponitur. Oleum Tartari nigrum est præstantissimum discutiens.

III. Desfluvium capillorum, quod à malo humore radices capillorum erodente oritur. In Curatione vitanda sunt Adstringentia. Gargarismi & sudores hic multum prosunt; quibus ablatio capitis, lixivio Fallopii, succedere potest.

IV. Dolores capitis, in quorum Curatione intra habet locum oleum Mercurii Diaphoreticum Hartmanni: Extra Emplastrum magistræ Vigonis de Ranis, & Plateri observ. l. 3.

V. Dolores articulorum, & præcipue inferiorum internodiorum, qui noctu exacerbantur, quod tum pori stipentur, & fomentis tolluntur.

VI. Pustula, Exanthemata, Scabies, Fissura, in volis manuum & plantis pedum. quorum Curationem vide apud Hartmannum.

VII. Gonorrhœa, in qua idem Hartmannus laudat, Mercurium præcipitatum viridem, aut gummi Guajaci, quibus exhibitis Terebinthina violar. aqua abluta, & cum vitello ovi trita, cum salsæparillæ decocto exhiberi debet. Distinguitur ab alia eo, quod exiguum vel nullum pruritus excitet, nec ita citò ægrum in tabem conjiciat.

VIII. Tinnitus aurium, qui difficillimè curatur: interdum tamen usu decocti guajaci evanescit. Scptalius laudat Asini urinam, in qua per noctem lignum Guajaci, portio castorei, & fasciculus mentastri maduere, destillatam, & auribus instillatam, aut per evaporationem exceptam.

IX. Tophi, seu Nodositates, & Gummata, quibus curandis egregia Emplastra suppeditavit Plate-

rus observationum libro tertio. Huc pertinet unguentum *Hartmanni* ex unguento aureo officinali, & *Mercurio sublimato* paratum.

X. *Tabes*, in cujus curatione *salsaparilla* decoctum cum carne vitulina macrâ factum, admirabile esse dicit, *Septalius* lib. 7. Animadversionum, mihi p. 322.

TITULUS II.

De Venenis.

CAPUT I.

De Venenis Fossilibus.

V Enena in specie considerata, sunt vel *Fossilia*, vel *Vegetabilia*, vel *Animalia*.
Fossilium præcipua & maximè communia sunt sequentia.

I. *Aqua fortis*, cujus vis mucilagine semin. cydonior. psyllii, gummi tragacanthi, &c. infringitur.

II. *Antimonium*, cujus antidotum est bolus *Armenus*, cum oleo Caryophyllorum & pauxillo vini exhibitus. Ne vaporibus dum in igne tractatur lædat, butyrum cum ruta comedendum est, vel aqua *Zedoariae* bibenda.

III. *Lapis Lazuli*, qui si vel malè præparatus, vel in majore quantitate sumatur, vomitu ejici debet, & haustu lactis tepidi, afinini præcipuè temperari.

IV. *Arsenicum*, *Auripigmentum*, *Sandaracha*, quæ interdum & odoratu insciunt. specifica earum sunt, Crystallus fossilis pulverizatus, & dr. j. pondere cum oleo amygdal. dulcium recenti potus: & oleum è nucleis pini dr. iij. pondere exhibitum.

V. *Æs ustum*, *Squama aris*, *Flos aris*, *Ærugo*, quæ infringuntur à pinguedine ovilla, in juscule sumta:

sumta: enecantur à bolo Armeno cum hydromelite exhibitio.

VI. *Scoria ferri* & *ferrugo*, cujus antidotum *Magnes* dr. j. pondere in pillulas cum succo Mercurialis conformatus esse putatur.

VII. *Plumbum*, cui grana cydoniorum excorticata, trita, & dr. ij. pondere cum vino dulci exhibitio, opponuntur.

VIII. *Argentum vivum*, cujus fumo recepto haustu vini, in quo Cephalica quædam decocta sunt, obviam itur. Sublimato oleum Tartari vel sal Ab-sinthii resistit.

CAPUT II.

De Venenis vegetabilibus.

V Enena vegetabilia, seu quæ ex plantis, sunt sequentia.

I. *Aconitum* seu *Napellus*, cujus antidotum, *Theriaca Andromachi* in vino, vel terra Lemniæ. Foris corpus tumidum oleo hypericonis & scorpionum inungi debet.

II. *Efula*, contra quam præmissio vomitu, *Theriaca Andromachi* cum aqua Carduibenedicti agit.

III. *Mezereon*, cui obviam itur scordio, *Coralis rubris*, *Theriaca*, & terrâ Lemniâ.

IV. *Helleborus niger*, cujus antidotus est, pulvis florum aut radicum nymphaeæ albæ, vel seminis pastinacæ cum vino.

V. *Colocynthis*, cujus vim *Theriaca* infringere potest.

VI. *Euphorbium*, cujus vim semen citri ex vino, in quo radices helenii coctæ sunt, infringit.

VII. *Coriandrum viride*, quod furiosum inducit delirium, & radicem Vincetoxici ex vino Antidotum agnoscit.

VII. *Mandragora*, quæ somnum gravem infert, Obviam ejus symptomatibus itur, raphano domestico cum sale aliquoties assumto.

VIII. *Hyoscyamus*, quem qui sumere modò rixantur, & ebriosorum instar delirant, modò se virgis cædi, ob pruritus in toto corpore excitatum putant. Bezoartica ejus sunt, Pistacia, Castoreum, Rura, semen urticae.

IX. *Juglans arbor*, cujus umbra, si quis sub ea jaceat, nocet, & capitis dolores infert. Tolluntur isti Lixivio ex Betonica, Majoranâ, Lavendulâ, &c.

X. *Nux vomica*, cujus antidotum Zedoaria dr. ij. pondere, Cortices citri vel succus ejus, Rob Myrti vel Cydoniorum.

XI. *Opium*, ad cujus nimium usum sopor gravis cum vertigine & pruritu totius corporis ingruit; & cujus antidotum est Asa & Castoreum, quibus Rutam & Origanum adde.

XII. *Fungi*, qui seu nimia copiâ ingesti, seu minus rectè cocti suffocationem inducunt, singultum excitant, urinam remorantur, & intestina exulcerant. In curatione commendatur Cinis fermentorum vitis, cum aqua mulsa, Theriaca, & alia.

C A P U T . III.

De Venenis Animalibus.

VEnena quæ ab animalibus inferuntur, præcipua sunt, quæ inferuntur.

I. Ab *Aspide*, cujus tam exiguum est vulnus, ut ferè visum effugiat. Morsui ejus, capitis gravitas, somnolentia, faciei pallor, crebræ oscitationes, &c. superveniunt. In Curatione providendum ligaturis & scarificationibus, ne venenum in corpus penetraret: vulneri Theriaca cum ruta contusa imponenda. Alexipharmaca intus exhibenda, inter quæ folia Thapsi

Thapsi barbati, Caryophyllatæ, in aceto decocta laudantur.

II. A *Vipera*, ad cujus ictum sanguis primò exit purus, quem sanies cruenta spumosa & ærugini similis cum partis & totius corporis notabili tumore, pustulis in parte affecta, adustis & nigricantibus. Antidotum ejus est Costum à dr. f. ad dr. j. cum vino absinthite, vel decoctionis absinthii exhibitum, coagulum leporis, porrum, &c.

III. A *Scorpione*, ad cujus ictum, dolor, inflammatio, tumor, circa plagam pustulæ verrucis similes insequuntur. Resistunt ei Salvia, Scordium, Absinthium, Gentiana, Aristolochia, Verbenacæ recta, Serpillum, &c. Quidam thure contrito, in quo scorpium sigillum impressum erat, liberatus est.

IV. A *Lacerta*, quæ dentes suos subtiles, parvos, nigros, plerumque in vulnere relinquit. Dentes cucurbitulis sunt eliciendi. Cataplasma ex panis triticeæ medulla, cum decocto rutæ, allii, gentianæ confectum, applicandum. Intus Alexipharmacis agendum.

V. A *Hirudine*, quæ si malè applicata est, ut vulnus non bene cedat, Cataplasma ex agrimonîâ contrita imponi debet. Si in intestina penetravit, stercore bovino sicco modicè calido, cimum pulvere vel castoreo irrorato, ano admoto, clystere ex solius cæpæ succo primò injecto, excluditur.

VI. A *Rubeta* quæ interdum afflatu, interdum urinâ in herbas ejectâ, inficit. In Curatione, Theriaca cum decocto rutæ propinetur. Vinum meracum liberaliter bibatur. Sudor copiosus in balneo provocetur.

VII. Ab *Araneo*, qui vel intra corpus sumitur, vel ictu venenum suum corpori immittit. Quocunque modo id fiat, ventris intumescencia, lacrymæ involuntariæ, mingendi cupiditas, membri virilis in juveni-

juvenibus tensio, in senibus laxatio, affligunt. In Curatione, intra Theriaca post vomitum bene exhibetur. Extra, locus demorsus sæpius aquâ falsâ abluendus est.

VIII. A *Muscis, Vespis, & Araneis*, quorum aculei eximendi: & locus postea aquâ falsâ abluendus, & animalcula contrita vulnere, ut venenum exsugant, imponenda.

I D E Æ MEDICINÆ PRACTICÆ LIBER XII.

De morbis Puerorum.

TITULUS I.

De morbis Capitis.

POTERAMUS jam subsistere, & opusculum concludere, nisi Puerorum morbi, in quibus nonnulla singularia occurrunt, fecissent. De illis itaque in hoc libro ultimo, tanquam appendice, brevissimè dicemus; eosque in morbos *Capitis, Medii, & Infimi ventris* haud incommode dividemus.

Morbi Capitis puerorum sunt.

I. *Crusta lactea, Achores & Farvi*, seu ulcerosa tubercula, in capite præcipuè, sed interdum in universo corpore exorta, è foraminibus saniosum quid fundentia. *Oriuntur* ab humore partim crassas, partim tenues, serosas, falsas, & nitrosas partes continente vel in utero, vel extra lactis vitio collecto. In Curatione, si nihil mali metuendum expellentia, ut syrupus fumariæ, cornu cervi ustum, exhibenda.

Nutrix

Nutrix evacuanda, Materia peccans exhibitio syrupo borraginis, fumariæ, &c. temperanda. Si putredo insignis sub crusta meruitur, Caput emolliente decocto lavandum; mox leniter exsiccantes inunctiones adhibendæ. Si cranium læsum est, eidem providendum.

II. *Siriasis*, seu cerebri & membranarum inflammatio, quam syncipitis & oculorum cavitas consequitur. *Cognoscitur* ex eo, quod ossa syncipitis parte superiore, ubi futura coronalis & sagittalis coeunt, membranacea quasi sunt, & omnium postrema indurantur. *Oriri* etiam potest à lacte, si nutrices potu spirituosiore & calidiore utantur. Ut Lucretius author est, scetus teneros caprarum à lacte mero dementari. In Curatione danda opera, ne cerebrum nimio refrigerantium usu lædatur.

III. *Epilepsia*, quæ provenit, A *Terrore*, cujus occasiones omnes vitandæ sunt. 2. A *Lacte corrupto* in ventriculo; & tum vomitus est optimus. 3. A *Vermibus* in intestinis sese moventibus; quorum ratio est habenda. 4. A *difficili dentitione*; quæ promovenda. 5. A *Variolis, morbillis, febribus*, quæ etiam sunt curanda. 6. A *primario cerebri affectu*. Curatio in genere; & tempus paroxysmi, & tempus post paroxysmum respicit. Ibi laudatur *Smaragdus* gemma, *Lapis* in *hirudinum ventriculis* circa oppositionem Solis & Lunæ disiectis repertus. *Vingula Alcis* auriculæ sinistræ indita. Vomitus. Hic, *Nodulus* ex C. C. præpar. sale Corallorum, Crytallo præpar. visci quercini ligno formatus, potui injectus, & singulis quinque diebus renovatus. *Emplastrum* ex succini albi, Thuris, Mastiches ana dr. j. f. Galbani, Opopanac. ana scr. j. Visci quercini dr. ij. Ambra gr. vj. Moschi gr. iij. semin. poconia maris dr. f. Ladani dr. i. f. Olei Nucis moschatæ pauxillo, formatum, & pulvere Cubebarum aspersum. Inungi quoque synciput, & cervix *oleo succini albi* potest.

A a a 5

IV. Pa-

IV. *Parviores in somno*, qui quia à vaporibus impuris & terris, spiritibus animalibus immixtis, & eos turbantibus, ex ventriculo elatis, oriuntur; ideo infantibus, qui lac avidius sugunt, accidunt. In *Curatione* videndum, ne vel se nimis lacte infantes ingurgitent. vel lac malum generetur, vel parvuli pleno ventre cubitum deferantur. Ventriculus circa orificium ol. cydonior. mastich. cum ol. nucis moscharæ inungatur; ante somnum rotula Diamoschi in lacte dissoluta ingeratur: & nisi calor adsit, Theriacæ aliquot hebdomatim offeratur.

V. *Convulsio* articularum in manibus & pedibus, quæ à crassi lactis copiosa ingestione oritur, & quæ circa dentitionem plerumque infestantur. In *Curatione* habenda ratio frigida & calida intemperiei. Cervix & Articuli convenienter sunt inungendi.

VI. *Vigilia nimia*; quæ plerumque à vaporibus acerbis, ex lacte in ventriculo corrupto elatis, oriuntur: Interdum à febribus, vel dolorifico affectu exsurgunt. In *Curatione* melius est, ut plantæ pedum medullâ cervinorum ossium inungantur, quam ut iisdem hypnotica fortiora, quibus stupiores redduntur, exhibeantur.

VII. *Strabismus*, quæ curatur in recens nato, si lucerna in partem oppositam, quo oculi declinant, ponatur: vel larva foraminata faciei apponatur, de qua apud Hartmannum.

VIII. *Aurium humiditas*, ob humiditatem cerebri excrementa multa cumulantis exorta, in qua non deproperandum ad curam. Laudatur *Urina puerorum destillata*, in aurem guttis aliquot immixta.

TITUL

TITULUS II.

De Morbis medii Ventris.

M *Orbi medium in pueris ventrem afficientes*, sunt:

I. *Dentitio difficilis*, quæ ex eo cognoscitur, quod tempus sit dentitionis, quæ circa initium septimi mensis accidit. infantes digitos frequenter ori inserant. nutrices papillas fortius stringi sentiant. locus ubi dentes erumpere conantur, albicet. dolor ingens, tum inprimis cum canini eduntur, vigilæ, fluxus alvi, convulsiones, afficiant. *Curatio est bonæ spei*, si alvus crebro emittit. si febris acuta accidit, quia materiâ convulsionem faciente per febrem assumptâ, convulsio non accedit. si hyeme vel vere dentes erumpunt: quia hyeme caloris nativi vigor major est; vere, gingivarum laxitas. In ea videndum, ne si alvus fluxa est, nimis citò sistatur. *Tumentes* gingivæ, cerebro leporino cocto, vel pinguedine illius: *Inflammata* unguento ex oleo rosaceo & cera candida, succo solani elota: *Exulcerata*, butyro non salito cum nonnihil mellis & thuris pulverizati, illinendæ.

II. *Tussis* cum difficultate respirationis, quæ vel à materia, à capite descendente oritur; & tum catarrhus & tussis adest, & inter respirandum stertor quidam ac sonus percipitur, dum aer non liberè, sed per obstructa pulmonis bronchia transit: vel ex sanguine pituitoso è venis ad pulmones ascendente; & tum catarrhus & tussis abest, & hypochondria sunt tumida. In *Curatione* observandum, utrum Tussis sit calida vel frigida: utrum sicca, vel humida. Laudatur *pedum lotio* cerevisiâ, in qua herbæ cephalicæ incoctæ fuerunt, quam inunctio plantarum pinguedine lucii, vel sevo hircino insequi debet. *Extra*, pectus pinguedine

guedine gallinæ ad facilitandam respirationem, inungi poterit.

TITULUS III.

De Morbis infimi ventris.

Morbi infimi ventris in pueris, sunt:

I. *Vomit*, qui si à *Copiâ lactis* procedat, subtrahendum est. si à *Lactis corruptione*, id quod vomitu ejcitur, attendendum est. In Curatione prodest mel rosatum solutivum, intus datum; extra, ventriculus oleo menthæ vel absinthii inungendus: si à vermibus, ad eos curatio obvertenda.

II. *Tormenta ventris*, quæ ex eo cognoscuntur, quod infantes sint inquieti, mammas averlantur. *Oriuntur* à flatibus, humoribus, lacte corrupto, vermibus. *Curatio* ex superioribus petatur.

III. *Hypochondriorum inflatio*, in qua infantes angustia & oris ventriculi compressione, Cardiacâ, & difficili respiratione laborant. Oritur ab infantum *indignatione*, quando vel copiose lac sugunt, vel nimium alterius cibi sumunt. Exhibetur commodè contra istum affectum pulvis radic. ireos, pœoniæ, intra: Extra, fomenta per decocta cardiacæ profunt.

IV. *Alvi adstrictio*, quæ procedit, Aut ab errore aliquo in diætâ matris vel Nutricis. Aut ab intemperie seu ipsorum intestinorum frigida & sicca: seu visceris alicujus calidâ & siccâ. *Ibi* alvus semper ferè tarda est, & humectantibus, Cassia nempe, passulis laxativis, &c. agi debet. *Hic*, signa & curatio ex suis petenda locis. Aut à *pituita viscida* & tenace fæces obvolvante; cui incidentia & abstergentia debentur. symptomati ipsius subvenitur, partim suppositoriis ex stercore muris cum sævo hircino: partim clysteribus: partim *Epomphaliorum* usu, quæ

quæ ex aloë, felle tauri, myrrha, butyro, oleo colocynthidos Quercetani, & aliis parantur. Possunt & nutrici medicamenta purgantia præberi.

V. *Alvi fluxus* accidit vel *extra tempus dentitionis*, cujus ratio ex libro sexto petenda est: Vel *tempore dentitionis*, ob alimenti corruptionem, & turbatam coctionem, seu propter febrem & calorem præternaturalem, seu propter vigilas nimias, quas dolor parit; seu propter dolorem calorem ad actionem necessarium avocantem. Hic citò sisti non debet, si nec est copiosus, nec infantes malè ferunt. Sin aliter accidit, abstergendum primò vel clystere, vel syrupo rosarum solutivo cum adstrictione. Mox adstringendum, habitâ ratione caloris & frigiditatis.

VI. *Lumbrici*, de quibus libro sexto sufficienter dictum. *Præcaveri* possunt, partim *Diætâ*, in qua dulcia, pingua, lac, pisces, fructus horarii, ficus, & alia vitanda; potui C. C. præparatum immergendum: partim *Medicamentis*, materiam generationi vermium aptam, subducentibus; ut sunt decoctum sebesten, aut ejus electuarium, Rotulæ diaturbith cum Rhabbarbo, &c.

VII. *Hernia*, quæ *Oritur* vel à *laxato aut rupto peritoneo* ob fletum, tussim, lapsum, crurum divaricationem; & tum, tumor in una plerumque parte est, intestina prolapsa tactu percipi possunt. Curationem vide suo loco. Vel ab humore aquoso in abdomine abundante, & in scrotum descendente, eumque in tumorem attollente; & tum, tumor plerumque est in utroque latere, scrotum magis quàm in Enterocœle inflatur. In Curatione Discutientibus utendum.

VIII. *Umbilici inflammatio*, quæ *oritur*, quando sanguis eo ex dolore, & læsione ab aëre externo concurrit. Periculosa est, si in abscessum muretur, eoque rupto intestina procidant. Ideò suppuratio quantum fieri potest, prohibenda est.

IX. Umbilici prominentia, quæ eo ab Inflammatione *Discernitur*, quod umbilicus tactui cedat, color cutis non mutetur, nec pulsus vel dolor, nisi intestina valde prolapsa sint, adest. *Oritur* 1. *A mala illius ligatione*, vel quando major ejus pars quàm debet, relinquitur. Et hæc incurabilis est. 2. *A peritonæi laxatione*; & tum tumor æqualis ferè manet, umbilicus non ita multum prominet. In Curatione, à flatulentis cibis, tussi, fletu cavendum. 3. *A peritonæi ruptura*; & tum tumor, dum infans supinus jacet, vix percipitur; dum ambulat, sedet, flet, clamar, incrementum sumit. In Curatione mucus, qui in pruno sylvestri nascitur, utilis est. Forestus Rorulas è corio confectas, & oxycroceo inunctas laudat.

X. Calculus vesicæ, qui ex eo *cognoscitur*, quod urina cum dolore & guttatim emittatur: ea interdum sit limpida, interdum lactis, vel feri instar, interdum sanguinis aliquid contineat, infantes pruritus in membro virili percipiant. *Oritur*, seu à lacte ex cibis materiam calculo formando aptam producentibus, genitos; seu à pulmentis, accedente vel ventriculi aut epatis; debilitate, propter quam inutilia non secernuntur; vel renum intemperie calidiore, ob quam chylus attrahitur, & ad vesicam non alteratus transmittitur. In Curatione Balnea locum habent, cum inunctionibus: nec non juscula cum granis Cygnosbati depuratis confecta. Vide superius l. 6.

XI. Urina incontinentia, quæ *Oritur* 1. *A consuetudine*, musculo orificio vesicæ claudendo dicato, ita disposito, ut ad minimum stimulum laxetur. Si in habitum abit, ad mortem plerumque comitatur. 2. *A Calculo vesicæ*, de quo in præcedentibus. 3. *A Sphincteris imbecillitate*, à frigida & humida intemperie inducta; quæ partim Diæta nutricis; partim medicamentis convenientibus, intra & extra ad-

hibitis,

hibitis, (laudatur *balneum* ex sulfure, nitro, & foliis quercus) tollitur.

XII. Intertrigo, quando cuticula in coxis à vera cute separatur. *Oritur* inprimis ab urinæ acrimonia, in corpulentioribus præsertim, in quibus fordes coxis ob corpulentiam corrugatis, adhærescunt. In Curatione habet post balneum, Nihili album, loco adspersum, vel unguentum de lithargyro illitum.

XIII. Macies quæ oritur, 1. *A vermibus subtilissimis*, qui in musculosis brachiorum & dorsi partibus generantur, & alimentum absumunt. Erumpunt capillis cinericis aut nigris similes, postquam illæ partes, in balneo, pane cum melle mixto fricatæ fuerint. Tolluntur, si novaculâ vel crustâ panis, postquam se exseruerint, abradantur. 2. *A lacte* vel pauco, vel *vitioso*, quibus vitiiis interdum nutricis mutatione occurritur. 3. *A Fascinatione*, quam vel corporum malè affectorum contactus, ut in scabie, lue venerea, &c. accidit, infert: Vel *nocturni demones*, seu morbosa effluvia, quæ aut ab iis aut eorum partibus, oculis præsertim, (hinc ophthalmia laborantes, si quis attentius aspiciat, ophthalmia corripitur) erumpunt, & in eos transferuntur. Inter Medicamenta fascinationem infringentia, *Succinum* & *Corallia* collo appensa, à quibusdam vehementer laudantur. Sed de puerorum morbis consule *Sebastianum Ausrum*, & *Nicolai Fontani* notas in ipsum.

Conclusio.

Hæc sunt, quæ de præternaturalibus humani corporis affectibus volui; quæ si familiaria sibi reddiderint Medicinæ tyrones, in atrium se ipsius inductos, ni fallor, sentient. De cætero, ut in præfatione, quædam observatu Ideam hanc aggressuro necessaria posui; sic & hic nonnulla breviter moneunda obveniunt: quæ & *Praxin Medicam aggressu-*

rus,

rus & eandem exercens, & in eadem feliciter prove-
ctus, observare necesse habebit, si ἀπειλῶ, δειλὴν,
& θρασυτήτι, &c. effigere voluerit. *Praxin aggressus*, i. Conferet istam cum aliis Authoribus Ideam;
& ex illis errata, si quæ occurrunt, emendabit; de-
fectus supplebit; obscuritati ex brevitate natæ, lu-
cem afflabit. 2. Acceder ad Consultationes, Obser-
vationes & Epistolas Medicas, ex quibus præcepta
firmabit, & experientiam alienam hauriet. Palmam
reliquis præripiunt, Forestus, Solenander, Dodo-
næus, Platerus, Crato, Langius, Fernelius, Horstius,
&c. in quorum ut & aliorum lectionem, Medicinæ
studiosos in animo introducere, habeo; si mihi
DEUS vitam ad plures curas produxerit. *Zacutus*
Lusitanus mihi ferè excidisset, qui & in Historia sua,
& in Praxi Historiarum multum præstitit. Episto-
lam, quam ultimo libro præfixit, pro mea non agno-
sco. Nec titulum mihi, nec stylum scriptioni, nec
locum literis competere, autographum ostendit.
Moneo; ne, quod quis calumniatur, habeat. 3. Visi-
tabit diligenter cum Medicis ægros, & eorundem in
morborum exploratione, filo curationis, prognosti-
corum decretis, temporum observatione, occasio-
num raptu, &c. processus expendet & notabit. His
mediis ἢ μεθυσὶς ἐμφυσῶν εἶσα δέξιός τε καὶ ἀλδύς
fructus suos proferet, & ἀπειλῶ καὶ θρασυτῆτος καὶ
κακὸν κερμῆλιον τοῖσιν ἐχασιν αὐτῶν καὶ οὐκ ἐν ὑπέρ-
δυσχεῖς τε καὶ ἀφροσύνης ἀμυγῆ, δειλὴς τε καὶ θρα-
σύτης πῆνι; ut Hippocrates in lege loquitur, exu-
labit. *Praxin exercens* faciet quædam, fugiet quæ-
dam. Ex faciendis sunt 1. *Dei cultus*, & invocatio,
sine quo nihil ritè, nihil providenter homines auspi-
cantur. 2. *Amor consultationum*, in quibus ἐκ νεω-
ταύτης ὡς περὰ τὸν νοσούντα disquiruntur, & conjunctis
operis εἰς εὐπορίας βοηθήσιος pervenitur, ut Hippocra-
tes ἐν πειραγέλλῃς scribit. 3. *Calumniarum vitæ*
con-

contemptus, quod temerario suo judicio effecit, ut
Medicina τεχνέων πεισίων ἐπιφανέστατη, jam longè in-
ferior habeatur. Fecit id Hippocrates, ut ex libro de
Articulis apparet: fecere & alii, qui vel ideo popu-
lo placere noluerunt, quod quæ populus sciret, ipsi
nescirent; quæ ipsi scirent, populus nesciret. 4. *Cau-
ta præsentia*, quæ in acutis sunt difficilia, & incerta:
ut videre est apud Galen. 1. de Art. constit. c. 18. si
bene cadunt, confidentiam medico largiuntur; sin-
minus, infamiam approperant. 5. *Sollicita occasio-
num captatio*. Cum enim occasio nihil sit aliud, quàm
opportunitas alicujus rei, qua habet idoneum tempus
faciendi, vel non faciendi; ut docet Cicero in lib. de
Invent. & vero hæc sit ἐξὺς, præceptum, ita ut sæpe
in Medicina, Φυχὴς κινδυνὸς ἢ ὑπὲρθεσις teste Hippo-
crate Epistolâ ad Crateram; multum in ea situm esse
unusquisque facilè colligere potest. Inter fugienda,
sunt, 1. *Avaritia*, quâ profectò illi laborant, qui
pauperioribus spretis, opulentioribus, tanquam mu-
sicæ victimis, inhiant; & mercedem non labore, sed
propria habendi libidine metiuntur. Hippocrates ἐν
ἀρχηγεσύνης, sapientem medicum argenti contem-
ptorem esse scribit: & in libro *præceptionum* inter-
dum gratis curare, & magis μνημὲν διαπραγμᾶν
τιελῶν, quàm παρέσθαι δίδουκεμὲν respicere jubet. 2.
Garrulitas, ex Celsi & Hippocratis præcepto; quo-
rum ille, eloquentiâ nullos curari morbos, sed reme-
diis, in procemio de re medica scripsit: iste garru-
lum medicum, alterum ægro morbum esse, l. c. di-
cit. 3. *Invidia*. Cum enim bono humani generis à
DEO Medicina data sit, & Medicus φιλόσοφος ἰσθ-
γῆς esse debeat; videtur invidus Medicus & à se i-
pso degenerare, & à fine inventionis aberrare, dum
sibi soli se natum putat, & propria commoda totius
humani generis salutis anteponit. 4. *Contumacia*,
qua multi nil rectum, nisi quod placuit, sibi ducunt,

nec errores suos fateri volunt. Abhorruerunt ab hoc vitio Hippocrates & Galenus. Hic se in dolore colico aberrasse, 2. de locis affectu cap. 5. fatetur : ille, à futuris se esse deceptum, memoriæ prodidit : quod Celsus l. 8. c. 4. more magnorum virorum & fiduciam magnarum rerum habentium factum dicit. Nam levia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt. Magno ingenio multaque nihilominus habituro, convenit etiam simplex veri erroris confessio, precipueque in eo ministerio, quod utilitatis causa posteris traditur, &c. 5. Morbi desperati, quos cavere & Hippocrates & Celsus jubent. Ille libro de Arte, cum dicit Medicinam, quod ejus sit *πλεμπαν ἀπαλ-
λάσσειν τῶν νοσούντων τὰς καμνύσας, μὴ ἐν ἡμέραν τοῖς
κακώτερον γίνονται τῶν νοσημένων*. Ille lib. 4. cap. 26. cum ait. Esse prudentis hominis primum eum, qui servari non potest non attingere, nec subire spem ejus ut occisi, quem sors ipsius peremit. 6. Temeraria & faciles pollicitationes. Sanè hæ agyrtarum & circumforaneorum propriæ, qui tam citò se morbos expugnatos jactitare solent, quàm citò vulpes pyrum est. Vir honestus rationalis Medicus est, mavult in arte conjecturali tacere, quàm temeritatis convinci. 7. Vana Pseudochymicorum promissa. Nihil apud istos frequentius, Panaceis Corallorum & aliorum lapidum, è quibus sæpe nihil præter salem elicias, tincturis, essentiis, &c. Unico remedio omnes febres, omnes fluxus, omnes à quacunque tandem causa exortos morbos prosligant. Autoritate Naudæi, Petrai, Sennerti, Billichii, Eichstadii loquor. Studiose juventus his decepta, sumtuum, temporis, occasionum, eruditionis & modestiæ jacturam patitur, & pro auro carbones invenit. Felix in praxi successus, multos in transversum soler agere. Secundæ quippe res efferunt animos, & difficile est blandiente fortuna tenere modum. Hinc, 1. Arrogantia, quâ

quâ fit, ut Dei obliti, proprio genio successum felicem multi adscribant. 2. Nimia sui fiducia, quâ fit, ut suetæ felicitati innixi, accuratè agenda & fugienda, non advertant. Unde sæpe opiata dosin suam excedunt, purgantibus non rite paratis OEconomia humani corporis labefactatur, & alia committuntur, quæ Heroës isti in junioribus infamia punirent. 3. Iactantia, dum se & sua mirantur, & iis coram ignara plebe & vanissimis mulierculis, laudibus extollunt, quæ interdum ferreæ frontis hominem rubore suffunderent. 4. Parium & inferiorum contemptus, ac si solis cerebrum & cor Natura formasset, reliqui vel in truncos & stipites abiissent, vel peponem pro corde, fungum pro cerebro, gererent. 5. Calumniandi denique studium, dum *ἐμπειρογέτες τῶν
ἐμπειροῦ* aliorum in curando seu Methodum, etiam accuratissimam, seu remedia etiam exquisitissima, seu industriam etiam singularem, traducunt, nec defunctorum manibus, ipsi interdum vita infames, parcunt. Et hæc quidem ita se habere, vel exemplis comprobari possit. At Medicus, qui Philosophum Deo similem exprimere cupit, pestes istas vitabit. Recordabitur, sortes nostras in manu Dei esse, sæpe egregios Medicos, rationi & experientiæ innixos, *ἐμπειρογέτες*, manum multis morbis frustra admovisse, quos vel circumforaneus stentor, vel anus edentula curavit. Sæpe quos ratio non potuit, temeritatem, ut Celsus ait, sanasse, nec paucos à fortuna in arte medendi evectos, ab eadem, successu temporis, destitutos fuisse, innumeros agros à veteranis derelictos, quos initiati feliciter restituere. In memoriam sibi revocabit, homines qui nullum aliud abominati spiritus premium novere, quàm odisse omnia, ut venena nasci. Menecratis Syracusi infaniam, *ὃς ἐφάρει μέγα ὡς μέγας ἀνὴρ τῷ ἑλῶ τῆς ἀνθρώπων
νόσος* &c. τῆς αὐτῆς ἱατρικῆς, Athenæo l. 7 Dei-
proph.

philosoph. referente, infamiam laborare, & Hippocratem
jurejurando in libro *prænotionum* affirmare, Medi-
cum ratione utentem alterum nunquam invidiose
calumniaturum, sed huic vitio *ἀντιδωκεν ἀνταγωνισ-
τήν*, seu qui forensam quæstum sectantur, magis
obnoxios esse. Sed manum de tabula. Thralonesi-
stos, Medicinæ opprobrio, vivis aliquando colori-
bus depingam. Dicta, quia ardor promovendi Aca-
demicorum studia expressit, grato quoque scio ex-
cipientur ab iisdem animo. Faxit Deus, ut in stu-
dio Medico & virtute feliciter progrediantur, & in
Philosophos Deo similes quam primum evadant.
Tantum.

Gratiâ Tibi, Domine JESU.





1600/07

296/400503664



